



Buprenorfina



Via de administracion: transdérmica

Parches: Transtec® 20 mg (**35 mcg/hr**)
Norspan® 5 mg (**5 mcg/hr**)
10 mg (**10 mcg/hr**)
20 mg (**20 mcg/hr**)

Dosis Máxima: Sin dosis máxima

Inicio de acción: retardo de 12 hrs de inicio de 1er parche

Dosis inicial: 1/4 a 1/2 de parche.

Habitualmente se inicia luego de titular dosis con otro opiáceo

Cambio parche: Transtec: c/ 3,5 días, Norspan c/7 días

Falla renal: Se puede usar

Método de aplicación: en piel no irritada sobre superficie lisa y exenta de vello. No aplicar sobre grandes cicatrices. Lugares preferibles: parte superior de espalda o sobre el pecho, bajo la clavícula. Cortar vello con tijera (no afeitarlo)

Equivalencia:

Parche de 35 mcg/hr (*Transtec*)= 60 mg de morfina oral día
Parche de 20 mcg/hr (*Norspan*)= 34 mg de morfina oral día
Parche de 10 mcg/hr (*Norspan*)= 17 mg de morfina oral día
Parche de 5 mcg/hr (*Norspan*)= 8 mg de morfina oral día

Al rotar opioides reduzca 30-50% la dosis

