

1. Was ist die Wahrscheinlichkeit ...

(a) ...eine 6 zu würfeln?

**Lösung:**

$$P(6) = \frac{1}{6}$$

(b) ...*keine* 6 zu würfeln?

**Lösung:**

$$P(\text{keine } 6) = \frac{5}{6}$$

Beide Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu 1.

(c) ...eine Zahl kleiner als 3 zu würfeln?

**Lösung:**

$$P(< 3) = \frac{2}{6}$$

Beide Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu 1.

(d) ...eine Zahl zu würfeln, die *nicht* kleiner ist als 3?

**Lösung:**

$$P(\text{nicht } < 3) = \frac{4}{6}$$

Auch diese beiden Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu 1.

(e) ...aus einem Kartenspiel den Herzbuben zu ziehen?

**Lösung:**

Wir gehen von einem Kartenspiel mit 32 Karten aus.

$$P(\text{Herzbube}) = \frac{1}{32}$$

(f) ...aus einem Kartenspiel *nicht* den Herzbuben zu ziehen?

**Lösung:**

Es gibt 31 Karten, die nicht der Herzbube sind.

$$P(\text{kein Herzbube}) = \frac{31}{32}$$

Wieder summieren sich die Wahrscheinlichkeiten zu 1.

- (g) ...aus einem Kartenspiel den Herzbuben oder das Kreuz-As zu ziehen?

**Lösung:**

Dasselbe wie für den Herzbuben, nur gibt es diesmal 2 Trefferkarten:

$$P(\text{Herzbube oder Kreuz-As}) = \frac{2}{32}$$

- (h) ...aus einem Kartenspiel irgendeine Karte *außer* Herzbube oder Kreuz-As zu ziehen?

**Lösung:**

Es gibt 30 Karten, die weder Herzbube, noch Kreuz-As sind:

$$P(\text{nicht Herzbube und auch nicht Kreuz-As}) = \frac{30^{15}}{32^{16}}$$

Und wieder summieren sich die beiden Wahrscheinlichkeiten zu 1.

- (i) ...mit zwei Würfeln insgesamt höchstens 4 Augen zu werfen?

**Lösung:**

Es gibt 6 Möglichkeiten:  $E_i = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (1,3), (3,1)\}$ . Also ist  $P(E_i) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

- (j) ...mit zwei Würfeln insgesamt mindestens 5 Augen zu werfen?

**Lösung:**

Das ist genau das Gegenteil: Wenn wir *nicht* höchstens 4 Augen werfen, so haben wir mindestens 5. Also gilt wieder:

$$E_j = 1 - E_i = \frac{36 - 6}{36} = \frac{5}{6}$$

- (k) Nehmen wir an, die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 15 Minuten ein gelbes Auto vorbeifährt, liegt exakt bei 21,7 %. Was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 15 Minuten *kein* gelbes Auto vorbei fährt?

**Lösung:**

Eines dieser beiden Möglichkeiten *muss* passieren: Entweder, es fährt ein gelbes Auto vorbei, oder eben nicht. Es kann auch nicht beides gleichzeitig passieren. Beide Wahrscheinlichkeiten addieren sich also wieder zu 1, bzw muss wieder gelten:

$$P(\text{kein gelbes Auto}) = 1 - P(\text{gelbes Auto}) = 1 - 0,217 = 0,783$$

- (l) Nimm an, wir haben ein Ereignis  $E$ . Das könnte irgendetwas sein (Glücksrad, Würfeln, Kartenspiel, Wahlergebnis, was auch immer). Wir wissen, dass  $E$  eine

Wahrscheinlichkeit von  $\frac{7}{12}$  hat. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass  $E$  *nicht* eintritt?

**Lösung:**

Und schon wieder, nur noch ein Stückchen allgemeiner formuliert:

$$P(\text{nicht } E) = 1 - P(E) = \frac{12 - 7}{12} = \frac{5}{12}$$

- (m) Ganz allgemein: Wenn wir die Wahrscheinlichkeit  $P(E)$  für ein Ereignis kennen, was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis  $E$  gerade eben *nicht* eintritt?

**Lösung:**

Und genau diese Formel ist, worum es sich hier immer wieder drehte. Wir können ganz allgemeingültig feststellen:

$$P(\text{nicht } E) = 1 - P(E)$$