UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL PARAGUAY

5TO SEMESTRE

Dra Alicia González

Anatomía Patológica

Unidad I:

Tema: Adaptación Celular

Atrofia:

La **disminución en el tamaño de la célula** por pérdida de sustancia celular, se conoce como **Atrofia.**

La atrofia puede ser:

1-Fisiológica: es común en principios del desarrollo algunas estruturas tales como la notocorda y el conducto tirogloso, sufren atrofia durante el desarrollo fetal.

2-Patológica: depende de la causa y puede ser localizada o generalizada.

ATROFIA







Figura 8. Forma de inmovilizar una fractura de cúbito, de radio o ambos (antebrazo).






ATROFIA


Newborn
4 years
Puberty
Adult
(nulliparous)
Adult
(parous)
Adult
(postmenopausal)
A. Netter MD


cm
SPECIMEN S-3239-84 DATE 5-6-84





METAPLASIA


La metaplasia es un cambio reversible por el cual una célula de tipo adulto se sustituye por otro tipo celular adulto. Puede presentar una sustitución adaptativa de células sensibles al estrés por tipos más capacitados

La metaplasia más frecuente es la **columnar a escamosa**


Ej: en el fumador el epitelio respiratorio de la tráquea y bronquios es sustituido por epitelio escamoso estratificado


Basement membrane
Normal columnar epithelium
Squamous metaplasia
A
B





Estas dos vistas endoscópicas demuestran **áreas del** esófago de Barrett con **eritema mucoso** del esófago inferior, con **islas de** mucosa escamosa



Una causa común de inflamación es el llamado "esófago de Barrett" con metaplasia epitelial a la mucosa de tipo gástrico por encima de la unión gastroesofágica. La metaplasia resulta de la enfermedad crónica por reflujo gastroesofágico (ERGE). Observe el **epitelio columnar** a la izquierda y el **epitelio escamoso** a la derecha. Esta es la mucosa de Barrett "típica", porque también hay metaplasia intestinal (observe las células caliciformes en la mucosa columnar).






Fig. 11.12 Barrett esophagus featuring secretion of acidic mucin, as demonstrated with Alcian blue s



Diagnosis	Intestinal metaplasia of the urothelium
Description	Colonic-type glands in the lamina propria. The mucosal fragment is lined by urothelium.
Clin.Findings	Urinary bladder cancer
Stain	Haematoxylin & Eosin (H&E)


1
2
3
4

- Láminas para hoy
- Atrofia testicular
- Esófago de Barret

Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com

Atrofia testicular


Órgano: Testículo


- Proceso: Adaptativo

- Alteraciones: Parénquima testicular con desaparición del epitelio tubular, túbulos pequeños, escleróticos, áreas de fibrosis intersticial. Y aumento de células de Leydig.

- DX PRESUNTIVO: ATROFIA TESTICULAR


cm
SPECIMEN S-3239-84 DATE 5-6-84


Sertoli
Interstizio
Interstizio
Leydig



Esofago de barret


ORGANO: Esófago

PROCESO: Adaptación Celular (metaplasia)

ALTERACIONES: fragmentos de epitelio escamoso esofágico con reemplazo por epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes.


DIAGNOSTICO: Esófago de Barret

Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com



Una causa común de inflamación es el llamado "esófago de Barrett" con metaplasia epitelial a la mucosa de tipo gástrico por encima de la unión gastroesofágica. La metaplasia resulta de la enfermedad crónica por reflujo gastroesofágico (ERGE). Observe el **epitelio columnar** a la izquierda y el **epitelio escamoso** a la derecha. Esta es la mucosa de Barrett "típica", porque también hay metaplasia intestinal (observe las células caliciformes en la mucosa columnar).

Bienvenidos al mundo maravilloso de la patología!!!!



LA PATOLOGIA ES EL ARTE DE MIRAR..



