UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL PARAGUAY

5TO SEMESTRE

Dra Alicia González

Anatomía Patológica

Unidad I:

Tema: LESION CELULAR

Lesión celular:

"La lesión celular es resultado de un **estrés celular** tan intenso que las células ya **no** son capaces de adaptarse a una exposición celular o a agentes inherentemente lesivos"

Lesión irreversible: Necrosis

MORFOLOGÍA

1- Eosinofilia aumentada

2- Figuras de Mielina


3- Cambios nucleares:

- Cariólisis: La basofilia de la cromatina puede desvanescerse

- Picnosis: encogimiento nuclear

- Cariorrexis: los núcleos o parcialmente pignóticos sufren fragmentación . Con el paso del tiempo el núcleo de la célula necrótica desaparece completamente.

KARYOLYSIS | **PYKNOSIS** | **KARYORRHEXIS**



Nuclear fading | **Nuclear shrinkage** | **Nuclear fragmentation**


chromatin dissolution due to action of DNAases & RNAases

DNA condenses into shrunken basophilic mass

Pyknotic nuclei membrane ruptures & nucleus undergoes fragmentation

Nuclear dissolution

ANUCLEAR NECROTIC CELL



Lesión celular irreversible y muerte celular


Existen dos tipos de muerte celular: la necrosis y la apoptosis que difieren en su morfología, mecanismos y papeles en la enfermedad y la fisiología

Morfología de la lesión celular irreversible

Formas de necrosis:


1. Coagulativa hemorragica/isquémica
2. Colicuativa o de licuefacción
3. Caseosa
4. Grasa
   . Enzimática
   . Traumática
5. Gangrenosa
   Seca
   Húmeda

Necrosis por coagulación o hemorragica






shutterstock.com · 725687557


Infarto Rojo




4
5
6


A
B
C
D









NECROSIS COAGULATIVA O ISQUÉMICA


INFARTO BLANCO






NECROSIS COAGULATIVA: INFARTO DE MIOCARDIO







Miocardiócitos têm núcleos centrais
Miocardiócitos perderam os núcleos


Necrosis Caseosa


Una forma muy distintiva de necrosis por coagulación se encuentra a menudo en focos de **infección tuberculosa.** El termino caseoso deriva de la apariencia macroscópica blanca en aspecto de queso del área de necrosis.


Micro: en el foco necrótico aparecen residuos granulares amorfos rodeados por un reborde inflamatorio bien definido, conocido como **reacción granulomatosa.** A diferencia de la necrosis por coagulación la arquitectura está **completamente alterada.**






Célula gigante
Macrófago activado
Necrosis caseosa
Fibroblasto
Linfocito
a









Figura 4.16.


A la izquierda, célula gigante de Langhans: núcleos dispuestos en forma de herradura; a la derecha, células gigantes de reacción a cuerpo extraño: núcleos algo vesiculosos, dispuestos irregularmente con nucléolos prominentes.

Necrosis Grasa

Es resultado de áreas focales de **destrucción grasa** que ocurren como resultado de liberación **de enzimas pancreáticas activadas en el páncreas y en cavidad peritoneal.**

En este trastorno las **enzimas pancreáticas** activadas se escapan de las células y los conductos acinares, las enzimas activadas licuan las membranas de las células adiposas y **las lipasas activadas** escinden los esteres de triglicéridos contenidos en las células grasas.






- Láminas para hoy
- Necrosis Coagulativa Isquémica
- Necrosis Caseosa


- ORGANO: CORAZON

- PROCESO: NECROSIS COAGULATIVA ISQUEMICA

- ALTERACIONES: Se observan cardiomiocitos anucleados por proceso de cariolisis, infiltrado de neutrófilos y áreas de hemorragia

- DX PRESUNTIVO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO


Miocardiócitos têm núcleos centrais
Miocardiócitos perderam os núcleos



- 4-Órgano: OVARIO

- Proceso: Inflamatorio Crónico granulomatoso/necrosis caseosa

- Alteraciones: Proceso inflamatorio crónico granulomatoso, con presencia de linfocitos, células epitelioides, células plasmáticas, fibroblastos, células gigantes multinucleadas de tipo Langhans y necrosis caseosa.

- Diagnostico: Tuberculosis



GRACIAS !!