
Cátedra De Anatomía Patológica

Dra. Alicia. González

INFLAMACION

Dra. Alicia González/ ali.glez2303@gmail.com

Introducción



Dra. Alicia González/ ali.glez2303@gmail.com

Inflamacion cronica

- De duración prolongada (semanas y meses) ocurriendo simultáneamente la inflamación activa
- Destrucción tisular
- Intentos de reparación
- Puede surgir de una inflamación aguda, insidiosa, solapada, asintomática, siendo está última causa de inflamación crónica que provoca daño celular, en enfermedades como aterosclerosis, artritis reumatoide, LES, neuropatías, TBC , etc

Tabla 2-1 Características de la inflamación aguda y crónica


Característica	Aguda	Crónica
Aparición	Rápida: minutos a horas	Lenta: días
Infiltrado celular	Principalmente neutrófilos	Monocitos/macrófagos y linfocitos
Lesión tisular, fibrosis	Suele ser leve y autolimitada	Suele ser grave y progresiva
Signos locales y sistémicos	Prominentes	Menos prominentes; pueden ser sutiles


Tiroiditis de Hashimoto


- Órgano: Glándula Tiroides
- Proceso: Inflamatorio Crónico

- Alteraciones: Proceso inflamatorio crónico con formación de centros germinales, además folículos tiroideos atróficos y residuales; además de áreas de fibrosis.


- Diagnostico: Tiroiditis de Hashimoto







TIROIDITIS DE HASHIMOTO





Pielonefritis Crónica


- Órgano: Riñón.
- Proceso: Inflamatorio Crónico


- Alteraciones: Proceso inflamatorio crónico tubulointersticial, con atrofia tubular “tiroidizacion” y áreas de fibrosis.

- Diagnostico: Pielonefritis Crónica.











Colecistitis Crónica / Colesterolosis


- Órgano: Vesícula Biliar
- Proceso: Inflamación Crónica-Acumulos Intracelulares


- Alteración: Proceso Inflamatorio Crónico con presencia de linfocitos aislados y en nidos, hipertrofia de la capa muscular con acentuación de los senos de Rokitansky-Aschoff, además se observan macrófagos espumosos en la lamina propia.


- Diagnostico: Colecistitis Crónica/Colesterolosis
















ORGANO: HIGADO


- PROCESO: INFLAMATORIO CRONICO/ ACUMULOS INTRACELULARES


- ALTERACIONES: Parénquima hepático con histoarquitectura alterada y reemplazada por nódulos regenerativos , separados por tabiques de tejido conectivo. Se observan además hepatocitos con vacuolas lípidicas, e infiltrado inflamatorio cronico sobreagregado


- Dx: Cirrosis hepática /Esteatosis hepática














Gracias!!

Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com