sinus.

ANATOMÍA PATOLÓGICA I · 2ª PARCIAL · DRA. ELIANA CHAMORRO

Caderno de *questões*.

As questões das provas da Dra. Chamorro e dos bancos Robbins e PEF que ela usa, com o enunciado igual ao original, para resolver como na prova.

176	98	48	26	4
QUESTÕES	MÚLTIPLA ESCOLHA	CITA	COMPLETA	VERDADERO O FALSO

TEMAS

01	Necrosis	23 questões · 1–23
02	Apoptosis	8 questões · 24–31
03	Acumulación: lípidos y glucógeno	13 questões · 32–44
04	Proteínas, amiloide, calcio	22 questões · 45–66
05	Pigmentos	13 questões · 67–79
06	Inflamación aguda	94 questões · 80–173
07	Fora do slide atual	3 questões · 174–176

COMO USAR

Este caderno traz **só as questões**, para resolver como na prova. As respostas certas e o porquê de cada alternativa estão no **banco respondido**, a outra versão deste PDF.

Os enunciados estão em espanhol, como na prova. As explicações estão em português. A fonte de cada questão aparece em cima dela, com as páginas do PDF das provas originais.

TEMA

01 Necrosis

23 questões · 1 a 23

1 P2 · foto, questões 9 a 14 · questão 13 — MÚLTIPLA ESCOLHA

Mujer de 29 años con una comunicación interventricular lleva 3 semanas con fiebre persistente de 38,6 °C y cefalea. Una TAC craneal muestra una lesión en anillo de 3 cm, de contenido licuado, que capta contraste en el lóbulo parietal derecho del encéfalo. ¿Cuál de las siguientes acciones de las células inflamatorias es más probable que haya producido este hallazgo en la TAC?

A Elaboración de óxido nítrico por los macrófagos

B Formación de inmunoglobulinas por linfocitos B

C Liberación de enzimas lisosómicas por los neutrófilos

D Producción de interferón γ por linfocitos T

2 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 2 — CITA

Patrones de necrosis que presentan digestión enzimática.

3 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 4 — COMPLETA

Picnosis es un cambio nuclear caracterizado por _____ nuclear y aumento de basofilia (la cromatina se condensa en una masa basófila sólida).

4 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 10 — CITA

Mujer de 75 años sufrió pérdida de conocimiento. No puede hablar ni mover el brazo derecho a causa de una oclusión de la arteria cerebral media izquierda.

5 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 12 MÚLTIPLA ESCOLHA

Al microscopio óptico, en un patrón de lesión celular irreversible, se podrá observar de forma característica:

A Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma de las células
B Presencia de masas de fosfolípidos llamadas figuras de mielina
C Formación de vesículas en las membranas plasmáticas
D Aumento de la acidofilia por medio de ARN citoplasmático

6 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 19 MÚLTIPLA ESCOLHA

Hombre de 55 años que tiene DM mal controlada hace 15 años presentó una extensa coloración negra de la piel y tejidos blandos del pie derecho con áreas de exudado amarillento. Se cultiva Staphylococcus aureus y se realiza la amputación. ¿Cuál de las siguientes anomalías patológicas tiene más probabilidad de mostrar la muestra recibida en el laboratorio?

A Apoptosis patológica
B Infarto rojo
C Gangrena húmeda
D Necrosis caseosa

7 P1 · Turma C · questão 2 CITA

Dos patrones de necrosis que presentan primariamente desnaturalización de proteínas:

8 P1 · Turma C · questão 4 COMPLETA

La _____ es un cambio nuclear caracterizado por pérdida de basofilia de la cromatina debido a la disolución nuclear por degradación enzimática.

9 P1 · Turma C · questão 10 CITA

Paciente de 70 años presenta un cuadro respiratorio de meses de evolución, y a nivel del vértice del pulmón derecho se observan imágenes granulomatosas.

10 P1 · Turma C · questão 12 — MÚLTIPLA ESCOLHA

Al microscopio óptico, en un patrón de lesión celular reversible, se podrá observar:

A. Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma de la célula
B. Presencia de masas de fosfolípidos y figuras de mielina
C. Calcificación [...] que genera carbonatos de calcio
D. Aumento de eosinofilia por pérdida de ARN en el citoplasma

11 P1 · Turma C · questão 18 — MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente de sexo femenino de 30 años de edad con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, enfermedad donde se producen reacciones inflamatorias de etiología inmunológica.

A. Necrosis fibrinoide
B. Gangrena húmeda
C. Infarto blanco
D. Granuloma necrosado

12 1° Parcial + Recuperación · questão 3 — CITA

Mujer de 30 años fallece por lupus eritematoso sistémico, enfermedad donde hay reacciones inflamatorias de etiología inmunológica que han afectado las paredes de los vasos sanguíneos.

13 1° Parcial + Recuperación · questão 6 — CITA

Dos cambios nucleares que se encuentran en una célula necrótica (no se aceptan descripciones).

14 1° Parcial + Recuperación · questão 7 — COMPLETA

Los infartos que macroscópicamente presentan una forma de cuña, que se clasifican según su color, corresponden histológicamente a una necrosis _____.

15 1° Parcial + Recuperación · questão 11 MÚLTIPLA ESCOLHA

Al microscopio electrónico, en un patrón de lesión celular reversible, se podrá observar:

A Rotura de la membrana plasmática
B Dilatación masiva de la mitocondria
C Presencia de figuras de mielina
D Aumento de acidofilia

16 1° Parcial + Recuperación · questão 14 MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de los siguientes trastornos clínicos se asocia a necrosis licuefactiva?

A Infección aguda por el virus de la hepatitis B
B Lesión vascular en el pie derecho de un paciente diabético
C Infarto del miocardio en paciente con aterosclerosis
D Infarto cerebral por trombosis

17 1° Parcial + Recuperación · questão 15 MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de los siguientes cambios morfológicos es más probable que apunte a una necrosis tubular aguda?

A Aumento de basofilia
B Pérdida de microvellosidades
C Tumefacción de las mitocondrias
D Núcleos que sufren fragmentación

18 1° Parcial + Recuperación · questão 20 MÚLTIPLA ESCOLHA

Mujer de 78 años perdió el conocimiento de repente; no podía hablar ni mover el brazo derecho. A los dos meses una tomografía mostró una gran área quística en el lóbulo parietal izquierdo. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en el encéfalo?

A Necrosis gangrenosa con formación de cavitaciones
B Infiltrados neutrofílicos con restos licuados
C Lesión granulomatosa que presenta células multinucleadas
D Granuloma que presenta centralmente depósitos de inmunocomplejos

19 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 36 CITA

La necrosis observada en el trastorno de una infección por bacteria piógena es un ejemplo de:

20 Banco Robbins · Inflamación · questão 12 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 94 años ha presentado fiebre y tos durante los últimos 2 días. Se realiza un cultivo de Staphylococcus aureus en su esputo. Recibe un tratamiento antibiótico. Dos semanas después ya no tiene tos productiva, pero sigue teniendo fiebre. Una radiografía de tórax revela una densidad redondeada de 3 cm en el lóbulo inferior derecho cuyo contenido licuado forma un nivel hidroaéreo central. No hay infiltrados circundantes. ¿Cuál de las siguientes es la mejor descripción de este resultado de su neumonía?

A Cicatriz hipertrófica
B Formación de abscesos
C Regeneración
D Carcinoma broncogénico
E Inflamación crónica
F Cavitación granulomatosa

21 Banco Robbins · Inflamación · questão 20 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 55 años tiene antecedentes de hipercolesterolemia con enfermedad de la arteria coronaria y sufrió un infarto de miocardio hace 2 años. Ahora presenta un dolor torácico subesternal opresivo. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio es más útil para diagnosticar la causa de su dolor torácico?

A Aumento del recuento de glóbulos blancos
B Tasa de sedimentación elevada
C Disminución del complemento sérico
D Aumento de la troponina sérica
E Recuento de plaquetas disminuido
F Aumento del colesterol sérico

22 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 22 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 24 años sexualmente activa ha notado dolor abdominal bajo en el último día. Su temperatura es 37,9 °C y, a la palpación, la parte inferior izquierda del abdomen es muy dolorosa. Los resultados de laboratorio son leucocitos totales de 29.000/mm³ con el 75 % de neutrófilos segmentados, el 6 % de cayados, el 14 % de linfocitos y el 5 % de monocitos. La laparotomía pone de manifiesto una trompa de Falopio enrojecida, distendida y llena de líquido que está a punto de romperse. Se realiza una salpingectomía izquierda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable observar en el examen microscópico de la trompa de Falopio resecada?

A Proliferación fibroblástica
B Células gigantes de Langhans
C Necrosis por licuefacción
D Infiltrados mononucleares
E Metaplasia escamosa

23 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 26 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 92 años es diagnosticada de neumonía por Staphylococcus aureus y recibe un ciclo de tratamiento antibiótico. A las 2 semanas ya no tiene tos productiva, pero aún presenta una temperatura de 38,1 °C. La TC de tórax muestra los hallazgos de la figura. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor la evolución de la neumonía de la paciente?

A Formación de abscesos

B Resolución completa

C Cicatrices fibrosas

D Inflamación crónica

E Regeneración tisular

TEMA

02 Apoptosis

8 questões · 24 a 31

24 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 1 — CITA

Dos enzimas involucradas en el proceso de muerte por apoptosis.

25 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 9 — CITA

La muerte causada por el aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, que permite la activación de sustancias citosólicas...

26 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 14 — MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Qué trastorno clínico se asocia con una apoptosis fisiológica?

A) Infección en el pie derecho en un paciente diabético
B) Paciente con demencia por enfermedad de Parkinson
C) Verrugas cutáneas en pacientes con infección por papilomavirus
D) Eliminación de las membranas interdigitales para la formación de los dedos

27 P1 · Turma C · questão 8 — CITA

Cuadro comparativo: características entre apoptosis y necrosis (membrana plasmática, inflamación, tamaño celular, contexto).

28 P1 · Turma C · questão 9 — CITA

La muerte causada por aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa causa a veces la salida de unas proteínas al citosol.

29 P1 · Turma C · questão 14 MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Qué trastorno clínico se asocia con apoptosis patológica?

A Infección en el pie derecho en un paciente diabético
B Paciente con demencia por enfermedad de Parkinson
C Verrugas cutáneas en un paciente con infección por papilomavirus
D Disminución del flujo sanguíneo miocárdico por aterosclerosis coronaria

30 P1 · Turma C · questão 17 MÚLTIPLA ESCOLHA

En el estudio de la infección por VIH se observa a los linfocitos T citotóxicos provocando la muerte de las células infectadas por el virus. ¿Cuál de las siguientes sustancias inicia la muerte celular programada?

A BCL2
B Endonucleasas
C Caspasas
D Gen TP53

31 1° Parcial + Recuperación · questão 8 COMPLETA

Las células tienen mecanismos por los cuales reparan el daño en el ADN, aunque cuando la afectación es demasiado grave la célula inicia un proceso de muerte que corresponde a _____.

TEMA

03 Acumulación: lípidos y glucógeno

13 questões · 32 a 44

32 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 3 — CITA

Dos componentes principales de las placas arterioscleróticas.

33 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 6 — COMPLETA

La tinción _____ da una coloración azul negra a depósitos intracelulares excesivos de triglicéridos.

34 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 15 — MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de los siguientes corresponde a una complicación de las placas ateromatosas?

A Taponamiento
B Rotura del músculo papilar
C Hemorragia pericárdica
D Formación de aneurismas

35 1° Parcial · Anatomía Patológica I · questão 16 — MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de las siguientes coloraciones sería la preferible para evidenciar adecuadamente la presencia de acumulaciones intracelulares en la glucogenosis tipo IV?

A Hematoxilina y eosina
B Tricrómica de Mallory
C Ácido peryódico de Schiff
D Aceite rojo O

36 P1 · Turma C · questão 1 — CITA

Dos rasgos macroscópicos presentes en el hígado con esteatosis:

37 P1 · Turma C · questão 3 CITA

Dos cambios patológicos que pueden sufrir las placas ateroscleróticas:

38 P1 · Turma C · questão 6 COMPLETA

La tinción con carmín de Best o PAS da lugar a una coloración rosa violácea al depósito de _____.

39 P1 · Turma C · questão 15 MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo adquirido para el desarrollo de ateromas?

A Sexo masculino
B Consumo moderado de alcohol
C Síndrome metabólico
D Aumento del colesterol LDL

40 1° Parcial + Recuperación · questão 1 CITA

Vesícula biliar con patrón en fresa, muestra microscópicamente numerosos [macrófagos] espumosos en la lámina propia.

41 1° Parcial + Recuperación · questão 4 CITA

Dos factores de riesgo no modificables para el desarrollo de placas ateromatosas.

42 1° Parcial + Recuperación · questão 5 CITA

Dos tinciones específicas para evidenciar las acumulaciones intracelulares de glucógeno.

43 1° Parcial + Recuperación · questão 17 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 69 años ha sufrido [episodios isquémicos] transitorios en los últimos 3 meses. En la [carótida] derecha se reseca una placa ateromatosa de aspecto firme, color amarillo oscuro a simple vista. Microscópicamente, ¿qué sustancias podemos encontrar en abundancia?

A Triglicéridos y lipoproteínas
B Colesterol y ésteres de colesterol
C Fosfolípidos y ácidos grasos libres
D Triglicéridos y [...]

44 1° Parcial + Recuperación · questão 19 MÚLTIPLA ESCOLHA

Hombre de 73 años consulta por dolor abdominal; en el examen el hígado mide dos veces el tamaño normal, amarillo, de superficie lisa. Microscópicamente se muestran numerosas vacuolas transparentes en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la posible causa de las alteraciones del paciente?

A Infección por el virus de hepatitis
B Alimentación rica en fibras
C Consumo de alcohol
D Anemia hemolítica

TEMA

04 Proteínas, amiloide, calcio

22 questões · 45 a 66

45 P2 · Turma C · questão 4 — COMPLETA

La tinción _____ muestra depósito de material amiloide de color verde manzana al observar al microscopio de luz polarizada.

46 P2 · Turma C · questão 7 — COMPLETA

En el proceso de calcificación patológica, la organela en la que se deposita el calcio es _____.

47 P2 · Turma C · questão 8 — COMPLETA

En la deficiencia de alfa-1 antitripsina se observan depósitos globulares eosinófilos de una proteína en los hepatocitos; su carencia causa en los pacientes _____.

48 P2 · Turma C · questão 10 — CITA

Mujer sana de 73 años cae por las escaleras y se lesiona la cadera derecha. No hay fractura, pero la radiografía revela calcificación de las pequeñas arterias musculares laterales al útero.

49 P2 · Turma C · questão 11 — CITA

¿Cuál de los siguientes depósitos corresponde a una calcificación distrófica?

50 P2 · Turma C · questão 13 CITA

El término hialino corresponde a:

51 P2 · Turma D · questão 1 CITA

Cita dos patologías que cursan con depósitos de amiloide.

52 P2 · Turma D · questão 4 COMPLETA

Paciente masculino de 65 años consulta por palpitaciones. El ecocardiograma informa aurícula izquierda agrandada con área valvular mitral de 1 cm (reducida), en donde se constata calcificación de tipo _____.

53 P2 · Turma D · questão 6 COMPLETA

Se denomina hialina de Mallory a la acumulación de _____ en células hepáticas relacionadas con el consumo de alcohol.

54 P2 · Turma D · questão 11 MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de las siguientes alteraciones es posible encontrar en los cuerpos de psamoma?

A Ateromas de aterosclerosis avanzada
B Válvulas cardíacas de ancianos
C Ganglios linfáticos tuberculosos
D Carcinoma papilar de tiroides

55 P2 · Turma D · questão 14 MÚLTIPLA ESCOLHA

Con respecto al depósito de material amiloide es correcto afirmar que:

A La tinción usada comúnmente para su visualización es rojo Congo
B Las sustancias insolubles se depositan en el citoplasma de las células
C La amiloidosis [...] es la forma más frecuente de la amiloidosis senil
D En la amiloidosis secundaria se acumulan amiloides de cadena ligera de las células plasmáticas

56 P2 · Turma D · questão 16 MÚLTIPLA ESCOLHA

Los cuerpos de Russell en las células plasmáticas del bazo de un hombre de 60 años están llenos de:

A Transtiretina
B AAT (α1-antitripsina)
C Inmunoglobulina
D β2-microglobulina

57 P2 · Turma D · questão 20 MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente masculino de 65 años, conocido portador de enfermedad renal crónica, con diálisis 3 veces por semana, acude a la consulta por dolor en la mano izquierda. Se evidencian depósitos de calcio en las articulaciones carpometacarpianas. En la prueba de laboratorio muestra una calcemia de 15,4 (valores normales [...]).

A Calcificación metastásica
B Calcificación idiopática
C Calcificación distrófica
D Calcificación senil

58 Segunda prueba de regularización · 2024 · questão 1 CITA

2 patologías que presentan una amiloidosis sistémica reactiva (secundaria):

59 Segunda prueba de regularización · 2024 · questão 4 COMPLETA

Paciente masculino de 65 años consulta por palpitaciones, el ecocardiograma informa aurícula izquierda agrandada con área valvular mitral de 1 cm (reducida), en donde se constata calcificación de tipo _____.

60 Segunda prueba de regularización · 2024 · questão 6 COMPLETA

Los cuerpos de Russell en las células plasmáticas del bazo de un hombre de 60 años están cargados de _____.

61 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 1 CITA

2 tipos de calcificación patológica:

62 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 3 CITA

Mujer sana de 73 años cae por las escaleras y se lesiona la cadera derecha. No hay fractura, pero la radiografía revela calcificación de las pequeñas arterias musculares laterales al útero.

63 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 8 MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la calcificación distrófica?

A Es altamente sugestiva de una enfermedad renal crónica
B Se observa en pacientes con hiperparatiroidismo primario
C Puede observarse en placas ateromatosas complicadas
D Es frecuente en la intoxicación por vitamina D

64 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 5 COMPLETA

La calcificación _____ se caracteriza por depósitos de calcio en tejidos viables como consecuencia de hipercalcemia secundaria a un aumento de PTH.

65 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 13 CITA

Hombre de 67 años falleció debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. En la autopsia el corazón pesa 580 g (normal 330 g) y muestra hipertrofia del ventrículo izquierdo y área valvular aórtica disminuida. El hallazgo bioquímico sérico solicitado antes fue normal. ¿Qué tipo de calcificación patológica explica mejor la afectación de la válvula aórtica?

66 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 16 MÚLTIPLA ESCOLHA

Los cuerpos de psamoma corresponden a un tipo de calcificación:

A Displásica
B Distrófica
C Metastásica
D Atrófica

TEMA

05 Pigmentos

13 questões · 67 a 79

67 P2 · Turma C · questão 1 — CITA

Cite 2 pigmentos de hemoglobina:

68 P2 · Turma C · questão 5 — COMPLETA

Las llamadas células de insuficiencia cardíaca corresponden a macrófagos alveolares cargados de _____.

69 P2 · Turma C · questão 9 — CITA

Una paciente de 4 años... [enunciado cortado en la transcripción]

70 P2 · Turma C · questão 15 — MÚLTIPLA ESCOLHA

Con respecto a la neumoconiosis [antracosis] es correcto afirmar que (tiene dos respuestas correctas):

A. Se observa en los pulmones de casi todos los adultos
B. Es más pronunciada en pacientes fumadores
C. No suele provocar ninguna reacción de lesión tisular
D. La exposición prolongada a partículas orgánicas e inorgánicas casi siempre se produce en lugar del tabaco

71 P2 · Turma D · questão 2 — CITA

Cita pigmentos endógenos que no causan daño a la célula.

72 P2 · Turma D · questão 10 CITA

Una mujer de 22 años tiene anemia congénita y ha recibido transfusiones durante muchos años. Ahora tiene un color bronce más oscuro en la piel por depósito de sustancias:

73 P2 · Turma D · questão 15 MÚLTIPLA ESCOLHA

Analiza los siguientes enunciados sobre acumulación intracelular de pigmentos. 1. Para confirmar los depósitos de hemosiderina se utiliza la tinción azul de Prusia. 2. Las células de insuficiencia cardíaca corresponden a macrófagos alveolares cargados de biliverdina. 3. El pigmento de lipocromo es un indicador de lesión por radicales libres y peroxidación lipídica. 4. La antracosis se produce por exposición prolongada a sustancias inhaladas, como el carbón, e induce una reacción fibroblástica en los pulmones. De estas, ¿cuáles corresponden a respuestas correctas?

A 1 y 3
B 1 y 4
C 2 y 3
D 3 y 4

74 P2 · foto, questões 9 a 14 · questão 9 MÚLTIPLA ESCOLHA

Con respecto a la antracosis es correcto afirmar que:

A Están relacionadas a enfermedades pulmonares ocupacionales
B Puede inducir una reacción fibroblástica en los pulmones
C Se debe a la inhalación de sustancias orgánicas e inorgánicas como la sílice y el carbón
D El polvo de carbón es captado por macrófagos alveolares y transportado en ganglios linfáticos traqueobronquiales

75 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 4 CITA

Hombre de 35 años es golpeado en la pierna por un estante que cayó. La piel no está rota; 16 días después presenta una lesión de color amarillo-marrón producida por acumulación de una sustancia:

76 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 6 — COMPLETA

Las llamadas "células de la insuficiencia cardíaca" corresponden a acúmulos de pigmento de _____ dentro de _____.

77 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 7 — COMPLETA

Para confirmar el depósito de pigmento hemosiderínico en un paciente con anemia hemolítica se utiliza la tinción _____.

78 P1 · Turma C · questão 16 — MÚLTIPLA ESCOLHA

Con respecto a la atrofia parda, ¿cuál de los siguientes es correcto?

A) Ocurre en situaciones de pérdida de estimulación endocrina
B) Algunos de los residuos celulares del proceso constituyen los gránulos de hemosiderina
C) Las células atrofiadas intentan aumentar la demanda nutricional
D) Va acompañada de un incremento de vacuolas autofágicas

79 1° Parcial + Recuperación · questão 9 — COMPLETA

Hombre de 70 años presenta atrofia parda en el corazón; en la autopsia el corazón pesa solo 250 g. Microscópicamente se ve que las fibras miocárdicas muestran cantidades excesivas de pigmento _____.

TEMA

06 Inflamación aguda

94 questões · 80 a 173

80 P2 · Turma C · questão 2 — CITA

Dos cambios vasculares característicos de la inflamación aguda:

81 P2 · Turma C · questão 3 — CITA

Dos sustancias quimiotácticas endógenas de origen celular:

82 P2 · Turma C · questão 6 — COMPLETA

Se denomina _____ al movimiento de los leucocitos por los tejidos hacia el sitio de lesión por productos bacterianos.

83 P2 · Turma C · questão 12 — MÚLTIPLA ESCOLHA

Teniendo en cuenta los siguientes mediadores químicos y sus efectos correspondientes, marca la opción correcta:

A) C5b-9 – opsonización
B) TNF – fiebre
C) Leucotrieno C4 – vasodilatación
D) Prostaciclina – aumento de la permeabilidad

84 P2 · Turma C · questão 14 — MÚLTIPLA ESCOLHA

En los siguientes pasos presentes en el reclutamiento de los leucocitos, ¿cuál de ellos se encuentra en orden secuencial?

A) Transmigración, adhesión, fagocitosis
B) Marginación, adhesión, rodamiento
C) Rodamiento, adhesión, diapédesis
D) Migración, adhesión, transmigración

85 P2 · Turma C · questão 16 MÚLTIPLA ESCOLHA

Se realiza una toracocentesis de la cavidad pleural izquierda y se obtienen 500 ml de líquido. ¿Cuál de las siguientes características de este líquido indicaría con mayor probabilidad que se trata de un exudado?

A Alto contenido de proteínas
B Aspecto claro, seroso
C Recuento bajo de leucocitos
D Baja densidad

86 P2 · Turma C · questão 17 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un grupo de pacientes recibe un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). Los hombres adultos tenían insuficiencia cardíaca y artritis de pequeñas articulaciones. Refieren que el fármaco ha presentado ciertos efectos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que refiera el grupo que recibió el fármaco?

A Reducción del dolor articular
B Numerosos episodios febriles
C Mayor tumefacción de los tobillos

87 P2 · Turma C · questão 18 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 58 años ha tenido tos con fiebre durante 3 días. Una radiografía de tórax revela infiltrados en el lóbulo inferior derecho. En un cultivo de esputo crece Streptococcus pneumoniae. La eliminación de estos organismos del parénquima pulmonar se lograría de manera más efectiva mediante la generación de ¿cuál de las siguientes sustancias por el principal tipo de célula inflamatoria que responde a esta infección?

A Prostaglandina E2
B Calicreína
C Leucotrieno B4
D Peróxido de hidrógeno

88 P2 · Turma C · questão 19 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una niña de 4 años ha presentado numerosas infecciones por Staphylococcus aureus desde la lactancia. Las pruebas genéticas muestran un defecto causante de la ausencia de producción de β2-integrinas. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que ocurra por deficiencia de β2-integrina?

A Menor producción de radicales libres (ERO)

B Adhesión neutrofílica inadecuada al endotelio

C Reducción de la fagocitosis de bacterias opsonizadas

D Fracaso del proceso en el cual los leucocitos se colocan sobre el endotelio de forma transitoria

89 P2 · Turma C · questão 20 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 37 años ha tenido náuseas y vómitos durante 5 semanas. Ayer experimentó un episodio de hematemesis. En el examen físico no presenta hallazgos anormales. Se realiza una endoscopia del tracto gastrointestinal superior y se observa una lesión de 1,5 cm de diámetro en el antro gástrico con pérdida de la superficie epitelial. ¿Estos hallazgos son más típicos de cuál de los siguientes procesos patológicos?

A Absceso

B Granuloma

C Gangrena

D Úlcera

90 P2 · Turma D · questão 3 CITA

Cite signos cardinales de inflamación resultantes de la vasodilatación.

91 P2 · Turma D · questão 5 COMPLETA

La _____ es el principal mediador de las fases transitoria inmediata de la inflamación, causante de vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular.

92 P2 · Turma D · questão 7 COMPLETA

En la inflamación aguda, la migración de leucocitos ocurre principalmente a través del endotelio de las _____.

93 P2 · Turma D · questão 8 CITA

Moléculas de adhesión, expresadas en las células endoteliales, importantes para el proceso en el cual los leucocitos de forma individual y en filas se colocan sobre el endotelio de forma transitoria.

94 P2 · Turma D · questão 9 CITA

Las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o sufren lisis, efectos que son facilitados por componentes del plasma sanguíneo:

95 P2 · Turma D · questão 12 MÚLTIPLA ESCOLHA

La pericarditis en "pan con mantequilla" es un ejemplo típico de inflamación de tipo:

A Serosa
B Fibrinosa
C Supurativa
D Ulcerativa

96 P2 · Turma D · questão 13 MÚLTIPLA ESCOLHA

Teniendo en cuenta los siguientes mediadores químicos y sus efectos correspondientes, marca la alternativa correcta:

A Leucotrieno B4 – vasodilatación
B Interleucina 6 – dolor
C C3b – opsonización
D Prostaciclina – aumento de la permeabilidad

97 P2 · Turma D · questão 17 MÚLTIPLA ESCOLHA

En la toracocentesis realizada en la cavidad pleural izquierda se obtiene un líquido amarillento y turbio que tiene un recuento de leucocitos aumentado con predominio de neutrófilos. La tinción de Gram muestra cocos Gram +. ¿Cuál de los siguientes términos describe el proceso?

A Exudado fibrinoso
B Ultrafiltrado de plasma
C Organización y cicatrización
D Exudado purulento

98 P2 · Turma D · questão 18 MÚLTIPLA ESCOLHA

Hombre de 25 años presenta disnea progresiva en las últimas horas; mediante una toracocentesis se obtienen 200 ml de un líquido amarillo ligeramente turbio en la cavidad pleural derecha. El examen citológico del líquido revela múltiples neutrófilos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos contribuye a la acumulación de este líquido pleural?

A Vasoconstricción arteriolar
B Contracción endotelial
C Obstrucción linfática
D Liberación de los lisosomas por los neutrófilos

99 P2 · Turma D · questão 19 MÚLTIPLA ESCOLHA

Hombre de 22 años desarrolla dolor abdominal marcado en el cuadrante inferior derecho. Se realiza una cirugía laparoscópica y el apéndice está hinchado, eritematoso, parcialmente cubierto por exudado amarillento. ¿Cuál de los siguientes mediadores químicos es causante del dolor que experimenta el paciente?

A Complemento C3b e inmunoglobulina G
B IL-1 y TNF
C Prostaglandinas y bradicinina
D Leucotrienos y HPETE

100 Segunda prueba de regularización · 2024 · questão 2 CITA

2 mediadores químicos que causan aumento de la permeabilidad vascular:

101 Segunda prueba de regularización · 2024 · questão 3 CITA

2 fagocitos principales presentes en la reacción inflamatoria aguda:

102 Segunda prueba de regularización · 2024 · questão 5 COMPLETA

La _____ es el principal mediador de la fase transitoria inmediata de la inflamación, causante de dilatación arteriolar y aumento de permeabilidad venular.

103 Segunda prueba de regularización · 2024 · questão 7 COMPLETA

La pericarditis "en pan con mantequilla" es un ejemplo típico de inflamación aguda tipo _____.

104 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 1 MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente femenina de 25 años de edad que, cocinando los alimentos en su casa, sufre quemaduras de la mano con presencia posteriormente de ampollas a ese nivel. ¿Qué tipo de inflamación presentaría y cuál sería la característica de la extravasación?

A Inflamación serosa; líquido con bajo contenido de células
B Inflamación fibrinosa; líquido con red eosinófila de fibrina
C Absceso; líquido con alto contenido de neutrófilos
D Inflamación supurativa; líquido con elevada concentración de proteínas

105 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 2 MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente de 20 años de edad que hace 2 días presenta fiebre elevada, dolor en fosas lumbares y ardor al orinar; en el examen de orina se encuentran leucocitos abundantes. En la respuesta inflamatoria, de los siguientes procesos, ¿cuál se produce más tardíamente?

A Liberación de histamina por degranulación de mastocitos
B Vasodilatación y estasis sanguínea
C Migración de monocitos
D Extravasación de líquido al espacio intersticial

106 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 3 MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente de 18 años de edad, femenina, con el antecedente de padecer una fiebre reumática y que ahora presenta fiebre, soplo cardíaco y un roce pericárdico; se le diagnostica una pericarditis "en pan y manteca", que es un ejemplo típico de inflamación de tipo:

A Serosa
B Fibrinosa
C Supurativa
D Ulcerativa

107 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 4 MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente de 38 años de edad, masculino, fumador, presenta dolor en epigastrio y acidez. Se le realiza una gastroscopia y se observa lesión ulcerada en el antro gástrico. ¿Qué mediadores químicos estarían implicados en la producción del dolor?

A Anafilotoxinas
B Leucotrieno B4
C Opsoninas
D Bradicinina

108 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 6 MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente femenina de 40 años de edad que, con antecedentes de una sinusitis aguda mal tratada, hace un absceso cerebral como complicación. En la complicación inflamatoria observada generalmente no se observará:

A Vasodilatación y vasocongestión
B Presencia de leucotrieno B4
C Infiltrado linfoplasmocitario
D Residuos licuados de células necróticas

109 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 7 VERDADERO O FALSO

La inhibición selectiva de la vía de la ciclooxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico influirá negativamente en la formación de leucotrienos y prostaglandinas.

( ) Verdadero ( ) Falso

110 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 8 VERDADERO O FALSO

El fenómeno de migración es un proceso de redistribución leucocitaria, por el cual los leucocitos se sitúan en la periferia del flujo sanguíneo.

( ) Verdadero ( ) Falso

111 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 9 VERDADERO O FALSO

La forma en que inicialmente aumenta la permeabilidad vascular es por la contracción de células endoteliales, que determinan el incremento de los espacios interendoteliales.

( ) Verdadero ( ) Falso

112 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 10 VERDADERO O FALSO

Cuando la sangre circula por el lecho capilar, se puede distinguir un flujo central y un flujo periférico. En condiciones normales, el flujo central contiene leucocitos y eritrocitos.

( ) Verdadero ( ) Falso

113 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 11 CITA

3 manifestaciones locales de inflamación conocidas como signos cardinales:

114 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 12 CITA

2 mediadores químicos de inflamación derivados del plasma:

115 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 14 COMPLETA

El principal mediador en el edema producido por una reacción alérgica aguda es _____.

116 P2 · foto, questões 9 a 14 · questão 10 MÚLTIPLA ESCOLHA

¿Cuál de los siguientes procesos se presenta más tempranamente en la inflamación aguda?

A Adhesión neutrofílica
B Incremento de la permeabilidad vascular
C Formación de edema inflamatorio
D Destrucción tisular

117 P2 · foto, questões 9 a 14 · questão 11 MÚLTIPLA ESCOLHA

Se realiza una toracocentesis de la cavidad pleural izquierda y se obtienen 500 ml de líquido. ¿Cuál de las siguientes características de este líquido indicaría con mayor probabilidad que se trata de un exudado?

A Alto contenido de proteínas
B Aspecto claro, seroso
C Recuento bajo de leucocitos
D Baja densidad

118 P2 · foto, questões 9 a 14 · questão 12 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una niña de 4 años ha presentado numerosas infecciones por Staphylococcus aureus desde la lactancia. Las pruebas genéticas muestran un defecto causante de la ausencia de producción de β2-integrina. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que ocurra por deficiencia de β2-integrina?

A Menor producción de radicales libres (ERO)
B Adhesión neutrofílica inadecuada al endotelio
C Reducción de la fagocitosis de bacterias opsonizadas
D Fracaso del proceso en el cual los leucocitos se colocan sobre el endotelio de forma transitoria

119 P2 · foto, questões 9 a 14 · questão 14 MÚLTIPLA ESCOLHA

Paciente femenina de 53 años sufre dolor abdominal de 2 semanas de evolución. No tiene fiebre; la zona superior del abdomen es ligeramente dolorosa, y se conservan los ruidos intestinales. Se realiza una biopsia y se observa una lesión duodenal caracterizada por pérdida local de la superficie mucosa que contiene restos necróticos inflamados. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que esté presente?

A Úlceras
B Absceso
C Inflamación crónica
D Exudado purulento

120 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 2 CITA

2 pasos del reclutamiento de leucocitos ocurridos en la luz vascular:

121 P2 · foto, Secciones I a IV · questão 5 CITA

Hombre de 25 años lleva todo el día trabajando en su jardín. En el examen físico se observa una ampolla por fricción en la piel de las manos.

122 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 4 CITA

Mediadores químicos denominados "anafilotoxinas":

123 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 10 CITA

Las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o bien sufren lisis. ¿Qué componente del plasma sanguíneo es más probable que facilite estos efectos?

124 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 20 MÚLTIPLA ESCOLHA

Teniendo en cuenta los siguientes mediadores químicos y sus efectos correspondientes, marca la alternativa correcta:

A Leucotrieno B4, aumento de permeabilidad vascular
B C5b-9, proceso de lisis celular
C Prostaciclina, vasoconstrictor
D IL-6, quimiotáctico

125 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 23 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un grupo de pacientes recibe un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). Los hombres adultos tenían artritis de pequeñas articulaciones. Refieren que el fármaco ha presentado ciertos efectos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que refiera el grupo que recibió el fármaco?

A Numerosos episodios febriles
B Reducción del dolor articular
C Mayor tumefacción de los tobillos

126 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 29 CITA

Fases del trayecto leucocitario que acontecen en la luz vascular:

127 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 30 CITA

¿Cuáles son los mediadores químicos derivados de células que causan vasodilatación?

128 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 32 CITA

¿Cuál es el mediador en reacciones alérgicas?

129 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 33 CITA

Proceso de redistribución leucocitaria: los leucocitos adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial.

130 Examen Final Complementario · 21/02/2024 · questão 34 CITA

Dos procesos de reclutamiento de leucocitos que acontecen en el tejido:

131 Banco Robbins · Inflamación · questão 1 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 22 años presenta un dolor abdominal intenso en el cuadrante inferior derecho durante el último día. [...] el apéndice está hinchado, eritematoso y parcialmente cubierto por un exudado amarillento. Se extirpa y un corte microscópico muestra infiltración con numerosos neutrófilos. El dolor experimentado por este paciente es [mediado principalmente por]:

A Complemento C3b e IgG
B Interleucina-1 y factor de necrosis tumoral
C Histamina y serotonina
D Prostaglandina y bradicinina
E Leucotrienos y HPETE

132 Banco Robbins · Inflamación · questão 4 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 58 años ha tenido tos con fiebre durante 3 días. Una radiografía de tórax revela infiltrados en el lóbulo inferior derecho. En un cultivo de esputo crece Streptococcus pneumoniae. La eliminación de estos organismos del parénquima pulmonar se lograría de manera más efectiva mediante la generación de ¿cuál de las siguientes sustancias por el principal tipo de célula inflamatoria que responde a esta infección?

A Factor activador de plaquetas
B Prostaglandina E2
C Calicreína
D Leucotrieno B4
E Peróxido de hidrógeno

133 Banco Robbins · Inflamación · questão 5 MÚLTIPLA ESCOLHA

Se realiza un estudio clínico de pacientes con infecciones faríngeas. El curso clínico más típico es de 3 días en promedio desde el momento de la aparición hasta que el paciente ve al médico. La mayoría de estos pacientes experimentan fiebre y escalofríos. En el examen físico, los hallazgos más comunes incluyen hinchazón, eritema y exudado purulento faríngeo. ¿Cuál de los siguientes tipos de inflamación tenían más probablemente estos pacientes?

A Granulomatoso
B Agudo
C Gangrenoso
D Resolviendo
E Crónico

134 Banco Robbins · Inflamación · questão 7 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 22 años tiene un parto prematuro con rotura prematura de membranas fetales a las 20 semanas de gestación. Antes de ese momento, el embarazo se había desarrollado con normalidad. Dos días después, se produce un parto sin vida. El examen [...] El parto prematuro probablemente estuvo mediado por los efectos de la liberación de ¿cuál de las siguientes sustancias?

A Inmunoglobulina
B Prostaglandina
C Complemento
D Fibrinógeno
E Linfocinas

135 Banco Robbins · Inflamación · questão 10 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 20 años ha tenido dolor al orinar durante 4 días. Se sospecha uretritis y se realiza un cultivo de Neisseria gonorrhoeae. En un frotis del exudado de la uretra del pene se encuentran numerosos neutrófilos. Estos neutrófilos experimentan diapédesis para llegar a los organismos. ¿Cuál de los siguientes mediadores químicos es más probable que provoque la exudación de neutrófilos?

A Histamina
B Prostaglandina
C Factor de Hageman
D Bradicinina
E Complemento

136 Banco Robbins · Inflamación · questão 13 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 36 años ha estado tomando ácido acetilsalicílico (aspirina) para la artritis durante los últimos 4 años. Su dolor articular se ha reducido temporalmente gracias a esta terapia. Sin embargo, ahora se ha identificado sangre oculta en sus heces. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea inhibida por la aspirina y cause esta complicación?

A Leucotrieno B4
B Interleucina-1
C Tromboxano
D Bradicinina
E Factor de Hageman

137 Banco Robbins · Inflamación · questão 14 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 25 años se incrusta en el dedo una pequeña astilla de madera, que no retira y, en los tres días siguientes, la zona que la rodea se enrojece, se hincha y duele. Los neutrófilos migran al tejido lesionado. ¿Cuál de las siguientes sustancias se expresa en las células endoteliales y es la más importante para promover esta reacción inflamatoria?

A Interferón gamma
B Factor de Hageman
C Lisozima
D E-selectina
E Prostaciclina

138 Banco Robbins · Inflamación · questão 16 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 37 años ha tenido náuseas y vómitos durante 5 semanas. Ayer experimentó un episodio de hematemesis. En el examen físico no presenta hallazgos anormales. Se realiza una endoscopia del tracto gastrointestinal superior y se observa una lesión de 1,5 cm de diámetro en el antro gástrico con pérdida de la superficie epitelial. ¿Estos hallazgos son más típicos de cuál de los siguientes procesos patológicos?

A Absceso
B Serositis
C Granuloma
D Gangrena
E Úlcera

139 Banco Robbins · Inflamación · questão 18 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 19 años que trabaja en un espacio cerrado pasa el día fuera trabajando en el jardín. No lleva sombrero ni protector solar. Esa noche, su pareja comenta que tiene la cara roja. ¿Cuál de los siguientes cambios dérmicos es más probable que explique su aspecto rojo?

A Agregación de neutrófilos
B Hemorragia
C Edema
D Hemólisis
E Vasodilatación

140 Banco Robbins · Inflamación · questão 21 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una niña de 15 años ha tenido episodios de estornudos con ojos llorosos y secreción nasal durante las últimas 2 semanas. En el examen físico presenta superficies de la mucosa nasal enrojecidas e hinchadas. Ha tenido episodios similares cada primavera y verano, cuando la cantidad de polen en el aire es alta. ¿Es más probable que sus síntomas estén mediados por la liberación de cuál de los siguientes mediadores químicos?

A Complemento C3b
B Factor activador de plaquetas (PAF)
C Factor de necrosis tumoral (TNF)
D Histamina
E Inmunoglobulina G

141 Banco Robbins · Inflamación · questão 22 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 45 años ha trabajado duro todo el día cargando montones de ladrillos para construir un muro. Toma un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (ibuprofeno). ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que disminuya este medicamento en sus brazos?

A Trombosis
B Dolor
C Necrosis
D Fibrinólisis
E Formación de cicatrices

142 Banco Robbins · Inflamación · questão 23 MÚLTIPLA ESCOLHA

A los pocos minutos de ser picado por una abeja, un hombre de 37 años presenta un marcado estridor respiratorio con disnea y [...]. ¿[Cuál de los siguientes mediadores explica mejor los síntomas] de este hombre?

A Bradicinina
B Complemento C5a
C Óxido nítrico
D Factor de necrosis tumoral
E Histamina

143 Banco Robbins · Inflamación · questão 25 MÚLTIPLA ESCOLHA

En un experimento, se añaden organismos del tipo Enterobacter cloacae a una solución que contiene leucocitos y plasma sanguíneo. [...] destruyen más bacterias. ¿Cuál de las siguientes sustancias presentes en el plasma es más probable que produzca este efecto?

A Complemento C3b
B Glutatión peroxidasa
C Inmunoglobulina M
D P-selectina
E NADPH oxidasa

144 Banco Robbins · Inflamación · questão 27 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 31 años tiene una herida punzante en el pulgar, que se infecta secundariamente con organismos del tipo [...]. ¿[Cuál es la función de los vasos linfáticos] para producir una respuesta inmunitaria específica a estos organismos?

A Transportar linfocitos a sitios de tejido periférico
B Eliminar el líquido del tejido extravascular
C Transportar células presentadoras de antígenos
D Servir como vía de diseminación de la infección
E Proporcionar un punto de emigración para los neutrófilos

145 Banco Robbins · Inflamación · questão 29 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 55 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta insuficiencia cardíaca congestiva que empeora. Ha notado un aumento de la disnea y la ortopnea durante los últimos 2 meses. En el examen físico hay matidez a la percusión en las bases pulmonares. Una radiografía de tórax muestra derrames pleurales bilaterales. Se realiza una toracocentesis izquierda y se obtienen 500 ml de líquido. ¿Cuál de las siguientes características de este líquido indicaría con mayor probabilidad que se trata de un trasudado?

A Aspecto nublado
B Alto contenido de proteínas
C Recuento bajo de leucocitos
D Presencia de fibrina
E Gran tamaño del derrame

146 Banco Robbins · Inflamación · questão 32 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una niña de 9 años sufre una pequeña laceración de 0,5 cm de longitud en el dedo índice derecho mientras juega a la "Reina de espadas" con un abrecartas. ¿Cuál de las siguientes sustancias, al entrar en contacto con la membrana basal vascular lesionada, [...]?

A Tromboxano
B Plasmina
C Factor activador de plaquetas
D Factor de Hageman
E Histamina

147 Banco Robbins · Inflamación · questão 33 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 65 años ha tenido fiebre durante el último día. En el examen físico su temperatura es de 39 °C y la presión arterial de 90/50 mmHg con frecuencia cardíaca de 106/min. Los estudios de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 12.510/µl y un recuento diferencial de 78 segmentados, 8 bandas, 11 linfocitos y 3 monocitos. Un hemocultivo es positivo para Escherichia coli. Su presión venosa central disminuye notablemente. Entra en shock como resultado de la liberación inapropiada generalizada de un mediador químico derivado de los macrófagos. Desarrolla insuficiencia orgánica múltiple. ¿Cuál de los siguientes mediadores es más probable que produzca estos hallazgos?

A Óxido nítrico
B Bradicinina
C Histamina
D Prostaciclina
E Complemento C3a

148 Banco Robbins · Inflamación · questão 35 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una primigrávida de 24 años se encuentra en las últimas etapas del segundo trimestre de embarazo. Siente de repente un dolor abdominal bajo en forma de cólico. A esto le sigue inmediatamente la expulsión de líquido por la vagina junto con una secreción maloliente. El feto nace muerto dos días después. El examen de la placenta muestra infiltrados neutrofílicos extensos en el corion y el amnios. ¿Cuál de los siguientes organismos es más probable que sea responsable de estos hallazgos?

A Mycobacterium tuberculosis
B Virus del herpes simple
C Escherichia coli
D Treponema pallidum
E Toxoplasma gondii

149 Banco Robbins · Inflamación · questão 37 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 45 años ha tenido fiebre y tos seca durante 3 días, y ahora tiene dificultad para respirar y tos productiva de esputo. En la exploración física su temperatura es de 38,5 °C. Se auscultan estertores difusos en los campos pulmonares inferiores. Una radiografía de tórax muestra un derrame pleural derecho. Se realiza una toracocentesis derecha. El líquido obtenido tiene un aspecto turbio con un recuento celular que muestra 15.500 leucocitos por microlitro, el 98 % de los cuales son neutrófilos. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor su proceso pleural?

A Inflamación serosa
B Inflamación purulenta
C Inflamación fibrinosa
D Inflamación crónica
E Inflamación granulomatosa

150 Banco Robbins · Inflamación · questão 38 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 52 años sin problemas médicos importantes emprende un largo vuelo en avión a través del océano Pacífico. Al llegar al aeropuerto Kingsford Smith de Sídney después del vuelo desde Los Ángeles, no puede volver a ponerse los zapatos. No siente dolor ni sensibilidad. ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable para este fenómeno?

A La activación del factor de Hageman ha llevado a la producción de bradicinina
B En la sección de primera clase se sirvieron muchas bebidas
C Se desarrolló trombosis de la vena femoral
D Le apareció celulitis en las piernas
E La presión hidrostática venosa aumentó

151 Banco Robbins · Inflamación · questão 40 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 56 años ha tenido dificultad respiratoria cada vez mayor durante la última semana. En el examen físico no presenta fiebre. La auscultación del tórax revela disminución de los ruidos respiratorios y matidez a la percusión bilateral. Hay edemas con fóvea 2+ a la altura de los muslos. Una radiografía de tórax revela derrames pleurales bilaterales. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de las pruebas de laboratorio es más probable que presente?

A Hipoalbuminemia
B Glucosuria
C Neutrofilia
D Anemia
E Hipernatremia

152 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 1 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un niño de 11 años se hace un corte en la mano al caerse. La herida se infecta. Las bacterias se expanden a la matriz extracelular alrededor de los capilares. En la respuesta inflamatoria frente a esta infección, ¿cuál de las siguientes células elimina las bacterias?

A Linfocito B
B Fibroblasto
C Macrófago
D Mastocito
E Linfocito T

153 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 2 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 53 años presenta fiebre alta y tos productiva con esputos amarillentos de 2 días de evolución. Sus constantes vitales son 37,8 °C de temperatura, frecuencia cardíaca de 103 latidos/min, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones/min y presión arterial de 100/60 mmHg. En la auscultación del tórax se aprecian crepitantes en ambas bases pulmonares. La radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares parcheados bilaterales. La figura se corresponde con la imagen microscópica del pulmón. ¿Cuál de los siguientes tipos de células inflamatorias es más probable que se observe en abundancia en la muestra de esputo?

A Células gigantes de Langhans
B Macrófagos
C Mastocitos
D Neutrófilos
E Linfocitos T

154 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 3 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una niña de 4 años lleva 2 días con diarrea de volumen alto. En el momento de la exploración está deshidratada. La muestra de heces evaluada mediante análisis serológico es positiva para rotavirus. Recibe tratamiento con líquidos intravenosos y se recupera. ¿Cuál de los siguientes componentes está presente en las células intestinales para reconocer el ARN de doble cadena de este virus y activar los factores de transcripción que regulan al alza la producción de interferón con vistas a eliminarlo?

A Caspasa 1
B Receptor del complemento
C Lectina
D Receptor de linfocitos T
E Receptor de tipo señuelo (toll)

155 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 4 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 72 años con enfisema grave ha presentado insuficiencia ventricular derecha progresiva en los últimos 5 años. Lleva 4 días con fiebre y disnea en aumento. Una radiografía de tórax muestra acumulación de líquido en los espacios pleurales. El líquido obtenido mediante toracocentesis tiene una densidad de 1,030 y contiene neutrófilos en degeneración. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de esta acumulación de líquido si sufre variaciones?

A Presión oncótica
B Diapédesis leucocítica
C Presión linfática
D Retención renal de sodio
E Permeabilidad vascular

156 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 5 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 35 años presenta disnea progresiva en las últimas 24 h. La radiografía de tórax muestra un derrame pleural bilateral de gran tamaño. Mediante toracocentesis se obtienen 500 ml de un líquido amarillo ligeramente turbio de la cavidad pleural derecha. El examen citológico del líquido revela múltiples neutrófilos, pero no hay linfocitos ni eritrocitos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos contribuye más a la acumulación del líquido pleural?

A Vasoconstricción arteriolar
B Contracción endotelial
C Inhibición de la adhesión plaquetaria
D Obstrucción linfática
E Liberación de lisosomas por los neutrófilos

157 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 6 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un niño de 6 años tiene antecedentes de infecciones de repetición por bacterias piógenas, incluidas Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Las infecciones se acompañan de leucocitosis con neutrofilia. El examen microscópico de una biopsia obtenida de un área de necrosis de tejido blando muestra microorganismos, pero muy pocos neutrófilos. Un análisis de la función de los neutrófilos muestra un defecto en el rodamiento. ¿Cuál de las siguientes moléculas es la causa más probable de la mayor susceptibilidad de este niño a las infecciones si sufre defectos?

A C3b del complemento
B Integrinas
C Leucotrieno B4
D NADPH oxidasa
E Selectinas

158 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 7 MÚLTIPLA ESCOLHA

En un experimento se introducen bacterias en un preparado de tejido perfundido. Los leucocitos salen de los vasos y migran a la zona de inoculación bacteriana. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que medie el desplazamiento de esos leucocitos?

A Bradicinina
B Quimiocinas
C C3a del complemento
D Histamina
E Prostaglandinas

159 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 8 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un niño de 12 meses con infecciones de repetición en los últimos 6 meses tiene fiebre y tos de 3 días de evolución. Una tinción de Gram del esputo muestra muchos cocos grampositivos en cadenas. El hemograma revela neutrofilia. Las pruebas de laboratorio [...] matan a los microorganismos rápidamente en presencia de suero [...] migran normalmente en un análisis de quimiotaxinas. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique la mayor susceptibilidad del niño a las infecciones?

A Anomalía de la expresión de selectina
B Reducción de la opsonización
C Producción insuficiente de peróxido de hidrógeno por los neutrófilos
D Déficit de integrinas
E Defecto de las proteínas de los microtúbulos en las células fagocíticas

160 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 9 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un niño de 5 años tiene antecedentes de infecciones bacterianas recidivantes, incluidas neumonía y otitis media. El análisis de los leucocitos recogidos de sangre periférica muestra un déficit de mieloperoxidasa. ¿Cuál de los procesos siguientes es la causa más [...] cuando se reduce?

A Elaboración de peróxido de hidrógeno (H2O2)
B Formación de radical hidroxihaluro (HOCl)
C Fracaso de la migración debido a déficit del complemento
D Consumo de oxígeno por las células fagocíticas
E Producción de prostaglandinas

161 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 10 MÚLTIPLA ESCOLHA

En un experimento, se analizan los neutrófilos recogidos de sangre periférica en busca de un "estallido" de consumo de oxígeno. ¿En cuál de los siguientes procesos este estallido respiratorio es un paso esencial en la respuesta inflamatoria aguda?

A Unión a las células endoteliales
B Generación de actividad microbicida
C Aumento de la producción en la médula ósea
D Opsonización de bacterias
E Fagocitosis de bacterias

162 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 14 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer alérgica a los gatos visita a un vecino que tiene varios de estos animales. Durante la visita, inhala epitelio de gato y a los pocos minutos desarrolla congestión nasal con secreción nasal abundante. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que provoque estos síntomas?

A Bradicinina
B C5a del complemento
C Histamina
D Interleucina 1 (IL-1)
E Fosfolipasa C
F Factor de necrosis tumoral (TNF)

163 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 16 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 19 años desarrolla irritación de garganta y fiebre el día anterior. En la exploración física se observan eritema y edema faríngeo. Los hallazgos de laboratorio revelan leucocitosis. Se le administra naproxeno. ¿A cuál de los siguientes elementos de la respuesta inflamatoria aguda afecta más este fármaco?

A Quimiotaxia
B Migración
C Leucocitosis
D Fagocitosis
E Vasodilatación

164 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 17 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 35 años toma ácido acetilsalicílico para la artritis. Aunque el dolor articular disminuye con este tratamiento, el proceso inflamatorio continúa. ¿Cuál de los siguientes mediadores es el principal responsable del alivio del dolor cuando se reduce su síntesis por acción del ácido acetilsalicílico?

A C1q del complemento
B Histamina
C Leucotrieno E4
D Óxido nítrico
E Prostaglandinas

165 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 18 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 77 años pierde el conocimiento súbitamente, con ausencia de movimiento en la parte derecha de su organismo. La angiografía cerebral muestra una oclusión de la arteria cerebral media. ¿Cuál de los siguientes mediadores es más útil para prevenir que se agrave la lesión isquémica en la corteza cerebral?

A Bradicinina
B Leucotrieno E4
C Óxido nítrico
D Factor activador de plaquetas
E Tromboxano A2

166 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 19 MÚLTIPLA ESCOLHA

En un experimento, se inoculan bacterias en alícuotas de sangre humana normal que ha sido tratada con un anticoagulante. Se observa que las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o bien sufren lisis. ¿Cuál de los siguientes componentes del plasma sanguíneo es más probable que facilite estos efectos?

A Complemento
B Fibrina
C Calicreína
D Plasmina
E Trombina

167 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 20 MÚLTIPLA ESCOLHA

Los pacientes con daño endotelial extenso en relación con una sepsis por Escherichia coli presentan consumo de factores de la coagulación, así como una respuesta inflamatoria generalizada. ¿Cuál de las siguientes sustancias, cuya cantidad disminuye con la administración de proteína C activada, es más probable que reduzca esta respuesta inflamatoria?

A Complemento
B Fibrina
C Calicreína
D Plasmina
E Trombina

168 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 21 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 95 años toca una olla llena de agua hirviendo. A las 2 h tiene eritema marcado en la piel de los dedos de la mano y pequeñas ampollas en las yemas de los dedos. ¿Cuál de las siguientes respuestas inflamatorias ha provocado este accidente?

A Inflamación fibrinosa
B Inflamación granulomatosa
C Inflamación purulenta
D Inflamación serosa
E Úlceras

169 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 23 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 68 años presenta disnea progresiva desde hace 1 semana. En la exploración física la temperatura es de 38,3 °C. La percusión revela un tono mate en los campos pulmonares izquierdos. En la toracocentesis realizada en la cavidad pleural izquierda se obtienen 800 ml de líquido amarillento y turbio que tiene un recuento de leucocitos de 2.500/mm³ con el 98 % de neutrófilos y el 2 % de linfocitos. Una tinción de Gram del líquido muestra cocos grampositivos en racimos. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor el proceso que está teniendo lugar en la cavidad pleural izquierda?

A Absceso
B Inflamación crónica
C Edema
D Inflamación fibrinosa
E Exudado purulento
F Derrame seroso

170 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 24 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una mujer de 87 años lleva 2 días con tos productiva y esputos amarillentos. En la exploración su temperatura es de 37 °C. La radiografía de tórax muestra infiltrados dispersos bilaterales. La sangre periférica revela leucocitosis. Una semana después no tiene fiebre. ¿Cuál de los siguientes resultados es el más probable de su enfermedad pulmonar?

A Inflamación crónica
B Cicatrices fibrosas
C Neoplasia
D Resolución
E Úlceras

171 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 34 MÚLTIPLA ESCOLHA

Una niña de 8 años presenta dificultades para la deglución desde el día anterior. En la exploración tiene la faringe edematosa y eritematosa con un exudado amarillo sobresaliente. Las pruebas de laboratorio muestran neutrofilia. El cultivo de la faringe identifica Streptococcus pyogenes (estreptococo del grupo A). ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que aumente en respuesta a los pirógenos liberados por este microorganismo?

A Factor de Hageman
B Inmunoglobulina E
C Interleucina 12 (IL-12)
D Óxido nítrico
E Prostaglandinas

172 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 35 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 41 años sufre cefalea intensa desde hace 2 días. En la exploración la temperatura es de 39,2 °C. Se realiza una punción lumbar, y el líquido cefalorraquídeo obtenido tiene 910 leucocitos/mm³ con el 94 % de neutrófilos y el 6 % de linfocitos. ¿Cuál de las siguientes sustancias es el mediador más probable de la fiebre de este hombre?

A Bradicinina
B Histamina
C Leucotrieno B4
D Óxido nítrico
E Factor de necrosis tumoral (TNF)

173 Banco PEF · cap. 3 Inflamación y reparación · questão 36 MÚLTIPLA ESCOLHA

Un hombre de 43 años con una comunicación interventricular lleva 2 días con tos y fiebre. En la exploración su temperatura es 37,6 °C y tiene un soplo cardíaco. En un hemocultivo crece Streptococcus del grupo viridans. La velocidad de sedimentación globular (VSG) está aumentada. Las células microbianas son opsonizadas y eliminadas. ¿Cuál de los siguientes mediadores químicos es más importante en la producción de estos hallazgos?

A Bradicinina

B Proteína C reactiva

C Interferón γ

D Óxido nítrico

E Prostaglandina

F Factor de necrosis tumoral (TNF)

TEMA

07 Fora do slide atual

3 questões · 174 a 176

174 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 5 — MÚLTIPLA ESCOLHA

Se pueden observar células gigantes multinucleadas en todos los siguientes procesos inflamatorios, excepto:

A Tuberculosis
B Sarcoidosis
C Leishmaniasis
D Cuerpos extraños

175 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 13 — COMPLETA

Las células gigantes multinucleadas derivan de la activación de _____.

176 Segunda prueba recuperatoria · 09/06/2023 · questão 15 — COMPLETA

La presencia de _____ son condiciones para la formación de un granuloma.