
枪与玫瑰的使用方法



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

泛科技兴趣社区果壳网，
提供有智趣的科技主题内容
果壳 guokr.com

关于你的眼神

关于他的心思

关于生理卫生

关于古往今来世间男女解决饱暖之后惦记的头等大事

果壳性情主题站的文章我一直爱读，既不冰冷地说教，也不为吸引眼球而牺牲知识的可靠性。这本书是果壳性情的精华，尤其是最后一部分，从“实战”指导转向心理学和演化知识，体现了一个科技媒体的深度和实用性。有些话题，即使是妇产科医生也未必知道！

——— **张 羽** 北京协和医院妇产科副教授，《只有医生知道！》作者

知人性者智，知自性者明。性是每个人与生俱来的资产，摆脱性蒙昧，做一个性方面的明智之人，对自我认同和亲密关系都具有重要的价值。《枪与玫瑰的使用方法》把性这个很难讲的事儿讲得非常“有意思”，读完，必会为你的人生增许多色。

——— **蔺德刚** 春水堂创始人

爱情可以是甜蜜的高烧，如果事先知道高烧的过程，你至少可以在甜蜜的时候尽情甜蜜，在惶惑的时候不那么惶惑。

——— **黄爱东西** 媒体人及专栏作家，近著《夏夜花事》《我有一个同事》等

秉承学术 精于传播

WHAT BOOKS

·什么·工作室

磨铁图书

上架建议：科普

ISBN 978-7-518

9 787518 932528 >

定价：39.80元

基本信息登记表



图书在版编目(CIP)数据

枪与玫瑰的使用方法 / 果壳著 . —北京：科学技术文献出版社，2017.10
ISBN 978-7-5189-3252-8

Ⅰ . ①枪… Ⅱ . ①果… Ⅲ . ①性知识—普及读物 Ⅳ . ① R167-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 213833 号

枪与玫瑰的使用方法

策划编辑：金　渔　　责任编辑：孙秀芳　　责任出版：张志平

出　版　者　科学技术文献出版社
地　　址　北京市复兴路 15 号　邮编 100038
编　务　部　（010）58882938，58882087（传真）
发　行　部　（010）58882868，58882874（传真）
邮　购　部　（010）58882873
官方网址　www.stdp.com.cn
发　行　者　科学技术文献出版社发行　全国各地新华书店经销
印　刷　者　三河市文通印刷包装有限公司
版　　次　2017 年 10 月第 1 版　2017 年 10 月第 1 次印刷
开　　本　710 × 1000　1/32
字　　数　183 千
印　　张　7.75
书　　号　ISBN 978-7-5189-3252-8
定　　价　39.80 元

版权所有　违法必究
购买本社图书，凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换

什么是性？还少有人真能够阐述得明明白白。世界卫生组织和世界性健康协会对此做了一个界定：

"性(sex)"是指决定人类男女两性性象谱的生物特征的总和。

性(sexuality)是指包括"性(sex)"、性别、性别认同与性身份、性取向、性爱倾向、情感依恋/情欲和生殖的人的核心方面。它以思想、幻想、欲望、信仰、态度、价值、行为、习惯、角色和关系予以体验或表达。性(sexuality)是生物的、心理的、社会经济的、文化上的、伦理上的和宗教上/精神上的诸多因素相互影响的结果。虽然性(sexuality)包括了所有的这些方面，但并不是所有这些方面必须都得去体验或去表达。可是，大体上、人类的性(sexuality)是人类之所在、之所知、之所思和之所做而获得的或所表达的有关性的所有方面的总和。

那么，什么是性学？

性学（sexology）是研究性（sexuality）的综合学科。它涵盖自

泛美卫生组织、世界卫生组织、世界性健康协会联合专家工作小组．性健康促进行动方案：区域磋商会议纪要．彭贤标，译，吴敬伦，审校．柏林柏林性学资料库（http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/PSH-CH/02e.html），2009-06-02。

然科学、社会科学及哲学人文科学多个学科范畴，是以性生物医学、性心理学和性社会学三个层次为支柱所构建起来的一个复杂的综合体系。

性的自然科学体系包括性生物学和性医学；性的社会与人文科学体系是更为庞大的学科群，包括性哲学、性心理学、性社会学、性伦理学、性法学、性文艺和性美学等分支学科。

性对于人类如此重要，使我们不得不抖擞起精神，对它做出一番认真、审慎的研究和探讨。《枪与玫瑰的使用方法》是一本主要基于性生物学、性医学和性社会生物学原理而组织编撰的科普性教育力作。通观全书，撰稿者在这方面的功底可见一斑。这些仍旧是性的自然科学体系中的基础内容。掌握这些基础的内容，对于指导读者的实际生活不无裨益！

有人常常会自诩“能够掌握真理”。而我认为，即使整个人类穷全力也只能逼近真理，永远达不到真理。我们先于大家在性的“神秘”领地巡游，渴望告诉大家，在那里究竟有怎样的真相。但是，我们深感费力。我们只是打开了性的无数重大门中的一扇，邀您一起巡游这块处女地。

我们巡游性的领地，领略“性的无限风光”。如果说我们对性的问题有那么一点点“开窍”的话，只是积累前人的研究与经验，并且从自己的研究角度尽量做客观的阐述。无限风光还在“性的险峰”，还得靠大家自己去攀登，去感受，去探察……

我们巡游性的领地，将一路风尘，耐心拂去千百年尘封在性的本性上的尘埃，用理性的圣水冲刷遮掩于性的美丽肌肤上的层层污垢，让性的本性亭亭玉立，傲首挺然。

我们巡游性的领地，将披荆斩棘，小心地规避或剔除蔓延在性的百花园里的那些“美丽的罂粟花”，用理性的利器开辟通向“性福”的坦途。

让我们“顺其自然，尊重选择”！让我们的身心更健康，我们的家庭更幸福，我们的社会更文明！

彭晓辉

[illegible]


爱火因何而燃？人类为何而做？天性不可夺！可这天性是什么？吾辈心中亦有惑——像小孩子是从哪儿来的？人怎么爱上另一个人？什么是爱做的事？人们为何做爱做的事？……小时候常会对这些问题好奇。但是，就学校生理卫生课本上的那点东西，实在是不能满足我等的好奇心。

慢慢长大了，从“你懂的”和正规点的渠道，也慢慢了解了很多杂七杂八的片段，不过仍然还是一知半解管中窥豹。阴差阳错地，我进入了果壳网负责性情站，得以名正言顺地挖空心思想些让人脸红心跳的选题，到处挖掘相关的研究资料，帮助各路作者，将性和爱从科学的角度呈现给大家。

在这个神奇的过程中，我自己也获益良多，知道了前辈们为研究这些事付出了怎样艰辛（和“奇葩”）的努力，也破除了之前对性的一些不正确的看法，还了解了 LGBT 们争取权利的漫长道路……不过最重要的，恐怕还是造就了我对性的态度，也是我希望能传达给性情站读者们的——在公众面前，考虑到其他人的感受，我大概不会旁若无人地讨论性；但在我心里，我把性看得和吃饭睡觉一样平常，我知道那些反应不过是本能的诱惑，既不会因此有负罪感，更不会屈从于本能。

Big.D

女同性恋者（lesbian）、男同性恋者（gay）、双性恋者（bisexual）和跨性别者（transgender）的英文首字母缩写。



两个人的床褥，有着缩微的世间百态。揣摩：猜疑，接纳，回避，尊重，亵渎，疼痛，极乐，在这里悉数登场。

性爱乃是天赋的本能，你我都能无师自通，但这不代表学习全无必要。相反地，其中的一切细节与技巧都值得书写。善意的谎言，神秘的物质，白日梦，恶作剧，各有位置；风云暗涌。知己知彼，方能安全抵达传说中的至美世界。

1

胎儿也自慰，天性爱愉悦 —3

爱她，就和她共享口腔菌群 —6

端正性爱观，重质不重量 —9

“走后门”的那些事儿 —13

口交也要戴套？ —17

这样的冲动是魔鬼 —20

男人酒后还有能力乱性吗？ —25

为烟瘾牺牲“性福”，施主你这是何苦？！ —28

高潮也能装，男女都一样？ —32

高潮诚可贵，生命价更高 —36

论“阴茎钳持”之不可能发生 —38

43

排卵期爱性幻想 —45

大丈夫能屈能伸？阴道也可以 —48

妇科里正在搞什么？ —51

修补处女膜，真有这必要？ —56

G 点真的被找到了？ —59

高潮来了才会喊？ —62

辣手摧花——非洲女性割礼 —65

71

长度：脱下裤子 or 伸出手来 —73

直还是弯？ —76

你，是硬汉吗？ —80
一直硬，也是病 —86
软的是阴茎，糟的是健康 —89
睾丸大者机会多 —93
天天都在喊“蛋疼”，蛋疼到底有多疼？ —96
“扯蛋”里边有科学 —100
自己动手，检查睾丸 —104
骑车杀精，确有其事 —107
你的精液合格吗？ —112
守住你的前列腺 —116
尿道里塞得进鼠标线吗？ —120


125

想当爹？看长度 —127
输精管：扎还是不扎？ —130
安全期不安全 —133
紧急避孕药的功过是非 —136
为求一子，壮士切蛋 —140
怀男孩肚子尖，怀女孩肚子圆？ —144
洗桑拿会不育吗？ —147

151

好友还是备胎：红颜知己真的存在吗？ —153
暗黑破坏神 or 婚姻破坏神？ —157
为何男女的性伴侣数量对不上？ —161

酒后眼里出西施 — 166
做爱之后谁先睡? — 169
爆乳战术为何屡试不爽? — 173
人为何不乱伦，文明还是天性? — 176
贫贱夫妻性事哀? — 181
男星为何爱出轨? — 186
面如萝莉，更有魅力 — 191
男人为什么喜欢小脚女人? — 196
在异性眼前，男人更爱当好人? — 201
男人真的只喜欢瘦姑娘? —204
女人只喜欢肌肉男? — 208
演化武器助女性对付强奸 — 212
阳具崇拜是怎么回事? — 218
— 222
— 228



你可能不知道

- 一个体重 70 千克的男性，在性爱过程中达到高潮时，每分钟消耗 3.5 千卡热量。
- 在西方国家，人们发生初次性行为的平均年龄是 18 岁，而在亚洲是 22 岁。
- 根据记录，在 1 小时内，女性最多能有 134 次高潮，而男性最多有 16 次。
- 据估计，有 24% ～ 37% 的女性无法获得性高潮。
- 性活动时，大脑会释放内啡肽，创造快感的同时亦可镇痛。

胎儿也自慰，天性爱愉悦

2011 年 4 月上旬，台湾地区一名孕妇在彰化市一家妇产科医院进行超声波检查时，意外看到肚子里 27 周的男胎儿竟然正在自慰，画面中胎儿的“小弟弟”还在勃起呢……这事儿尽管听起来很不可思议，但它却是真的。至于原因，既不是孩儿他妈妈检查前看了“果壳性情”，也不是这孩子天赋异禀。事实上，所有男孩都有这功能，而且不仅男胎儿能勃起，女胎儿也能。

这个还在妈妈肚子里的小男孩确实让人感到后生可“慰”。事实上，作为前浪的我们没必要太过惊讶，若干年前的我们其实很有可能做过相同的事情，只是没有被拍到，我们对此也毫无记忆罢了。

20 世纪 90 年代，国外的研究者们就通过超声波成像发现 16 周大的男性胎儿有勃起反应。《美国妇产科学杂志》（American Journal of Obstetrics and Gynecology）也曾记录了一名女性胎儿自慰的全部过程。

研究者看到一名 32 周的女性胎儿用右手手指触摸外阴，主要是集中抚摸阴蒂的区域。这一活动持续了 30 ～ 40 秒，过了一段时间又再次开始，并伴随着骨盆和双腿的活动。之后，胎儿躯干和四肢的肌肉呈现出达到高潮的肌肉痉挛，最终放松休息，这一过程持续了近 20 分钟。

人们猜测，从这一时期开始，女性胎儿已经可以分泌阴道润滑物，阴蒂也已经可以勃起了，只是这些反应并不容易被观察到。

对胎儿或者婴幼儿来讲，抚摸阴蒂或者龟头的行为与我们通常认为的自慰不同。研究者普遍认为，胎儿以及婴儿的自慰行为与他们吮吸手指头没有什么区别，只是单纯出于寻求愉快的目的。

在子宫内，胎儿自慰可以获得放松和愉快。出生之后，婴儿对于身体的各个部分都感到好奇，他们通过触摸或者被触摸而体会到兴奋，也能够在这一过程中了解自己的身体。而由于末梢神经分布集中，生殖器的抚摸会更容易令婴儿感到兴奋。

在对婴儿活动的研究中，经常可以观察到婴儿通过自己触摸外生殖器而产生的“性兴奋”。有研究者记录了一名 4 个月大的女婴的性兴奋活动，还记录了 23 名 3 岁以下的女婴通过自我刺激达到“性兴奋”的情况；也有研究者估计，至少有一半 4 岁以下的男婴体验过性兴奋的刺激。同时，无意识的阴茎勃起以及阴蒂胀起也时有发生。

曾经有一些 3 个月到 3 岁大的孩子出现了肌肉痉挛、身体扭曲、面红耳赤以及发出呻吟声等异常状况。家长非常担心，怀疑自己的孩子出现了

运动功能紊乱症，后来确诊这些表现只是因为孩子通过自慰而达到了兴奋的状态。家长很难辨别婴儿的自慰活动，因为有些时候婴儿自慰并不直接“上手”，而是通过与大腿的摩擦或是通过摩擦婴儿床来“爽一把”。

对于婴儿的这类行为，做父母的其实不用太在意，顺其自然就好。如果父母刻意阻止婴儿的自慰行为，或者在换尿布时做出厌恶的表情，都可能使婴儿对自己的生殖器产生厌恶感。研究表明，那些没有体会到足够触摸感受的婴儿在成长过程中往往不容易兴奋。

博尔内曼（Ernest Borneman，性学界“大牛”，还玩爵士乐、写小说，曾获赫希菲尔德性学奖）的一项对于4 000多名孩子的历时20年的研究发现，那些在婴儿时期自慰的孩子，运动能力，特别是动手能力发展得更好更快。这大概可以提醒我们，要想使身体的各个器官有效地发挥作用，还是早点练习为好。

赫希菲尔德性学奖（Magnus Hirschfeld Prize），由德国性社会学与性科学研究会（German Society for Social-Scientific Sexuality Research）颁发的国际性性学奖，以赫希菲尔德（Magnus Hirschfeld，1868–1935，德国著名性学家、医学博士，1919年在柏林创办了“性学研究所”）的名字命名，以纪念其在性学研究领域的卓越贡献。该奖项每2年评选1次，授予在全世界性科学领域中获得突出成就的学者，号称“性科学领域的诺贝尔奖”。

爱她，就和她共享口腔菌群

Fran

在电影《漂亮女人》中，罗伯茨饰演的妓女从来不和她的客人接吻，只因母亲告诉她，接吻是一种亲密的行为，性却不是。而调查显示，性工作者确实会避免与顾客亲吻，以防止与他们发生感情纠葛。亲吻为什么会这样神奇？在双唇相接的时候发生了什么？

首先，你们交换了数不清的微生物，包括多种细菌、病毒和寄生虫等。爱意正浓的情侣不仅经常交流内心感受，还会经常共享口腔菌群。不过，健康的成年人口腔中携带的微生物大多是无害的，而且这些微生物进入对方的口腔后，会遭到溶菌酶、胃酸的奋力反击，不大可能导致疾病。

同时，你们还交换了多种多样的激素和信息素——研究“接吻学”（philematology，别怀疑，真的有这门学问）的科学家认为，情侣之间的深吻其实是通过接触对方的各种化学信息，来判断彼此的身体能否“化学兼容”。大多数情侣对接吻时的感觉还是很重视的，甚至有人因为第一

次接吻时感觉不好，就闹分手了（当然也不排除早想分手拿接吻当借口的可能）。

而且有证据显示，男人在接吻时更喜欢嘴巴张得较大的“湿吻”，他们或许是本能地通过此举来把自己唾液中的雄性激素传递给女人，以唤起她的欲望，甚至影响她自身的激素分泌——不过如果他口水流得太多，结果可就会适得其反了。

接吻时，除去上面那些不大浪漫的事儿，还发生了什么？是什么使这样一个动作变为亲密关系的象征？我们来看看下面几条：

在双唇相接前后，情侣双方一般会在很短的距离内含情脉脉地对视片刻。而如果其中一人心里对他们的关系感到不自在，他/她将无法自然地凝视对方，并且会不由自主地移开目光或打断对方的注视。这使得接吻成为检验双方感情的方式（对近视眼来说可能不靠谱）。

情侣之间的接吻是一种没有性别之分的性行为。在接吻时，双方会同时感到同样的身体器官“进入”和“被进入”。而且，嘴唇的皮肤是全身最薄的，表面布满了神经末梢，具有丰富的感受性（嘴唇皮肤厚度只有面部皮肤的1/6，难道“表情可以装，接吻就露馅儿”是这个原理？）。

接吻不会怀孕——所以它是纯粹为了快乐而做的（不过当心有人说“吻一下嘛，反正又不会怀孕”）。

接吻时两人的一系列小动作其实是一场无意识的对话——谁的口

腔动作比较强势，谁张开嘴的时候不太情愿，谁只是张着嘴动也不动——这一切都说明了他们对于这段关系的感觉（口腔动作过于强势的人，可能是没吃晚饭）。

人们一般只通过四种感官来认识其他人——视觉、听觉、触觉、嗅觉。在接吻的过程中，不仅味觉这种极少被动用的感官得到大大激发，对方所散发的气味也较平时更加浓烈。通过品尝到对方独一无二的滋味以及不同于他人的气味，这个人在你脑海中留下的印象会非同一般地深刻（看来，如果想给人留下难以磨灭的印象，不妨让牙刷休息一段时间啊）。

当然，接吻是需要技巧和练习的。许多情侣刚开始觉得亲吻没什么意思，但随着感情逐渐加深，就亲得欲罢不能了。不管怎样，只有你把自己的口腔菌群展示给了对方，才算是向对方敞开了你的心。

端正性爱观，重质不重量

Marquess Rouge

做爱，男人和女人私底下多少都会将之作为谈资。然而相比之下，体力派男人更喜欢就自己的体力过人进行宣传。其实那事儿和耕田犁地完全是形似而神不似，“一夜七次郎”在姑娘们面前实在是未必如同各种色情作品描写的那么有市场。

女性的身体构造独特，和男性相比具有不易唤醒、容易受伤的特点。无论你是体力派或是技术流，都不妨暂且收起你的那些“我以为”，看看如下的建议。毕竟，谁不希望自己的女人在自己的怀里得到真正的满足呢？如果你是女人，那了解你的身体和渴望就更为必要。毕竟，谁不希望在自己的男人怀里和他一起酣畅淋漓呢？

许多男人曾万分不解地表示疑问：我或“三围”出众，或技术高超，或体力过人，为什么我的女朋友就是体会不到那事儿的乐趣，反而老是喊疼呢？实际上，性交疼痛绝不是少数女性所面临的问题。

《红皮书》（Redbook，一种女性杂志）的一项调查指出，80%的女性曾遭受性交疼痛的困扰，这一情况在分娩后的被调查者中尤为明显。相信这个数字超出了很多人的想象，而造成这一数字的原因更是五花八门。

美国性教育顾问和性治疗师协会（American Association of Sexuality Educators Counselors and Therapists，简称AASECT）的认证治疗师托马斯（Lisa Thomas）女士总结说，性交疼痛不是由单一原因导致的，除了阴道不够湿润、长期服用避孕药、女性对阴部的过度冲洗、工作压力、阴道感染以外，男方动作过激、心理因素、伴侣日常相处中的问题都有可能造成性交疼痛。因此，能够良好沟通的伴侣在床上显得更协调不是没有原因的。

虽然，对于润滑和扩张，也有让人眼花缭乱的润滑油和扩张练习器可供选择，但这些还是有些治标不治本。如果无法良好沟通，那么对男女双方，尤其对女人来说，性交常常会成为一场彻头彻尾的痛苦体验。

[illegible]

相比于横冲直撞的男人，柔情似水的女人在床上实在是扭捏太多了。比如会出现下面这种不明不白的对话："老婆，是这里吗？""哼哼……""亲爱的，这里感觉还好吗？""嗯嗯……哼……""宝贝，这样好……还是这样好？""嗯嗯，嗯……"

女人更怯于在男人主导的过程中表达自己的感受，尤其是当她正在你的关照下突破不适与快感的临界点时。在这样的时候，一味冲刺和展现自己的力量绝不是恰当的男性行为。若此时你的伴侣依然不情愿正面描述她

的感受，或者你怀疑她的描述可能带有误导性，学者们的研究报告也许能给你提供一些参考。

《调情指南》（*Guide to Getting it On*）的作者、精神分析学者乔尼德（Paul Joannides）在2000年至今的十余年间为了书籍的写作搜集了万余个案例。他发现，女性被调查者的回答能为我们了解女性的实际需求提供相当丰富的资源。女性的感受很可能是因人而异的，就拿人们普遍认为是敏感区的阴蒂来说，不同的女性也有不同的感受。

当被问到“你第一次发现触摸阴蒂给你带来快感是什么时候”时，一名27岁的女性被调查者给出了一种较有代表性的描述：“我不记得那是什么年纪，只记得比较年少。最开始，那并不是快感，而是一种让我感到安慰的感觉，这种感觉帮助我在晚上更好地入睡。之后它才慢慢开始成为释放压力的方式。”

这是不是和男人通过DIY释放压力的方式很接近？但是同样是这名被调查者，在之后的答卷中却表示了对“活塞运动”中刺激阴蒂的抗拒。难道在“活塞运动”时就不该刺激阴蒂了吗？有趣的是，对这一问题的回答，表示“愿意”和“抗拒”的女人大约是五五开。女人啊，真是种让人读不懂的生物。

所以，同样作为一个女人，我能给男士的建议就是：每当你尝试一种之前没有尝试过的方式时，请谨记循序渐进。如果能诱导她说出真实感觉固然是好，如若不能，也不必着急。耐心地做前戏，不动声色地发掘她的敏感带，温柔地助推……相信冲浪的感觉一定指日可待。总之，千万不要想当然。

这里摘录美国大学（American University，简称 AU，一所美国公立大学）的终身教授麦卡锡（Barry W. McCarthy）博士的两句忠告，与大家分享。

海阔天空的想象："适当的外在刺激，比如成人影片、音乐、烛光、性玩具、来自镜子的视觉反馈等，都能促进双方的想象，提高性生活的质量。"

切合实际的渴望："在每一次性体验中，对自己和对方要求程度一致的渴望、高潮和满意度是不适当的。想这么做的可以试试看，结果准能把你爷们儿的自信心打击得很彻底。事实上，哪怕对于一对很和谐的伴侣来说，两人都不够满意的性体验也有可能占到 5% ～ 15%。"

由此看来，那些自信满满的"床上永动机""一夜七次郎"或是"三个 180"什么的，你们的硬件或许确实很有亮点，但是要让心爱的女人远离性交不适、充分体会到做"你的女人"的幸福感，你们还有很多要做的。而稍不自信的兄弟们，对你们来说，通过磨合和体会，也还有相当大的提升空间哦。


“走后门”的那些事儿

Fran

人类历史上对于同性肛交的记载最早可追溯到公元前 500 年的希腊陶器绘画，异性之间的肛交则要晚一些，首次见于公元 300 年左右的秘鲁陶器。古代的中国和日本有许多对异性间肛门性行为的记载，在现代的色情出版物中，异性肛交的情景也随处可见。

对于肛交这回事，一般人肯定都有许多想问又不敢问的问题。肛交时会有快感吗？男性和女性的快感一样吗？为什么说肛交容易传播艾滋病？

男性在被“走后门”时是有快感的，而快感的来源自然就是前列腺。它在哪里呢？如果你觉得光看解剖图（见图 1）还是不够直观，可以亲身尝试一下——将指头伸入肛门内 4 ～ 5 厘米处，在腹侧如果能摸到比其他地方硬的部分，那么你就成功地找到了它（女性朋友可在男朋友身上试一试）。对前列腺进行适当的按摩可让男性产生快感，并通过尿道排出前列腺液。阴茎射精时，前列腺液也混在精液里一并被排出，起到润滑尿道、



承载和营养精子的作用。

需要指出的是，通过“走后门”来体验快感并不是男同性恋的专利，不论性取向如何，男性都能通过自慰的方式获得前列腺快感。另外，也有许多男性在与妻子或女友做爱时，经由对方将手指伸入直肠按摩前列腺获得快感。由于没有阴茎进入肛门，这种行为不能被称为肛交，不过，它也是肛门性行为的一种。

那么女性呢？她们没有前列腺，但直肠和阴道之间只有薄薄的隔膜，因此在肛交时，女性的阴道也能受到间接刺激。不过话又说回来，女性得到阴道高潮本来就不是件很容易的事儿，再这么“隔靴搔痒”，效果就更要打折扣了。一般而言，女性从肛交中得到的快感可能还是心理方面居多。

肛交是一种很容易传播疾病的性行为，原因是直肠缺乏分泌物，没有阴道那样的润滑和杀菌功能，而且直肠上皮细胞和阴道上皮细胞种类不同，被插入时极易受到损伤。因此，在“走后门”时，一定要使用人工润滑剂和安全套，并进行长时间的前戏和按摩，使肛门括约肌放松。通过这些方式，可以避免肛交过程中绝大部分的不适，并且杜绝双方之间性病的传播。

然而，即使双方都没有性传播疾病，并妥善使用了辅助工具，肛交还是会带来一些风险。因为，无论多小心，无论是否有不舒适甚至疼痛的感觉，直肠还是会在插入过程中产生许多小伤口。这些伤口是肉眼不可见的，然而可以借助法医学或刑事案件调查中常使用的检验指示剂检测出来。而在直肠再次排出粪便时，细菌就可能通过这些小伤口侵入，造成感染。

很显然，肛交一直是人类性行为的一种方式。但是异性之间这样做的人多吗？由于人们通常不愿承认自己有过这种行为，对肛交的调查一直很困难。不过，由于肛交是 HIV 传播的重要方式，随着艾滋病威胁的增加，人们无法再回避这个问题。1999—2000 年，在美国进行的一项调查显示，22% 的女性在过去 3 个月内进行过肛交，男性的数据则为 21%。

两性之间对于肛交的看法有很大差异。总的来说，许多男性都比较迷恋这种行为，他们可能会想方设法地说服自己的伴侣做这件事，面向男性的色情电影中也经常会出现这种情节。而女性对此一般兴趣不大，甚至会

感到厌恶。

那么，为什么男人会对这种性行为这么着迷呢？他们经常给出的解释如下：愿意进行肛交的女人对男人有着莫大的吸引力，因为这象征着她不是为了怀孕而与他做爱，而是出于对性本身的欲望；同时，这也标志着女人对他全身心的爱和信任。而且，有报道指出，尽管女性不大可能从肛交中得到生理快感，但那些愿意进行肛交的女性通常是愿意发掘性生活乐趣的人，因此她们能够从性生活中得到比较多的高潮。

当然，男性迷恋肛交还有一些其他的理由，比如，肛门周围的括约肌的收缩能力比平滑肌控制的阴道更强，因此为插入一方带来的快感也更加强烈。另外，不可否认，这种性交形式能够满足男人的统治欲望，以及对伴侣的占有欲。

而进行过这种行为的女性中，一半以上的人都将其描绘成一种痛苦的经历，并表示不愿再次经历它。

在双方都是成年人且彼此同意的情况下，做些刺激性的尝试也无可厚非。不过，比起传统的性行为而言，肛交的风险还是太大，而且难度系数也太高了（想想 Wrong Hole 吧）。要是想玩一回这种“禁忌的游戏”，可得做足了准备才行。

口交也要戴套？

Fran

口交是指以唇、舌、齿及喉部刺激生殖器的性行为。它正常吗？这点似乎无须多言，因为大多数性学家认为，在具有完全行为能力的成年人之间发生的、双方均能接受的性行为都是正常的。当然，各种形式的性行为都有一些问题需要注意，口交也不例外。

口交没有怀孕的风险，但它也并非一种绝对安全的性行为。

口交传播艾滋病的概率虽然比肛交、阴道性交低，但也不是完全没有可能。英国公共卫生实验室管理署（Public Health Laboratory Service，简称 PHLS）的调查发现，在患艾滋病的人群中，因无防护措施的口交而被传染的比例为 8%。而临床病例表明，口对阴茎、口对阴道和口对肛门的性交方式均可能传播艾滋病。也就是说，无论施行口交双方的性别如何，他／她们都有感染艾滋病的危险。

口交是如何传播艾滋病的呢？导致艾滋病的人类免疫缺陷病毒（HIV）

存在于患者或携带者的血液、精液、精前液、阴道分泌物和乳汁中，因此，如果施行口交者的口腔或喉咙里有小伤口或溃疡，HIV 就能够通过体液与血液的接触进行传播。如果其中一方已经感染了其他性传播疾病（STD），传播 HIV 的概率也会增高。

那么，怎样才能有效地规避这些风险呢？答案和肛交及阴道性交一样——戴套吧。

安全套可谓是人类最伟大的发明之一，在正确使用的前提下，它能够把怀孕和传播性病的概率降到最低。不过，国内了解口交安全套知识的人还比较少，许多人在阴道性交时都不愿戴套，口交时更是懒得费这个工夫。如果口交发生在彼此充分信任且确信无性传播疾病的夫妻之间，戴套可能不是很必要，但如果你想找点刺激，那么套套就是不可或缺的了。

对男性的口交可以使用普通安全套，不过它们通常会在嘴里留下一股乳胶味，而且上面涂的润滑剂在口交时没什么用，因此许多安全套生产商都推出了口交专用安全套——“干性安全套”。这种安全套通常使用超薄设计，大多数不添加润滑剂，头部也少了储精囊，有的还会添加各种食用香精，如草莓、香蕉、葡萄、巧克力……使得它们尝起来有多种口味。不过，有些安全套附赠的“风味”仅仅是厂家的促销措施，因此在选购的时候，一定要预先读说明书，弄清楚这种安全套是否适用于口交。

那么，对女性的口交有什么保险措施吗？答案是“口交保险膜”（dental dam for oral sex）——一张隔在舌头和生殖器之间的乳胶膜，来源于牙

科用的阻隔膜（dental dam），用一个普通的避孕套可以自制简易的口交保险膜——把套套的头部剪掉，再把侧面剪开，让它变成一张长方形的乳胶膜就行了。

除了用这种方法自制保险膜之外，在市场上也可以买到专用的口交保险膜。不用说，它们也有着丰富多样的口味，供大家“各取所好”。

这样的冲动是魔鬼

北斗京华

在大多数人看来，性冲动乃是人生中一大幸事，是一个人性能力的体现方式之一。可问题是，当你已经精疲力尽，想跟冲动说“明天见”的时候，它却非要跟你“天天见”“时时见”，甚至可能在某些不当场合随时“造访”你，这样的冲动，真的就是魔鬼了。

2001年，美国新泽西罗伯特·伍德·约翰森医学院性与性关系健康中心主任桑德拉·雷拉姆（Sandra Leiblum）首先发表了有关持续性生殖器唤起紊乱（Persistent Genital Arousal Disorder，简称PGAD）的文章，他对这一症状的定义为“没有任何性欲望的强烈的生殖器充血感觉”。

PGAD症的冲动不同于一般的性冲动，因为这种冲动并非欲望所致，没有任何身心上的愉悦感。更要命的是，它甚至根本不受思想的控制，而且发作频率极高，持续时间可能是几分钟，也可能是几小时甚至几天，总之是完全不按套路出牌的。

由于长时间没有得到人们的关注，持续性生殖器唤起紊乱有各种称呼，比如持续性性唤起症（Persistent Sexual Arousal Syndrome）、生殖器不

安症（Restless Genital Syndrome）等。据说，在美国公布 的新版《精神疾病诊断与统计手册》中，将会收录持续性生殖器唤起紊乱，对同一症状的不同名称也可能会进行统一。PGAD 这一名字消除了人们长期以为这一症状是性病表现的误解。

PGAD 可能发生在各个年龄段。一篇于 2006 年发表的文章称，自从 2001 年 PGAD 这一症状报告出现以来，大约有 400 名女性被确诊患有这一疾病。事实上，具体的患者人数也许很难统计，因为很多人可能感到难以启齿。

PGAD 可能完全摧毁一个人的生活。一位不愿透露姓名的女性患者这样描述了自己的情况：当她在中学的时候，本来好好地坐在座位上，突然就“激动”了；高三的时候，她在一天内能感觉到 100 ～ 200 次冲动，以至于她不得不在课间休息的时候到洗手间 DIY，来释放冲动的压力。

大学之后，这一问题影响到了她的学业和日常生活，以至于她大学延期毕业，甚至在看电影时都不得不出去释放两次……由于受够了性冲动的折磨，她只希望享受被男朋友拥抱的感觉，而并不想做爱。

PGAD 可能严重影响家庭关系。珍妮·艾伦（Jeannie Allen）是最早报告这一症状的患者之一，艾伦不想让丈夫感到压力，于是欺骗丈夫说她

第五版《精神疾病诊断与统计手册》（DSM-5）已于 2012 年 12 月得到了美国精神病学会（APA）批准，于 2013 年 5 月公布。

过得不高兴，两人就这样离婚了。

另一位患者海泽·戴尔曼（Heather Dearmon）则确确实实让丈夫汗颜，丈夫曾经尽力满足她的性冲动，但最终还是"败下阵来"。对她来说，自慰没有什么性快感，只是为了释放百爪挠心般的痛苦。戴尔曼甚至无法进行正常的社交活动，因为她不得不随时准备应对突如其来的"状况"。

让患者闹心的还有社会的误解以及医生的无能为力。戴尔曼在看了一连串妇科医生以及精神医生之后，觉得自己的情况反而更糟了。心理学家认为她可能是性心理受到了过多的压抑，甚至建议她换换口味，验证一下自己是不是喜欢同性……而她的护士竟然说："我倒真希望跟你一样天天有自慰的冲动。"可见，人们对这种病的患者有多么不理解。患者南希·布朗（Nancy Brown）的精力难以集中，陷入了严重的抑郁中，持续的失眠加上对家人的极度愧疚，使她甚至想过自杀。

在2002—2006的5年中，美国费城公众与性健康研究院（Public and Sexual Health Institute of Philadelphia）性内科主任苏珊·克劳格（Susan Kellogg）诊断出5位患有此症的患者，这些患者保持着稳定的一夫一妻的婚姻关系，却都承受着巨大的肉体和心灵的折磨，没有任何性渴望或者性幻想。

到目前为止，还没有足够的医学研究证实到底是什么方面的问题引发了这一疾病。自从2001年以来，雷拉姆一直在收集相关的材料，但还没有足够多可以做医学研究的患者数量，患者只能都被作为个例进行治疗。

虽然性行为可能是最直接的缓解冲动的方法，但终究不是长久之计。根据雷拉姆的研究，患者通过性行为获得短暂的缓解之后，冲动的感觉反而可能有所加强。

不了解疾病的原因，治疗起来就格外麻烦。比如，上文提到的南希就尝试了几乎所有可能有成效的治疗方法，包括药物、神经减压手术以及42次电击治疗，现在这些治疗的负面效应（比如健忘、失忆）已经开始显现，但是持续性的性唤起却没有丝毫缓解的迹象。

对于前边提到过的戴尔曼，抗抑郁药物帕罗西汀（Paroxetine，这一药物同时可能降低性欲）减轻了这一症状对她产生的影响。她自慰的频率也从2天一次降低到7～10天一次。也有患者称服用了稳定情绪的药物双丙戊酸钠（depakote）之后，症状有所缓解。

在美国加利福尼亚圣地亚哥州立大学心理学系乔安娜·柯尔达（Joanna B. Korda）的研究中，化学药物瓦伦尼可林（Varenicline）被认为可能能够降低发病频率。

然而，一种药物可能并不适合所有的PGAD患者。在雷拉姆的研究中，一些患者甚至认为服用抗抑郁药物是他们发病的诱因。

女性性健康基金会（Women's Sexual Health Foundation）的执行理事丽莎·马丁内斯（Lisa Martinez）直言，现在还没有确定治疗此症的有效药物，她特别提醒有此种困扰的女性朋友谨慎采用包括电击疗法等特殊疗法。

从2001年起，研究者们报告的都是女性患病案例，不过男人们可别

得意。后来，马塞尔·瓦丁格（Marcel D. Waldinger）等人首次报告了男性发病的案例，情况也是相当让人烦心。其中一个案例是这样的，一位患者从34岁开始出现无意识自发射精的情况，射精可能出现在工作中、开车回家的时候，甚至在体育锻炼的过程中！

在这些时候，患者都会感到射精的冲动非常强烈，但是只能射出很少量的精液。而且关键问题在于，射精时患者并没有感到性高潮，也没有勃起。这种情况每天可能会发生1～3次，伴随着阴茎躁动不安的感觉。在射精之后的一个半小时左右，他又会感到有射精的冲动（天天这么整，难不成要精尽而亡？）。所以，爷们儿也不能掉以轻心。

男人酒后还有能力乱性吗？

SILENTGHOST

有些男人“完事”之后，会推说自己喝高了、记不清、没责任。有人对此提出反驳，说男人喝醉以后根本没法勃起，所以只要是成了事，就证明他根本没醉！到底男人酒后还有没有能力“乱性”？这是一个涉及科学和人品的重要议题。

在一篇关于酒精和人类性行为的综述中，纽约州立大学的心理学家克罗（Leif C. Crowe）和乔治（William H. George）整理了很多相关资料。其中有研究指出，酗酒者的夜间勃起次数少、硬度低、勃起慢，而如果夜间勃起出现问题，则常常也会阳痿。这与医学界广泛认同的酗酒可导致阳痿一致。

如果并非长期酗酒，只是一次喝多，这种情况下男人的“小弟弟”会怎么样呢？

早在 1976 年，法卡斯（G. Farkas）和罗森（R. Rosen）就进行过这

方面的研究了。他们通过测量阴茎的周长发现，血液中酒精浓度（Blood Alcohol Concentration，简称 BAC）达到 0.025% 的男性的性反应会略微提高。BAC 达到 0.025% 是什么概念呢？一般来说就是小酌了几杯，行为举止与正常人无异，不算喝醉。但是当 BAC 超过 0.05% 时，男人的性反应就会直线下降——这时他们开始变得话多，注意力涣散。

1979 年，马拉特斯塔（V. Malatesta）、波莱克（R. Pollack）等人通过研究志愿者饮酒后自慰时的射精情况发现，当 BAC 达到 0.06% 时，志愿者们射精所需的时间显著延长；而当 BAC 达到 0.09% 时，很多志愿者就干脆没法射精了（BAC 达到 0.09% 的时候，人会变得感觉迟钝，离发酒疯只有一步之遥）。不过，无论射精情况如何，研究者发现，喝酒对勃起并无显著影响——也就是说他们依然有条件“作案”。

2008 年，华盛顿大学的一项研究也试图搞清楚酒精对男性勃起的影响。学者通过阴茎体积描记法，分别研究了 78 位异性恋男性在不饮酒及 BAC 达到 0.08% 的状况下对色情片的反应。最后他们“遗憾”地得出了一个结论，那就是——平均来说，喝醉和不喝醉，男性的勃起状况并无显著不同。

所以，男人到底能不能酒后乱性呢？果壳性情只能说：从勃起功能来看，男人是有喝醉后“作案”的能力的。至于事后认不认账，是真的不记得还是假的不记得，那就属于人品问题了。

即使喝酒并不会影响男性勃起，酒精却可能导致床上表现欠佳。研究

显示，酒精能够麻醉男性和女性生殖器组织中的细胞，因此在饮酒后，两人都很难达到性高潮。

前文提到的心理学家乔治来到华盛顿大学工作后，和戴维斯（K. C. Davis）等人合作了一项研究，结果表明，女性在大量饮酒之后，比较难以性唤起；而男人呢，如前文所述，喝到一定程度可能就无法射精了——别以为这能起到延长性交时间的效果，那滋味绝对不好受。

而且，酒精会使人们思维迟钝、动作笨拙，这些都会给激情一刻带来不小的障碍。

[redacted]

酒精对怀孕也大有影响。这是因为酒精能够影响人的肝脏功能，从而导致雌激素水平增加，对男人来说，这可能影响精子的发育。而且，酒精还可能杀伤睾丸中的生精细胞，导致精子数量减少。因此，经常饮酒的男性精子数量常常较少，活动性也差。

对于女性，饮酒可能导致月经不调以及排卵功能障碍，这些都会影响受孕，所以医生通常会建议想要怀孕的夫妇暂时戒酒。

总之，适量饮酒基本对身体无害，事前稍微喝点也会有个良好的情调。但喝到了烂醉如泥，还是趁早别折腾了，洗洗睡吧。

为烟瘾牺牲“性福”，施主你这是何苦？！

赵紫凌

“吞云又吐雾，交心不二途，人情欲往来，烟丝先开路”——香烟常常作为现代社会中的行礼急先锋用于社交场合。除了递烟打招呼外，不少烟民（特别是男性）还会以烟作为一种装饰或是寂寞的象征。

然而，香烟尽管已经成为一种文化符号和社交用品，但它对健康却是有百害无一利的。虽然不至于一眨眼就送你见上帝，但是香烟的烟雾可谓毒物大全。根据《环境毒物》中的统计，香烟的燃烧烟雾里有 175 种各色有毒物质。不过这还不是重点，本文将着重探讨香烟对性功能的损害。

许多学者已经就吸烟对性功能的影响做了不少研究。在香港，研究人员对 819 名正常男性进行了一次调查，结果显示，与不吸烟者相比，每天吸烟超过 20 支的烟民患勃起功能障碍或性功能障碍的可能性显著增大；而且随着年龄增加，他们患勃起功能障碍或性功能障碍的概率也明显增加。另一篇来自德国的文献显示，在 1999—2009 年巴伐利亚地区的一项统计

调查里，性功能障碍患者中有 2/3 都是常年烟不离手的老烟客。

也许，这样的描述看起来还是很抽象，那么，我们来具体说说这云雾缭绕之中都有哪些东西能让男性“缴枪”吧。

很多女人觉得胖男人的性能力较差，这感觉虽然不具备确凿证据，但是却强烈地影响着她们寻找伴侣时的行为。实际上，这种感觉是本能的正确指引。胖人的性能力大多不强，这是因为胖人往往血脂较高，而高血脂会影响勃起能力和勃起状况。

我们知道，阴茎之所以能勃起，靠的是海绵体大量充血。而这种充血必须依靠动脉血的大量流入和静脉血的少量流出来实现，如果流入的血少了，那么勃起就会不够坚挺，甚至压根无法勃起。

而血脂含量过高，就可能附着在动脉血管的内壁，使血液流通不畅，进而造成动脉硬化。不巧的是，阴茎里的主干动脉血管比其他绝大多数器官的主干动脉血管更细。这样一来，一旦血脂偏高，“小弟弟”就会首先受到高血脂的影响。要是那里的动脉变狭窄了，“开源”就不给力了。如此一来，不管静脉方面如何“节流”，“小弟弟”都没法站起来了。

这些又和香烟有什么关系呢？原来，香烟燃烧产生的烟雾里的尼古丁可以帮助血脂在动脉内壁附着，这就使得吸烟者更容易因为高血脂而发生勃起障碍。除此之外，尼古丁还能使神经过度兴奋，导致对性刺激不那么敏感。

有些烟民可能要说了："我这人对'性福'不太感冒，只希望能生个可爱的孩子。无论抽不抽烟，要弄出个孩子来，还是很容易的吧。"

嘿嘿，如果你真的这么打算，那你就要哭死了。为什么呢？还记得上文提到的那本《环境毒物》吗？里面所列出的"香烟烟雾有害物质成分表"简直就像有毒物质清单一样，五花八门，应有尽有！像是芳香烃，生物碱（尼古丁也叫烟碱，属于此类），重金属微粒，有毒非金属，有毒小分子，氧自由基，甚至还有放射性气体——氡！想想看，身体吸入了那么多毒物，难道对"造人"没有影响吗？

想要孩子的烟客们，睁大眼睛看看这残酷的事实吧：

镉（Cd）、铅（Pb）、铬（Cr）、砷（As）等元素进入身体后，能让睾丸出现病理性的组织变化，正常的精子就产生不了多少了。

烟草焦油里面有些氧化性的基团，可以和 DNA 紧密结合，这直接导致生成精子时染色体联会的紊乱——结果就是受孕率暴跌。

一种苯并芘的衍生物，可以和 DNA 的鸟嘌呤碱基结合，造成后代的患癌率增高。吸烟者本人也同样面临患癌症的风险。

吸烟过程中还会产生各种有毒的氧活性物质，如超氧化物阴离子（O_2^-）、过氧化氢（H_2O_2）和羟基自由基（·OH），它们不仅损害血管，引起生精功能障碍和畸形精子增加，而且会导致体内促氧化剂 / 抗氧化剂不平衡，引发线粒体和核 DNA 受损。

另外，母亲吸烟也可能对儿子的精液质量产生远期效应。延森（M.S. Jensen）等人对来自 5 个欧洲国家的共 1 770 名年轻男性做了一项研究，

探讨母亲吸烟与他们睾丸大小以及精液质量的相关性，结果显示：与母亲不吸烟的男性相比，母亲在孕期吸烟的男性精子浓度降低了 20.1%，精子总量也减少了 24.5%。

如果细细罗列，吸烟的危害还有很多。现在国家出台禁烟令了，其实最明显的事实和价值，是不需要靠说教来普及的。为了你自己，也为了别人，让世界少一点烟臭，多一些花香吧。

高潮也能装，男女都一样？

Marquess Rouge

根据一些现有的研究，我们已经知道，无论男女都会装高潮。也许有些人在得知对方装高潮的时候，会想不通、郁闷，或者感觉信心大受打击。可是作为一个 geek（极客），如果你停留在这简单的“想不通”的层面，而不能看清楚它背后的真相，也许你和你的伴侣之间就会永远隔着一层窗户纸。所以今天，我要带你走进厚厚的科研文献，借助堪萨斯大学女性心理和性研究系 2009 年的一项研究，让你看清男女伪装高潮背后的真相。

首先，从 1973 年至今，已经有不止一项研究表明，1/2 ～ 2/3 的受试女性曾经有过伪装高潮的经历。在海蒂（Shere Hite）1976 年的研究中，3 019 名女性受试者中的 53% 表示曾有此经历（编者按：海蒂的报告因样本数量和方法问题受到过指摘）；达林（C. A. Darling）和戴维森（J. K. Davidson, Sr.）在 1986 年针对美国 15 个州的女性进行了一次普及调查，58% 的女性给出了曾伪装过高潮的回答；2001—2003 年间，大约

有 60% 的女性在各种类型的性行为中曾有至少一次伪装高潮的经历，这一数据也包含了口交、“手活儿”、电话性爱甚至“蹭蹭”之类边缘性行为中的伪装。

针对男性伪装高潮的调查起步较晚，但是这种现象也逐渐受到学者们的关注。1999 年，基尔伯歌德（Bernie Zilbergeld，对男人的性很有研究，著有 *The New Male Sexuality: The Truth about Men, Sex, and Pleasure*）在他的研究中指出，相当一些男性也会伪装。在斯坦纳（A. E. Steiner）于 1981 年进行的调查中，361 名男性样本中的 36% 表示曾伪装高潮，并且 31% 的男性不止一次进行过这样的尝试。

顾名思义，伪装高潮也就是用声音或肢体表现出已经达到高潮的样子，如肌肉紧张、呼吸急促等。有些正采取主动的男人会停下来，告诉对方“亲爱的，我已经到了”，然后若无其事地摘下套套扔掉。还有些人会向对方动情描述刚才的性过程，以增强“我已经到达过高潮了”的说服力。

关于伪装高潮的前因后果，解释起来的复杂程度不亚于高潮本身。性爱中谁采取主动、“拍档”是谁、是否在性行为前摄入了酒精，都会成为伪装高潮的影响因素。

47% 的女人和 13% 的男人认为，没有高潮的性爱也许会伤害这段关

系或对方的自尊心。其中有些女人会害怕男方觉得自己不易取悦，或自己达不到高潮是因为欲求过多。

61% 的女人和 82% 的男人表示，当他们开始疲劳时，他们希望通过伪装出一个完美的终点，使性爱平缓而不失温情地结束。一位被试者说：我高中时的第一个女友总是“想要”，每天都要 5～7 次。我不得不伪装，因为在第三次高潮之后，“真枪实弹”实在是太难了。

另外，75% 曾有过如此经历的女人表示，她们发现她们的伴侣快要“来了”，所以会采取一点她们觉得无伤大雅的伪装，让彼此能一起“登顶”。

除了上述主要原因，另有 25% 的女人和 7% 的男人提出，对方缺乏性技巧也是自己伪装的原因。不得不提到，有少数男人也会因为在性过程中没有使用安全套又害怕女方怀孕而假装——一位男性受试者很认真地说：“我的确很享受这个过程，但是一想到怀孕以及接踵而来的各种麻烦事，我就一个头两个大。”（友情提醒：不戴安全套直接操作，就算体外或伪装高潮，也不一定安全。）

[redacted]

实际上，被视为“常识”的性认识里面有不少都是误区。如果你是因为下列原因而伪装高潮，那么希望今后你能放下心理包袱，真正享受性的美妙。

[redacted] 常规的过程一般应该是：她先到，他后到，“爱爱”结束。

[redacted] 如果“爱爱”有蓝本，那还有什么趣味和美感可言呢？高潮的

顺序并不是一场性爱的任务，男方先高潮后，如果希望能为女方带来高潮，也可以采用爱抚、器具等方法。

性爱＝性交。直接性交中出现的才叫高潮。

无论男人还是女人都可能在一系列其他的性行为中达到高潮。甚至有一些受试者表示，直接性交中的高潮会让他们感觉到压力。

让对方高潮是一种责任。

有 12% 的女人和 2% 的男人提出，他们伪装高潮是为了让他们的伴侣觉得自己已经完成了该做的。可是，将高潮变成协议，是不是太荒谬也太程序化了一点呢？

高潮诚可贵，生命价更高

Big.D

“嘿咻”的时候，突然发现自己在和尸体“办事”，或者自己变成一具尸体，听起来让人毛骨悚然难以置信，但这种事其实不算罕见。报纸上登出的“XXX寻欢作乐裸死酒店”之类的事件，常常都是“脱阳”而死。

曾经有一种说法——人会因纵欲过度精尽人亡．这是不科学的，精液又不是什么性命攸关的东西。纵欲过度只会使人精神委顿身体疲惫，真正的死因还是心脑血管系统出了意外。

很多病都要人命，但让人死得最快的真过于心脑血管疾病的急性发作．心肌梗死、脑血栓之类的疾病一旦发作，不及时抢救的话，几分钟人就没的救了。而脱阳（或者说马上风），其实就是在不恰当的时间和地点，心脑血管突然出了问题，结果导致猝死。

做爱本身没什么风险，但是，因为做爱的时候两人神经高度兴奋，运动量又大，特别是达到性高潮时，心跳加速，血压升高，这对正常人当然

没什么问题，但对那些患有高血压、冠心病或者脑血管病的人来说，则可能诱发心律失常或者脑溢血，导致死亡。

所以，为了安全地“办事”，就得悠着点，不能随性胡来。像酒后、剧烈运动之后、疲乏的时候，都最好别急着亲热。而且长期频繁地行房，也会使人极度疲乏，增加脱阳的风险。还有，别以为 DIY 就安全了，有人曾因为“打飞机”猝死，《杀死比尔》里比尔的扮演者就被怀疑是其中之一。

紧张也是脱阳的一大诱因。那些偷情的人“中招”的机会比夫妻俩要多得多。法国曾有一任总统叫福尔（Félix Faure），他在和自己的办公室助手做爱时，突然中风去世。

当然，因噎废食也不可取，毕竟脱阳发生的概率还是很低的。只要平时注意保持良好的生活习惯，随着年龄的增长适当地调整做爱的频率，动作别过于激烈，别力不从心了还硬来，做爱还是很安全的。有很多研究表明，适度的性生活还有延年益寿的效果。

其实，不只是做爱，很多比较剧烈的运动都有引发中风或者心肌梗死的危险。例如，有个赛马师叫作海斯（Frank Hayes），他非常悲惨地在激烈的赛马比赛中突发心脏病，不幸逝世，而他的赛马却第一个冲过了终点，这大概是最名副其实的“马上风”了。

论“阴茎钳持”之不可能发生

SILENTGHOST

通常这类故事是这么讲的：某一对情侣在不合适的场所“办事”，由于受到惊扰，女方突发严重的阴道痉挛，导致双方下体无法分开。于是俩人只好裹条毯子，被人用一副担架抬到医院解决。

这种故事都讲得有鼻子有眼、有声有色的，听完基本上没人不信。但这种事儿到底是不是真的？答案恐怕是否定的——因为从没有证据证明它是真的。

有一个学术名词是专门用来描述这种情况的，叫作“阴茎钳持”（Penis Captivus）。关于阴茎钳持的资料非常少，最早的记载可追溯到中世纪，内容是有人在教堂里做爱的时候出了问题，直到第二天早上才被来祷告的信徒们发现。这个故事年代过于久远，其真实性不可考。

另一则往事发生在 1923 年的波兰。有报道称，两个年轻学生在花园里亲热的时候发生了这种事。由于记者过分激情地渲染，这两个学生羞愤不已，

饮弹自尽。不过这件事主要是记者在那里起哄，并没有医生方面的说法。

然而，阴茎钳持也确曾有过一个著名的“病例”，刊登在1884年的《费城医学新闻》（*Philadelphia Medical News*）上，引起一片热议。不过，后来发现这件事其实是该杂志的编辑奥斯勒（William Osler）的一个恶作剧，此人从小就是个上房揭瓦的主儿，这次可玩大了（这家伙是个货真价实的医生，是约翰斯·霍普金斯大学医学院的创始人之一，也难怪他开个玩笑就有人信了）。

之所以编造阴茎钳持的病例，是因为奥斯勒认为他一位同事发的一篇关于罕见的严重阴道痉挛的文章纯属扯淡，气不忿，于是化名戴维斯（Egerton Y. Davis），编造了一个由于严重阴道痉挛导致所谓的阴茎钳持的病例，投给杂志社，没想到这封信被当真了，而且还被登了出来。结果，这一“病例”从此就成了阴茎钳持的一个经典，尽管后来被证明造假，却一直被广泛引用。甚至到了1979年，还有人认为阴茎钳持或许是可能的，因为有这个“病例”存在。

有人认为，在某些极端情况下（比如偷情时担心被发现），精神高度紧张，一旦受到惊吓，会产生非常剧烈的阴道痉挛，并导致阴茎钳持。也有研究者认为，肛提肌在阴道痉挛的时候也会强劲地挤压阴道，让两人无

法分开。尽管这些说法看起来有点道理，不过目前相关领域专家的普遍观点还是——阴茎钳持不大可能发生。

因为从正常的阴道结构和阴道括约肌的特性来说，阴道痉挛固然有可能导致疼痛和阴茎无法进入，但阴道括约肌没有足够的力量使阴茎无法拔出。而且，在前面说的那个著名病例被证明是个玩笑之后，一个多世纪以来，虽然常有传闻，但始终没有可信的医学记载和研究。

“花儿们弱不禁风，天真无邪。它们总是设法给自己壮壮胆子，以为有了刺就可以吓退……花儿是多么自相矛盾啊，可惜我那时太年轻，还不懂得爱她……”

这个时代，女人们就算做不到文可执笔安天下、武可上马定乾坤，自我保护总是基本要求。瑟缩等爱、被动防御这些古典品格，实在潜藏危险。

一朵合格的玫瑰，要熟悉自身每一片花萼的纹理，牢记每一根刺的位置，对方也许不懂爱，但你要懂得爱自己。

你可能不知道

◦ 女性（单侧）乳房的平均重量是 500 克左右，两侧乳房总共包含了身体总脂肪量的 4% ～ 5%。

◦ 与阴茎类似，性唤起时乳房也会胀大，此时坚挺的乳头可以长达 1 厘米。

◦ 美国女性 2010 年的平均罩杯是 36C，而 15 年前是 34B。

◦ 文胸从 20 世纪 30 年代开始被大规模量产，现在，全世界消费者每年在文胸上的花费总数达 160 亿美元。

◦ 大部分阴道的长度为 7.6 ～ 10 厘米。

排卵期爱性幻想

冬天好热啊

任何一种有性爱意义的精神意向都可以被称作性幻想。它具有独特性、私密性、受现实环境影响很小等特点，它能更好地反映一个人性欲和性唤起的程度。因此，来自加拿大莱斯布里奇大学（Universiiy of Leihbridge）心理学系的萨曼莎·道森（Samantha. J. Dawson）等选择用性幻想内容和对性刺激（不同性别、年龄的人物照片）的观察时间，来探究女性月经周期和“性趣”之间的关系，并得到了一些有意思的结果。

我们知道，一个完整的月经周期是指从一次月经开始到下次月经开始的时间，通常为 28 天左右。它包括卵巢周期和子宫内膜周期。仅就卵巢周期而言，它可以分为卵泡期、排卵期和黄体期（对子宫内膜，可以分为月经期、增殖期和分泌期），整个周期伴随着多种性激素的规律性变化。

如果把月经周期比作一个公交循环路线，把女性的性幻想内容等比作沿途风景的话，那么这个公交循环共包括三个路段，且风景各不相同。接下来，就让我们跟随萨曼莎·道森的脚步，沿路欣赏吧！

研究者选择了 27 名平均年龄为 21.5 岁的女性作为研究对象，她们的共同特点是：都为异性恋者，没有在使用激素类避孕药，单身或者没有稳定性伴侣，未怀孕且没有要怀孕的打算。

在为期 30 天的观察中，研究者要求她们每天填写电子日记以记录幻想内容，且分别在生理周期的三个阶段让她们对不同性别和成熟度的人物图片进行评价排序，同时用仪器记录对图片的观察时间。

这个时期大约为月经开始后的第 1 ～ 13 天，是卵细胞在卵泡中发育至成熟的过程。卵泡期开始时子宫内膜脱落，形成月经。之后血浆中卵泡刺激素（Follicle-Stimulating Hormone，简称 FSH）水平增高，卵细胞逐渐发育至成熟。雌激素（estrogen）水平随之升高，导致子宫内膜增厚，内膜腺体增加，出现大量螺旋小动脉。

通常女性性幻想的内容并不只是与性有关的具体意向，还包括浪漫而抽象的内容，稍偏重于情绪和感受。但相比于其他两个时期，处于卵泡期的女性的性幻想中与性相关的内容最多，也更加具体，偏重于视觉意向。

卵细胞发育成熟后从卵泡中释放，由卵巢进入输卵管的阶段称为排卵

期。其约在月经周期的第 13 ～ 15 天。此时体内卵泡刺激素和黄体激素（Luteinizing Hormone，简称 LH）水平出现峰值，子宫内膜继续增厚。

这可以算是女性月经周期中性幻想变化最大的一个时期。随着排卵期的到来，被试女性的性幻想频率达到最高——平均每日 1.3 次，性唤起也变得更容易。并且在她们的幻想情境中，男性数量增多。但出乎意料的是，在这个阶段，幻想中有关于性的内容并不是她们关注的重点，情绪和感受反而更受到青睐。

随着卵细胞的释放，卵巢进入黄体期并持续到下一次月经来潮。这一时期大约为月经周期的第 16 ～ 28 天。表现为血液内孕酮（progesterone）水平显著增加，子宫内膜持续增厚，并达到最大值。子宫内膜中储存大量糖原颗粒，腺体含糖黏液分泌增加，螺旋小动脉卷曲加剧。这一切的改变都是为受精卵着床做准备。

月经周期的这个阶段，女性性幻想的频率最低，且幻想情境中出现的男性数量也最少。在观察不同性别、年龄的人物图片时，她们的目光也并没有在男性身上停留得更久。但这并不代表这个时期的她们对男性没有兴趣——性别喜好主观排序结果显示，她们对男性（尤其是那些外貌强壮成熟的男性）的评价会升高。

若受精卵一直未着床，那么黄体会在月经周期的第 24 ～ 26 天发生退化，伴随着雌激素和孕酮水平的急剧下降，子宫内膜脱落，形成月经——下一个月经周期开始咯！

大丈夫能屈能伸？阴道也可以

北斗京华

阴道的弹性着实让人惊叹：收缩时一根手指头也插不进去，而舒张时不仅能放入卫生棉条、阴道窥器，甚至婴儿的脑袋都可以从中通过。阴道为什么这么“能屈能伸”呢？

阴道的结构决定了它的弹性。阴道肌层为平滑肌，排列成内环、外纵两层，在阴道外口处有环行的骨骼肌，称为阴道括约肌。阴道外膜为富含弹性纤维的致密结缔组织。一句话概括，阴道的这种结构决定了它是一种非常结实的“超级弹性软管”。

拥有这种弹性结构的阴道的最神圣而艰巨的使命，就是让胎儿从中通过。正常情况下，女性阴道的直径为 2.5 厘米左右，但在生孩子的时候，直径可扩张达 10 厘米。2006 年，湖北省武汉市江夏区一个重达 5.8 千克的婴儿（接近 12 斤的巨婴）通过自然分娩降生，可见阴道巨大的扩张性。当然，阴道的潜力也不是无限的，美国一位母亲曾怀有重达 16 磅（合 7.26

千克）的男婴，面对这么大的孩子，阴道再有弹性也无能为力，只能借助于剖腹产了。

不同女性阴道的松紧程度大不相同，这与年龄和生育与否有很大关系。年轻女子的阴道都比较紧，肌肉富有弹性；而中年以后，阴道壁逐渐变得松弛，阴道也就比较宽松了。阴道过于松弛可不是好事，因为原本够用的阴茎在其中可能就无法发挥正常水平了。好在，可以通过阴道哑铃来锻炼阴道肌肉，这样多少能够恢复一些弹性。

除了生孩子，阴道还与性生活直接关联。许多人对阴道的收缩、舒张能力缺乏了解，男方害怕阴茎插入会损害女方身体，女性也担心性交会伤害自己的身体。其实这种担心完全是多余的，只要润滑得当、动作合适，性交是不会对阴道造成伤害的。

阴道的生理构造使其可以充分扩展，性兴奋时，占阴道 2/3 的阴道上段部分明显扩张，俗称“内勃起”。除了扩张，阴道在性交的时候还能收缩。阴道下 1/3 段和阴道口处对刺激极为敏感，在性高潮时，阴道下 1/3 段的阴道括约肌可强烈而有节奏地收缩，起到对阴茎的“紧握”作用，促进男性性兴奋的产生。其弹力和扩张力使阴茎和阴道紧密结合。

这里再额外说一句，阴道各段对性刺激的反应不同。上面所说的阴道上 2/3 段来自中胚层，没有神经末梢分布；而阴道下 1/3 段系由外胚层分化而来，富含神经纤维。所以对于接触有反应的神经末梢只集中在阴道口附近，阴道外 1/3 段要比内 2/3 段更富有性感觉。一般来说，阴茎勃

起后都能大大超过阴道 1/3 的深度，因此就刺激程度来说，女性性满足的决定因素并不是阴茎的长短。

需要提醒的是，阴道虽然弹性很好，不过也很脆弱，不注意卫生或不正确的清洗都会给它带来麻烦。

妇科里正在搞什么？

roseVSthorn

阴部瘙痒，阴部异味，阴部不适……亲爱的女性朋友，你遇到过这样的问题吗？如果你正在忍受种种难言之隐，求助妇科天使吧！让他们为你做些检查，就能知道真正病因，对症下药，早日康复了！在检查时，通常妇科大夫会让你摆一个女性特有的 pose，以便进行深入的检查。这中间当然要用到很多不同的检验方法和医疗器械，不过有一种是最常用的，那就是阴道窥器，或者叫扩张器。

还记得《老友记》里有一集，罗斯的前妻怀孕去医院做检查，罗斯傻乎乎地拿了个金属小工具当鸭子嘴比画，结果惨遭众人鄙视的情景吗？他拿的那个东西就是阴道窥器了。阴道窥器的英文名字是 vaginal speculum，speculum 来自拉丁语中的 specere，意思是“看”。

阴道平时像一根被压扁的软管，想观察它的内部和子宫颈，就得先把它撬开，这正是阴道窥器的用途。现代的阴道窥器是一种鸭嘴形的金属或

塑料（一次性）工具，可以探索阴道内部和采集分泌物，主要用于巴氏涂片检查（Pap Smear）、阴道检查、肛门检查等。


早在古埃及和古罗马时，聪明的人们就开始使用阴道窥器了。起初的窥器由竹子和葫芦茎制作而成，随着历史的发展逐渐演变成金属材质，再到现在的塑料材质。由于材质和地域的关系，最早的那些窥器早就变成历史的尘埃了。现存的老古董窥器有在庞培发现的，由青铜铸造；黎巴嫩也出土了款式类似的窥器。

后来，美国的J. 马里恩 · 西姆斯（J. Marion Sims，为现代妇产科学做出了很大贡献，不过当时他的新玩意儿主要是在当奴隶的黑人女性身上做实验的）对阴道窥器做了改进。改进后的窥器由一个空心圆柱加上两瓣分开的圆“屁股”组成，看起来就像一个长长的鸭嘴巴，这就和现在常用的阴道窥器没有太大区别了。

在阴道窥器上，人们其实也做过不少尝试（见图2），不过最终还是那种鸭嘴式的最受欢迎。


现今妇科使用的阴道窥器主要由金属或塑料制成。金属窥器属于可多次使用的工具，每次使用完后需对其进行消毒及高温处理；而塑料窥器则是一次性使用，更加安全。用之前，大夫会在要插入的部分涂一些润滑性的物质（如石蜡油），然后边推边转边扩张，以使之达到工作状态。

此外，还有一种充气的阴道扩张器具，据说对患者来说很舒适。可惜这东西不太受医生喜欢，未能推广开来。



有了好工具，还得有正确的姿势　妇科床就是一种专门为做妇科检查的患者或顺产的女性保持便于医生操作的体位而设计的医疗器材。患者背部平躺在腰板上，双脚踏在脚板上，双腿分开，根据身材大小调整头部位置，以便完全露出阴部；这个姿势看起来就像半平躺或坐在椅子上。

大夫在进行操作前，会让患者了解操作，避免患者紧张；还要让患者排空膀胱，以免影响检查结果；做好准备工作后，让患者以膀胱截石卧位（见图3）的姿势躺下，深呼吸放松。一切准备就绪后，病人就会感到有一个



冰凉的物体渐渐进入体内，并伴有丝丝疼痛。而事先预热金属器械或者用塑料窥器的话，患者就少了许多冰凉的感觉。

阴道窥器固然是妇科医生的好帮手，不过有时候也会有悲剧发生，因为处女膜不认进来的是生物材料还是金属材料，但有的男人可只认处女膜。

实际上，为了避免损伤处女膜，按照规程，妇科大夫在做此类检查时，对婚姻状况一栏填着“未婚”的都会格外谨慎，事前还会仔细跟患者解释和

沟通可能的风险，所以一般情况下不会出现这种问题。不过关于妇科检查弄破处女膜造成的纠纷，网上也是一搜一大把，看来还是有人会不小心啊。

那么，妇科里正在搞什么呢？如果你随便挑个时候一头闯进去，多半会看到辛勤的大夫在妇科床前为患者低头忙碌的场景——一点也不神秘，所以，让那些奇怪的想法都退散吧。

修补处女膜，真有这必要？

北斗京华

原本普普通通的一层膜，被赋予了“处女膜”的称呼，与贞操挂上了钩，就变得神秘而敏感，还成为女性贞洁的象征。不少人以为，新婚之夜“嘿咻”之时，这层膜破损出血（见红）就表示女性处女膜的完整，象征着女性婚前的贞操。

这在一些社会文化中可能极为重要，处女膜的完整性影响着婚姻前景、家庭名誉，甚至生活的方方面面。比如，地中海地区的一些阿拉伯国家的男性非常在意自己的爱人在结婚时是不是处女，男方的家庭可能会由于女方洞房花烛之夜没有出血而对女方进行“打击报复”。中国的文化传统中也有着对于贞操的“特别关注”，传统的贞操观要求女性婚前不失身，婚后不改嫁，甚至还有新婚不见红就休妻的悲剧。

正是由于未婚夫及其家庭对处女膜完整性的关注，不少女性才选择进行处女膜修复。一场盛大婚礼的幕后，可能会有个女孩为处女膜的问题步

线行针。可惜，历史上这种手术的初衷却不那么体面。据说，处女膜修复术是在 19 世纪前半期的欧洲为方便妓女要高价而发明的。

处女膜修复的技术已经日趋成熟，修复方法不尽相同，但过程都并不复杂，一般能在 2 个小时之内完成，属于门诊手术，根本无须住院，不会耽误工作。修复的方法主要包括以下几种。

将残留的处女膜缝合。这一方法适用于那些破损不太严重的案例。但是由于缝合之后持续的时间不会很长，手术时间大约在大喜之前 3～7 天，以确保能够在行房之时产生出血效果。在局部麻醉的状态下，这一手术并不会使人感到痛苦。

如果处女膜已经不适合缝合了，可以考虑植入膜状的人工生物材料。植入的材料主要由胶原纤维的提取物构成，具有无毒、抗原性弱等特点，并可以逐渐被受体自身的组织吸收，所以这一手术最好也在新婚之前几天完成。

除了缝合和移植，还可以打打阴道黏膜的主意。切开两侧阴道黏膜，

将其缝合在一起伴装处女膜。相比于上面两种方法，这一方法需要在结婚之前留出充足的时间，以使伤口愈合。这里需要多说一句，由于这一方法还可以起到收窄、拉紧阴道的效果，一些人也乐于接受这种方法的处女膜修复，以便追求更高层次的性享受，一箭双雕。

当然，最直接的应付“见红”的办法应该算是直接在阴道内植入一个装有类似血液物质的“血液”胶囊，胶囊会在性交时破裂，“见红”的目的也就达到了。

尽管修复过程不算复杂，但处女膜修复终究还是一次手术，有一定的风险，比如麻醉的过敏反应、手术出血、感染、伤口结疤、肿胀等。

事实上，处女膜的情况与性行为之间的联系，绝对不像早餐时用吸管捅破一杯豆浆的包装那么简单明显。处女膜破损的原因有很多，初次性交不出血的情况也并不少见。使用卫生棉条、妇科检查时的不慎，或是骑自行车、体操等剧烈运动都可能造成处女膜破损。

两个人走到一起真心相爱，毕竟爱的是人，而不是膜。看了现在的处女膜修复技术，再过分纠结于有没有膜的问题，恐怕真的会把自己绕进去。与其在那儿瞎琢磨是原装还是返修，不如静下心想一想眼前这个女孩究竟是不是你打算用一生去爱的人。

G 点真的被找到了？

SILENTGHOST

自格拉芬博格（Ernst Grafenberg）医生于 1950 年提出 G 点的概念以来，人们对它的探索从未止步——无论是基于科学目的还是实践需要。可惜，寻找 G 点的具体位置和解剖结构的路途并非一帆风顺。很多女性对自己 G 点的存在坚信不疑，但学界找 G 点的情况则是——搞解剖的一筹莫展，做脑成像的步履艰难，从心理学角度研究的云山雾罩。在这种情况下，突然，整形妇科专家亚当 · 奥斯特罗钦斯基（Adam Ostrzenski）的一项研究说：G 点的解剖结构被找到了！

奥斯特罗钦斯基声称，他在阴道壁深处发现了一些囊状结构，当打开这些囊状物的时候，会发现其中有白色的像“毯子”似的膜状结构，揭开这层“毯子”之后，就能看到一些很小的蓝色葡萄串状的结构，他认为这就是 G 点的真身。奥斯特罗钦斯基还指出，这个“G 点”区域还包括一条绳索状的管状物，看起来似乎是阴道壁中间的勃起组织，充血时就会向

周围的组织升起。

这个"惊人发现"，是奥斯特罗欧斯基在解剖一具来自波兰华沙、不幸死于头部重击的 83 岁老妪的尸体时发现的。据奥斯特罗欧斯基说，之所以在波兰做这个研究，是因为当地允许解剖死亡不久的尸体，而此时组织之间的区别比较明显。

这真的是个突破吗？至少印第安纳大学性学专家赫本尼克（Debby Herbenick）不这么看。

赫本尼克在博客中表示，或许假以时日，我们会在一些女性身上发现一些解剖结构，当通过阴道去刺激这些区域时，会带来快感甚至高潮。如果是这样，我们可能把这些地方称作"G 点"。不过，也许在另外一些女性身上，根本无法确定这样的结构。或者说在有些女性身上，就算发现了一些特定的结构，但这些结构与性快感和高潮之间也没有关系，如果是这样，这些结构还能叫作 G 点吗？在奥斯特罗欧斯基的研究中，这位老妪之前的性经历根本没人知道（而且恐怕也没法知道了），又怎么能确定她的 G 点是否真是那里呢？而且，只解剖了一具不太具有典型性的尸体就匆匆宣布找到了 G 点，却无视之前那么多的相关研究，也未免仓促了一点。

而知名科普作家、遗传学博士刘易斯（Ricki Lewis）则同奥斯特罗欧斯基进行了交流，刘易斯发现，奥斯特罗欧斯基之所以要做这个研究，是因为 2008 年有篇文章是关于"G-spot 基因"的，他相信既然"G-spot"有遗传基础，那么每个人都应该有。

奥斯特罗钦斯基所说的文章，题目是《在昂飞公司的基因芯片上，G-spot 导致错误的表达测量》（*G-spots Cause Incorrect Expression Measurement in Affymetrix Microarrays*）。看起来还挺像那么回事，不过，或许你已经发现了，我在前边那句话里用的全是"G-spot"而不是"G点"，这是为了将遗传学上的"G-spot"和阴道里那悬而未决的"G点"区别开来。刘易斯在博文里解释，在遗传学上，"G-spot"是一种特定序列的缩写，指的是一串由4个（或更多）鸟嘌呤（也就是"GGGG"）组成的重复序列，这个重复序列能使DNA复制中断，也会干扰DNA探针在芯片上的附着（也就是上文提到的那篇关于基因芯片的文章的内容）。这个"G-spot"与尚不能确定是否藏在阴道某处的"G点"之间毫无联系。

因为奥斯特罗钦斯基的研究中并未涉及组织学检测，刘易斯还特地请教了一位不愿透露姓名的解剖专家。据这位解剖专家说，那种蓝色的葡萄状的东西或许是血肿，也可能是以前胯部撞到了什么东西导致的。

总之，医学期刊报道一个特殊的病例固然没错，但是，仅凭一个案例就宣称发现了G点，这种行为还是值得商榷的。

高潮来了才会喊？

冬天好热啊

在“XXOO”时，为什么女性会发出复杂的声音——呼吸加重，呻吟，叫喊，说脏话，或哭或笑？这是否预示着她们的高潮快来了，或者她们正在体验着性高潮？叫床与性高潮真的像人们通常认为的那样具有一致性，是女性到达高潮时情不自禁的反应吗？

来自英国中央兰开夏大学的心理学家盖尔·布鲁尔（Gayle Brewer）的研究试着回答了这个问题。研究者们对71位年龄在18～48岁之间的女性做了问卷调查（她们的共同特点是，都有过性史且体验过性高潮）。结果发现，这些参与者的性高潮多发生在前戏阶段，但叫床最强烈的时段却是她们的伴侣射精之前。如此看来，女性叫床似乎并不能起到预示自身性高潮的作用，叫床与高潮之间也并没有表现出时间上的一致性。她们对如下问题的回答也证实了上述推断——当被问到“在明知高潮不会到来的情况下，是否还会发出叫床声”时，接近80%的女性回答了“Yes”。

不仅仅是人类，我们的灵长类“亲戚”在交配时也会发出类似的声音。

关于它们为什么这么做的猜测非常多。比较公认的一种理论是，这种声音能使它们在交配的过程中掌握更多主动权，对雌性而言是有利的。

通常，对于那些非一夫一妻制关系的雌性灵长类动物而言，交配时发出叫声是为了引起其他雄性的注意，向外界宣称自己正处于生育期，具备生育能力，从而煽动雄性个体之间的竞争，或者招来更多的雄性与其交配，引发精子竞争（sperm competition，粗略地讲就是多个雄性同一个雌性交配时，精子数量多且质量好的雄性留下后代的机会更多）。雌性通过这样的方式选择更加强壮的雄性个体，或者得到更加优良的遗传基因，保证生出更健康的下一代。

但新时代的女性既不会用叫床这样赤裸裸的方式来吸引更多男性注意并进行选择，也不能同时与多个男性交配以引发精子竞争，而且这叫声还不全是情不自禁的产物，那这番折腾到底是为哪般呢？

毋庸置疑，叫床确实能瞬间点燃男性心中的欲望之火，影响他们的性行为。但是当被问到“为什么会叫床”时，答案却有点出乎意料——66%的研究参与者表示她们叫床是为了让伴侣快些射精！

当女性在性交中无法获得欢愉，反而感到不适、疼痛，或者认为过程很无聊、感到疲劳时，她们会使用叫床声刺激男性，使他们快快射精完事儿。这样做也能尽量躲避粗鲁的性交，降低由此带来的擦伤、感染等风险。当然，当女人们认为时间紧张、需要速战速决时，也可能会采取同样的策略来结束“活塞运动”。

此外，叫床也能让女性得到她们想要的。虽然和伴侣谈性并不是什么有伤风化或者难以启齿的事情，但是要说出自己在床上想怎么做、要什么并且付诸行动，总让女性们觉得有点不好意思。即使说了，也极可能出现男方的行动和自己的想法相去甚远的情况。而通过叫床这种“嗯嗯啊啊”的方式，女性可以含蓄且直接地表达出自己的喜好，告诉男性们怎样做她们才更满意，从而让伴侣的行为更符合自己的期望。

那么，根据上面的说法，这荡漾的叫声多半只是出于操纵对方的目的？当然不是——在布鲁尔的研究中，92% 的参与者称她们感到叫床能增加伴侣在性事上的自信程度，并且 87% 的参与者明确告知，这，就是她们叫床的目的。看吧，并不是因为欺骗，反而是为了沟通，暗示他们做得非常好，是个理想的好情人。

但是，更深一步讲，或者从我们的灵长类朋友的角度出发，真相似乎又会变得有些赤裸裸——雌性之所以通过叫床增加伴侣的自信，是为了加强与他们之间的联系，以使自己不被抛弃，能一直享有男性所提供的安全保障和物质援助。


当然，叫床这种事毕竟还是因人而异的，考虑到样本数和覆盖度的问题，还是有必要进一步扩大调查范围。至于日常生活中嘛，想叫就叫，想什么时候叫就什么时候叫呗。

非洲女性割礼——名媛与屠夫

冬天好热啊

“我从两腿之间，看到那吉卜赛女人正在做准备……她从一个旧旅行包里，找出一把破剃刀……我看不清刀的细节，然而，我能看到那破刀锯齿状边缘上干涸的血迹。她往刀上吐了点口水然后用衣服擦了擦……接着，我感觉到我身上的肉，我的生殖器被割掉了。我听到那把钝刀从我皮肤上锯过来锯过去的声音。我像块石头那样坐在那里，告诉自己别动，长痛不如短痛，然而不幸的是，我的腿却自己开始颤抖，于是我开始祈祷：‘神啊，让这一切快点结束吧！’祈祷马上变成了现实，因为我晕了过去。”

上面这段血腥的文字摘自黑人超模华丽丝·迪里（Waris Dirie）的自传小说《沙漠之花》（该书于2009年被改编为电影，在多国上映）。迪里出生于索马里沙漠，5岁时被迫接受了女性割礼，13岁那年为了逃避强加给她的婚姻出逃，后来历尽艰辛成为超模。1997年，她放弃如日中天的事业，成为联合国大使，投身于反女性割礼运动。那么，这种野蛮残忍的习俗究竟是怎么回事？会对女性造成哪些伤害呢？



如图 4 所示，根据世界卫生组织（World Health Organization，简称 WHO）定义，女性割礼（Female Genital Mutilation/Cutting，简称 FGM/C）为“出于非医疗原因，部分或全部移除女性外生殖器，以及伤害女性生殖器官的行为”，这种习俗主要在非洲一些国家及中东地区流行。根据外生殖器被割去的程度不同，WHO 将女性割礼分为了四个类型：

通常包含两种子类型：①只切去阴蒂核或者阴蒂包皮；②切除阴蒂包皮并部分或者全部移除阴蒂。

割除阴蒂以及部分或者全部的小阴唇，切除或不切除大阴唇。它包括三种子类型：①只切除小阴唇；②部分或者完全切除阴蒂以及小阴唇；③部分或者完全切除阴蒂、小阴唇以及大阴唇。

切除或不切除阴蒂，但是部分或者全部移除小阴唇，并

缝合大阴唇，只留一个小孔以便尿液和经血排出。迪里在《沙漠之花》里描写过，她小便时须花 10 分钟，因为尿液只能一滴一滴流下，而来例假时更是什么都做不了，只能躺在床上。

即指除以上三者以外，其他出于非医疗原因而损害外阴的行为，包括阴部打孔、阴蒂穿刺等。

受教育程度低下、男尊女卑的思想是导致女性割礼的一个重要原因。此外，实施女性割礼地区的人们认为：女人的双腿之间有“不洁净”的、让男人沉溺的东西，只有当这些东西被移除以后，女性才是干净、美丽和有教养的。

由于割礼时阴蒂被切除，女性会出现性欲降低、性行为减少的情况。特别是当女性被实施类型 III 割礼后，她们会出于对性交导致阴部缝合处部分撕裂的恐惧，以及害怕伤口撕裂被发现等原因，而避免发生性行为——在有女性割礼习俗的地区，人们认为割礼能证明一个女孩在婚前是否为处女，并且将其作为婚后忠诚度的判断标准。

总之，对于一个被实施过割礼的女人而言，性爱不仅不是一件欢愉的事情，更是种折磨。但讽刺的是，那些支持自己女儿去做割礼的母亲相信这样做是为了保护她们的女儿，是在为女儿将来的婚姻生活做好准备，并且能维护良好的家庭名誉。

其实女性割礼绝不像那些母亲所认为的那样保护了女儿，割礼对女性健康有着非常大的伤害。由于现在许多割礼手术都是私下进行，手术人员

未经过专业培训，卫生条件也往往不合格，因此剧烈疼痛、大出血、伤口感染等情况自然时有发生。

此外，女性割礼还会造成很多长期的负面影响，比如上面说到的阴蒂敏感性下降、性欲降低，这使接受过割礼的女性不能进行正常的性生活，更无法体会性爱带来的快乐。对做过类型Ⅲ割礼的女性而言，为了让伴侣进入，性交的开始部分更是痛苦，反复的伤口撕裂不仅会造成感染，还会导致囊肿、脓疮等多种并发症，并提高艾滋病的感染率。

另外，根据2006年WHO的调查，相对于没有接受过割礼的女性而言，几乎所有形式的女性割礼都会提高婴儿出生时的死亡率，而且受过类型Ⅲ割礼的母亲剖腹产率增加了30%，产后大出血的风险增高了70%。除此之外，接受过割礼的女性也更容易表现出紧张、焦虑等情绪。

女性割礼这一残忍的习俗已经延续了好几个世纪，而关于禁止女性割礼的斗争仍在继续。例如，苏丹在1946年就出台了有关禁止女性割礼的法律，但直到20世纪末，苏丹仍是世界上女性割礼最流行的国家之一。

一把好枪，由一系列数据支持．大小长短直弯软硬，哪些值得密切关注，哪些只宣付之笑谈，持枪者必须了解。细心呵护，仔细擦拭，时时检查，才有关键时刻的上膛发射．才不至于未到使用寿命就折戟沉沙。男人，也要对自己好一点。

給予副署
免許書面

你可能不知道

◦ 美国男性 2008 年的平均精子密度数据比 1978 年的少了 30%。

◦ 万艾可（伟哥）的上市时间是 1998 年，上市前 3 个月就卖了 4.11 亿美元。

◦ 世界上活着的男性中，拥有最长阴茎者勃起后阴茎长 34 厘米。

◦ 成年男性的左侧的睾丸平均质量为 10.2 克，右侧则为 10.7 克，通常左侧睾丸位置略低。

◦ 一般男性每次射精量为 2 ～ 6 毫升。

长度：脱下裤子 or 伸出手来

Dacong

与心仪的男性深入交往之前，如何大致判断这位英雄的“宝剑”尺寸是否适合“剑鞘”的需要？窍门就是：留心观察一下“白马王子”食指与无名指的长度，如果第四指比第二指长，而且长很多，那么恭喜你，你将会有一个“大大的惊喜”——比起两指长度相差无几的人，他的“宝贝”更可能长度傲人。

《亚洲男科杂志》（*Asian Journal of Andrology*）最近发表研究表明，食指和无名指的长度比值（也称为“手指率”，英文名称为 **digit ratio**）与阴茎长度有一定的关联．两指比值越小，阴茎长度越长。

在韩国仁川嘉泉大学附属医院（Gachon University Gil Hospital），以泌尿科医师金太白（Tae Beom Kim）为首的研究者们招募了 144 名 20 岁以上的志愿者参与研究。研究者测量了志愿者的手指长度，以及阴茎弛缓和被抻直时的长度（后者与阴茎完全勃起时的长度存在统计相关）。 最

后研究者发现，手指率越小，被试男人的阴茎长度越长。

阴茎的长短，很大程度上是激素说了算。研究人员虽然还不清楚究竟是怎样的激素暴露和遗传过程让手指率与阴茎长度产生了联系，但他们认为：在男孩的胚胎期，母亲子宫中的雄性激素（特别是睾酮）对此有重大影响。

斯基德摩尔学院（Skidmore College）的生物学家丹尼斯·麦奎德（Denise B. McQuade）表示，如果该发现被证实，那么手指率就能为男性患激素引发疾病的风险提供简单的初步诊断：医生们只需要打眼一看，就能大致知道患者们还未出生时，在母亲子宫中究竟暴露在多大量的雄性激素之下。因为雄性激素不仅能使男人变得阳刚，也会抑制免疫系统的功能和强度，阻碍男性自身的修复能力。从无伤大雅的脱发，到可能夺人性命的前列腺癌，总之，单从激素的角度上来说，“越纯的爷们儿越短命”是有一定道理的。

各式研究表明，男人们的手指率与很多指标有关。较小的手指率，常常意味着更棒的生育能力和更强的性欲。而对女性来说，较大的手指率则意味着更好的生育能力。

当然，手指率与阴茎长度的关系仍是受关注的重点。2002 年，希腊

雅典的海军退伍军人医院也曾有一项相关研究，结果发现被试者食指长度与生殖器大小有一定的相关性。

看来，手指不仅可以戴戒指，还会泄露你“紧紧包裹”起来的秘密哦。

必须指出的是，对待这类研究也需要相当谨慎。毕竟手指率和阴茎长度只是恰好都受雄激素水平的影响而已，这种联系是非常间接的。而且在韩国的这项研究中，144 名志愿者都是来泌尿科做手术的患者，并不能完全代表一般人群。而且，目前尚未有更多研究证明手指率和阴茎长度之间的确凿联系。

再次重申，手指率应当被看作是一种胎儿时期性激素水平的参考，并不能直接拿来当作精确预测阴茎长度的指标。更重要的是，身高不是问题，长短不算差距，只要两人有爱有技巧，阴茎长度正常的男性都足以取悦伴侣，没必要纠结于阴茎的尺寸。

直还是弯?


别误会，我们可不是要为大家做性取向测试，我们要讨论的仅仅是男性的阴茎在“嘿咻”时的形状。

为什么要研究“直”和“弯”的问题呢？这还得从莱昂纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）在1493年画的一幅人体素描说起。

图5是达·芬奇绘制的一幅人体素描。但它与常见的人体素描有一个巨大的区别，那就是图中的男女正处于性交的过程当中！如果我们仔细查看这幅图的话，会发现右边男士的“小弟弟”有个特点，体外勃起的部分与体内根部的部分基本上处于一条直线上。事实果真如同达·芬奇所描绘的那样吗？

荷兰格罗宁根大学医院妇科的舒尔茨（Willibrord Weijmar Schultz）副教授等研究人员进行的磁共振扫描结果告诉我们：事实并非如此。


研究人员征集了8对性功能正常的志愿者夫妻。实验开始前，男性志



愿者需要服用 50 毫克的万艾可“加强火力”。45 分钟之后，实验正式开始。每一对志愿者均被要求以“传教士体位”（男上位）的姿势进行性交（这个体位与达·芬奇手稿中的男女体位相同）。当然，在扫描拍照的时候，研究人员会要求志愿者停止运动，保持静止的状态，从而确保设备能获取较高质量的照片（见图 6、图 7）。

想想这些志愿者，非但要忍受磁共振机巨大的噪声，还得努力在直径 60 厘米的扫描孔拘束下进行“活塞运动”；更有压力的是，外头还有一帮科学家伸着脖子围观，最要命的是，别人喊“咔”的时候还得停，真是“为科学献身无底线”啊。





Willibrord Weijmar Schultz, Pek van Andel, Ida Sabelis, et al. Magnetic resonance imaging of male and female genitals during coitus and female sexual arousal. *BMJ*, 1999, 319:1596.

A. Faix, J.E. Lapray, O. Callede, et al. Magnetic Resonance Imaging (MRI) of Sexual Intercourse: Second Experience in Missionary Position and Initial Experience in Posterior Position. *Journals of Sex & Marital Therapy*, 2002, 28(s):63—76.

最后，研究人员获得了一些较为清晰的照片。很明显，在这种姿势下，男性阴茎的形态并未呈现类似直线的状态。体外勃起部分的长度大约占阴茎总长度的 2/3，体内根部长度大约占阴茎总长度的 1/3。阴茎的体外勃起部分与体内根部之间的角度在 110° ～ 120° 之间。此时阴茎的形状很像一支回旋镖。

法国的研究人员使用相同的检测手段也得出了相似的结果，而且从他们获得的图片中，一眼就能看出那支“回旋镖”。

原来在这样的姿势下，阴茎弯得如此厉害。不过也不用担心，海绵体本身很有弹性，阴茎的皮肤也完全承受得住，只要润滑充分就完全没问题。

其实，再仔细看看达·芬奇那幅手稿的其他部分，还能发现亮点。比如，从女性乳房到子宫那条管子，这是因为达·芬奇时代的人认为女性怀孕时月经会变成奶；而从男性阴茎到脑子之间相连的那条通道，则代表当时一种流行理论——精液由大脑产生（虽然不符合科学原理但颇有哲理啊）。不过也大可不必吹毛求疵，毕竟在那个时代能画出此等“重口味”的精美作品，已足以令人高山仰止了。

你，是硬汉吗？

我们常用“硬汉”形容男人，对男人来说，“硬”确实很重要。硬度是男性在性生活中最基本的要素，只有阴茎勃起达到了足够的硬度，才能完成正常性交。研究发现，阴茎勃起的硬度与性交成功率、性交满意度等指标均呈正相关。

从古至今，男人一直对硬度非常重视。在古埃及，人们认为鳄鱼的阴茎能够帮忙解决男人的硬度问题，于是，不知有多少“男鳄鱼”被性无能了……直到四五十年前，人们还在通过电击睾丸这种既不人道又不靠谱的方式对待不够硬的“小弟弟”们。而今，某些壮阳药之所以能够经久不衰，就是因为它解决了硬度的问题。

在英国、美国、德国、意大利、西班牙等国家及地区进行的“更性福调查”（Global Better Sex Survey，简称GBSS）发现，被调查者普遍认为保持良好性生活与性关系的关键在于能够维持足够硬度的勃起。专门针对

亚洲国家或地区的调查也获得了相似的结果。可见，对于绝大多数情侣来讲，能够正常勃起并维持勃起的硬度对于性生活的满意度非常重要。

然而，在全球的调查中，称自己总是能够在性交中保持勃起状态和硬度的被调查者不足 2/3。在亚洲的研究中，只有 23% 的男人对自己的坚挺状况感到满意，而对自己爱人的硬度感到满意的女性只有 15%。

在一些研究中，阴茎勃起的程度被划分为四个层次：阴茎增大，但不勃起；阴茎勃起，但未达到足以插入的硬度；阴茎达到可以插入的硬度但未完全坚挺；阴茎完全勃起并坚挺。

正常性交中，只有硬度足够的阴茎，才能同时对抗阴道使阴茎弯曲的阻力（轴向硬度）和阴道壁对阴茎的环形压力（径向硬度）。否则，前者将使阴茎弯折，后者会将阴茎“压扁”。因此，在测量阴茎硬度时，需要同时考虑轴向硬度和径向硬度两个指标。


轴向硬度主要取决于三项因素：阴茎海绵体内压、阴茎几何学（阴茎轮廓比，常以疲软阴茎的直径和长度之比表示）和阴茎组织的机械特性。所以，一根轴向硬度较好的阴茎应该具有阴茎海绵体内压高、阴茎粗壮且阴茎组织弹性较好等特性。径向硬度与海绵体的张力特性相关，而与阴茎几何学或组织机械特性关系不大。

轴向弯折试验通常用于测量轴向硬度。如图 8 所示，测定时用带有保护帽的公斤压力计施压于阴茎头，并保证压力方向与阴茎纵轴一致而没有角度偏移。当海绵体内压为 5 ～ 10 毫米汞柱时，记录导致阴茎轴弯折时的力量，即为轴向硬度。一般用克或千克来表示使阴茎发生弯曲的力量大小（若使用单位“牛顿”，则用“千克数 ×9.8 牛顿 / 千克”进行换算）。

当轴向硬度小于 500 克时，阴茎几乎难以插入任何阴道；当轴向硬度为 500 ～ 1 500 克时，阴茎可能成功插入阴道，但到底能否成功，取决于性伴侣阴道的阻力；当轴向硬度大于 1 500 克时，阴茎几乎可以插入任何阴道。

如图 9 所示，径向硬度测量仪带有两个包含弹力簧锁的阴茎圈，测量时分别置于阴茎的头部和根部。当阴茎圈以 10 盎司（1 盎司约为 28 克，将 10 盎司的力量换算为“牛顿”的话，约 2.744 牛顿）的力量作用于固体物质时，将不能收缩，以此作为 100% 硬度的参考点。测量阴茎径向硬度时，将阴茎圈套在勃起的阴茎上，并同时施以 10 盎司的力量。由于阴茎不可能达到 100% 的硬度，因此，为了束紧阴茎，阴茎圈必然会变小，而阴茎圈内的弹力簧锁也必然会发生移位，于是测量仪器便能得到一个代表相对硬度的百分数，这便可以用来反映阴茎的径向硬度。

当测量值大于 70% 时，表明阴茎处于正常勃起状态；当测量值在 40% ～ 70%（含 40% 和 70%）之间时，表明阴茎处于无效勃起状态——此时阴茎发生了一定的膨胀，但没有达到顺利完成性交的硬度；当测量值小于 40% 时，阴茎处于无硬度性勃起状态。







D. Udelson, A. Nehra, D.G. Hatzichristou, et al. Engineering analysis of penile hemodynamic and structural-dynamic relationships: Part II-Clinical implications of penile buckling. *International Journal of Impotence Research*, 1998; 10:28.

D. Udelson, K. Park, H. Sadeghi-Nejed, et al. Axial penile buckling forces vs Rigiscan radial rigidity is a function of intracavernosal pressure: Why Rigiscan does not predict functional erections in individual patients. *International Journal of Impotence Research*, 1999; 11:329.

了解自己硬度情况的更简便易用的方法是使用“国际勃起功能问卷表”（IIEF），一份完整的IIEF包括勃起功能、插入满意度、性高潮、性欲、总体满意度等多个部分，问题包括进行性行为时是否能够保证勃起、勃起的硬度是否能够保证性交、对性活动是否感到满意，等等。多年的临床研究验证了IIEF问卷的可靠性和有效性，这一问卷也已经出现了一些简化版，如IIEF-EF、IIEF-5等。对自己亲密无间的“伙伴”心存疑虑的爷们儿，不妨用本文后的附表测一下。

当然，也有研究显示（但目前不能完全证实），长时间每周少于1次的性生活频率可能增加发生勃起功能障碍的风险，因此保持有规律的、有一定频率的性交活动有助于保持阴茎的勃起硬度——正如运动能够保持身体机能一样。所以说，对单身的男同胞而言，适当的自慰也是有帮助的。

[illegible]

在过去6个月中，

1. 您对性活动somethingsomething的自信程度如何？

(0)毫无把握　1)很低　(2)低　3)中等　4)高　5很高

2. 您有引起性欲而自慰或性活动时，勃起的硬度足够插入阴道的次数有何

(0)没有性行为

1几乎没有或完全没有

2少数几次（远少于一半时候）

3有时（约一半时候）

4大多数时候（远多于一半时候）

5几乎总是或总是

3. 在性交时，您在阴茎插入后，有多少次能够维持勃起状态？

(0)没有性行为

1几乎没有或完全没有

2少数几次（远少于一半时候）

3有时（约一半时候）

4大多数时候（远多于一半时候）

5几乎总是或总是

4. 在性交时，维持阴茎勃起直至性交完成，以下哪种情况最为困难？

(0)没有性行为

1极度困难

2非常困难

3困难

4有点困难

5不困难

5. 在性交时，您享受性交的频率如何？

(0)没有性行为

1几乎没有或完全没有

2少数几次（远少于一半时候）

3有时（约一半时候）

4大多数时候（远多于一半时候）

5几乎总是或总是

阴茎勃起的总得分：当您的得分不足21分时，或许即您可能存在勃起方面的问题，建议及时就医。

一直硬，也是病

SILENTGHOST

阴茎的一大特点是能屈能伸、能软能硬，不过有时候，它会硬起来，并且保持数小时之久而不软。如果硬着的状态超过了 4 小时，通常就称为阴茎异常勃起（priapism，阴蒂有时候也会出现类似情况）。不过，别以为这是件方便又显示男子气概的事，阴茎异常勃起常常伴着疼痛、肿胀青紫等情况，还往往造成排尿困难，如果不及时治疗，还可能导致勃起功能障碍。那么，阴茎异常勃起是什么原因造成的呢？

勃起，靠的是海绵体充血。不过需要指出的是，勃起可不像吹气球，并不是吹起来之后把气球口封住、用完之后再放气的过程。阴茎勃起靠的是动脉血流增加和静脉回流减少，这更像是消防队用水枪灭火，一开阀门，水枪一边喷水，消防软管一边胀起来。而阴茎异常勃起的原因，说到底，要么是血液从阴茎回流时变困难了，要么是流进阴茎的血液变多了。

其中，最常见的原因是血液进入阴茎容易，出来却难，也就是通常说

的缺血性或低流量性（low-flow）阴茎异常勃起。造成这种现象的可能因素有很多，比如服用一些抗高血压或镇静类药物、神经系统的受损和疾病、外力压迫等，都能导致白膜下的小静脉受到压迫，造成异常勃起。除此之外，血液黏稠度增加也可能使白膜下小静脉的血流受到阻碍。比较常见的原因是血液病，最典型的是镰刀状细胞贫血症，此病患者的红细胞呈镰刀状，更容易在海绵体内聚集。实际上，阴茎异常勃起是镰刀状细胞贫血症的相关症状之一。此外，白血病和疟疾等疾病也可能造成阴茎异常勃起。

造成阴茎异常勃起的原因还可能是血液大量涌入海绵体，也就是通常说的非缺血性或高流量性（high-flow）阴茎异常勃起，比如阴茎或会阴部受伤导致的相关动脉受损。不过，这种情况远不如之前所说的缺血性阴茎异常勃起多。

特别需要指出的是，当发生缺血性阴茎异常勃起时，血液循环不畅，会导致海绵体内供氧不足和疼痛，如果久不处理会造成海绵体坏死等损伤，并且直接影响勃起功能。因此，患者需要及时去看医生，以免留下遗憾。

对阴茎异常勃起的治疗，一是要让阴茎解除勃起状态并减轻疼痛，另一方面还要尽量保存日后阴茎勃起的功能。主要的治疗方法包括：

- 冰敷患处以消肿止痛；
- 结扎受损的动脉，以使血流量恢复正常；
- 向海绵体内注射药物，使肿胀缓解，这种方法适用于缺血性异常勃起；

◦ 手术分流也适用于缺血性异常勃起．大夫们会通过手术将阴茎的血液分流到别处，以使血液循环恢复正常。不过，手术分流法通常在前述方法不管用的时候才会用到；

◦ 穿刺术，将阴茎麻醉，然后直接把针头插入阴茎抽出瘀血，以便减压和消肿。

总之，如果出现阴茎异常勃起的现象，应尽快就医，切勿自行尝试处理。因为异常勃起时间越长，损伤就越大，而且常常不得不采取创伤更大的治疗方法，这些都直接影响到日后的勃起功能。多数及时就诊的病例都能恢复勃起功能，而那些拖过36小时的病例情况就很不妙了。

软的是阴茎，硬的是健康

北斗京华

人们常常以为勃起功能障碍（Erectile Dysfunction，简称ED，传统叫“阳痿”）大多是由心理因素或是生活过于奔放所致，也往往认为ED的影响仅限于男人的“床上功夫”。事实却并非如此。床上心有余力不足的背后，可能隐藏着更大的危机。因为ED可能是其他健康问题的反映，或与一些疾病的发生和发展相关，比如心脑血管疾病、动脉硬化和抑郁症等。

心血管

ED可能是心脑血管疾病的警示信号，这是由于阴茎上肩负着充血勃起任务的动脉非常细小，所以，即使很少量的血栓也能对勃起效果产生很大的影响。英国赫特福德郡大学专门从事ED相关工作的科比教授（M.G. Kirby）研究认为，男性ED的发病时间点通常在其心脏病发作的4～5年前。

英国伯明翰好望医院（Good Hope Hospital）的杰弗瑞·哈克特

（Geoffrey Hackett）博士则指出，通过数年来对同时患有心脏病和ED的患者的临床观察统计，ED发病通常在心脏病发作之前的2～3年，而这一信号往往被患者忽略。哈克特进而认为，ED患者的心脑血管疾病发病率大约是健康成年人的2倍。

而当ED和抑郁“沆瀣一气”之后，就可能与心脑血管疾病建立更亲密的关系。佛罗伦萨大学的伊莉莎·班迪尼（Elisa Bandini）等人对近2 000位ED患者进行了结构式访谈（一种常用的调查方法，优点之一是结果便于量化），结果显示，在与ED相关的疾病中，抑郁症独立于其他风险因素，提高了心脑血管疾病的发病率。

ED已经成为糖尿病的并发症之一，这是由于糖尿病患者患有动脉粥样硬化的概率更高，血管内更容易形成血栓，这些血栓限制了血管内的血液流量，同时可能诱发ED。

从全世界范围的统计来看，大约80%的男性糖尿病患者同时患有ED，而对于未患糖尿病的男性，ED的发生率则低于25%。2型糖尿病还可能显著降低ED的发病年龄。通常情况下，ED的平均发病年龄是65周岁，而2型糖尿病患者的发病年龄则要提前10～15年。

前述的科比教授同样也将糖尿病列入了ED的相关疾病，而哈克特则指出，对于伴有2型糖尿病的ED患者，ED甚至比高血压和高胆固醇指标更能够预测心脏病的发生。

再试想一下我们的口腔和“第三条腿”有什么关系。

2011 年，中国泸州医学院一项以大鼠为对象的研究，首次揭示了炎症会对勃起功能形成负面影响，即牙周炎可能导致男性 ED，这一研究成果发表于《性医学杂志》上。

研究人员解释说，牙周病会增加心脏病的危险，而心脏病又与 ED 关系密切，因此，研究人员怀疑牙周病与 ED 之间存在直接关联。结果，研究发现，在患牙周病的大鼠中，其体内一种与勃起能力直接相关的内皮型一氧化氮合成酶（eNOS）水平更低。这种酶可以产生一氧化氮，而后者能够使血管放松扩张，增加阴茎血流量。也就是说，牙周病导致的炎症会降低体内一氧化氮的水平，进而造成勃起困难。这就是所谓的牵一“牙”而动全身。

当然，这一结论仅是通过大鼠实验得出的，至于人体是否也会存在同样的关联，还需要进一步临床试验的证实。

可见，ED 不仅仅是性生活问题，更关乎身体健康。既然存在不少潜在问题，当然不能只靠那些 XX 丸、XX 鞭、蓝色小药片之类的东西解决，要寻根溯源，刨根问底，让 ED 成为反映男性健康问题的“晴雨表”。

有种为男性设计的“ED 晨勃自测条”，或许可以帮忙监测一下“小弟弟”在睡梦之中的表现。自测条带有红、黄、蓝三种颜色的细纸带，每一种颜

色代表一种拉力。入睡前，把自测条像指环一样套在阴茎上，理想情况当然是三色带都断裂，说明有勃起而且勃起充分。

当然，这种测试方法的误差较大，需要反复测试才能说明情况。不过可能没必要做得这么专业，有人表示用邮票（边上有方便撕的小孔那种）缠上一圈也能起到定性的作用。

想想，一个 ED 就够闹心的了，后边还跟着这么些问题，您说当个爷们儿容易吗？不过，有病该治就治，不必尴尬，"小弟弟"瘘了，拿得起放得下的爷们儿气势不能跟着萎。

睾丸大者机会多

非处方药

在为了生存和繁衍不择手段的动物界，雄性要把自己的基因尽可能多地遗传下去，有什么好办法呢？它们要么守着雌性，不让别的雄性有可乘之机；要么到处留情，并让自己的精子战胜别人的精子。而后者，是需要大睾丸做支持的。

[illegible]

多伦多大学（University of Toronto）的研究人员发现，在美洲的麻雀中，如果种群中的雌性有多个伴侣，那么这个种群雄性的睾丸尺寸（以睾丸与身体的大小之比表示）就相对较大。斯特灵大学和爱丁堡大学的研究人员对索艾羊（Soay sheep，学名为 Ovis aries）的研究也证实了这一点。

为什么会出现这样的情况呢？研究人员认为，在多伴侣的生物中，相对较大的睾丸能够让雄性的基因得到较大程度的延续。由于雌性在发情期会与多个雄性个体交配，一天内，甚至一小时内就可能交配 N 次，这时候，

雄性要想获得更大的胜算，就可以使用“精海战术”——在雌性体内射入更多的精子，通过数量上的优势来提高自己做父亲的概率。而睾丸的相对体积越大，产生的精子就越多，在竞争中获得胜利的可能性也就越大。

但是，在一夫一妻制或者配偶关系较固定的生物种群中，大睾丸就不那么有必要了，因为这些雄性之间不太需要搞精子竞争。

以黑猩猩和大猩猩为例。黑猩猩是典型的热衷乱搞的生物，它们的伴侣从不固定；大猩猩则不同，成年雄性银背大猩猩会将群体中的雌性大猩猩看得死死的，雌性大猩猩很少有机会与其他的雄性交配。

了解了它们的习性，再比较一下这两种动物的睾丸——黑猩猩的睾丸重量大约是其体重的 0.3%，而大猩猩的睾丸重量仅仅是其体重的 0.02%。黑猩猩一次射出的精液中大约含有 6 亿个精子，而大猩猩一次射出的精液中只有大约 0.5 亿个精子。很明显，黑猩猩睾丸的相对体积较大，射出的精子较多。

耐人寻味的是，人类的睾丸重量通常是体重的 0.04% ～ 0.08%，一次射出 2.5 亿个精子，介于黑猩猩和大猩猩之间。

在发情期，当雄性频繁与雌性交配时，短期内射精次数太多，每次射出的精子数量就会减少。例如，用人工取精的方式让索艾羊每天射精 11 次，持续 5 天之后，索艾羊精液的精子密度将会下降 70%。

因此，精子能否快速、大量地生成，也是精子竞争成败的重要影响因素。研究人员观测发现，雄性索艾羊可以在 8 小时之内与 6 只雌性索艾羊

交配，共计 13 次。如果没有相对体积较大的睾丸，没有充足的精子供应，很可能就当不上爸爸了。

人类每次射出的精子数量也会因短时间内多次射精而减少。所以，在捐精的时候，为了得到含有足够精子的精液，每两次捐献需要间隔 1 周左右（因为要求捐献量为 15 毫升，1 次射精量是不够的。参见第 222 页「捐精未遂记」）。

天天都在喊“蛋疼”，蛋疼到底有多疼？


赵紫凌

在人类演化的过程中，我们身体的神经分布不断改变，但是生殖系统中——尤其是睾丸上——的神经密度始终非常高。这也许是由于那里负责的工作是最精细、最重要的；所以也必须拥有极高的敏感度。这里的敏感不仅包括对温度、湿度、运动的敏感，也包括对血压和机械作用力的敏感。

[illegible]

仅靠粗略观察，你就会发现，‘小弟弟’附近的毛发是卷曲的．这是为了排汗散热。相应地（见图 10），阴囊上有一些褶皱，这些褶皱会随着睾丸的蠕动而缓慢伸展或收缩。这种局部皮肤运动的功能有很多．其中最重要的就是散热。睾丸在产生精子时，单位空间内的能量消耗是很大的，虽然人体是一台非常高效率的机器，但是仍旧难免有一部分能量会变成热量。

这些热量对于事关后代延续的“造精工业”来说是毁灭性的，因为刚刚形成的精子对温度极其敏感。所以，为了保证“产品质量”，两个球状



的"生产车间"就不能待在身体内部，它们需要突出到身体外部来增强散热。不仅如此，阴囊表面还可以伸展开较大的皮肤面积，这样就有了足够的热交换能力，以保证男性的"百万雄师"在"渡江战役"之前保持强盛的活力。

所以在夏天，男性往往能感受到，自己的阴囊下垂得比较厉害，表面也保持着一定的湿润感。而在温度比较低的冬天，出于保温的目的，阴囊表面的褶皱收缩到最紧致的程度，同时表面也非常干燥。这是因为阴囊皮肤除了拥有强大的收放功能以外，其表层的汗腺也功能强大。皮肤伸缩散热系统和排汗散热系统并肩合作，才成就了强大的精子生产能力。

然而，凡事有利必有弊，如果从产能和质量的角度来讲，这台机器的

品质的确是卓越超群，但它为了做到精细监控，付出的代价也是很高的——神经系统分布密集，敏感度也极高，这就让它着实“伤不起”。

众所周知，足球赛开始时，裁判为了决定开球方，会用拇指将硬币弹向天空。仅以弹硬币这个动作为例，它的力道如果是作用于你的四肢或者躯干上的大部分部位，估计你都不会痛，只会感觉被碰了一下。可是，如果代替硬币的是你的“蛋蛋”，那你就比较倒霉了。据有这种不幸经验的人描述，这种疼痛虽然不会持续太久，但是生物电流很大，痛感也极强，就类似于被电击的感觉。

幸好，漫长的演化让“蛋蛋”有了优良的弹性和一定的韧性，只要过个几十秒，往往就没事了。但是在某些情况下，它的伤势将会一发不可收拾，如果处理不及时，非但要承受长期而深度的痛苦（类似于不停地被电击，生不如死啊），更严重的话还要忍痛割爱，将它们摘除。当然，假如只摘除其中一颗，而另一颗能够健康地保全下来的话，生殖功能就不会受到什么影响。

接下来，我们就来看看它常见的“伤不起”吧。这些痛，你最好一辈子也不要经历。

最常见的引起“蛋疼”的伤情是阴囊内出血。因为阴囊内壁的血管丰富而密集，剧烈的摩擦有可能让里面的血管断裂，一般来说是受到猛烈撞击或者擦伤所致的。曾经有报道表明，如果翻墙时动作不慎，让阴囊受到短时间剧烈的摩擦，同时阴囊外皮又不出现破损的话，那么只需过几个小

时，“蛋蛋”周围就会充满血液，阴囊就会肿得和椰子一样大（国学大师季羡林先生在《牛棚杂忆》中就曾描述过类似的症状）。疼痛自然是免不了的，不过这是几种类型里相对最轻微的疼痛。

虽然最开始的几小时内，痛苦不会太深，但如果拖延到下一次太阳升起来的时候，你就有可能不得不和你的“蛋蛋”说再见了，因为阴囊血肿有时也是睾丸损伤的征兆。尴尬的是，在阴囊血肿的情况下，你只能狼狈地托着裤子（或者用其他的东西兜住下体），被抬上疾驰往急诊室的救护车了。所以，工作中经常要翻墙的人最好穿上厚实耐磨的外裤和紧致的内裤。

这种伤比较少见，一般都出自摩托车手的车祸，或者马术选手的骑行事故。中等程度的撞击会让“蛋蛋”失去方向。这里我不得不尴尬地指出，虽然这种伤在常见睾丸伤害里是处理起来最方便的，但是它带来的痛苦却最恐怖——比内出血和破碎溢出都要剧烈，甚至能让你疼到昏过去。所以，这是最让人心惊胆战的状况。

造成这一点的原因只有一个：睾丸作为内脏器官的一种，它发生移位时的疼痛反应要远比发生破裂时大得多。而这种移位有时又不值得靠打开阴囊来手术解决——通过按摩式的推动使其复原，想象一下这个过程多“蛋疼”吧。

“扯蛋”里边有科学

北斗京华

细心的男性朋友肯定会发现，睾下的睾丸有时候会比较低垂，有些时候却会被体内的某种力量扯起，贴近身体。特别是当大腿内侧上方皮肤受到敲打或尖锐物品刺激时，同侧的睾丸会向上提升或是向身体内收缩，这被称为提睾反射。

人体运动需要肌肉收缩，提睾反射也是在提睾肌的作用下完成的。提睾肌收缩时，就会带动阴囊以及睾丸向上收缩。

提睾肌是包裹着睾丸和精索的一层很薄的肌肉组织，只有在男性身上才得到充分的发育；而女性的提睾肌组织较小也较柔弱，位于子宫圆韧带上，几乎可以忽略。那么，男性提睾肌的主要功能是什么呢？

顾名思义，提睾肌自然是用来提睾的，事实上，提睾肌的首要功能是控制阴囊的温度，当处于寒冷环境中时，提睾肌会收缩，让阴囊和睾丸更靠近自己的身体以便保温；而在较炎热的情况下，提睾肌会放松以便阴囊

和睾丸得到更好的散热。有时，当人处在恐惧害怕的情绪中时，提睾肌也会有收缩反应。

作为男人“小弟弟”的重要组成部分，提睾肌也必然要为“嘿咻”服务，“嘿咻”之时，特别是“嘿咻”得热烈忘我之时，提睾肌通常会收缩以防止睾丸受到撞击伤害。当然，具体实践时，提睾肌收缩与否，大概也与具体姿势和房间温度有关。

提睾肌不仅能保护“蛋蛋”，还能做大夫的小帮手。本文一开始提到的提睾反射是由神经系统控制的，而在临床上，可以通过检查提睾反射来判断神经系统的浅反射情况（提睾反射是浅反射的一种，即刺激皮肤、黏膜引起的肌肉快速收缩反应）。比如，提睾反射可被用作诊断腰髓是否受损，有些疾病（如精索静脉曲张）也会引起提睾反射消失。

还有些研究者试图通过提睾反射来鉴定麻醉的程度。土耳其阿塔图尔克大学医学院麻醉学系的多甘（Nazim Dogan）、塞尔博（Fikret Silbir）和艾尔丹姆（Ali Fuat Erdem）等人就试图利用提睾反射情况验证神经麻醉的效果。

他们给两组提睾反射正常的被试者分别注射了神经麻醉药物布比卡因（bupivacaine）和杜冷丁（meperidine），并在几分钟后检查了被试者两侧阴囊的提睾反射情况。研究结果显示，在麻醉药物注射 4 分钟之后，几乎全部被试者的提睾反射都消失了。

由于个体间的差异，提睾反射的情况也会有所不同。一些人可能更为敏感，另一些人则可能比较迟钝，而年龄也是影响提睾反射的重要因素之一。

加州大学圣迭戈分校泌尿系的凯撒（R. E. Caesar）和卡普兰（G. W. Kaplan）等人在1994年曾统计了225名0～12岁男孩的提睾反射情况，并将报告发表在了《泌尿学杂志》（*Journal of Urology*）上。

他们发现，当被试者大腿内侧上部受到刺激时，100名未满月新生儿中，48人出现了提睾反射；71名1～30个月大的男孩中，32人出现了提睾反射；而54名年龄在30个月以上的男孩则全部出现了提睾反射。基于此，凯撒和卡普兰认为，对30个月以下的婴幼儿进行的提睾反射检查并不具有说服力。

对于成年人来讲，提睾反射的消失可能是睾丸扭转（睾丸和精索之间的扭转，可能导致睾丸充血肿胀甚至坏死）、脊椎受伤以及神经元失调等病症的表征，而睾丸扭转可能是造成这一反射消失的最常见的原因。

一项对245位0～18岁的男孩进行的研究发现，125个提睾反射完全正常的男孩中没有同侧睾丸扭转的案例出现，而56个发生过睾丸扭转的被试者，则都没有出现提睾反射。

本尼－伊斯莱尔（T. Beni-Israel）等人的研究也认为提睾反射异常和

睾丸扭转相关。不过，正常的反射也并不意味着排除了睾丸扭转的可能，在本尼－伊斯莱尔的研究中，17 位睾丸扭转的患者中就有 5 位提睾反射是正常的。所以，提睾反射对判断睾丸扭转的症状是有所帮助的，但这一方法目前仍存在缺陷。

提睾反射对保护睾丸意义重大，不过过度活跃的提睾反射也会给当事人带来不小的麻烦。提睾肌痉挛就是这样，过度收缩的提睾肌会使睾丸过分上提，引起腹部剧烈疼痛。有时候，这种令人尴尬的疼痛甚至能由过分紧张引起。

比如，有个病例说的是一位受到提睾肌痉挛折磨的牧师，发病时会感到腹部抽搐和疼痛，更要命的是，这种疼痛总会在他上台布道的时候“如期而至”，原因就是他太紧张了。幸好，在手术之后他恢复了健康。

男人的事只有男人自己知道，提睾反射这个事要想验证恐怕还得找其他人帮忙，DIY 有点难度，就像自己在自己眼前挥拳就不容易眨眼一样。

自己动手，检查睾丸

北斗京华

睾丸是男人的象征，但也是男人的软肋。除了外伤，还有很多疾病会在睾丸上悄然降临，让男人痛不欲生。

难言之“隐”的极致可能是隐睾症了，这通常是由胚胎发育后期或出生后某侧睾丸未能下降至阴囊所致。不过，物极必反，尽管隐睾症“隐”到了极致，但仍是最容易被患者发现的睾丸异常情况。

睾丸可能出现的问题还包括肿块、肿大、睾丸硬度异常、睾丸或者阴囊的疼痛或不适、阴囊有下坠感等。总之，出现上述这些症状都不能掉以轻心，因为它们有可能是睾丸癌的前兆。

根据英国癌症研究组织（Cancer Research UK）对英国男性的统计，尽管睾丸癌本身发病率很低（在所有男性罹患的癌症病例中只占1%左右），但在15～44岁的男性中，睾丸癌却是最常见的癌症类型，环法王者阿姆斯特朗就曾罹患此疾。不过，如果能够在早期阶段发现，95%

的患者能够完全康复。而现实生活中，很多睾丸癌病例的发现都基于患者自检之后的自我报告，可见睾丸自我检查的重要性。那么，检查自己的睾丸时都需要注意些什么呢？

检查睾丸常简写作TSE（Testicular Self-Examination），即睾丸自我检查。在介绍检查的方法之前，需要先说明男性应该在什么时候检查。首先，睾丸的自我检查可以从男性青春期开始，一般在14～15周岁之后。其次，检查的频率最好是每月1次，这样高频率的目的就是让你对自己的“小弟弟”的脾气秉性有足够的了解，包括大小、形状以及“摸上去的感觉”，因此可以敏锐地捕捉到细微的变化，使有可能出现的病情处在可控阶段。

当然，不少医生认为，每月1次的自我检测对大多数人来讲有点过于频繁了。这样的检测频率可能更适合睾丸癌的“高危人群”，比如有家族病史或隐睾症的人群，或者有睾丸癌病史的患者。最后，检查的好时机是在洗澡之后，因为温暖的热水可以使阴囊的皮肤充分放松，便于进行观察和触摸检查。

尽管不同文献对睾丸自检方法的表述有所不同，但归纳起来大同小异，并不复杂。男性只需保持站立姿势，抬起左腿或右腿，脚踩于一定高度的平台（如椅子）上，将大拇指放在睾丸的上部，食指和中指放在下面，

轻轻转动并揉捏抬腿侧的睾丸，仔细观察，感觉有无肿块或硬度异常。重复这一过程检查另一侧睾丸的情况即可。美国国家癌症协会（National Cancer Institute）则建议男性站在镜子之前，这样可能更便于观察阴囊情况，检查一下阴囊的皮肤是否有肿胀。

检查过程中，正常的睾丸摸起来应该是平滑的，没有肿块，饱满但并不坚硬，无疼痛感出现。如果发现睾丸表面有豌豆大小的坚硬肿块，或是睾丸出现了肿胀、肿大的情况，请及时就医，切不可觉着肿块消失就万事大吉了。

当然，不要因为睾丸大小略有差异而大惊小怪，也不必为睾丸高低不同而寝食难安，这些都属于正常情况。另外，注意不要错把附睾怀疑为肿块。癌变的肿块一般会出现并附着在睾丸的侧面，而附睾上的块状结构可不是癌变细胞。

最后要说的是，尽管睾丸的自检主要是用来预防癌症的，但这一方法对于诊断其他相关的病症也可能有所帮助。比如，自检时摸到曲张的静脉团或是见到蔓状扩张的静脉，就可能是由于精索静脉曲张而造成的；突然的睾丸疼痛或是阴囊肿胀则可能是附睾炎或者是睾丸扭转引起的。

骑车杀精，确有其事

北斗京华

一年一度的环法自行车大赛总能吸引很多人的关注，一辆高科技碳架公路车，一身帅气的骑行服锁鞋，加上锃亮的头盔墨镜，闪耀的黄色领骑衫，风一般的骑行速度以及冲线之后的美女和香槟……这些使得自行车选手成为众多人欣羡的对象。

然而光鲜之后总有“难言之隐”，阿姆斯特朗不就割了一个睾丸吗，谁知道这和他骑车到底有没有关系呢。很多骑车的男人有过这样的感觉：当骑车时间长了，“小弟弟”也就麻木了……其实骑车对“小弟弟”的伤害不只是“觉得麻”这么简单（以下凡是提到自行车选手，都特指男选手）。

和骑车有关的男性生殖系统症状很多，包括生殖器麻木、勃起障碍、异常勃起、阴茎血栓、不育、前列腺炎、血尿、睾丸癌等。超声波检查也发现，81%的自行车选手有睾丸结石，还被发现有附睾囊肿、附睾钙化、阴囊积水等症状。

上述有些病症只存在个别案例的报告，而最常见的还是神经卡压综合


征。根据雷波维奇（Ilan Leibovitch）等人发表的一篇关于骑行和泌尿生殖系统疾病的综述，在 62 篇研究论文中，自行车运动员生殖器麻木的发生率为 50% ～ 91%，而勃起障碍的发病率为 13% ～ 24%。

包括德国科隆大学医学院泌尿学系的森马（F. Sommer）所做研究在内的多项研究结果显示，自行车运动员患有勃起性功能障碍的可能性增大。长时间骑车的男性（如自行车运动员或骑警）在睡眠期间的自发勃起次数显著减少，并且伴有一定程度的阴茎勃起硬度减弱、直径变细等情况。而这些往往伴随着短暂的阴茎麻木、臀部麻木、睾丸麻木等。

更为严重的是，通过研究 15 名西班牙铁人三项赛运动员，研究者们发现，在比赛期间，这些运动员的精子活性“降低到了不正常的低水平”。参加研究的 15 名运动员的正常精子只占精子总数的 10%（正常值为 15% ～ 20%），而对于其中那些每周骑车 300 千米的运动员，这个比例更是降低到了 4%，而 4% 正是男性不育症的临界值。

众所周知，几届环法大赛的冠军阿姆斯特朗曾被查出患有睾丸癌并做过手术，这是否和骑车有关呢？当然，不能简单地说骑车导致睾丸癌。不过，位于温哥华的不列颠哥伦比亚癌症研究中心（British Columbia Cancer Agency）的柯德曼（A. J. Coldman）等人曾对 133 名患有精原细胞瘤的运动员进行研究，在排除了隐睾症和年龄等因素的干扰后，发现骑车或骑马活动的确提高了睾丸癌的发病概率。

如图 11 所示，男性的会阴内有条阿尔科克氏管（Alcock's canal），



里面的动脉和神经穿过坐骨和生殖器之间，直接控制着阴茎的血液流通和感受。当人骑坐在窄长的自行车座上时，动脉和神经就会受到盆骨的压迫，采取前倾的姿势骑行时，相当一部分身体重量会落在与会阴紧贴的坐包前鼻上，进而造成生殖器麻木。

安德森验证了骑车与神经压迫症状的关系。通过对在挪威进行的一项540千米自行车赛事的参赛者进行研究，他发现阴部神经持续1～2天受到压力对阳痿的发生有诱导作用。也有研究者通过IIEF问卷测试（一种阳痿程度调查表，参见85页）发现身体重、车座压力大者，勃起功能不佳。

阴茎氧分压的测定被认为能够体现出阴茎的血流情况，研究发现，阴茎氧分压在骑行过程中显著下降。1989年，加利福尼亚大学医学院泌

尿学系的阿波塞夫（S. R. Aboseif）等对狗的研究发现，只阻塞一侧的阴茎动脉并不会严重影响勃起，但是双侧动脉阻塞可能会对勃起产生严重的影响，进而造成阳痿，而自行车骑行很可能产生相似的影响。

除了压迫神经和动脉，产生影响的还有温度。众所周知，过紧的内裤可能会造成男性生育能力下降，人们认为这是因为过紧的内裤造成睾丸温度上升，而睾丸温度上升又可能阻碍精子形成。睾丸外挂于阴囊中而非位于体内，就是这个原因。

那么，骑行爱好者难道就要与自己的爱车道别了吗？并非如此．找一个合适的坐包、穿有衬垫的骑行裤、适当调整座椅和车把之间的高度关系，会大大减轻骑行带来的伤害。骑行过程中，阴茎氧压的下降程度主要取决于骑行姿势和座椅形状。骑躺车较少压迫会阴部，且不会改变阴茎的血流情况；而骑一般的自行车则会减少阴茎约70%的血流量，好在站起来骑一会儿就能够恢复阴茎的供氧。

尽管骑车多少会影响阴茎的血流量，但是符合人体工程学设计的座椅可以为阴茎提供最大限度的保护。传统的鼻形车座对生殖器官产生的压强可以达到150毫米汞柱，最高可以达到近280毫米汞柱（要知道，量血压时大臂的血压不过120毫米汞柱，当外界压强超过这个数值，血液就无法顺畅流动了），这样的压力可能会使血流量减少80%。无鼻的座椅至少可以将骑行过程中生殖器官的压强减少65%，仅仅使血流量减少20%。

1999年，15名自行车手曾试验了一种新座椅。这些选手每周要骑行

240～480千米，试验结果显示，12位选手在使用传统座椅时有生殖器麻木感；而使用新座椅后，只有2位选手感觉到生殖器麻木。合适的车座、车把高度比也可以使脚蹬分担一部分身体产生的压力。

此外，骑车还是多找平坦的地方，以尽量减少颠簸所产生的冲击力，那些玩越野（XC）、落山（DH）及自由骑（FR）的朋友要节制点哦。要是觉得实在闹心，还有一招妙计——冷冻精子。已经有医生建议自行车运动员在开始大运动量的训练之前冷冻精子，以免以后真的被自行车“除了武器”。

当然，喜欢骑车的朋友，不管是男性还是女性，都不必过分担心。尽管很多研究都列举了一些骑车对男性性能力以及精子产生影响的实例，但这些研究结果大都是根据对自行车运动员的研究得出的，这帮人都是整天待在坐包上的主儿，日常的相对短途的骑行配合正确的姿势和适度的休息，并不会对男性的性能力产生多大影响。毕竟在汽车普及之前，自行车曾是人们出行的主要工具。再往早了说，成吉思汗那帮天天生活在马背上的人，不也没断子绝孙嘛。

你的精液合格吗？

Big.D

精液检查通常是出于以下几个目的：看看这位先生是否在当爹方面有困难，输精管结扎的效果如何，输精管复通后的效果如何。此外，捐精时也需要检查捐献者的精液是否合格。那么，精液检测具体要做些什么呢？

取精过程不用过多描述，和 DIY 一样，只不过最后不能随手制造一张充满“生命”的折纸，而要将精液装到标本杯里罢了。

虽然过程很简单，但也有很多需要注意的地方。取精前需禁欲 48 小时，要先排尿，然后洗干净手和生殖器，还不能使用润滑剂，此外，用避孕套收集精液也是不可取的，因为避孕套上的杀精剂和润滑剂可能影响检测结果。为了保证精子的活性，可以先预热标本杯到与体温相一致的温度，此外，还要避免精液受到太阳的直晒，以免温度过高。而且，标本要 1 个小时之内送检。总之，即便精液离开了身体，还是要稍微呵护一下。

这里再说句题外话，尽管精液对它的主人没什么特别的，不过实验技

术人员会将它们一视同仁地作为“危险品”，小心翼翼地操作，这是因为精液中可能含有 HIV、肝炎病毒等病原体，在检测之前谁知道里面有没有这些东西呢？

最直观的检查项目，是精液的体积。普通男性一般 1 次射精的量在 2 ～ 6 毫升之间，太多或太少均可能意味着身体的异常。还有一项检查是观察精液的拉丝情况，精液刚被射出来时呈胶冻状，在被射出后半小时左右会变成黏液状态，质量好的精液可黏起 3 ～ 5 厘米的拉丝。

精液的色、香也比较直观（检查的时候，“味”通常就不考虑了吧）。从颜色上说，正常精液的颜色是灰白色（或略带黄色），如果呈红棕色或带血，则可能是血精，需要进一步检查。从气味上来说，精液会带有一种特殊而难以描述的腥味，这是前列腺分泌物造成的，是正常现象，不用担心。

以上所说的那些检查内容，其实自己在家也能做，反正每次 DIY 都 DIY 了，不妨顺便瞅一眼，发现问题也好及时去请教大夫。

光看外观是不够的，精液的 pH 值也是指标之一，需用 pH 试纸测量。正常精液的 pH 值在 7.2 ～ 8.0 之间，过高或过低则说明可能是泌尿生殖系统出了问题（比如感染）。

精液检测中，最要紧的当然还是精子的情况。首先是数量，检测者需




图 12 精子形态，只有中间的那一个是畸形精子，其他的大概都不是这里的重点

要在显微镜下数出满视野蝌蚪的数目，再根据稀释或浓缩的倍数算出精液中实际的精子数。每次射出 4 000 万个以上精子就算合格，当然，如果是为了检测结扎手术的效果，那应该是一个精子也没有才对。

光有数量还不够，质量也得跟上。同样是在显微镜下，检测者需要数出活动精子的数目，对精子的运动能力进行分级，还要看看精子们长得正常不正常，缺尾巴、断头、畸形的比例如何（如图 12 所示）。

在显微镜下，检测者还会检查精液中有没有混进去很多奇怪的东西。比如，白细胞出现在精液中是正常的，但数量太多就可能是出现感染了。

即便精液检测者不觉得天天满眼蝌蚪是件令人厌烦的事，为了消除精液分析中常会出现的主观影响，计算机辅助精液分析现在也应用得越来越多了。

除了上面说的那些检测之外，精液检查还包括精浆成分的检查以及一系列相关酶活性的测定，还有一些免疫学检验。不过，这些检查常常是在进一步确定不孕不育原因时进行的，这里不再赘述。

精液的质量会受到很多因素的影响，因此，有时候精液检测不正常也无须太过焦虑，不妨先静下心找找原因。

很多药物都能够影响精液检测的结果，比如西咪替丁（一种胃药）、激素类药物以及一些草药。烟、酒、咖啡、大麻或一些毒品也是如此。另外一种常见的情况是取精液的时候只取到了部分射出的精液，这会大大影响检测结果。还有，如果进行检测前很久都没有射精过，则可能出现射精量偏多的结果。如果要去做精液检查，不妨先看看自己是否有上述情况，以免造成错误的诊断。

守住你的前列腺

北斗京华

前列腺是男性生殖系统的重要组成部分，它分泌的前列腺液是精液的主要成分。同时，在射精时，前列腺会收缩，可将输精管和精囊腺中的内容物经射精管压入后尿道，排出体外，防止精液回流至膀胱。

实话实说，前列腺的功能挺重要，可它的生存空间并不怎么美好，基本上算是“蜗居”。它位于膀胱的底部，紧挨着阴囊，包围着尿道。想象一下，那个狭小的区域内，挤了多少“宝贝物件”。在直肠检查时，可以触摸到前列腺，如果想自己感受一下，得柔韧性比较好才行（参见第14页图1）。

前列腺很重要，同时也是个娇嫩的器官，很多毛病都会找上它，比如增生、发炎，甚至癌变。其中，单单前列腺炎就可分为急性细菌性前列腺炎、慢性细菌性前列腺炎、非细菌性前列腺炎以及骨盆肌肉疼痛等好几种情况。不过，不同的前列腺问题也有着一些共同的症状，比如：起夜次数增多；尿频、尿急，却又是涓涓细流，尿不爽；尿道有灼热感，甚至出现血尿；

盆骨、睾丸以及会阴部疼痛，在如厕的时候疼痛更甚。出现以上症状就得考虑前列腺方面的问题了。

除了疼痛和影响排尿，前列腺出问题还可能给生育和性生活带来很大的麻烦。我们知道，前列腺液中的营养物质能给精子提供养分，而且前列腺液是弱碱性的，有助于降低阴道中的酸性。当前列腺发生问题时，前列腺液分泌减少，从而使精液量减少，干扰了精子的生存和活动；同时，前列腺液的 pH 值下降，可能影响精子的活性，最终导致女方不易受孕。

此外，诱发急性前列腺炎的细菌同样能够引发膀胱炎症，类似的细菌可能会通过性行为传播给“老婆大人”。即使已经有了孩子，再借助于套套遏制细菌传染，抱着“谁能挡我，但求一爽”的心态，也并不意味着万事大吉。前列腺炎的问题会让“小弟弟”勃起时不太舒服，缠绵之时，突如其来的隐隐作痛会令人败兴至极；真疼厉害了，自然而然也就痿了。

从青年到老年，前列腺都有可能出现问题。无论是膀胱发炎感染，还是尿道畸形，抑或是对于“走后门”行为的特殊爱好（注意，这种情况是不戴套的“攻”容易“中招”）以及长时间骑车，都可能让前列腺出毛病。

对付前列腺问题，最好的方式还是防患于未然。如果能够保持良好的日常生活习惯，就能降低前列腺出问题的风险，比如注意保持敏感部位清

洁，或者多喝水，保证正常排尿排便。

前列腺出现问题，去医院检查是很有必要的。当然，如果症状突如其来，暂不方便就医，一些家庭治疗的方法也能帮忙减轻一点症状：

◦ 服用一些非处方类镇痛剂或消炎药，比如阿司匹林（吃药之前请务必仔细核对禁忌证）；

◦ 找一个浴盆，打盆热水，温度控制在 50 C 左右，坐浴 20 分钟左右；

◦ 深呼吸，放松。

还有一种新的方法——按摩法。虽然这个方法免不了受些“爆菊”之苦，不过有研究表明受这个苦还是值得的。美国纽约哥伦比亚大学泌尿系的研究人员卡珀迪斯（Jillian L. Capodice）等人对 115 名在家中使用前列腺按摩设备的患者进行了回顾性研究（这些患者患有前列腺增生或者前列腺炎），其中 90% 的人称自己在按摩之后症状有不同程度的缓解（如表 2 所示）。

	7 (7.8%)	3 (12%)
	11 (12.2%)	7 (28%)
	26 (28.9%)	2 (8%)
	42 (46.7%)	10 (40%)
	4 (4.4%)	3 (12%)

这一结果发布在《肾脏与泌尿学》杂志（*The Open Urology and Nephrology Journal*）上，研究人员认为，前列腺按摩器对前列腺相关病症是有一定缓解效果的。

最后也得提醒大家注意，前边所说的缓解前列腺症状的方法绝对不能代替正规的诊断，切勿因为症状缓解了就不去看医生。另外，热敷和按摩都有禁忌证，不可滥用哦。

尿道里塞得进鼠标线吗？

一本大叔

最近有条新闻让人看得有点难受：一名男青年找女网友幽会，女网友的男友发现后，找来帮手强行将一根 1.2 米长的鼠标线塞进男青年的尿道进入膀胱。大家都发出惊叹：要把这么长、这么粗的鼠标线插进尿道，究竟需要多狠心啊！其实，尿道或者膀胱异物在泌尿外科并不少见，比鼠标线崎岖的东西多得是。

那么，都有哪些异物进入过膀胱呢？答案之丰富多彩准会让你大跌眼镜：塑料软管、圆珠笔、蜡烛、橡皮筋、体温计、发卡、针、避孕环、节育器、气囊导尿管破裂残留物、长鳝鱼、蒜薹、韭菜叶……而现在，基于本文开头说的那条新闻，恐怕还得加上鼠标线了。

绝大多数膀胱异物是经过尿道外口进入的，而且大多数都是由患者（以男性为主）自行塞入。对一般人来说，光是想想往尿道里塞进那些崎岖的东西，就足以起一身鸡皮疙瘩了，为什么还会有人往里硬塞呢？主要的原

因如下：

性心理障碍。多为青壮年，由于缺乏性知识，希望通过尿道置入异物以得到快感；也有看了相关书籍、色情影像或者浏览了相关的网页之后出于好奇而用各种物品插入尿道者。也有部分人由于采取不正确的手法自慰，从而导致异物进入膀胱。

一些性衰弱或阳痿的男性患者希望借助异物的刺激，取得一些壮阳的功效或者快感。

部分患者（特别是老年男性）因有尿道炎症、前列腺肥大等，为解除尿道狭窄或者排尿困难而插入异物。

个别患者被他人恶作剧或暴力强行将异物放入（如本文开头提到的那则新闻）。

部分患者由于自身精神异常致使异物进入膀胱。

少数女性患者由自己的性伙伴经尿道置入异物。

少数女性为了测体温计算排卵期，不慎把体温计滑入膀胱而无法自行取出。

少数由医源性途径进入（就是说在医疗过程中不小心弄进去的），也有宫内节育环异位进入膀胱的报告。

发生尿道或膀胱异物后，患者会有不同程度的尿频、尿急、尿痛等尿道刺激症状，部分会有肉眼血尿（指目测即可发现尿带血色）或者尿着尿着突然停了（即尿流中断），也有部分患者合并尿道周围炎或尿道周围脓肿，

甚至并发膀胱结石，严重者可出现全身感染症状。

如异物长期存在，炎症感染破坏尿道形成内瘘，与肠道相通的话，会有气尿（即小便的同时从尿道排出气体）．还可能排出食物残渣．如尿道与阴道或子宫相通，会有尿失禁、漏尿的现象。部分患者会出现下腹痛。

由于尿道或膀胱异物患者一般会有比较典型的病史，所以诊断并不困难。但是常常有患者由于害羞或者自卑而选择不就诊，或者就诊时不告知医护人员实情，从而导致误诊或者病情延误，甚至长达35年。像前文新闻里说的那个被塞入鼠标线的小伙子，就是硬扛了几天才去的医院，弄得自己很痛苦。

那么，出现了尿道以及膀胱置入异物的情况，应当如何处理呢？自然是赶快把它们弄出来了。碰上这事儿可别自己动手，应该尽快就医。经B超、X线、尿道镜或膀胱镜等确诊后，医生会根据异物大小、形状以及位置而采取不同的方法将异物取出。

除了少数患者能自行排出外，对于前尿道异物，可用尿道镜或长钳取出；对于后尿道异物，可以通过尿道镜取出，也可将异物推入膀胱，再用膀胱镜取出；对于膀胱异物，如果膀胱镜无法取出，可以通过耻骨上膀胱切开异物取出术来解决，并根据膀胱感染的严重程度做耻骨上膀胱穿刺造瘘术。部分患者会根据需要留置导尿管7～14天，并进行抗感染治疗。大部分患者预后良好，少量患者术后出现尿道狭窄、切口感染、异物、结石残留、尿瘘等并发症。说起导尿管，其实它才是进入尿道和膀胱最多的

"异物"，只不过，放置导尿管是出于医学目的，需要专业医护人员全程严格无菌操作。

这里顺便再解释下为什么鼠标线能放进去，因为常见的鼠标线直径多在 3 毫米左右，而成年男性用的导尿管直径有 3.8 ～ 5 毫米，所以，鼠标线在尺寸上还略有富余。当然，伤害者对付情敌的手段恐怕不会像大夫对患者那么温柔……

总的来说，将异物置入尿道是很危险的行为，它不但会对身体造成伤害，还会对心理造成负担。想让自己或者伴侣获得快感有各种各样的方法，想让情敌难受也有各种各样合法的解决方式，切勿如此“剑走偏锋”。

有时候我们需要有故事，有时候我们需要没事故。

你想让他们擦肩而过还是合而为一？遇与不遇，各有门道。

瞄准技巧与走火分析

你可能不知道


[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	几乎无不良反应，使用方便，不影响感官体验	需每次使用，不易坚持，失败率高	18
[illegible]	一次上环有效期长达 5 年，方便可靠，可恢复受孕能力	可导致月经异常、宫内炎症，环可移位、脱落	0.6
[illegible]	获取方便，无不良反应，可预防性病	需男性配合，需每次使用	2
[illegible]	调经，缓解痛经，减少卵巢癌及子宫内膜癌的发病率	需每日服用，漏服失去保护作用	0.3
[illegible]	方便，不花钱	需很强的自制力，否则失败率达 27%	4
[illegible]	安全，无不良反应	周期不规律者不适用，否则失败率达 25%	5
[illegible]	一劳永逸，无不良反应	要动手术，恢复生育能力不易	0.1
[illegible]	亡羊补牢	不良反应较严重（悲心，月经紊乱）	降低至少 75% 的受孕概率

[illegible] 珀尔指数（Pearl Index）指某种避孕方法的年失败率，如果 100 位成年女性采用某方法避孕，1 年时间内有 1 名女性怀孕，该方法的珀尔指数即为 1。珀尔指数越高，表示避孕的失败率就越高。注意：表格中的数值皆为正确、严格采用相应方法时的数值。表格内容引自 Department of Reproductive Health. World Health Organization. *Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use* (4th ed. 2009)；译者：和谐大臣。

Big.D

男人们如何评价自己的生育能力呢？有个指标其实是与生育能力相关的，那就是肛殖距（Anogenital Dstance，简称 AGD）。

首先要搞清楚的就是，肛殖距该怎么量？如图 13 所示，在此项研究中，



被测量者仰卧在床上，腿像青蛙那样屈着，将生殖器、会阴、肛门整个暴露出来，用尺量一下阴囊后缘到肛门边缘的距离，这个距离就是肛殖距了。

那么，这个神奇的距离和生孩子之间到底有什么关系呢？贝勒医学院男性生殖医学的研究者艾森伯格（M. L. Eisenberg）等人用实验告诉了我们答案。

艾森伯格的团队测量了 117 名不育男性和 56 名已有子女的男性的肛殖距，并测量了他们的阴茎长度、精子密度、活动精子数等指标——其中精子密度和活动精子数是决定男性生殖能力的重要因素。

他们发现，不育男性的肛殖距普遍比较短，平均只有 31.8 毫米；而 56 名父亲的肛殖距平均有 44.6 毫米。

除此之外，不育男性的阴茎伸展长度也更短，平均只有 107.0 毫米；可育男性的平均阴茎伸展长度为 119.5 毫米。

而对精液的分析，也同样显示出了肛殖距差别的影响：肛殖距增长 1 厘米，每毫升精液中所含的精子就增加 430 万个，而活动精子的总量也会增加 600 万个。此外，肛殖距的长短差异还体现在激素水平方面。

看到这里，可能已经有朋友蠢蠢欲动，既然 AGD 这么重要，那么靠自己的锻炼实现 AGD 的增长是不是就能提高做父亲的成功率呢？先别忙着天

天使劲捧胯下，因为这个距离本身并不是影响生殖能力的原因——肛殖距之所以与生殖能力有关，是因为它实际上是生殖器官发育的一个指标。

如果雄性动物的生殖器官在发育过程中受到了诸如内分泌失调的影响，往往会发育不良，进而使生育力下降，这种变化能体现在肛殖距上。已有研究证明，如果正在发育中的大鼠接触了邻苯二甲酸二丁酯（DBP，增塑剂的一种，能干扰内分泌），生殖道会发生异常，睾酮分泌受损，肛殖距缩短。

此外，如果母亲暴露在内分泌干扰物浓度较高的环境下，生下的儿子的肛殖距就会缩短。这意味着，环境中的内分泌干扰物（如增塑剂等物质）与生殖器发育异常有关。

在性发育的过程中，未成熟的生殖器前体细胞会通过雄激素介导的途径向腹部迁移。如果在胚胎阶段生殖器发育的时候接触到了能够影响这一途径的物质，最终就会在肛殖距上体现出来。

总之，肛殖距能反映个体生殖器的发育状况，并与生殖能力有关，因此它可以作为衡量男性生殖能力的一个指标。不过，这仅仅是一个指标，而非直接影响生殖能力的原因，所以要想真正确定自己的生育能力，还是去医院做男科检查吧。

输精管，扎还是不扎？

赵紫凌

输精管结扎也是种手术，许多人对手术的第一反应也许是害怕，不过，在你了解了它的过程之后，这种恐惧就会消失一大半了。

首先说说结扎避孕的原理和手术过程。我们知道，精子们在睾丸中产生，在附睾中成熟，接着，精子通过输精管经精囊腺到达射精管。如果截断了输精管，那么射出的精液中就不含有精子了，如此一来，也就达到了避孕的目的。

结扎手术的大致过程是：首先在阴囊上摸索搜寻输精管所在的位置，切开一个微创口，拨开输精管外包裹的髓鞘和血管，把输精管挑出一段来，固定在精囊外面。在挑出的这段输精管上选定并剪除一段 1.5 厘米左右的管道，再用输精管髓鞘膜分别包裹好两个断点，并用缝合线捆紧，缝合伤口即可。看，多简单，比切阑尾、割扁桃体都要省事，需要切开的口子也小得多。

记不住这许多术语也没关系，只要知道结扎是把输精管弄断了，让精

子没法“上膛”就行了。

有些男性或许担心做结扎会影响自己的雄风，其实大可不必。结扎手术根本不会影响雄性激素的分泌，也不会影响勃起。结扎后的男性在性高潮时照样会射精，只不过射出来的是没有精子的前列腺液。

不过这样一来，许多人便会很自然地想到一个问题：精子们都被憋在阴囊里了，越积越多，那样不会出问题吗？答案是不会。被生产出来的精子如果待在那里的时间过长，就会被附睾壁的细胞吞噬吸收。

另一方面，结扎后射出的精液量也没有多大变化，因为精子在精液中只占极小的比例，同时，射精时的快感也不会受到影响。当然，也有少数人做了结扎以后觉得自己“不行了”，这其实都是心理作用。

说了那么多结扎的好处，那么它的短处与不足呢？

我们知道，避孕套除了避孕，另一大作用是屏蔽双方的体液接触，进而阻止细菌、真菌、病毒的交叉感染。而一般来说，实施过结扎术的人不会刻意去使用避孕套（扎都扎了，还用套干吗）。事实上，这也是结扎手术带来的一个问题。

首先，每次“嘿咻”之前，你都必须把你的“工具”彻底清洗干净。因为包皮分泌的包皮垢实在是微生物的大爱。它们如果跟着你的“小弟弟”

进入爱侣的通道，那跟着进去的就是很多种未知的风险。关于这点，你可以参考包皮过长与性病传播的关系。

其次，如果你和你的爱人都没有别的性伙伴，那么你们沉浸在没有隔膜的幸福里，倒是相对安全。但是如果其中有人太"博爱"的话，你们依然需要用到避孕套，来防止潜在的疾病风险。而既然用了避孕套，结扎不结扎又有什么关系呢？

[redacted]

结扎后就真的一生都不必担心意外怀孕啦？错。手术结束后2～3个月的时间里，最好不要冒险体内射精。一方面，在切口愈合之前，少量精子依然可以从没有愈合的切口缝隙"钻"到精囊腺里去；另一方面，切断处的管道中仍可能有残留的精子。

这样一来，如果没用避孕套，又没有避孕药的干扰，那么你的伴侣仍然有一定的怀孕风险。当然，从手术康复后算起，如果已经超过了2个月，并且连续2次射出的精液都没被检验出精子的话，就可以彻底消除这个担心了。

在结扎完成之后又想要孩子的话，可以去做输精管修复手术，或者叫复通术。理论上说，随着两个断开的接口被重新接通，生殖功能将得到恢复。但实际上，因为自身免疫反应等原因，即使通过手术修复了输精管，仍不能保证100%恢复生育能力。因此，做输精管结扎之前有必要慎重考虑。

总之，输精管结扎是一种很有效的避孕方法。不过，考虑到它有一定的造成彻底绝育的可能性，想要保留生育能力的人，还是以套套和避孕药为主吧。

安全期不安全

jiefucy

有些夫妇会采用安全期法来避孕，不过，如果在所谓“安全期”盾牌的保护下肆无忌惮，多半会有意外发生。因为，“安全期”并不安全，在众多避孕方法中，采用安全期避孕是相当不靠谱的选择。个中缘由，且听我慢慢道来。

首先得知道受孕的必备条件：女性正常排卵，足够数量的健康小蝌蚪，小蝌蚪的旅途通畅，精卵能正常结合，精卵邂逅后能在子宫腔内落地生根。上述任何一个环节出现问题，都不能受孕。

女性一般每个月经周期只有 1 个卵子排出，排出后可存活 1 ～ 2 天，精子在女性生殖道内一般可存活 2 ～ 3 天。有文献报道，单次性交后获得妊娠的时间为排卵前 6 天到排卵后 3 天，其中多数发生于排卵前 3 天之内。安全期避孕的原理就在于，避开女性的排卵期，让小蝌蚪的旅行成为一次有去无回的观光之旅。

所以问题的关键在于确定排卵日。排卵多发生在下次月经来潮前14天左右。所以安全期是一个只存在于月经规律（月经规律指周期为21～35天）的女性身上的概念，月经不规律者不排卵或稀发排卵（这也是不孕的常见病因），也就不存在安全期的概念了。但是月经规律的女性排卵就一定那么守时吗？这样的女性基本可以被认为有规律排卵，但有规律排卵女性的排卵时间也受个人情绪、压力、健康状态、外界环境等因素影响，女同胞们对此应该是深有体会的，考试前紧张情绪、巨大的工作压力、异地居住环境变化都会引起“大姨妈”的变化。

[redacted]

常见的安全期计算方法有基础体温法、日期计算法、宫颈黏液观察法、排卵试纸等方法。

基础体温测定方法为早晨醒来不起床不活动不说话，测体温并绘制成曲线。其缺点有：1可操作性差：坚持一个月每天都得起床后躺着不动先测体温需要很大的毅力，尤其是用作避孕而不是打算要baby的时候；2易受各种因素影响：夜班、性交、感冒发烧等等都会影响测量结果。

日期计算法也不准确。如上所述，“大姨妈”受各种因素影响，本来就未必能准确预测下一次具体哪一天到来，在此不准确的基础上计算出的结果，其可靠性也得打折扣。

宫颈黏液观察法也不是很给力。理论上，卵泡生长、排卵导致的激素水平变化会引起宫颈黏液的相应变化，但临床上经B超证实有排卵时，追问患者有无宫颈黏液的变化，她们未必都会观察到蛋清样可拉丝的白带。

[redacted]

排卵试纸是通过检测尿中黄体生成素（LH）的变化来判断有无排卵。LH 会在排卵前上升至峰值，排卵后下降，一般需多次测量才有可能测到峰值，有时没法确定测到的结果是在上升还是下降过程中。另外，有些排卵异常（多囊卵巢综合征、卵巢早衰）患者的 LH 可能本来就比较高，所以不论在月经周期的什么时间测量，都会得到偏高的结果。

在当今有多种避孕措施可供选择的情况下，为了女同胞的健康，为了有计划生育健康宝宝，请远离安全期避孕法。如果有人说，我们一直采用安全期避孕多年，从未“中招”，并因此沾沾自喜，扬扬自得，那么鉴于安全期如此不靠谱，作为生殖科医师的我得泼一下冷水了。你们很可能戴上了“不孕症”的帽子。

紧急避孕药的功过是非

窗敲雨

在性情界，紧急避孕药大约可以算是“救火队长”，出了意外，人们总会第一时间想到它。然而，人们对于这位“救火队长”也颇多诟病，指责它危害女性健康，还可能被用来进行非法堕胎。紧急避孕药究竟是功臣还是罪人？我们又该如何看待它的作用呢？

常见的紧急避孕药有两种。一种含有大剂量的孕激素（通常是左炔诺孕酮），剂量可达口服短效避孕药的 5 ～ 10 倍。大剂量的孕激素可以迅速起到抑制排卵的作用，并且可以使宫颈黏液变黏稠，阻止精子通过。此外，它还能够影响子宫内膜，阻止受精卵着床，通过这些效应的共同作用防止怀孕。这类药物的原理与短效避孕药类似，但作用更快更强，同时由于剂量大、不良反应更多，不适合长期使用。

另一种紧急避孕药通过拮抗孕激素发挥作用。这种紧急避孕药的成分通常是小剂量的米非司酮，它可以阻止受精卵在子宫内膜着床，从而防止

妊娠的发生。作为补救措施，它与大剂量孕激素同样有效，但长期使用表现如何尚不清楚，因此也不是常规避孕的推荐方法。

紧急避孕药通常要求在性行为后72小时之内尽快使用，通常需服用1次或2次。使用紧急避孕药大约可使意外怀孕的风险减少70%～80%，也就是说，紧急避孕药避孕的失败率比其他那些可靠的方法（如短效避孕药、避孕套等）高出不少，但仍可阻止大部分意外妊娠的发生。

谈到紧急避孕药，一个很常见的观点是：紧急避孕药对身体伤害很大，吃不得。事实是否真的如此呢？

我们将两种紧急避孕药分开讨论。含大量孕激素的紧急避孕药在短期内比短效避孕药更容易引起恶心、呕吐等不适，而且，停药后由于体内孕激素水平突然下降，可导致撤退性出血，相当于使月经提前。然而，并没有证据证明偶尔使用一次此类药物会使健康受到长远的伤害（注意，是偶尔使用）。

至于含有米非司酮的紧急避孕药，其药物剂量很小，不良反应也较轻。米非司酮用于避孕的不良反应主要有恶心、乏力、下腹痛等，大多是轻微且可以恢复的。按照说明书，用于紧急避孕时仅需服用25毫克米非司酮，而当用于药物流产时，需要在2～3天内服用总剂量达150毫克的该药。在大剂量使用的情况下，米非司酮的安全性仍然可以接受，小剂量使用时，其安全性就更有保障了。

其实，紧急避孕药最常见的不良后果是避孕的失败。也有观点认为使用这些药物需警惕宫外孕风险，但文献资料只涉及个别的病例报告，并没有宫外孕发生率明显升高的证据。

总的来说，作为偶尔使用一次的补救措施，紧急避孕药是安全的。不过，如果过分依赖紧急避孕药，每次都找它来摆平，月经周期紊乱之类的麻烦就会找上门来。而且鉴于紧急避孕药的失败率不低，也会增加“中招”的风险。

[illegible]

有观点认为，紧急避孕药可能被用于非法的性别歧视性堕胎，因此需要严加管制。紧急避孕药真的具有堕胎这样凶残的能力吗?

成分为孕激素的紧急避孕药没有终止妊娠的作用，不能用于堕胎。然而，另一类紧急避孕药的有效成分米非司酮确实可以用于药物流产。

药物流产一般会用到两种药物——抗孕激素药（例如米非司酮）和前列腺素类药物（例如米索前列醇）。完成整个流产过程需要先后配合使用这两种药物。虽然药物流产看上去只是吃几片药，比“无痛的人流”还要轻松很多，但这个过程也有风险。

药物流产可引起子宫出血，对于小部分人，出血可能会变得严重且不可控制，需要刮宫和输血治疗，如果处理不及时，大出血可能致命。为了确保安全，药物流产必须在正规医疗机构、在医生的密切观察下才能进行，而且只能用于怀孕 49 天之内的情况。

不过，上文已经提到，用于避孕的与用于流产的米非司酮药片在剂量

[illegible]

上有明显不同。用于避孕的药片通常只含有 10 毫克药物，而药物流产时总共要吃下 150 毫克。因此，积攒紧急避孕药来进行“药物流产 DIY”并不是一件容易的事，何况在没有前列腺素类药物帮忙的情况下，药物流产的效果并不好。

总的来说，紧急避孕药虽不是长久之计，但也是将意外妊娠的风险降到最低的合理之选，作为补救方案，偶尔动用一次无损长远健康。只要不对其过分依赖，这位“救火队长”依然是我们可以信任的伙伴。

为求一子，壮士切蛋

Big.D

在古代，人们为选择孩子的性别发明了很多非常匪夷所思的方法。它们一看就不靠谱，大家绝对不要尝试。

比如，亚里士多德曾提出，在北风中做爱会生儿子，南风中则会生女儿（突然刮旋风该怎么办啊）。亚里士多德还曾表示，想生儿子的话，在做爱前请绑住左睾丸，想生女儿则反之。

原来，亚里士多德认为，男人的两个睾丸分别掌管着不同性别，来自左边睾丸的精液会生出女儿，右边的则生出儿子，难怪想生儿子的人对左睾丸那么看不顺眼了。18 世纪的法国爷们儿在这方面则做得更绝，他们为了生儿子，会干脆把自己左边的睾丸割掉。除此之外，还有更加暴力荒诞的方法：古时一些炼金师曾建议那些求子若渴的人饮下雄狮的鲜血，在月圆之夜、寒风之中，与身着男装的女性交合，就能让她怀上儿子。这法子虽然看起来既野性又有激情，但真的没用哦。

后来，人们终于弄清楚了性别是由携带X或Y染色体的精子（以下简称X精子或Y精子）决定的，这时候，努力的方向才开始变得清晰了。在20世纪70年代前后，研究性别决定因素的人们把主要精力放在了如何控制受精条件上。研究者试图通过改变条件，来让X精子或是Y精子与卵子结合。这一时期的方法虽然看似十分科学，却没什么实际效果，其中有很多还变成了现在广为流传的“偏方”，让一对又一对的夫妇白忙活。

当时人们认为，携带X染色体的精子在酸性环境中存活时间更长，而携带Y染色体的精子，因为携带的遗传物质少（Y染色体比X染色体小很多），所以个头小，游得更快。

因此，根据1972年的一篇文献，谢特尔斯（Landrum B. Shettles）医生建议想选择孩子性别的夫妻掐着点“办事”：想要儿子就在排卵时性交，这样跑得快的Y精子就会先遇到卵子；想要女儿就得在排卵前2～3天性交，这样活得久的X精子就有更大的机会。由此，还衍生出了一系列诸如通过冲洗改变阴道酸碱度以及控制插入深度的方法，不过现在已经证明这些都是不足取的了。2001年，霍塞恩（A. M. Hossain）的一项研究还证明，X、Y精子的大小、形状、尾巴长短等特征对胎儿性别并无影响。

除此之外，还有人试图利用X精子和Y精子的不同，将两种精子分离纯化，再进行受精。埃里克松（Ronald Ericsson）的方法是通过离心将精子收集起来，然后把这些精子滴在人血清白蛋白溶液（这种液体很黏稠）上层再离心，这样，游得较快的Y精子就会率先穿过人血清白蛋白溶液到达离心管底部。最后将分开的精子洗涤稀释后，就能根据需要选择合适性

别进行授精了。不过这个方法也饱受质疑，很多研究没能重复出埃里克松的结果。

后来，总算有了一些真正能用来选择性别的方法。其中大家最耳熟能详的大概是用 B 超分辨孩子性别，如果不是自己想要的就拿掉。不过，这种既不负责任又有损女性健康的粗暴做法已经被禁止多年。

还有种更好的方法能通过分选 X 和 Y 精子来决定性别，这就是流式分选法。先将精子用能与遗传物质结合的荧光染料染色（含有更多遗传物质的 X 精子会结合更多的染料，在荧光下更亮），接着，精子们在流式细胞仪中排队挨个儿经过检测装置，在检查精子的亮度后，分选装置会利用电场将不同亮度的精子分开（L. A. Johnson，2005）。有人或许会问，精子一个一个过得分到什么时候啊？其实在打一个字的时间里，流式细胞仪就已经筛选上万个细胞了。分选出不同的精子后，选择需要的精子进行受精就行。

不过，美中不足的是这种方法不是 100% 准确——想用这种方法生女孩有九成把握，想生男孩的话只有七成把握。不过在牛和羊身上，不论选雌性或是雄性，这种方法都能达到九成以上的准确率。事实上，基于这种原理的方法也的确广泛应用于畜牧业。比如选育种牛和奶牛时，如能人工选择性别，会节省很多成本。

此外，我们还有几乎 100% 准确的基因筛查（PGD）。这种方法需要先让精子和几个卵子在体外结合，在受精卵发育 3 天后对胚胎进行检验，

此时木已成舟——选取 XX 型胚胎植入母体的子宫就必然获得女孩，反之就是男孩了。当然，为了确保成功，大夫会额外植入一个或几个胚胎作为备份。

生男生女这事儿，很多夫妻都特别想自己做主，但除了规避某些伴性遗传病，我完全不赞成这种做法。实际上，包括中国在内的全球绝大多数国家的法律都是禁止各种非治疗目的性别选择的（美国除外）。在男女比例已经有些失调的中国，咱还是享受一下到最后一刻才知道是儿子还是闺女的刺激吧。

怀男孩肚子尖，怀女孩肚子圆？

SILENTGHOST

在中国，虽说重男轻女的思想已渐渐淡去，但未出生孩子的性别仍是准妈妈及家人和闺密重点关注的事情。于是，也有很多相应的关于孕妇的说法，像“如果妈妈肚子圆圆的，那多半怀的是女孩；如果肚子是‘尖’的，则多半是个男孩”。别以为只有中国有这种说法，老外们在这种问题上也异曲同工地迷信，说如果孕妇的肚子向前突出像个大号的网球，则可能是个男孩；而如果肚子的分量分布得比较均匀，则可能是个女孩。

当然，上边的那些说法统统都不靠谱，孕妇肚子的形状很大程度上是由胎儿的个头决定的，尽管男孩出生时的体重平均来说确实要重于女孩，不过这种差距并不足以让孕妇隆起的肚子产生让人一目了然的差别。

此外，胎儿在子宫中的体位也是会影响妈妈的肚子形状的。如果胎儿在子宫中背朝妈妈，那么妈妈的肚子就会更突出；反之，如果胎儿在子宫中面对妈妈，则会使腹部显得更平坦。这些都和孩子的性别没什么关系。所以，那些靠肚子形状判断胎儿性别的方法实际上都属于瞎蒙。

想要在孩子出生前判断其性别，最靠谱的方法，要么是等胎儿长到13周左右去做B超，要么是用绒毛穿刺法，要么就是通过检测母亲血液

中是否有Y染色体上特有的序列——有的话就一定是个男孩。不过，妇产科的大夫们还有一项有趣的研究，可以通过孕妇生孩子的难易程度，提前猜中孩子是男是女（虽然只提前了那么一丁点的时间）。

2003年，一帮来自都柏林的妇产科大夫在《英国医学杂志》（*British Medical Journal*）上发表了一项简短的研究报告，内容是生产过程和胎儿性别之间的关系。他们回顾了1997—2000年间在都柏林的国家妇产科医院出生的8 075名婴儿（包括4 070名男婴和4 005名女婴，而且都是头胎）的生产过程，结果发现——男孩比女孩难生！

从统计结果（见表4、表5）来看，生产男婴时更多地使用了催产素，也更多地用到了诸如产钳、吸杯等器械，花的时间更长，且剖腹产的病例也显著多于生产女婴。总之，通过多重回归分析，研究者们发现，生男孩和生女孩确实有所不同，至少在难易程度上是这样。

研究者还不是很清楚造成这种现象的原因是什么，体重或许是个因素，不过他们发现，分娩的方式和体重并没有联系。还有一种可能性是男婴的头围更大一点，这会让生产不那么顺畅，但研究者表示，这也不能很好地解释生产时的男女差异。不过，研究者在文章末尾也说了，这项研究的成果大概就是告诉妇产科的同行们，当在产房里开玩笑说“这么难生，一定是个男孩”时，这可能还真未必是玩笑。

表4　生男孩和生女孩的区别（一）

	男婴人数（%）	女婴人数（%）	P值
催产素催产	2 435（59.9）	2 279（56.9）	0.008
膜外麻醉	2 829（69.5）	2 667（66.6）	0.005
脐血穿刺术	792（19.5）	662（16.5）	0.000 7
分娩方式			
头位顺产	2 896（71.2）	3 064（76.5）	<0.000 1
子宫下段剖腹产	249（6.1）	179（4.2）	0.000 2
产钳	324（8.0）	259（6.4）	0.009
吸杯	601（14.8）	513（12.8）	0.001

表5　生男孩和生女孩的区别（二）

	男婴数值（标准差）	女婴数值（标准差）	P值
平均生产时间（分钟）	376（193）	352（296）	<0.001
平均出生体重（克）	3 574（457）	3 453（435）	<0.001

Maeve A Eogan, Michael P Geary, Michael P O' Connell, et al. Effect of fetal sex on labour and delivery: Retrospective review. *BMJ*, 2003, 320:137.

同上。

洗澡會令不育嗎？

一本大叔

炎炎夏日，大家拿出各种各样的现代“武器”来对抗炎热的同时，有没有想过谁比我们更怕热呢？没错，那就是精子。

人体的核心温度（即通过直肠测量到的体温）是37°C，而睾丸的温度比核心温度低2°C～3°C，阴囊通过收缩和松弛，可以使睾丸保持35°C左右的精子发育最佳温度。而桑拿房的温度比体温高得多，这会给精子带来怎样的影响呢？

国内外多篇文献指出，温度过高对精子发育不利。温度过高，能使精子的数量（精液容积、精子密度）减少，活动度（平均路径速度、曲线速度、精子头侧摆幅度）下降，精子形态异常（包括大头精子、小头精子、梨形头精子、锥形头精子、无定形头精子、空泡样头精子、双头精子、颈部和中段缺陷精子、尾部缺陷精子等）以及诱发生殖细胞凋亡等。

其中，温度影响精子形态的机制可能为：①温热引起精子形态学改变，

使附睾内精子出现胞质小滴，精子通过附睾的速率加快、成熟减缓。2 温热引起生殖系统代谢及生化改变，使睾丸生精组织被破坏，睾丸生精能力下降，精子在睾丸中大量死亡，睾丸萎缩、体积缩小，导致精子形态异常

而国内的相关研究结果也显示，桑拿与精子的异常有关。在一项由 135 名有桑拿史的不育患者以及 369 名无桑拿史的不育患者参与的对照试验中，研究人员得出结论：桑拿影响精子形态，特别是无定形头精子的数量增多了。在另外一项关于 310 例生育组样本、944 例无桑拿史不育组样本以及 306 例有桑拿史不育组样本的对照试验中，研究人员得出的结论与前一个试验完全相同。

其实，除了桑拿之外，坐姿不正、久坐不动、裤子过紧等均可导致阴囊温度过高。总之，精子是很容易受伤的，别热着它们。

那么，高温导致的精子异常，能与男性不育画上等号吗？比如，经常泡桑拿是否会导致男性不育？关于这个问题有不少研究，结果表明，桑拿的确会影响精子的形态，但这并不等于桑拿会造成不育。

芬兰图尔库大学的一项关于桑拿与怀孕关系的研究表明，桑拿并不影响男性的生育能力。无独有偶，《美国医学杂志》（*American Journal of Medicine*）刊登的一篇由汉努克塞拉（Minna L. Hannuksela）等人撰写的文章也说明，桑拿并不影响生育。文章还指出，血清中睾丸激素以及促性腺激素的浓度在多次桑拿后不会发生改变，而且男性及女性的泌乳素浓度在泡桑拿期间会暂时上升（男性正常的泌乳素水平有助于维持睾丸内高

水平的睾酮，并影响附属性腺的生长和分泌）。虽然一些研究表明桑拿会降低精子活动度，然而，作为桑拿发源地的芬兰，当地男子的精子计数却很高，而且，芬兰男子使女子怀孕所需时间比英国人要短。当然，这项研究是在桑拿的发源地做的，能否放之四海而皆准还有待检验。


除了芬兰的研究，泰国玛希隆大学也做过一个试验，8 名平均年龄为 30 岁的正常成年男子在连续 2 周桑拿浴后，精子活动度显著降低；但停止桑拿 1 周后，精子的活动度恢复正常。他们从而得出结论：桑拿引起的阴囊温度升高会导致精子活动能力降低，好在这种降低是暂时性的。

不过，尽管没有证据表明桑拿会让你彻底断子绝孙，但如果你目前正有“造人”计划的话，为了增加怀孕的可能性，还是少蒸桑拿为好。

把绮丽心思拆解成统计数字，在脉脉秋水中寻找来自石器时代的遗迹，有趣还是扫兴？

愿意与否，现阶段的我们，还必须一生都困在继承自祖先的躯壳里，感受和他们对等的尊荣与无力；不管是缘是劫，同样是逃不开演化的翻云覆雨手，不过与祖先相比，我们的进步在于，至少已能略略窥探这只手的操纵规律。

目次



你可能不知道

◦ 男人每天都能制造数百万精子，而女性只携带数量有限的卵子（近期有研究认为女性的卵子也有更新）。

◦ 阴蒂上有 8 000 多个神经末梢，而阴茎只有大约 4 000 个

◦ 演化心理学家发现，男人比女人更爱好舌吻，2/3 的人在接吻时会把头朝右边偏。

◦ 世界上约有 1% 的人既对男人没兴趣，也对女人没兴趣

◦ 除了人类、倭黑猩猩和海豚也会为了享受快感而做爱。

好友还是备胎：红颜知己真的存在吗？

冷月如霜

曾经有痴男怨女问沈宏非红颜知己和蓝颜知己的事情，沈爷答曰："什么'红颜知己''蓝颜知己'，都是女人用来骗自己，或是男人编出来骗女人的。在男人的心里，他的'红颜知己'和他充当的'蓝颜知己'，其实一开始就被自动归入'待搞'这一个类别里了。"

男女之间的友谊果真是不纯洁的吗？或者如同有些人所关心的，男女之间的友情真的可以升华成爱情，并顺理成章地发展为一段恋情吗？这种有趣的话题，自然不乏科学家的研究。2012 年 4 月发表在《社会与人际关系杂志》（*Journal of Social and Personal Relationships*）的一篇论文中，威斯康星大学欧克莱尔分校（University of Wisconsin-Eau Claire）心理学系专门从事个体差异和演化心理学方面工作的艾普丽·布莱斯克·莱切克（April Bleske-Rechek）的研究成果表明，沈爷的回答固然有理，却不尽然。

为了找到研究的对象，布莱斯克·莱切克在当地大学的学生里进行

了一番筛选。自然，这些学生正拥有一段异性之间的友情（两人不能仅是上课的同学，也不能是同一家族的成员，更不能处于恋爱之中）。为了确保这些友情的真实性，布莱斯克·莱切克设计了一套问卷，里面隐含了两个小问题以检查两人的关系是否只是发乎情止乎礼。此外，为了确保实验的结果不受其他因素的干扰，布莱斯克·莱切克还特别确认了所有的受试者都有异性恋倾向。按照以上这些标准，最终 88 对大学生成为受试者（最短的友情只有 2 周，最长的友情持续了 17 年）。

有了受试者，接下来自然就是着手研究了。布莱斯克·莱切克又设计了另一套问卷，其中要求每名受试者评估自己与红颜 / 蓝颜知己在彼此的眼中受欢迎的程度。此外，受试者还被要求评估双方各自想和对方进一步发展的可能性。

研究结果表明，男性更容易被自己的异性朋友所吸引，也更容易错误估计自己在异性朋友眼中的魅力。布莱斯克·莱切克发现，对方在自己眼中的吸引力取决于每名受试者自我评估的自己在对方眼中的吸引力。换而言之，倘若一名受试者越是认为自己在对方眼中充满了魅力，他 / 她对对方的好感度也就越高。另外，友情跨度的长短并不会影响两人眼中彼此的吸引力。

布莱斯克·莱切克早就发现许多异性友谊中存在着动机不纯的现象。在她与大卫·巴斯（David M. Buss）2001 年的一项研究中，受试者们就赤裸裸地表示“动心”是他们决定交朋友的重要因素之一。或许很多人

确实将自己的异性好友放进了“待搞”区，却因为害怕“连朋友都没得做”而迟迟无法迈出关键的一步。对于自己的异性好友，究竟应该“近水楼台先得月”，还是应该“兔子不吃窝边草”？

布莱斯克·莱切克认为，这需要根据自己和对方的恋爱状况，具体问题具体分析。对于男性而言，无论自己是否处于一段恋爱关系中，异性好友在自己眼中的吸引力都所差无几，自己想和对方进一步发展的程度也几乎没有改变。而自己的异性好友单身与否对男性的影响也并不大。即便知道自己的好友处于恋爱中，男性想和对方拍拖的程度也不会有明显下降。

与男生相反，感情状况更容易影响女性对蓝颜知己的看法。恋爱中的女性认为异性好友魅力不足，也无意与对方拍拖。而一旦女性开始独守空房，她对异性好友的好感度立刻上升，和对方进一步发展的意向也得到了加强。但相比于男性，女性毕竟还是更有节操——她们只有在确认对方确实是单身后才会憧憬下一步行动。对“想吃窝边草”的男性而言，倘若自己和对方都处于单身，那么至少在数据上，两人拍拖的可能性还是挺大的。

为何男女有别？布莱斯克·莱切克认为这是求偶策略演化至今的结果。在人类历史的绝大多数时间里，除了繁衍后代之外，处于育龄期的男性和女性并没有什么机会形成其他亲密的关系。而在现代社会，这种情况发生了改变。随着越来越多的场合中出现了“男女搭配，干活不累”的场景，人类的求偶策略也在潜移默化中发生了演化。男性为了传播自己的基因，

会利用身边一切可以利用的机会，因此对异性的好友也更容易动心。而女性更期望有一段稳定的长期关系来抚养自己的后代，因此才会在处于单身时急于在身边发展下家。

布莱斯克·莱切克发现，处于婚育期的男女（27岁以下，美国平均结婚年龄为27岁）对异性好友的感兴趣程度要明显高于已过婚育期的男女（27岁以上），这些数据和这个模型吻合。

虽然有数据表明多达一半的青年男女和自己的异性好友发生过关系，布莱斯克·莱切克并没有研究这些进一步发展的朋友们最终修成正果的比例。不过，这篇论文中的其他一些数据恐怕并不是那么令人乐观：无论在婚育期还是婚育期后，男女都把这种发展看作是一种负担而非一种福利，女性尤甚。须知倘若一旦被发现而停留在“好朋友”的区域里，之后想要翻身可谓难上加难。

写到最后，还是写上一句不能免俗的话：“勾搭有风险，表白需谨慎”。

瞎黑破坏神 or 婚姻破坏神？

冷月如霜

网络游戏让男生获得了宣泄荷尔蒙的渠道，却苦了他们的女友和太太。每有热门新游戏，这些女性就成了“游戏寡妇”。为了排遣这些女性的寂寞，法国一家成人用品店甚至愿意为被游戏抢去另一半的女性免费提供按摩棒……

这些棒子是否起到了效果自然无从考证，不过有人却以“游戏寡妇”为研究课题拿到了博士学位。在这篇题为“游戏寡妇：在线电子游戏上瘾者配偶的现象学经验》（*Gamer Widow: The Phenomenological Experience of Spouses of Online Video Game Addicts*）的毕业论文里，来自美国得州理工大学的杰森·诺斯拉普（Jason Northrup）详尽分析了“游戏寡妇”产生的原因以及沉迷游戏对周边人带来的影响。

或许在很多人的眼里，游戏玩家都是未成年人，或者是正在读大学的学生。这些游戏玩家中，有女友或者已经结婚的又能占多少比例？

然而，事实却非如此。在一些网友玩家的调查中，成年玩家的比例有75%～84%之多；一些大型网游中，50%的玩家是有正式工作的成年人，而全职学生的比例只有22.2%。此外，36.3%的玩家已经结婚，更有22.1%的玩家已经为人父母。简而言之，游戏已经不再仅是小孩子的玩意儿了。

随着游戏制作水平的提高，现在的游戏有了更多使人沉迷的成分：华丽的画面和逼真的音效给人带来感官上的愉悦；击倒boss的那一瞬间能使玩家释放压力；个性化的角色也能让游戏打上玩家的烙印。当然，游戏最使人沉迷的地方就是内置的奖励机制。游戏中的一些目标虽然看似困难（比如击败炼狱难度的大菠萝），但是在经过努力完成这些目标后，玩家在游戏中得到的装备、成就等会让他们产生巨大的满足感。

不过即便有了这些外在因素，沉迷与否仍然因人而异。有些玩家身上会出现一种叫作“冲动控制紊乱”（Impulse-Conirol Disorder）的现象，与滥用药物的生化和神经机制有着相似性。沉迷游戏的后果并不仅仅体现在这些玩家身上，他们的配偶、孩子、父母以及其他家人也会受到波及。2004年的一项研究表明，20.8%的玩家会因为游戏而减少与朋友或家人交际的时间；而另一项研究表明，15%的玩家“强烈认同”自己在不能玩游戏的时候会变得极易发怒。当女人的另一半来自这些人群时，“游戏寡妇”就诞生了。

为了更好地了解“游戏寡妇”的生活，诺斯拉普博士决定与她们进行

直接接触。为了征集到足够的访问对象，诺斯拉普在网络上一些名为“游戏寡妇”的小组里发帖直接寻找愿意参加研究的人，并顺利地找到了16名有意向参与研究的女性。

这些女性中有3名未婚，1名不认为自己的丈夫沉迷于游戏，1名虽然认为自己的丈夫沉迷于游戏，但实际上她丈夫每周玩游戏的时间低于美国玩家的平均时间，另1名由于丈夫觉得“感情受到了伤害”而最后退出了研究。为了提高最终研究成果的可信度，诺斯拉普将最终接受调查的“游戏寡妇”减为10名。

托尔斯泰说：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”但这句话在“游戏寡妇”身上并不适用。几乎所有的游戏寡妇都提到了以下几点：

“他戴上耳机不愿交流，或者假装听不到你的话。”

“除了游戏圈子，很少参与社交活动。”

“在他玩游戏时和他说话，他就会生气。”

“他总是匆匆把事情做完，以便能够早点回去打游戏。”

对游戏沉迷的丈夫们也使这些太太的生活发生了改变：

“我总是憋着一肚子气，直到实在憋不住就大发脾气。”

“每次回到家看到他坐在电脑前，我总是感觉压力很大。”

“我不得不亲自带孩子。”

“我们不像以前那样，有那么多的性生活了。”

“除了‘我回来了’和‘再见’之外，我们都快不说话了。”

而问及这些“游戏寡妇”为何不离开她们的丈夫，回答也只是可悲地

说“我害怕面对离开后的生活”。顺便提一下，这里暴雪又“中枪”了，访谈里的这帮“游戏寡妇”有很多都是《魔兽世界》造就的[还有些是《无尽的任务》（Everquest）造就的]。

诺斯拉普博士希望他的这项研究能够使学界开始意识到游戏对婚姻可能造成的影响，并最终带来对游戏沉迷的根治，以便帮助那些有人沉迷于游戏的家庭。

关于游戏，我一直挺欣赏“游戏你的游戏，而不要被你的游戏所游戏”这句话（编者补充：哪怕是暴雪的游戏）。游戏固然是一种很好的娱乐方式，不过记得在游戏之外，也有很多美好的东西值得去追寻，比如说，妹子……

暴雪娱乐公司简称“暴雪”（Blizzard），是一家美国电脑游戏制作公司，总部设在[illegible]经典系列作品：魔兽争霸、星际争霸、暗黑破坏神系列、决胜时刻、魔兽世界、等等。

为何男女的性伴侣数量对不上？

Albert_JIAO

2007 年美国政府公布的一项研究认为，美国男人的性伴侣数量平均是 7 个，女人平均是 4 个。英国学者的一项研究称，英国男人一生共有 12.7 个异性性伴侣，女人有 6.5 个异性性伴侣。而根据杜蕾斯公司的调查，香港男性平均有 14.2 个女性性伴侣，女性平均只有 4.1 个男性性伴侣。中国大陆男性平均有 3.5 个女性性伴侣，女性平均只有 2.3 个男性性伴侣。

看来天下男人都一样花心和放荡呀……稍等，你有没有发现这里面有些不对劲呢？性伴侣应该是一对一对的，而世界各个国家男性和女性数量都接近 1 ： 1，那么下面的公式应该是成立的：

男性人口数 × 男性平均性伴侣数量

= 女性人口数 × 女性平均性伴侣数量

= 人群中的性伴侣总对数

也就是说，男性和女性的平均性伴侣个数应该是比较接近的才对，至少，这两个数字不应该相差过大，否则一定是数据统计中的某个部分出了问题。对了，有一条忘说了，上面所说的都是异性性伴侣，同性性伴侣数量问题不在本文考虑之列。

各种调查中，男女性伴侣个数总是对不上号，男性的平均性伴侣个数总是比女性的高出几十个百分点甚至几倍。对于这种奇怪现象，数学家、统计学家、经济学家、社会学家都提出了各自的看法，但是并没有一个被人们广泛接受的解释。

从直觉上讲，一种可能性是，在各类调查中，男性往往喜欢夸大自己的性伴侣数量，女性则会怀着比较害羞的心理，把自己的性伴侣数量尽量往少了说。这种解释听起来似乎很有道理，但是却没有多少证据支持。

不少心理学家做过实验，让一组被测试者在正常情况下填完问卷，另外一组被测试者身体连上插满线的假测谎仪，要求他们“如实招供”。不过比较起两组结果，往往相差不是很大，调查中撒谎的人只是少数，而且未必“男性夸大、女性隐瞒”。一些害羞的男性开始的时候说了个比较小的数字，当研究人员说“接下来，我们将会使用测谎仪，大家有一次更改答案的机会”，他们会在“惊恐之下”把答案改大；同时，也有一些女性虚夸自己的性伴侣个数。

2000年《美国科学院学报》（PNAS）上的一篇报告认为，妓女是造成数据不靠谱的“罪魁祸首”。华盛顿大学社会学家布鲁尔（D. Brewer）觉得此类调查大多数在普通社区中进行，较少触及妓女聚集之处，

受访对象中的妓女比例远低于她们在总人口中的比例。即使受访者中妓女的比例比实际人口中妓女的比例只是低了零点几个百分点，但是由于每个妓女的性伴侣个数比普通女性多很多，被忽略的这些妓女的性伴侣庞大数量会把女性的平均值拉低不少。

妓女真的应该对数据失真负全部责任吗？不少研究者并不认同。

1997 年《性研究期刊》（*The Journal of Sex Research*）上的一篇论文中，研究者对性伴侣数量进行调查时，在问卷中增加了一个问题："你是否参与过有偿性行为？"统计数据时把回答"是"的被调查者的数据第一次保留，第二次去掉，两次显示男性和女性的平均性伴侣数量比例分别为 2.96 ∶ 1 和 2.38 ∶ 1，表明妓女卖淫的因素对调查结果有影响，但不应该是全部。

而英国的一位心理学家查阅了伦敦警察局红灯区"扫黄"的记录和对妓女们的调查数据，对妓女数量进行了估算。他发现，如果妓女真的为平均性伴侣数量贡献如此之大，让每个伦敦男性平均比女性多 7 个性伴侣，那么，假设 500 名女性中有 1 个是职业妓女，则每个妓女需要有 3 500 个不同的客人；要是 1 000 个女性中有 1 个是职业妓女，则每个妓女需要有 7 000 个不同客人。可现实中，妓女以兼职和只工作几年的居多，她们的性伴侣个数远远没有那么多，而全职的、每星期坚持接客几十人、十年如一日"兢兢业业"工作的妓女数量有限。对于嫖客数量的调查数据同样表明，似乎没有那么多的客户提供给妓女们。最后算来算去，妓女让男性增加的性伴侣个数怎么也达不到期望的数值。

剑桥大学的一位数学家莫里斯（M. Morris）认为，数据的漏洞不是出自良家妇女和荡妇，也不是出自良家男子，而是出自淫荡的老男人们。

在一些调查结果的男性和女性性伴侣数量分布图中，莫里斯发现男性和女性的分布曲线形状比较接近，不过在性伴侣数量最多的10%的区域，男性的分布图上多出来一块。

莫里斯认为，这些拥有超过20个性伴侣、年龄比较大的男性受访者，他们在回忆一生中一共有过多少个性伴侣的时候因为时间太长、数量太多而记忆不清，在问卷上会“凑个整”，随意填上一个像50或者100这样的数字，他们在更多时候是“五入”而不是“四舍”，于是这些老男人让男性的平均性伴侣数量膨胀起来。如果只考虑性伴侣在20个以下的男士的数据，男女的平均数就可以基本平衡了。

不过莫里斯的解释可能只适用于他研究的那次性伴侣调查，对于其他调查结果是否应验，恐怕就难说了。

还有人觉得，以下这些因素也可以一定程度上造成男女性伴侣数量的失调。

一般此类调查只会给18岁以上的男性和女性发放问卷，但是一些萝莉控的变态大叔喜欢和未成年的女性建立性伴侣关系，这会使得调查结果中男性的平均性伴侣数量更高。

调查中，男性往往会把发生过所有种类性接触的人都作为性伴侣，包括口交、肛交；但是女性往往只把发生过“标准”的阴道性行为的异性算作性伴侣。

相比于女人，男人更喜欢性幻想，男人平均比女人多出的性伙伴数量有可能出于幻想，男性或许会想象自己与第三者发生性关系。

一些发达国家或者地区的男性会到邻近落后国家去“勾女”，这样，针对一个国家内部的调查就会出现男性平均性伴侣数量多出来一截的情形。

看来，对于这个伤脑筋的学术难题，科学界也是众说纷纭，莫衷一是。各位性情中人，对于男性女性的性伴侣平均数总是对不上号的“神秘现象”，你又是怎么看的呢？

酒后眼里出西施

SILENTGHOST

灯红酒绿的酒吧常会成为一些人寻求露水姻缘的最佳场所。这里昏暗的灯光、煽情的音乐和酒精很容易让人感到意乱情迷。其中，酒精的作用值得重视：一方面，适当饮酒能让人变得兴奋健谈，还能增加情趣和壮胆；另一方面，喝了点酒的人看别人会更顺眼，这也就是所谓的“啤酒眼镜”（beer goggles）效应。那么，这种效应是否真的存在呢？

早在1990年，一项发表在《个性与社会心理学公报》（*Personality and Social Psychology Bulletin*）上的研究就描述了这种现象，随着夜色渐浓，酒吧里的男女对其他异性吸引力的评价慢慢增高了，不过这项研究并没有证明这与酒精有关。

2008年，英国布里斯托尔大学实验心理学系的研究者们对此进行了较为详细的研究。他们在布里斯托尔大学里征集了84名饮酒的异性恋单身学生，男女各半，年龄在18～22岁之间（平均年龄为20岁）。此外，

研究者们还准备了 40 张人像照片，拍摄对象是在布里斯托尔大学里挑选的 20 对正在谈恋爱的异性恋学生（平均年龄为 21 岁左右）。之所以选择成对的恋人，是因为处在恋爱中的男女双方在吸引力上比较相近，以他们作为吸引力的评判对象，男性组和女性组的吸引力平均值会更接近，有助于得到准确的结果。

实验时，一部分被试者需要喝一点伏特加调的酒，对照组被试者喝的则是汤力水调的饮料（不含酒精）。接着，被试者们需要对前面提到的 40 张人像照片的吸引程度按照从低到高共 7 个等级来评分。做完第一次测试 24 小时后，被试者们还需再进行一次同样的测试。之后，研究者们对得到的结果进行汇总和统计学分析。

最后得到的结论是，喝酒的确能够提高被试者对人像照片的评价。有意思的是，这和性别无关。也就是说，在喝了点酒的被试者眼里，不论男女都会更加顺眼。而且，研究者们还发现，男性被试者在饮酒 24 小时后仍会对异性照片的吸引力有更高的评价。

不过，研究者们也表示，他们的研究有两个问题：一方面，研究对象和照片中的人都是同一所大学里的学生，这样的样本代表性欠佳；另一方面，实验中被试者摄入的酒精量并不高，而且并未建立饮酒量和评价程度改变的联系。

澳大利亚邦德大学（Bond University）的人文与社会科学系在 2009 年也进行了一项类似的研究。

在这项研究中，研究者们在邦德大学的校园酒吧中选择了 80 名异性恋被试者（男性 41 名，女性 39 名），年龄在 18 ～ 29 岁之间。被试者需要对着酒精测试仪呼一口气以便测量血液中的酒精浓度，之后需要对研究者提供的照片上异性的吸引力做出评价。最后研究者们发现，血液中的酒精浓度越高，被试者对照片中异性吸引力的评价也越高。不过，如果被试者饮酒很多的话，这种关系就不那么明显了。

此外，2009 年发表在《英国心理学杂志》（*British Journal of Psychology*）上的一篇论文从其他角度更细致地讨论了这个问题。在这篇论文中，英国莱斯特大学（University of Leicester）心理学系的教授文森特（Egan Vincent）通过对来自酒吧和咖啡馆的 240 名被试者的研究发现，在那些喝了酒的男性眼里，化了妆又面容成熟性感的女性的吸引力增高了。不过，饮酒却不能提高被试男性对未成年女性吸引力的评价，而且，饮酒也不会使男性高估未成年女性的年龄。因此，以喝了酒为由推卸和少女发生关系的责任是不可信的。

总之，已经有不少类似的研究都证明了饮酒能够提高饮酒者对别人吸引力的评价，但造成这种效应的原因尚不十分清楚。据推测，这可能是因为酒精刺激奖赏系统中的多巴胺分泌所致。

做爱之后谁先睡？

冷月如霜

作为人类与生俱来的天性，饮食和男女之事这两件事情都不可避免地要经历“准备—中途—善后”这三部曲，缺一不可。以饮食为例，倘若半夜看日剧，不幸被《深夜食堂》挑起了胃里的馋痨虫，立刻冲到厨房里寻找食材开刀烧水下锅做熟吃掉，然而饭后，你翻出的锅碗瓢盆泛着一层油光等待着你的清洗……

同样是善后，男女之事则比刷锅洗碗来得更为复杂，扔套擦洗换床单这等俗务暂且不论，事关感情和心理方面的交流沟通至关重要，而且男方要注意的事项更多。“事后不要立即抽一根烟，使自己看起来像姑爷仔或嫖客”，“事后不应立即穿上裤子离开”，诸如此类，不一而足。而张小娴更是在“所以男人礼貌上不应立即睡觉，该听听女人说话”之前触目惊心地用了“最介意”三个字，并将其作为《男人的床上礼仪》的事后头条。

相比之下，女性的善后工作则简单得多：“事后不要缠着男人说话，应该理解他们是很疲倦的。”从女性的角度看来，一场完美的性生活固然少不了一番“敌进我退”“敌驻我扰”，但事后的“敌疲我打”却是大大地不可取。

世界上最遥远的距离，不是生与死，而是男方急于呼呼大睡，女方却想要侃侃而谈。如何以正确的人生态度处理“善后”这个问题？科学家们给出了他们的意见。1979 年，詹姆斯·哈尔彭（James Halpern）与马克·谢尔曼（Mark Sherman）两人提出了一个理论，认为性交后的时间间隔（Post-Coital Time Interval，简称 PCTI，也就是俗称的“事后”那段时间）是处于性关系中的双方成功建立起情感纽带的大好时光。这段时间越短（比如翻个身睡着了），就越有可能损害两人之间的情感联系。

而男女面对“事后”那段时间表现出的截然不同的态度，可能与两性的繁殖策略有关。对策略为“广播种”的男性而言，拥有多名性伴侣意味着自己在繁殖上的巨大成功。所以男性在迈入一夫一妻制的婚姻前，往往会不自觉地逃避承诺。这种情绪在“事后”的体现，便是男性不愿意与对方说话调情来巩固感情的联系，索性一睡了事。而对于女性而言，由于自身一生中所能拥有的后代数量有限，因此在挑选终身伴侣时往往会慎之又慎。在“事后”，女性会更主动地寻找话题和男性聊天，以期枕边人能够伴自己走过一生。

然而理论归理论，即便男女在“事后”的形象已经根深蒂固，但在几十年后的今天，仍有人觉得有必要去验证下这个想法。密歇根大学公共卫生学院的丹尼尔·克鲁格（Daniel Kruger）教授就总结了现有的两个假设

如果“事后”那段时间真的对两者的感情维系起着重要作用，那么那些伴侣在性爱后早早鼾声大作的人一定有更多的感情需求。此外，考虑到两性的繁殖策略，克鲁格教授还假设男性在性爱后更容易进入梦乡。

限于研究题材的特殊性，想要获得第一手的观察资料自然不可行。克鲁格以两所大学的本科生为研究对象，采用网络匿名调查问卷的方式，成功收集了 456 个样本。在除去 163 名没有经历过完整性生活的学生以及 18 名声称自己有同性恋倾向的学生后，克鲁格开始分析数据。在筛选过的样本里，克鲁格发现但凡性生活后伴侣（不限男女）睡得比自己早的人，都渴望更多情感上的羁绊和交流。

而在关于谁先入睡的调查中，克鲁格设置了 5 个选项，对应的分数为：1. 基本是我；2. 经常是我；3. 双方差不多；4. 经常是对方；5. 基本是对方。问及性生活后哪方先入睡，男女双方给出的答案出乎意料地一致：男方给出的平均答案为 3.03，女性给出的平均答案为 3.05，这意味着这次调查中并没有出现普遍意义上的“男性倒头就睡”。

而在没做爱直接睡的调查中，女方依旧给出了 3.01 这个数字，而男方的答案则让人吃惊——3.31！这意味着如果不及时“跟进”，女性更容易睡着。

克鲁格是这样解释的：由于男性迫切想传递自己的种子，即便和性伴侣同床共枕也不能使男性获得安全感，生怕自己睡着之后女性就和其他男性发生关系。于是在播种之前，男性先要确认伴侣睡着，然后才能安心入睡。虽然人类的文明已经发展了那么多年，男性骨子里的不安全感以及对应的“监视机制”却依旧保留至今。

克鲁格认为自己的研究时于性生活并不限于性交过程结束，无论男女，"事后"的行为偏好也透露了自己和对方的择偶态度。关于自己的实验中并没有出现"男性更容易在事后入睡"这个预期结果，"要么我们的研究方法可信度不够，不足以反映这个事实；要么我们一直以来都误解了男性"，克鲁格在论文的讨论部分如是说。

考虑到在"办事"的过程中，男性往往会付出更多的体力，而高潮过后的催产素也有助眠的作用，如果诸位女同胞的男友们出现了即将入睡的症状，也请多多包涵——要知道这不仅是一个心理上的现象，更是一个生理上的现象。而诸位男同胞们如果不想扫女友的兴，也不妨强打起精神，多聊几句吧。根据沈宏非对上海市革命出版组 1970 年 9 月第一次印刷出版的《"赤脚医生"手册》的解读，"男同志（在事后）不要只顾自己呼呼大睡，而应该关心女同志"。

爆乳战术为何屡试不爽？

冷月如霜

不知从什么时候起，“胸大为美”的观念开始在人们心中变得根深蒂固。那些大胸的女性往往能大红大紫：美女主播柳岩成了红透半边天的节目新宠；《让子弹飞》的助理赵铭短短几秒迅速走红；《国光帮帮忙》更是每集邀请不同的美女助理主持来吸引观众。而这些女星在节目上下有意无意露出的乳沟，更被趣称为“事业线”。

为了博得更多人的眼球，女星们总是挖空心思来让自己的胸部看起来更大。《康熙来了》就曾经有几集通过杂志摄影师之口来传授挤胸的技巧，而红地毯上的女星也纷纷穿上低胸礼服秀出自己的“事业线”。

有意思的是，新西兰威灵顿维多利亚大学的研究人员在研究这一问题后认为，相较于脸庞，男性可能确实会首先关注女性的乳房。在这项研究中，研究者随机选取了 36 名年龄跨度从 22 岁到 42 岁的男性受试者。在事先不知道测试内容的前提下，研究人员给每名受试者观看同一张女性正面裸

体的照片。

在观看的同时，一台隐蔽的仪器悄悄记录下了他们的眼球运动轨迹，从而可以分析出他们的眼球在女性的哪些部分上逗留，以及停留时长。研究结果显示，有47.2%的男性（36名中的17名）首先将目光聚焦在女性的胸部上，而首先关注女性脸庞的只有可怜的5.6%（36名中的2名）。

那么，女性的胸部越大，就越能吸引男性吗？实验表明并非如此。在同一个研究组的另一项研究中，研究者用Photoshop把一张裸体女性照片的胸部分别扩大和缩小了20%，然后让受试者对每张照片进行评分。与没有被PS的照片相比，受试的男性对缩小的胸部好感度明显降低。

但令人惊讶的是，扩大20%的胸部与普通大小的胸部相比，两者的吸引力没有明显区别。更有意思的是，在对目光驻留时间的分析上，研究人员发现：无论是缩小的胸部还是扩大的胸部，受试者对它们的关注时间相差无几。

既然纯粹的大胸对男性的吸引力有限，那么哪些女性特质更容易吸引男性呢？值得一提的是，在第一项研究中，研究人员在用PS修改胸部大小的同时，还修改了照片中女性的腰围，使得腰围/臀围比从0.7上升到了0.9。在后续的吸引力评分环节中，腰围/臀围比为0.7的女性得到的

分数明显高于比值为 0.9 的女性。而在比值固定的前提下，胸部的大小引起的对男性吸引力的改变并不明显。

由此看来，腰围 / 臀围比才是对男性吸引力的决定性因素。研究人员推测，腰围 / 臀围比是反映女性身体健康程度以及生育能力的一项指标，因此在长久的演化中成为女性最吸引男性的地方。至于男性关注女性胸部的问题，研究人员认为仅仅是因为胸部能够让人产生“审美上的愉悦感”。

看来我们都误解了男性——在对胸部的要求上，他们并不是要求“大大益善”的动物。在演化方面，虽然男性对女性的胸部有着特殊的审美喜好，但是如果谈论到传宗接代的问题，男性还是会觉得腰围 / 臀围比合适的女性更具有吸引力。由此看来，在用来形容一名女性性感的“丰乳肥臀”之后，实在应该再加入“小蛮腰”三个字。

人为何不乱伦，文明还是天性？

非言语

在绝大多数人类文明中，乱伦都是一种禁忌。关于这种禁忌起因的探讨，毫无疑问是一场旷日持久的战争：一边是奥地利心理学家弗洛伊德（S. Freud）及其追随者，他们认为乱伦心理是潜意识的自然欲望，禁忌是文化施加的外在控制，这一假设也叫俄狄浦斯情结；一边是芬兰人类学家韦斯特马克（E. Westermarck）及其追随者，他们认为乱伦禁忌本身就是一种古老的本能，而非某种文化建构的结果。

如果从 1891 年韦斯特马克发表《人类婚姻史》一书算起，对于乱伦禁忌的争论已经持续了一百多年。争论双方的态势可以用"风水轮流转"来形容。20 世纪的上半叶，将乱伦禁忌视为一种文化发明的观点广为人知，影响甚大，人们似乎接受了这样一种经典精神分析的观点：乱伦似乎是一种本能的缺省设置，而乱伦禁忌是一种用来压抑这种本能的文化产物。相比之下，韦斯特马克的假设则备受冷落、无人问津。

不过从 20 世纪下半叶开始，韦斯特马克的观点日益占据上风，得到了越来越多证据的支持——乱伦禁忌是一种本能心理，跟亲缘识别机制有着密切关系。而相比之下，精神分析的俄狄浦斯情结依然只是一个充满文

学色彩的美妙隐喻，或者更糟糕的是，一个没有得到证实或永远无法得到证实的概念。

包括法国著名人类学家列维-施特劳斯（Claude Levi-Strauss）和弗洛伊德在内的许多学者，都曾武断地认为动物有乱伦本能，它们的交配似乎不分亲疏远近，人皆可妻、亦皆可夫，因此人类社会中罕见的乱伦现象正是文化压抑的结果。不过，认为动物具有乱伦本能似乎是对大多数动物的污蔑，它们有理由提出强烈抗议，"这种观念更多地出自想象，而非事实"。动物间偶尔发生的乱伦常常导致后代的基因退化，而因此留下的后代绝大多数都会"英年早逝"。

动物学家的研究一致表明，乱伦其实是动物圈子里非常罕见的个案，许多动物都会避免跟自己的亲属发生性关系。例如2006—2007年，中国生物学家在长达半年的时间里对黄山短尾猴的交配行为进行了观察记录，发现在它们多达360次的交配行为中，只有7次是近亲交配，而且没有母子乱伦的现象发生。

美国杜克大学的演化心理学和人类学教授普茜（A. E. Pusey）等人于1996年撰文指出，聪明的动物会采取各种策略避免近亲交配的悲剧。

许多哺乳动物在性成熟之后会离开自己的家庭。即使其他原因（如同伴竞争）也会导致这一结果，但不少证据依然表明它们也是在试图避开自己的血亲。在异性父母被移除之后，雄性和雌性白足鼠（Peromyscus）都减少了迁徙行为。

对很少迁移的动物来说，它们使用出轨的方式偷偷地反抗近亲结合。雄性和雌性的领航鲸（pilot whale）一辈子都在自己的领地里，但所有孩子的父亲都来自其他的领地。

动物学家在实验室里搭建“招亲”场地，让某种动物可以在不同异性之间选择中意的配偶，结果发现它们通常都会避免选择自己的兄弟姐妹或者同窝同巢的异性伙伴。

当亲生父亲被其他年轻的雄狮取代之后，雌狮的发情期会提前；当异性父母被移除之后，白足鼠的成熟会加快。人类社会中也有类似的现象：在父亲缺失的单亲家庭中，女儿的青春期会提前，虽然具体的原因尚不清楚。

2005 年，普茜系统地回顾了灵长类中广泛存在的乱伦回避行为，发现跟人类关系最为密切的灵长类中，直系亲属之间的乱伦行为几乎不存在，于是她毫不犹豫地得出结论说，在人类出现前，作为一种自然选择的行为，回避近亲交配就已经广泛存在于其他动物之中了。

按照韦斯特马克的观点，打小生活在一起的孩子，长大之后会形成彼此之间的性厌恶，进而表现出乱伦禁忌的行为。即使他们之间没有任何亲缘关系，但是共同生活的经历会被作为一种亲缘线索，促使他们避免跟青梅竹马的异性结合。如果文化习俗强令彼此结合，由于有性厌恶的存在，可能会导致他们婚姻生活的不幸。斯坦福大学的人类学家伍尔夫（A. P. Wolf）和谢弗（J. Shepher）的经典研究有力地支持了韦斯特马克的这个假设。

人类学家对乱伦禁忌的研究，常常通过分析某些社会的婚姻现象进行，伍尔夫等人的研究也是这样。20 世纪 60—90 年代，伍尔夫等人对日据时期台湾的童婚现象进行了长达 30 年的调查，调查对象多达 14 000 人。在童婚制度下，女孩子通常在 4 岁之前就被送到未来的丈夫家，跟自己的小丈夫一起生活，然后到 17 岁左右举行婚礼。除了童婚制度之外，另外两种婚姻习俗是从小不认识的男女长大之后订婚，婚后或在夫家居住，或在娘家居住。

伍尔夫发现，童养媳的生育率比普通女性低 25%。相比于普通女性，她们更可能背叛自己的丈夫，她们的离婚率则比普通女性高 3 倍。影响婚姻幸福与否的一个重要因素是女孩被收养的年龄：年龄越小，长大以后的婚姻生活就越不幸。如果她们被收养时年龄在 3 岁以上，以后的婚姻生活通常跟普通婚姻没有太大区别。而在这种童养媳制度中，男孩和女孩见面时的年龄则对男孩以后的婚姻没有影响。

跟其他女性相比，童养媳的健康水平并不差；同时，有的童养媳由于某种原因后来跟别的男人结婚，她们留下的后代数量跟普通女性没有差别。这就排除了造成童养媳婚姻不幸的其他两种替代假设——她们本身健康不佳，或者在收养家庭中压力过大。

正如伍尔夫明确指出的那样："韦斯特马克的批评者认为乱伦禁忌会阻止人们做他们想做的事，实际情况并非如此。恰恰相反，乱伦禁忌是一种心理上不可避免的情绪表达，不管社会是否认可。"

几乎就在同一时期，谢弗对以色列的基布兹公社（Kibbutz）[1]进行了

[1] 基布兹公社是以色列的一种集体农庄，所有财产均为公有，成员可享受子女免费受教育、水电免费等福利。

深入研究。在基布茨公社里，所有的孩子在很小的时候都被受过训练的护士专门看护，他们一天里大约 22 个小时都待在一起，这样的社会生活一直持续到青春期。

谢弗对 65 名基布茨成员的观察表明，没有任何成员跟同一公社中的异性有性行为或结婚。而且大家对性行为的回避都是自愿的，公社中不存在对性行为的正式或非正式的制裁，无论是来自导师、父母还是其他同伴。对 211 个基布茨公社的 2 769 对已婚男女进行调查，谢弗发现其中几乎没有任何一对男女来自 6 岁以前同一个公社的同伴群体。有 13 对男女曾经在同一个公社待过，但其中 8 对是在 6 岁以后；另外 5 对是在 6 岁之前，但一起待过的时间不超过 2 年。

跟伍尔夫的发现一样，谢弗的研究明确地支持了韦斯特马克的假设，即无论是在没有文化压力的基布茨公社，还是文化鼓励男女结合的童婚制度下，幼年时期的共同生活会导致男女在成年以后彼此之间性吸引力的丧失。

贫贱夫妻性事哀？

非言语

唐朝诗人元稹写过一首名叫《遣悲怀》的诗，怀念他的亡妻，其中有两句："诚知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。"想象力发达的读者恐怕也会好奇，既然贫贱夫妻百事哀，除了日常琐事，男女"性事"是不是也包括在内？有钱人的性生活会更好吗？

[illegible]

性高潮是一种极度快乐的性爱体验，有这种体验的女人通常对自己的性生活更满足。不过，研究者们争论不休的一个问题是：女性的性高潮到底是一个男性射精运动的副产品，还是具有某种适应意义的演化机制？有一种假设认为，女性的性高潮是自然选择赠送给女性的一种检测设备，这一设备可以帮助她们区分不同质量的男人。简单地说，跟高质量的伴侣在一起，女性的性高潮会增加；而跟低质量的伴侣在一起，她们的性高潮则减少。

性高潮作为检测设备的假设得到了若干研究的支持。1995 年，新墨西

哥大学（University of New Mexico）的生物学家兰迪·桑希尔（Randy Thornhill）等人发现，年轻女性报告的性高潮频率跟性伴侣的身体对称性成正比。2000年，演化心理学家托德·夏克福德（Todd K. Shackford）等人也发现，在最近一次性事中，假如自己的男性伴侣更有吸引力的话，女性体验到性高潮的可能性更大。身体对称性和吸引力评价都可以作为衡量男性质量高低的指标。不过，上述两个研究中的被试者数量都比较少，一个是86人，一个是388人，而且都是美国的女大学生，样本的代表性自然是一个令人头疼的软肋。

[illegible]

2009年，在《演化与人类行为》（*Evolution and Human Behavior*）期刊上，来自英国纽卡斯尔大学的两位研究者托马斯·波莱（Thomas V. Pollet）和丹尼尔·奈特尔（Daniel Nettle）发表了一份有争议的调查报告。在这份报告里，他们使用了1999—2000年之间进行的“中国健康与家庭生活调查”（The Survey of Chinese Health and Family Life）的数据。这批数据来自60个乡村和城市的社区，涵盖了不同社会经济发展水平的地区（不包括香港和西藏）。因为访谈的内容涉及私密的性生活以及家庭收入等信息，因此每个社区随机选择20～64岁之间的成年公民进行匿名电脑访谈，形成了一个多达5 000人的具有代表性的样本。

对波莱和奈特尔来说，他们试图回答的问题是：男性有钱没钱能否影响女性性高潮的频率？他们假设，如果男性的财富也能像身体对称性一样作为衡量他们质量高低的指标，那么高质量的男人（这种情况下指有钱的

男人）会让女性体验到更多的性高潮。他们对已有样本进行筛选，把伴侣信息完整的女性保留下来，得到了 1 534 名女性参与者，她们提供了自己跟伴侣做爱时体验到性高潮的频率，从“没有”到“总是”包括 5 个级别。除此之外，两位研究者还检测了其他可能影响性高潮的因素，包括年龄、目前关系的持续时间、幸福感、健康水平、教育层次、收入差距、教育差距以及不同地区的经济发展水平。

做了那么多准备工作之后，波莱和奈特尔采用顺序回归分析（Ordinal Regression Analysis）的方法检验他们的假设。果不其然，男性的收入水平能够预测女性性高潮的频率：男性伴侣的收入越高，女性报告说自己体验到的性高潮也越多。当把其他的因素（比如女性的年龄、健康、教育水平等）考虑进去之后，男性收入水平跟女性性高潮之间的正相关依然存在。因此，在此项研究中，“有钱就有性高潮”的结论得到了支持。

[illegible]

除此之外，波莱和奈特尔还发现了一个意料之外的结果：身高好像不重要。因为，在他们的数据中，男人的收入跟他们的身高无关，女人的性高潮频率也跟男性伴侣的身高无关。在 2008 年的一项研究中，香港大学的理查德·菲尔丁（Richard Fielding）等人通过对近 1 万名中国人的调查也发现，男性的身高跟他们的繁衍成功与否无关。因此，波莱和奈特尔认为，男性的身高对中国人而言可能不是一种很受重视的特质。

文章发表之后，似乎大功告成。可惜，波莱和奈特尔两人的研究结果遭到了同行的质疑，质疑的焦点是他们采用的统计模型有问题。2010 年，两名来自德国的研究者重新分析了波莱和奈特尔的数据，结果发现在不考虑其他因素的情况下，男性收入的确跟女性性高潮的频率正相关。问题在于，把收入以外的其他因素统统考虑进来之后，男性收入的高低跟女性性高潮的频率之间就不存在直接关系了。

于是2011 年，波莱和奈特尔在他们最初发表文章的 演化与人类行为期刊发表声明，明确更正了他们最初的结论。两人认为，女性的男性伴侣收入较高的话，通常意味着她们自己更年轻、更健康、更有幸福感，具有更高的教育水平，这些因素会整体影响女性性高潮的体验。波莱和奈特尔承认："当其他因素被控制之后，已有数据并不支持伴侣收入和自我报告的性高潮频率之间存在直接关系。"

换句话说，波莱和奈特尔的研究最后证明的是，受过教育的年轻、健康女人拥有更高的幸福感，因而体验了更多的性高潮。由于有钱的男人更可能跟这样的女人结婚，因此表面上是有钱男人的女人有更多的性高潮，其实不过是这些女人本身的素质引发了她们的性高潮体验。没钱的男人因为很难得到年轻健康的高学历女人，那些女人即使跟他们在一起，可能也不会有太多的幸福感，因而性高潮体验更少。

直接影响性高潮的四个因素之中，健康、年轻和教育水平都是女人本身的特点，只有幸福感可能跟男人收入水平有关系。因此，波莱和奈特尔的研究恰恰凸显了女性本身的特质对于她们体验性高潮的重要性，男性收

入产生的影响很小，有可能通过影响女性的幸福感来实现，而男性收入对女性性高潮的直接影响则是不存在的。

从演化心理学的角度讲，波莱和奈特尔的研究给出了一个有趣的发现：男人的收入只能表明他们拥有社会资源的多少，并不表明他们本身质量的高低，跟身体对称性和吸引力这些因素不同。

PS：因为自己的统计错误，波莱和奈特尔得出了一个有争议的结论。不过，他们也由此“因祸得福”，以更正错误的名义继续发了两篇论文。

男星为何爱出轨？

非言语

回顾2011年底时科比（Kobe Bryant）闹离婚这事的开端，是科比的妻子瓦妮莎（Vanessa Bryant）公开指责他搞婚外恋。据她估计，科比每年都有至少10次婚外情，总计拥有不下105个情人。不过，早在科比之前，同样作为NBA球星的张伯伦（Wilton Norman Chamberlain），就在他的自传中声称跟2万名女性上过床。也许张伯伦的自传有夸大其词的地方，不过他们的故事自然引出一个话题：男明星们真的都那么不靠谱吗？

首先，不管是不是明星，男人都有花心的天性。研究人类择偶行为多年的演化心理学家大卫·巴斯（David M. Buss）认为，相比于女人，男人有更强烈的花心倾向。这是因为，物种在演化尺度上的成功意味着留下尽可能多的后代，而制约男人成功的条件是女人的数量：一个男人在2年时间里跟100个女人发生性关系，理论上就可能留下至少100个后代。

对女人来说，情况迥然不同，制约女人成功的是男人的资源：一个女人即使在2年时间里跟100个男人发生性关系，她一般最多也就能留下一两个孩子，而没有充足的资源，恐怕连一两个孩子都难以养活。

2003年，美国布拉德利大学（University of Bradley）心理学系的施密特（D. P. Schmitt）领衔的一项跨文化研究发现，在52个国家的16 000多名被试者中，男人在任何一个年龄阶段内期望的性伴侣数目都要多于女人。比如，男人希望30年内能有7个性伴侣，而女人则是3个。

在1987年，心理学家克拉克（R. D. Clark）和哈特菲尔德（E. Hartfield）进行了一项有趣的现场研究。在大学校园里，一个中等相貌的异性走向一名大学生，询问几个问题。第一，“晚上想跟我一块出去吗？”第二，“你愿意来我的房间吗？”第三，“你想跟我上床吗？”当女性被问到这些问题时，没有一个做出肯定回答。而当男性被问到同样的问题时，大多数人却做出了肯定的回答。确切地说，有3/4的男性选择了同意。

当然，即使男人有花心的操作系统默认设置，也不是所有的男人都有机会这么做。因为一个巴掌拍不响，还得有女人合作才行。毫不奇怪，女人更倾向于跟社会地位高的男人发生一夜情。按照得克萨斯大学心理学系的格瑞琳（H. Greiling）和大卫·巴斯的观点，女人跟陌生男人做爱，常常有两种秘而不宣的目的。第一，为了找到更好的伴侣；第二，为了得到物质方面的好处。2000年，他们通过实验验证了这一假设：无论男人女人，都认为女人通过一夜风流能够得到好处，包括她可能借此找到一个更优秀的伴侣，以及她能得到珠宝首饰、漂亮的衣服。除此之外，花心的女人通常觉得从情人那里得到馈赠很吸引人。

于是，现在我们就能还原这样的一个经典的婚外恋模型：男人有花心

的想法，而他一旦飞黄腾达、拥有显赫地位之后，就可能把这种想法变成现实。这是一个内在的推力。除了这个推力之外，还有一个外在的拉力：当男人变得有钱有势之后，被他吸引的女人也多了起来，不少女人愿意跟他上床，也许因为觉得他是一个更优秀的男人，想要通过做爱的方式转变为他的家庭女主人；当然也有女人跟他做爱只是为了一点零花钱，如同动物学家观察到的相似场景——雌性黑猩猩有时候会为了一根香蕉献出自己的身体。

不过，科比的案例并不那么简单：因为女人既会被拥有社会资源的男人吸引，同时她们也会被男人本身吸引。而科比能够拥有至少 105 个情人（如果是真的），也跟他拥有令人羡慕的身体魅力有关——肌肉发达，身手矫健，运动场上叱咤风云，王者风范气度十足」

这也就成为科比不靠谱的另一个原因——他是个精壮的男人，而精壮的男人在女人眼里是超级性感的理想情人。这是为什么呢？

男人的许多第二性征都是表明自己具有"好基因"的信号，这些信号的真伪跟它们本身的代价有关：简单地说，打广告的代价越大，广告内容就越可信。男人的精壮就像这么一块广告牌一样，告诉女人这个男人值得拥有，因为其他男人可能不能承受精壮的代价。

跟精壮有关的是影响男性气质的激素——睾酮，这种化学物质会抑制免疫系统的机能，同时耗费更多的能量。在精壮具有种种不利的前提下，某个男人的精壮恰恰表明他的身体能够承担这种代价，他的基因质量非常

过硬，这个广告的确太令人印象深刻了，女人很吃这一套。“好基因”能够抵御恶劣环境的不良影响，从而增加自身生存和繁衍的可能。女人跟具有“好基因”的男人结合，自己的后代也更有可能拥有“好基因”，无疑也增高了存活下来的概率。

根据美国新墨西哥州大学人类学系冈杰斯特德（S. W. Gangestad）和辛普森（J. A. Simpson）提出的策略性多元化理论，女性的理想伴侣是既能提供资源、又能提供“好基因”的男人，不过大多数的女性都难以实现这个目标。因为通常适合做老公的男人很顾家，但未必有“好基因”；而有“好基因”的男人又通常不靠谱，风流成性。因此，女人很可能采取折中方案，找一个可靠的男人养活自己，在必要的时候又会跟有“好基因”的男人暗度陈仓。

许多研究为这一理论提供了支持。比如，在月经周期中受孕可能最高的时候，女人却通常被其他的男人吸引，尤其是在她们的长期伴侣缺乏魅力的时候。精壮的男人也受到女人的青睐。比如，跟普通男人相比，他们被女人认为更具吸引力、更强势、更适合做情人。一项对 470 名美国女性的调查显示，她们跟精壮的男人从相识到做爱通常只需要 7 天，但跟其他男人则需要多达 12 周的时间。而且这些女性承认，最近跟她们做爱的男人通常比原来的那位要更威猛。

具有“好基因”的男人通常不靠谱，因为他们演化的“目的”就是尽可能多地播种，而不是耐心地耕作，只有这样才能留下尽可能多的后代。

2009 年，美国匹兹堡大学的心理学家拉塞克（W. D. Lassek）和高林（S. J. C. Gaulin）通过对 18 ～ 59 岁之间的 5 536 名男性和 6 492 名女性的调查分析发现，越精壮的男人拥有越多的性伙伴，同时他们第一次做爱的

时间也越早。除此之外，来自对法国3所大学527名大学生的调查也显示，体育系的男生在过去一年里拥有的性伙伴数量是其他系男生的2倍。加州大学洛杉矶分校传播研究和心理学系的弗里德里克（D. A. Frederick）和哈塞尔顿（M. G. Haselton）的研究结果表明，精壮的男人一生中拥有更多的露水姻缘，他们跟已婚女人上床的可能性也更高。

像科比这样的男星为什么不靠谱的三个答案已经呼之欲出了：第一，他们是男人；第二，他们是有资源的男人；第三，他们是精壮的男人。这些因素叠加在一起，意味着这样的男人搞婚外恋的可能要比普通男人高很多。因此，当105个情人的消息被报道出来的时候，我们其实不必惊讶，因为像科比那样的明星，的确是婚姻世界里的"危险分子"。

画如萝莉，更有魅力

非言语

"人不是因为美丽才可爱，而是因为可爱才美丽。"至少在女人身上，这句话得到了很多心理学研究的支持：那些长相萝莉的女人（看清楚，是女人，不是小女孩哦）在男人眼里通常更有魅力。全世界最流行的玩偶芭比娃娃，就有一张高额头、大眼睛、小鼻子和厚嘴唇的典型的萝莉脸。

20 世纪 80 年代初，美国布兰迪斯大学的心理学家麦克阿瑟（L. Z. McArthur）和阿帕图（K. Apatow）发现，具有萝莉特征的面孔拼图被认为更可爱、更年轻。对于一张普通照片来说，如果把眼睛扩大、五官下移，会让一个原本 24 岁的人看起来像是 16 岁，而相反的做法则会让此人看起来像是 31 岁。

1986 年，美国埃尔姆赫斯特学院的心理学家卡宁汉（M. R. Cunningham）等人别出心裁地选择真人照片，使用卡尺测量面部特征的精确尺寸，同样发现女性面孔的萝莉化程度跟她们对男性的吸引力成正比。接着，卡宁汉

跟他的合作者对这一发现进行了跨文化检验。他们发现，无论是非裔、欧裔、亚裔和拉美裔的美国人还是台湾地区的中国人，这些文化背景下的男性都认为萝莉脸的女性更有魅力。2004年，来自法国和匈牙利的研究者在各自的国家也发现了同样的结果。

男人为什么会被萝莉脸的女人吸引呢？简单地归因于文化差异似乎是行不通的，因为这一现象更像是不同文化下的普遍心理。目前来说，这一问题至少已经有了两个可能的答案。

[redacted]

无论是麦克阿瑟还是卡宁汉，都认为萝莉脸能够带来生存优势。婴儿化的萝莉脸能够激发人们的关怀本能，增加他人对自己的照顾和保护，减少来自他人的攻击和侵犯。这一观点得到了某些证据的支持。

加州大学洛杉矶分校的麦卡比（V. McCabe）在1984年发现了一个令人震惊的现象：跟3～6岁的正常儿童相比，同样年龄段被虐待的孩子通常都有一张比他们实际年龄看起来更成熟的“老脸”。麦卡比认为父母可能从孩子的外表上判断年龄，因而对面孔更老的孩子提出了更高的期望和要求。当他们不能达到这些要求时，就会遭到惩罚。

除了萝莉化特征缺失可能导致的恶果之外，卡宁汉发现萝莉化特征能够带来不少好处：男人更喜欢雇用萝莉脸的女性作为雇员，更愿意跟她们约会、做爱和一起抚养孩子。面孔萝莉不萝莉，对个体的影响似乎真是天壤之别。

除了生存优势的观点，有人认为男性青睐萝莉脸的女性是因为她们"很傻很天真"，在家里更顺从，男人因此更容易控制她们，更少被她们伤害。不过，这一假设似乎不怎么靠谱。贝瑞（D. S. Berry）和麦克阿瑟在1986年指出，最脆弱、最不具有威胁性的女性的确有着最萝莉化的面孔，这种面孔给人的印象是对方就像4岁左右的孩子。不过最性感的女性面孔通常具有中等程度的萝莉化，她们的外表年龄大概是23岁。这一发现至少说明，男人并不认为最顺从的女人最有吸引力。

亚利桑那州立大学的肯瑞克（D. T. Kenrick）等人则发现，对于12～18岁的青少年来说，他们理想中的女性伴侣要比自己大4岁左右。这也意味着，男性青睐的并不是年轻、容易控制的伴侣。

除此之外，来自民族志方面的研究也对萝莉脸的女性"很傻很天真"的观点提出了质疑。内华达大学的人类学家扬科威尔克（W. Jankowiak）在中国注意到一个有趣的现象，即男人喜欢年轻漂亮的女人，但同时也害怕陷入与漂亮女人的亲密关系中，因为这样的女人不是更顺从，而是更难控制。犹他大学的人类学家琼斯（D. Jones）在巴西也听到过类似的说法，即年长的男人跟年轻的女人在一起，常常面临被对方控制、剥削甚至"戴绿帽子"的危险。

因此，萝莉脸的女人被青睐，似乎不是因为她们"很傻很天真"。按照琼斯的理解，这也不是因为萝莉脸引发了他人的关怀本能。倘若男性是因为萝莉女的天真无助而父性大发，进而觉得她们有吸引力，那么女性基于同样理由也应该觉得正太很有吸引力才对，而这并不符合事实。因为很

多研究都发现，正太脸通常会降低男性的吸引力。男性青睐萝莉脸的女性，似乎成了一个难解的谜题。谜底，到底在哪里呢？

在批判了两个可能的答案之后，琼斯提出了自己的看法。他注意到萝莉脸的女性通常被认为比她们的同龄女性更年轻，而年轻不年轻与生育力有着密切的关系。早在20世纪60年代，法国历史学家路易·亨利（Louis Henry）就发现，对于不同的文化群体来说，年龄与生育力之间的关系是相对稳定的。以20～24岁时女性的生育力为标尺，30～34岁时生育力降为原来的85%，这一指标在40～44岁时进一步降到35%，在50～54岁以后不再具有实际意义。相比于男性，女性的生育力下降得更快。

鉴于年龄可以作为评价女性生育力的一个有效指标，琼斯认为萝莉脸可能是女性年轻和生育力强的一个外在信号。这些信号，包括大眼睛、小鼻子、厚嘴唇、小下巴等等，就像一块无声的广告牌一样，向男性传达女性年轻和富有生育力的信息。因此，男人对具有萝莉脸的女性表现出由衷的兴趣，被她们自然而然地吸引，有助于他们找到一个能生孩子的女人。而对女人来说，具有萝莉脸也有助于增强自己在择偶市场上的竞争力。

因此，琼斯假设萝莉脸的女性更有吸引力、更年轻。他收集了多个文化群体的审美偏好数据，发现无论是美国、巴西、俄罗斯的学生，还是巴拉圭和委内瑞拉的印第安人，男性的确更喜欢萝莉脸的女性，这种女性也比她们的实际年龄显得更年轻。此外，相比于普通女性，时尚杂志上的女模特通常都有一张明显的萝莉脸。琼斯还发现，增强或减弱面孔的萝莉化

程度，会相应地增加或减少女性的吸引力，不过这一效果只在原本长相较差的女性身上出现。这似乎意味着萝莉化程度不是越强越好——琼斯认为，长相中等以上的女性已经够萝莉化了，继续萝莉化并不能增加她们面孔的吸引力。

琼斯的假设也得到了其他研究者的支持。2006 年，来自伦敦大学学院的心理学家佛海姆（A. Furnham）和瑞夫斯（E. Reeves）也发现，具有萝莉脸的女性被男性认为更年轻、更健康、更有生育力。不过，这些研究只是间接地支持了琼斯的观点，萝莉脸的女性的确比普通女性显得更年轻，更讨男人喜欢，她们是否真的比普通女性有更强的生育力则是另外一回事，目前这一方面尚无实证资料。

不过，琼斯的观点显然有助于解释女性为什么不喜欢正太脸的男人。因为男性的生育力跟年龄的关系不是那么密切。此外，年长男性能够提供更多的社会资源，具有更高的社会地位，这些都是女性在选择长期伴侣的时候更看重的因素。而年轻男性则相对欠缺这些条件，如果再加上一张正太脸，恐怕只能恶化他们的处境罢了。

萝莉脸增加了女性的吸引力，即使背后的深层原因尚未完全探明，但这一特征很有可能跟男性对女性年龄和生育力的判断有关。不过，早在这一领域的研究展开之前，世界各地的人们似乎就已经懂得利用化妆品来增加女性面孔的吸引力。无论是戴“美瞳”使眼睛看起来更大，还是抹口红让嘴唇变得更丰满，也许都在有意无意地塑造一张更萝莉的女性脸，以便紧紧抓住男性的目光和他们的心。

男人为什么喜欢小脚女人？

中国古代有女人缠足的习俗，这一习俗的原因是什么？有人以为和“楚王好细腰，宫中多饿死”相似，跟官府提倡有关；有人以为跟男人阴谋控制女人的自由有关，把女人的脚缠起来她们就不容易随意走动；还有人以为跟审美有关，因为小脚女人站立不稳，走起路来婀娜多姿，因而满足了男人的视觉享受。众说纷纭，莫衷一是。

不过，可以肯定的是，中国古代男人具备喜欢小脚女人的心理，然后才有文化习俗对这一心理的某种过度满足，通过缠足来制造人为的小脚。那么，男人是否本来就有喜欢小脚女人的心理？如果有，背后隐藏的原因又是什么呢？

女人的脚的确更小，不只是在绝对尺寸上，在相对尺寸上也是如此。2005 年，加州大学洛杉矶分校的人类学家费斯勒（D. T. Fessler）、哈雷（K. J. Harley）以及拉尔（R. D. Lal）对不同群体中男女两性脚的尺寸资

料进行了分析，发现在任何一个群体中女性的脚都相对较小。

比如，在240名美国学生中，女性脚长占身高的13.9%，男性则为15.4%。在784名美国士兵中，女性脚长占身高的13.1%，男性则为15.4%。两年以后，费斯勒跟维也纳大学和圣玛丽大学的研究者们合作，分别在奥地利和加拿大招募了150名各个年龄阶段的被试者，验证了他们2005年的研究结果：控制了身高因素之后，女性的脚依然明显小于男性，越年轻、越苗条的女性脚越小。

早在1993年，南加州大学矫正外科系的弗雷（C. Frey）等人就发现，大多数美国女性都经常穿小鞋，哪怕这样会带来脚部疼痛。如果了解男人喜欢小脚女人的心理，恐怕就不难理解这一现象了，女人不过是迎合了男人的口味而已。问题是，男人真的喜欢小脚女人吗？事实可能的确如此。

2005年，上文中提到的人类学家费斯勒率领他的一帮朋友进行了一场跨文化研究。他们对伊朗、印度、坦桑尼亚、立陶宛、巴西、俄罗斯、美国、巴布亚新几内亚以及柬埔寨的男女进行测验，要求他们在两张图画的各5张男女画像序列中选出自己最喜欢和最不喜欢的一个，同一性别的画像除了脚部尺寸有区别之外，其他部分都保持一致。中间人物的脚长取该性别的平均值，两边的人物脚长分别以6%的长度递增或递减，不过图画上不能看出同一列5个人物的明显区别。

结果发现，脚最小的女性最被人喜欢，脚最大的女性则最不被人喜欢；而对男性来说，最大和最小的脚都不被喜欢，拥有平均脚的男性最受欢迎。

不过，该研究的缺陷是不同国家参加测试的人数差别很大，坦桑尼亚只有29人，而美国则有150人。因此，后续研究有必要改进这一缺陷。

2012年，费斯勒带着他的跨国合作者在《演化与人类行为》发表的一篇文章中指出，对包括中国在内的9个国家的1 300名被试者的调查表明，小脚女性更受欢迎。选择“最喜欢小脚女人”的人数比例是59%，选择“最不喜欢大脚女人”的比例是62.6%，两者都明显高于随机选择的概率40%。

有趣的是，费斯勒等人在随后的研究中发现，有的男性更容易看出女性脚部尺寸的变化，这些男性对小脚女人更偏爱，其中多达75%的人都认为小脚女人最有魅力。但没有意识到这种区别的男性则首选平均脚的女性，然后才是小脚女性。除了采用手绘或者电脑制作的男女画像之外，费斯勒等人扫描男女真人的脚，制作成类似的序列，要求人们推测最有魅力和最没魅力的异性，无论是南非还是美国大学生都觉得小脚女人更有吸引力。

[illegible]

世界各地的男人似乎都喜欢小脚女人，如何理解这一现象呢？费斯勒等人认为，女性的小脚可能是性选择（sexual selection）的结果，跟男性的审美偏好有关，而跟自然选择（natural selection）无关。

因为按照自然选择的逻辑，女性应该具有较大的脚才更合理。女性怀孕之后身体前部体重增加，提高了身体的重心，向前跌倒的可能性因此剧增。大脚无疑可以站得更稳，这对孕期女性的安全尤其重要。此外，孕期松弛肽（relaxin）全身循环会导致韧带松弛，降低了脚的运动能力，因而

也需要更大的脚才能具有与平时同等的运动步幅。而实际上，女性普遍拥有相对她们的身高来说更小的脚，这与自然选择的预期完全相反，但可以用性选择的理论解释。

性选择理论认为，某一性别的某种特征是由异性的审美偏好决定的。举例来说，雄孔雀具有硕大美丽的尾巴，这是雌孔雀"选择"的结果：具有美丽尾巴的雄性更受青睐，因而可以留下更多后代。爱江山更爱美人，虽然大尾巴带有种种不便，甚至可能让雄孔雀成为天敌口中的猎物，但具有这种"广告牌"的雄孔雀更可能成功地完成传宗接代的"宏图大业"，因而这一不可思议的特征就保留了下来。

在女性小脚的案例中，男性扮演了雌孔雀的角色。他们喜欢小脚女人，因此小脚女人繁衍的成功率更高，而小脚女人留下的女性后代也通常是小脚。经过几百万年的传递，就使得现在的女性拥有了相对身高来说更小的脚。

男人喜欢小脚女人，可能是因为小脚跟她们年轻和未曾生育有关。从绝对大小来看，孩子的脚要小于成人的脚，因此由单纯的小脚的确可以自然而然地联想到年轻。另外，脚的大小随年龄增加而增加，而且已婚女性的脚通常要大于未婚女性，这些也都意味着小脚确有可能作为表示年轻和未曾生育的有效指标。

虽然很多灵长类雄性不喜欢年轻的雌性，不过人类似乎有"老牛吃嫩草"的癖好，选择年轻女性作为伴侣。对男性来说至少有两样好处：第一，拥有更长的女性生育期意味着他可能借此留下更多的后代。第二，减少女性之前怀孕带来的后果或者养育别人的孩子需要付出的代价。

自然选择的力量总有显现的时候，大脚女人可能在某些情况下更受欢迎。费斯勒意识到，自己带着朋友们做了那么多跨国研究，收集的通常是世界各地都市女性的数据。因此，他们后来又收集了苏门答腊岛上卡罗巴塔克人（Karo Batak）的数据。这个民族无论男女都要参加体力劳动，经常要徒步走很远的路。

结果发现，卡罗巴塔克人虽然也认为小脚的女人更年轻，不过他们更喜欢大脚女人。可能是因为大脚女人更强壮、更能劳动，这些都有助于增加家庭的经济收入。这一结果跟通常的研究不同，费斯勒认为也许是卡罗巴塔克人把“喜欢”跟“择偶标准”联系起来，审美需要让位于生活需要。

在早期的狩猎采集时代，女人的脚力和体力自然也影响她们的繁衍，不过农业社会的来临无疑大大强化了这一因素的重要性。因此，在女性的脚力和体力对维持生存非常重要的地区，男性喜欢小脚女人的心理偏好就会逆转。这一点在李凤飞和暴鸿昌对中国女性缠足史的考察中得到了支持。他们发现边疆地区的汉族和少数民族女性都不缠足，这可能跟边疆地区生计艰苦、需要女性参与体力劳动有关。南方各省不缠足的女性或农人之女，或樵子之妇，或船夫之妻，也都是劳动妇女。

费斯勒承认：“即使现在，审美偏好跟脚的相对尺寸上的性别二态性（sexual dimorphism）之间的准确关系，依然是一个开放的问题。”不过，鉴于都市男性的确存在对小脚女性的特别偏爱，这一审美心理的社会效应有必要引起女性自身的警觉，她们必须在无意识地取悦男人和有意识地保护自己之间求得平衡。

在异性眼前，男人更爱当好人？

冷月如霜

俗话说："电脑修得好，好人当到老。"即便知道自己有被"发卡"的可能，为什么一茬又一茬的好人依旧乐此不疲地给女生修电脑呢？用现在学界支持的观点来说，由于女性自身可生育的时间较男性来得短，抚养后代的代价也比男性来得高，因此女性在挑选自己伴侣的时候是慎之又慎。为了获取女性的芳心，男性自然需要拼命展现自己关爱他人的一面（包括但不仅限于修电脑）。比如，1970 年的一项研究就指出，在女性朋友的陪同下，男性会施舍给乞丐更多的钱。

这种男性之间为了争夺伴侣而表现出的竞争关系能否用来增加他们在公益事业上的贡献呢？2012 年发表在《英国心理学杂志》（*British Journal of Psychology*）上的一篇论文测试了这个想法。在实验中，研究者总共召集了 130 名学生（平均年龄为 21 岁，男女各半）作为实验对象。在实验中，研究人员发给每名学生 3 英镑（约合 30 元人民币），并告诉

他们可以把任意数量的钱留着自己用，并把剩下的钱存进一个公共账户（都在计算机上单独操作）。在所有人分配完手头的钱后，研究人员会统计公共账户的总数额，然后将这个数字翻番，再平均分给随机抽出的少数幸运者。

在部分学生操作计算机选择分配数额的时候，他的旁边 1 米处会站立一名观察员，有时是男性，有时是女性。但这些学生不知道，这些观察员其实是精挑细选出来的最为美貌的志愿者：10 名男性和 10 名女性的外观由另外一些志愿者打分（为了不影响实验结果，这些打分的志愿者不参与最终的实验），而分数最高的 2 名才能上岗——这也是为了让异性可能产生的效应达到最大。

实验的结果完美地符合研究者的预期。对男性学生而言，在由帅哥作为观察员或者没有观察员的情况下，他们往公共账户里打的钱数相差无几，而在由美女作为观察员时，男生往公共账户里打的钱数则明显上升。相比之下，女生则没有出现这种情况，无论是帅哥还是美女，都激不起她们的兴趣。由于参与的总人数众多，往公共账户里打的钱越多，单个人可能拿到的钱就越少，而这个人也就更加“利他”。

研究人员又设计了第二个实验来重复验证他们的理论。在这次实验中，他们选取了 60 名男生（平均年龄为 21 岁）作为实验对象，并将每 3 人分成 1 组。这些男生需要决定将手头的 1 英镑如何分配到私人账户和公共账户中去。与第一个实验不同，这一次，钱的分配需要连续重复 5 次。在

每一次的间隔中，被试者可以得知其他组员的分配数额。与第一次实验类似的是，一些小组被分配了一名美女或帅哥观察员，唯一的不同在于，观察员在电脑上而不是在被试者身边进行观察。为了强化“实验有观察员”这个印象，这些参与实验的学生可以在电脑上看到观察员的照片。

最终的结果又正中研究人员的下怀：当这些男学生意识到有一名女性观察员正在观察他们对于资金的分配时，5 轮往公共账户里打入的金额呈上升趋势。而在有男性观察员或者无观察员存在的情况下，往公共账户里汇入的金额则一落千丈。研究人员认为，这表明男性在女性面前更喜欢通过和其他男性竞争的方式来表现自己、打动对方。

让我们再回到修电脑这个话题。男生在修电脑时，或许也已经把“修得又快又好”当作向女生表现自己的资本了吧。这里还要告诉大家一个好消息，也有研究表明，善良和乐于助人的确会给男生加分，所以好好利用修电脑的机会和女生搞好关系吧，少年！即便最终不幸被女生“发卡”，当你回忆起那段修电脑的经历时，不是还可以摆出“我爱你，与你何干”的那份酷劲儿吗？

男人真的只喜欢瘦姑娘?

冬天好热啊

到底什么样身材的女性才符合男性的期望?答案也许是"看起来不胖，但摸起来肉肉的"！调查发现，大多数男性并不认为瘦身板儿的女性更有吸引力，他们喜欢稍微有点儿肉（身体脂肪含量约为30%）、凹凸有致的女性——脂肪在腰部分布较少，臀部和大腿较多（最好还有天然大胸，呈沙漏形）。这意味着这些女性具有较高的身体质量指数（即BMI，全称为Body Mass Index，体重除以身高的平方，单位为kg/m^2），和较小的腰臀比，这两个特点到底传递了怎样的信息呢?

作为将女性定位为终身伴侣和孩儿他妈的男性，他们在传宗接代这件事上自然操心更多，希望自己的基因能顺利地传递下去，能繁育出健康的后代。无可厚非，这些是演化的结果。人类长期的发展历程告诉男性，拥有稍高的BMI值和较小腰臀比的S型女性（拍照时硬拧成S形的不算哦）能生出更健康的后代。

怀孕、分娩和养育小孩是非常消耗能量的工作。脂肪作为高效的储能物质，当然最为重要。但相比于其他雌性哺乳动物，人类女性身体的脂肪含量却要高出许多，为什么呢？

进一步研究发现，这和人类的脑容量有关——与同身形大小的哺乳动物相比，人类有着大得多的脑容量。由于脂肪是构成人类大脑的主要物质，这就要求女性必须有足量的脂肪预算，用以构建下一代的大脑。因此，多出来的身体脂肪和更大的脑容量并不仅仅是一个巧合。

在人类身体所含的脂肪类物质中，一种叫作 DHA 的不饱和脂肪酸是构成大脑皮层的重要物质，对婴幼儿的智力发育十分重要。但人体自身并不能合成 DHA，只能从食物中摄取。女性将它们储存在臀部和大腿上，以便怀孕时供给婴儿的大脑。而大脑发育对后代的重要性不言而喻，这也解释了为什么演化中男性更偏好 BMI 值偏高、腰臀比较小的 S 型女性。

[illegible]

演化使大部分男性对女性体型有共同的偏好，但是这样的偏好并不是一成不变的，它受到诸多因素的影响。

根据卡罗来纳海岸大学（Coastal Carolina University）的心理学家佩蒂约翰（Terry F. Pettijohn, II）等人的研究，男性对女性体型的偏好会随社会经济环境的变化而发生改变。他们对比 1960—2000 年间《花花公子》年度兔女郎体型与当时的社会经济情况发现，社会经济环境越差，年度兔女郎的腰围、身高、体重和 BMI 值也越大，同时腰

臀比也越大。这正符合佩蒂约翰提出的环境安全假说（Environmental Security Hypothesis）：在困难时期，男性更偏好善于劳动生产的、成熟、高大、强壮、身体脂肪含量较低，且曲线感不那么明显的女性。

不难理解，当生存环境严峻时，下一代是否健康似乎已变得不那么重要。人们首先考虑的是能否生存，能否获得足够的物质资源保证生产活动，并且也只求有后代，而不把重点放在后代的质量上。

[redacted]

除此之外，工业化程度也会影响男性对女性的体型偏好（实际上也影响女性对自己体型的偏好）。威斯敏斯特大学的心理学家斯瓦米（Viren Swami）等人以来自工业化程度不同地区的马来西亚人为调查对象，比较了受男性偏好的女性体型，结果发现：在工业化程度偏低的乡村，男性们更喜欢BMI值稍高的女性，丰满的身材被认为是生育能力和财富的象征。

一方面，伴随着社会的工业化进程，各文化之间的差距不断缩小，大众传媒所宣传的纤细的理想形象得到迅速传播；另一方面，肥胖人群增多，肥胖带来的种种不便和疾病也让人们对肥胖的恐惧愈发强烈。简而言之，很可能是媒体对纤细形象的强调，和大众对肥胖的不良印象，使工业化社会中的男性们更偏好BMI值稍低的女性（或者说更苗条的女性）。

但与佩蒂约翰不同的是，斯瓦米认为只有BMI才能影响人们对女性体型的偏好，腰臀比不过是用来判断性别以及怀孕与否而已。

当然，种族也是一个不得不提的因素。不同的种族有着特定的生存环

境，在漫长的发展过程中，为了平衡生存环境和自身发展之间的关系，他们会慢慢找到有利于自己种族生存、延续的最佳 BMI 值范围。

总之，这里要告诉姑娘们的是，控制体重、保持健康固然重要，但在合理的范围内即可，绝对不要为了让自己变成“排骨妞”使劲作践自己。

女人只喜欢肌肉男？

冬天好热啊

当看着镜中清瘦的自己，感叹“瘦是瘦，缺肌肉”时，当无奈于肌在腹肌上的那圈脂肪，高喊“我要 strong，不要虚胖”时，男人，你们心里是否也曾碎碎念：姑娘们哪，我到底要练出咋样的身材，才能让你们多看俺两眼，才能换来你们的回眸一笑？这等事关繁殖大业的事情自然逃不过科学家们的眼睛。

来自纽卡斯尔大学心理学系的研究人员迈西（D. S. Maisey）找来30名女大学生（平均年龄为20.6岁），让她们对50名男性的照片进行吸引力排序（这些照片中的男性都被遮去了面部，以排除长相带来的干扰）。之后研究者考查了男性的腰胸比（WCR）、腰臀比（WHR）和身体质量指数（BMI）对其身形吸引力排名的影响。

结果发现，与男性将BMI与腰臀比作为判断女性吸引力的主要因素不同，女性在判断男性吸引力时，腰胸比变成了主要因素——在实验所考

查的数据范围中，腰胸比越小的男性吸引力排名越高。这意味着，女性们喜欢细腰扎背的“倒三角形”身材。BMI作为次要因素，也影响着女性对男性身形吸引力的判断。可腰臀比呢？好吧，基本不在考虑之列。

来自香港理工大学的研究人员发现，与女性稍有不同，在判断一位男性的身形是否具有吸引力时，男性虽依然会以腰胸比作为第一考查因素，但以腰臀比作为次要考查因素。

睾酮是男性体内主要的性激素，男性身体肌肉的发达程度以及脂肪分布等都与它有着密切的关联——它使男性的上身和肱二头肌更加发达。在体型上的表现便是：睾酮含量高的人，看起来可能会更加健硕且精力旺盛。同时，对不良环境的适应能力更强，也更能抵御疾病所带来的威胁（参见第188页）。

如此看来，女性偏爱倒三角形的身材便具有了演化学意义。拥有这样身材的男性，不仅能给女性提供更多的物质资源和安全保障（跟着他们有肉吃），也携带更优良的基因，使生出的下一代更健康！基于这样的观点，有研究称：当女性与一个自己认为有吸引力的男性“XXOO”时，会享受到更多的高潮（有学说认为，高潮的目的之一就是为了留住精子）。

根据女性杂志《花花女郎》（*Playgirl*）的调查，在1973—1997的

这25年间，杂志插页中的男性身形越来越壮实。这是不是说明，越有肌肉的男性就越讨女人喜欢？其实也不尽然，因为，女性对男性身形的偏好也受社会、经济发达程度的影响。同样来自纽卡斯尔大学心理学系的马丁·沃非（Martin J. Tovée）分别选择英国和马来西亚首都吉隆坡以及马来西亚第二大州沙巴州三个地区，作为不同社会、经济发达程度的样本（其发达程度依次递减），以考察社会、经济发达程度是否影响女性对男性的吸引力的判断。

结果是，社会、经济的发达程度是会影响女性对男性的身材偏好的。在判断一名男性是否具有吸引力时，沙巴州的女性们最关注的是体重，倾向于丰满的体型和水桶身材（腰胸比高于1.0或接近1.0，也就是说上下一般粗）。在她们眼中，体重是经济实力和威望的象征。而英国和吉隆坡的女性更加注重男性体型，喜欢具有线条感且上身呈倒三角形的苗条男性。这可能是因为，在社会、经济、文化较发达的地区，女性和男性在社会地位和分工上差异不大，因此，身形、体能等就变成了强调男子气概的重要因素。并且，在她们眼里，肥胖也是不健康的标志。

就像妹子们认为男人只喜欢瘦姑娘一样，汉子们会不会也认为女性对肌肉男有执着的迷恋呢？

加利福尼亚大学心理学系的大卫·弗里德里克（David A. Frederick）称，在对“什么样的男性身材更加吸引女性注意”这个问题的认识上，男女之间确实存在着一些差异。这主要是媒体和杂志针对性宣传的结果，照

片是读者对身材期待的更加理想化状态——男性杂志中男性的体型更健硕（女性杂志中女性的体型更加纤瘦），这使得购买这些杂志的男性们相信，杂志里男模特那样的身材才是令女孩们神魂颠倒的。可如果去翻翻女性杂志，看看那里面男模特的身形，他们也许就会长舒一口气——呼，原来女孩对咱的要求也不是那么高嘛！

演化武器助女性对付强奸

非言语

女性如何对付强奸？这里讨论的不是各种具体的“防狼术”，而是女性是否具有自然选择配备的演化机制，让她们从心理到身体到行为都能更好地对抗潜伏在暗处的色狼们。

密歇根大学的人类学家司马茨（B. B. Smuts）认为，女性喜欢跟同性或异性结伴，是因为她们害怕被人强奸。本着“人多力量大”的原则，结伴行为有助于降低被强奸的风险。心理学家威尔逊（M. Wilson）和生态学家麦斯尼克（S. L. Mesnick）提出一个假设：女人喜欢身体强壮或者性格强势的男人，其实是想找一个可靠的保镖，以便自己在遇到色狼的时候，对方能够英雄救美、施以援手。科学家调查了 12 000 多名加拿大女性，控制了年龄因素之后，发现在 65 岁之前的各个年龄阶段内，已婚女性遭受性骚扰和强奸的概率都要低于未婚女性。有一个男人待在身边，看来有助于降低女人被强奸的风险。

不过，跟人结伴有安全方面的考虑，但未必一定是针对可能会骚扰和强奸自己的色狼，因为选择身体强势的男人也有可能是因为对方有好基因。至少在理论上，这些假设并不能说明女人这么做纯粹是为了对抗强奸，虽然这些做法确实有助于降低她们被强奸的风险。

除了从安全层面理解结伴行为，其他的研究者还试图从女性身体和心理两个方面探讨女性用来对付强奸的自救装置。

[redacted]

怀孕女性中有一种常见的并发症叫作子痫前期（先兆子痫），表现为高血压和蛋白尿，常常导致胎儿发育受损。在所有哺乳动物中，这是人类女性特有的一种表现，令人非常费解。2006 年，纽约州立大学奥尔巴尼分校的心理学家戴维斯（J. A. Davis）和盖洛普（G. G. Gallup Jr.）对此提出了一个有趣的假设：常发生在怀孕女性身上的子痫前期可能是一种对抗陌生精子的演化策略。

因为在演化环境中，女性错误怀孕的代价非常之高，由于哺乳，她可能要有 3 ～ 4 年的时间无法排卵（现代女性的哺乳时间缩短为 2 ～ 3 年，在非母乳喂养的情况下这一时间还会缩短），因而无法达到传播基因的目的。当孩子的父亲不愿投资或不能投资的时候，她和孩子都将处于异常危险的境地。尤其是在被强奸之后，她的处境更加凄惨。

因此，女性必须通过自己的身体来识别可靠的伴侣或者不靠谱的坏蛋。而子痫前期可能就是这样一种针对陌生精子的识别和抗拒手段。熟悉的精子——说白了就是跟她有更长时间相处和交往的男人的精子——代表对方

跟她白头到老的长期承诺；而不熟悉的精子——包括强奸犯的精子——则像过把瘾就走的花花公子，如同毒药一样会害死自己。于是，女性的身体悄悄地帮她做出决定，在她的阴道遭遇陌生的精子入侵之后进行“壮士断腕”的选择，以短痛的方式结束未来可能的长痛。

单单提出假设还不够，戴维斯和盖洛普搜集了一系列证据来证明陌生精子更可能导致子痫前期。

接受人工授精的女性相比普通女性更容易发生子痫前期，但假如所授精子来自丈夫，则子痫前期的危险与普通授精方式无异。

在女性阴道内停留时间较长的精子会更容易导致怀孕，因为它是一颗更熟悉的精子。相比于不采取避孕措施的交媾，采取避孕措施会导致精子的熟悉程度下降，进而导致子痫前期的发病率高达两倍。

使女性身体对精子熟悉起来的性接触（比如口交）会降低子痫前期的发生率。莱顿大学医学中心的免疫血液学家柯尔曼（C. A. Koelman）等人发现，在报告子痫前期的荷兰女性中，44% 有口交经历；而在没有子痫前期的女性中，这一行为高达 82%。而且，在有过子痫前期的女性中吞精者占 17%；而没有这一症状的女性中，吞精者占 48%。研究者认为，这和精液中的可溶性 HLA（人类白细胞抗原，是免疫系统区分自身和异物的基础）有关。

同居时间和伴侣数量也都影响子痫前期的发生率。怀孕之前跟孩子父亲有更长同居时间的女性，发生子痫前期的概率更低。另外一项对 5 800 位已婚女性的调查则指出，换了丈夫的女性患上子痫前期的概率要比未换丈夫的女性高 29%。

戴维斯和盖洛普认为，除了子痫前期之外，女性用来对抗不当怀孕风

险的策略可能还包括自发性流产、产后抑郁症以及杀婴。相比于子痫前期，这些策略的证据还有待进一步的收集。如果子痫前期真的是针对陌生精子的一种防御反应，那么这一现象当然也就有了反抗强奸的积极意义。当然，这种身体防御的假设只是一种看起来能自圆其说的观点，这一结论是否能经得起更多直接证据的检验尚不清楚。

女性的生理防御更多的只是善后，对付强奸更好的办法是预防。演化心理学家认为，女性具有针对强奸风险的多种心理防御机制，这些机制在适当的情况下被激活，从而有助于降低她们成为强奸受害者的概率。有趣的是，这些机制通常跟女性的排卵期有关。因为假如女性在这一时期被强奸，她们受孕的机会是很大的，这会带来更大的伤害。

既然排卵期的女性会承受被强奸带来的巨大代价，那么这一时期，她们评估男人强奸意图的能力就应该特别敏感。她们必须非常警觉地看出哪些男人可能用暴力胁迫自己。即使她们的判断可能出错，至少也比迟钝、不明是非要好，如果因为低估男人的强奸意图而“中招”，代价实在太大了。

2007 年，新墨西哥大学研究演化心理学的嘉沃－阿帕格（C. E. Garver-Apgar）等人招募了一批月经周期正常的女性，要求她们观看两个男士争抢着邀请女士跟自己约会的录像，接着要她们评价对方的人格特点，也包括是不是可能在约会中强暴自己。结果发现，排卵期的女性的确更容易高估男性的强奸意图，从而支持了女性这一时期对强奸风险更敏感的结论。

在演化环境中，相比于本群体男性，外群体男性对女性来说是一个实在的威胁。因为他们不受本群体规范的约束，有更强的流动性和匿名性，骚扰或强奸女性之后更容易逃窜和隐匿。于是，排卵期的女性有理由对外群体男性有更高的警惕性，认为他们更可怕、更危险，这种想法会减少女性被这类危险分子强奸的可能。2009 年，密歇根州立大学的纳瓦雷特（C. D. Navarrete）等人发现，越接近排卵期的白人女性对黑人男性的偏见和恐惧就越严重，这一现象在那些强奸敏感性更高的女性（根据实验操作中测量的一个变量确定，并不特指某一人群）身上体现更明显。

20 世纪七八十年代，美国心理学家摩根（Marcia K. Morgan）等人发现了一个耐人寻味的现象：他们在调查强奸受害者的情况时，发现绝大多数的女性都不是在自己最容易怀孕的排卵期被强奸的。这是否意味着排卵期的女性会有意无意地减少自己的冒险行为呢？来自美国和德国的研究都表明，排卵期的女性的确更少做出冒险行为。比如，她们在那个特殊时期极少一个人行走夜路，或喝醉了之后跟人外出。

排卵期女性可以通过减少冒险行为来自我保护，可要是真的碰到了强奸犯，她们还有办法对付吗？尽管女性在强奸中处于弱势，但排卵期的女性似乎还是有办法超水平发挥抵抗一阵子的，因为她们的手劲会突然增强。

2002 年，盖洛普和他的学生发现，排卵期的女性在阅读带有强暴危险的故事时抓握力会增强，这种现象在她们阅读没有强暴危险的故事时不会出现。而在其他阶段，即使阅读同样的带有强暴危险的故事，她们的抓握力都不会有这种明显的变化。尽管手劲增强未必真的能阻止强奸者，但毕竟聊胜于无。

也许除了死亡，被人强奸对女人来说是最可怕的经历。这一梦魇般的威胁在人类社会中持续地反复出现，也相应地塑造了女性防御强奸的内在机制。这些机制让女性能够通过自己的身体、心理和行为来对抗强奸这种古老而可怕的危险。

阳具崇拜是怎么回事?

冬天好热啊

每年4月的第一个星期日，日本川崎都会举行一个特别的庙会——铁男根庙会。在此期间，人们会抬着一个巨大的粉红色男根穿越闹市。在庙会中，男根这一形象可谓体现在方方面面：男根糖果、男根蔬菜雕花、男根冰棒，呃……总之，各种物品都以该形象出位。这在我们看来虽然有点"红果果"，但庙会依然呈现出一派节日的祥和气氛。人们或兴高采烈，或新鲜好奇，并没有因为这些无处不在的仿男根物品而面露羞涩。像这样的阳具崇拜活动并不只是日本的专属（不过日本文化确实将它体现得尤其到位），它在人类的发展史上具有相当的普遍性，崇拜方式也有诸多相似（比如古希腊的狄俄尼索斯节、古罗马的维纳斯节）。

阳具崇拜是生殖器崇拜之一，除此之外还有女性生殖器崇拜，不过说到底都是对大自然创造力和生殖力量的敬畏——在生产力极不发达的原始社会，后代的数量与族群的繁荣息息相关，生命的诞生不论放在哪个时期

都是件神圣的事。不过最初，原始社会中的男同胞们并没有认识到这“功勋章”里有女性的一半，也有他们的一半。他们看到的只是孩子从母亲身体里出来，所以最初的生殖崇拜表现为女性生殖器崇拜。

但是渐渐地，男性们发现如果他们不和女性“XXOO”，就没有“成品”从女性腹中生出来（何止成品，现在看来连原材料都没有）。于是，他们认为自己提供了生命的“种子”，对新生命的产生具有绝对高于女性的功劳，而女性的肚子只是一个暂时居所，“种子”不过是在其中长大到一定程度后再换个地儿自己生存罢了。按照这样的想法，男性是生殖的主动方，女性只是个被动角色。于是慢慢地，男性生殖器成为权威和力量的象征，女性生殖器崇拜也被男根崇拜替代。

再者，从原始社会中女性对男性审美的角度出发，性征是个重要的判断标准，女性总期望通过对刚强外表的挑选，找到一个性能力强、能产生优良后代，并健壮到足以保护她们的男性。而男性为了使自己的血脉生生不息，不得不想方设法迎合女性的胃口——凸显自己的第一性征，其做法常常就是对自己的阴茎进行各种装饰。

然而，在那个草昧未辟的年代，巫术是贯穿生活始终的，装饰阴茎的同时也表示对阴茎生理功能的捍卫，驱逐潜在的威胁力量。这两点相互交织、掺杂，便给男根笼罩上了宗教的神秘色彩——男根神圣不可侵犯。如此，男根就进一步成为生殖力量的象征。

当然，说到阳具崇拜，弗洛伊德老师也得插句话。他认为这个事情还

得从娃娃说起。当孩子处于幼年期时，两性的存在并不会让他们感到困惑，在他们眼中，无论男女都具有和自己一样的生殖器官。可当孩子们逐渐长大，他们纠结了——怎么不一样啊？男孩们在心理上抵抗这种差异的存在，以各种物体来代替他们认为女孩所失去的阳具。女孩们倒是很快能接受这个现实，但同时会羡慕男孩们拥有这么一个“小弟弟”。不过，这种理论也常遭人诟病。比如，有的学者认为女孩羡慕男性是因为很多文化常常会强化男人的优越，女孩所羡慕的其实是男人的社会地位而非阴茎本身。

直到现在，尽管已经没有男人会去没事秀自己的阴茎了，不过有相当多的男性还是很在乎自己阳具的尺寸，这可能也是传统的一种不自觉延续吧。

如果一个人曾经捐过血、捐过骨髓，人们会觉得他很高尚、很了不起。但如果一个人说他捐过精子，人们就会讪笑，会挤眉弄眼地围观他："里面啥样？有小护士帮你弄吗？"

这让人情何以堪哪！

在写作本文的过程中，我深刻地体会到：捐精是需要勇气的！把捐精的经历讲出来，同样是需要勇气的！

2008年夏天，我独自在上海的一个小研究所里打着一份小工，我的一个高中女同学正在仁济医院实习。我跟她说"那以后我看病就去找你"，她说"好啊，我在产科"……

有一回我又找她聊天，不知道怎么就聊到捐精子这事儿上了。她说，上海人类精子库就在他们医院，现在十分缺货，恨不能到大街上拉人去。像我这样条件的（她上下打量我一眼）他们绝对抢着要，而且还有几千块的报酬。我一听有这么多钱，也顾不上被她"调戏"了，赶紧问她具体怎么捐法，她让我上网查查看。

我回家后上仁济的人类精子库网站一查，果然在招募捐献者，在线就能报名。细看了一下流程，发现和想象中不太一样——原来捐精子不是一锤子买卖。

要捐精子，首先要体检，体检合格以后才能捐。由于捐献量必须达到15毫升，而一般人每次射精量只有2～6毫升，所以差不多要去捐个四五次才能完成指标。每两次捐献需间隔5～7天，在此期间的精子也不能"浪费"，都得攒着。所以整个生产指标要一个多月才能完成。这可以理解，奶牛产奶也是需要时间的嘛。间隔太短了影响质量，男同学都懂的。捐献完成后，等待半年还要再体检一次，这次是艾滋病病毒（HIV）检测，因为艾滋病病毒自感染之后，可能需要经过数月的潜伏期才可以被检测到。

而报酬是按次领取的。第一次体检领取50元，之后每次捐献可以领取200元，全部完成后还有1 000元的奖励——根据情况，奖励的数额可能还会更高——总计下来在3 500元左右。对刚工作不久的我来说，算是一笔很可观的零花钱。

我填了一个申请表，不久就接到电话了，大致问了问学历、工作等基本情况。感觉电话那边对我很满意，特别是听到我学历是硕士、在中科院工作以后，更加表现出很欢迎的态度。我上学以后一直被叫作理科宅男，"男朋友"这个头衔都没戴过一天，突然被鉴定为当父亲的好人选，不由得扬扬自得。

后来我那个同学说我自作多情，说只要年龄合适、没有遗传病过敏史、学历在中专以上、符合健康指标的捐献者都会被接受，精子库才不挑三拣四。

我颇不甘心地反驳她："至少将来某位女士需要挑选精子的时候，拿

着好多份资料一翻，我这种条件的绝对脱颖而出。”她说那更不可能，因为精子的使用原则是“三盲”（捐献者和使用者之间、捐献者和负责使用者的医生之间、捐献者和他的后代之间互相都不认识），所以，需要使用精子的人是看不到精子提供者的任何资料的（包括学历、身高、帅不帅等等）。换句话说，根本没得挑。

我就郁闷了。一开始是谁说我这样条件的会被抢着要来着？我突然有一种上了贼船的感觉。我同学则一个劲儿地偷笑。

到了预约的体检时间，我义无反顾地去了。第一次去这种神秘的地方，心里充满了紧张和期待。我平时和不认识的女生说话都会脸红，一会儿如果见到年轻貌美的小护士，还要和她聊“上一次是什么时候”这种“真心话大冒险”才会问的问题，我我我……人家会害羞啦！

事实证明是我想多了。精子库在仁济医院一个特别破旧的楼上，从头到尾我都没有看到一个年轻貌美的小护士，只有一位中年男大夫拿了一些表格来让我填（你们把小护士藏在哪里了！），顺便问了一些问题，比如“上次射精是什么时候”之类，我都老老实实地回答了（我为什么要和一个中年男人聊这些啊！）。表格主要是询问一些基本资料（比如籍贯、出生地）和既往病史，遗传病、过敏史的部分问得比较详细。

填完表格，我被抽了管血，用来做肝功能和乙肝检测，接下来就进入正题——取精！第一次不是捐献，只是为了检查精子的质量，包括精液外观、pH 值、精子数量及活力等指标。

必须要说的是，网上流传的那些所谓“美女护士帮你取精”的图片纯粹是假的！整个过程都是自己动手，相当于在一个陌生的地方进行一次自慰（别告诉我你没干过这事儿）。

我拿着一个带盖子的小塑料杯（跟杯装可爱多差不多大），沿着走廊往里，拐了个弯，来到尽头处的一扇小门前面。那门特别不起眼，要不是上面写着“取精室”，准被以为是厕所。

推门进去，原来这就是传说中的取精室啊，里里外外透着俩字——寒酸。一个不足 5 平方米的小房间，里面一把椅子、一个洗手池、一个废纸篓，仅此而已。墙上挂着两幅画，让人很是无语：两个三点不露的姑娘摆着很不专业的 pose，穿的内衣一看就是地摊货，感觉像是从 20 世纪 80 年代的电影杂志上扒下来的照片。为什么三点不露呢？我很不解。这里怎么说也是医学场所，有裸体照片怕什么呀？中医科墙上挂的人体穴位图都比这个带感。

突然灵光乍现，自创了一个笑话：女施主打扰了，贫僧是东土大唐来的取精人……

抬头近看，我去！“女施主”身上的一些地方，塑料泡沫画板都发皱起泡了，一看就是长期磨损所致。你们这些人有没有公德心啊！

大夫还在外面等着样品，我也没拖时间。快速解决后，洗洗手就出来了。在检验窗口，一个男大夫戴着手套，把小塑料杯子接了过去。我也拿到了第一笔钱——“交通费”50 元。

回家后过了几天，我接到电话说，精子质量是合格的，活性很好。只

要等到血液检查的结果出来，就可以正式开始捐献了。

然而两天后，事情峰回路转。精子库的工作人员来电话说，血液检查结果出来了，肝功能正常，但是“两对半”的第五项却呈阳性。

“两对半”又叫作乙肝五项，是乙肝病毒的检测项目。所谓的“大山羊”“小山羊”（大三阳、小三阳）就是指“两对半”的检查结果。我的结果中，前四项为阴性，代表我体内没有乙肝病毒；但是第五项为阳性，这种情况一般被认为以前感染过乙肝病毒，现在已痊愈。我不记得自己得过乙肝，不过根据网络上的资料，在本人没有察觉的情况下，感染了乙肝病毒又自愈的情况也是可能发生的。

因为这个莫名其妙的阳性结果，我失去了捐献资格。生殖中心对于捐献样品的质量要求是十分严格的，因为乙肝病毒可以通过体液传播，样品如果有可能携带乙肝病毒，哪怕只是有一点点可能性，都是不合格的。

于是我赚零花钱的计划就这样夭折了。但也不是完全没有收获，毕竟我拿到了50元钱，做了一次免费体检，并且高兴地得知自己精子活性很好，肝功能正常。

数年后我再去体检，发现两对半第五项已经转为阴性了。我想如果我现在去捐，应该就没问题了吧。按照规定，每个人一生只能捐精1次，捐献的样品最多只能用于5位使用者，这是为了减小同父异母的两个人遇到一起、相爱结婚——这种狗血的韩剧情节——的概率。不过既然上一次以失败告终，也许哪天我可以再去试试？不知道这么多年过去，物是人非，墙上的“女施主”是不是换人了呢？

想知道更多？

可以参考——

金赛性、性别与生育研究中心（The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction）

世界华人性学家协会（World Association of Chinese Sexologists，简称 WACS）

美国性科学研究学会（The Society for the Scientific Study of Sexuality，简称 SSSS）

今日心理学

科学日报

《性研究杂志》

《变化心理学》

〔美〕贺兰特·A. 凯查杜里安．性学观止（第六版）．胡颖翀，译．北京：世界图书出版公司，2009.

〔美〕珍妮特·S. 海德，约翰·D. 德拉马特．人类的性存在（第八版）．贺岭峰等，译．上海：上海社会科学院出版社，2005.

〔美〕黛安娜·阿克曼．爱的自然史．张敏，译．广州：花城出版社，2008.

〔美〕贾里德·戴蒙德．性趣探秘：人类性的进化．郭起浩，卞明闽，译．上海：上海科学技术出版社，2008.

〔美〕托马斯·拉科尔．孤独的性：手淫文化史．杨俊峰等，译．上海：上海人民出版社，2007.

〔美〕斯蒂芬·C. 乔纳，温斯顿·K. 肯尼．一生的性……

海口：海南出版社．2005.

〔美〕W.马斯特斯，V.约翰逊．人类性反应．马晓年等，译．北京：知识出版社，1989.

〔美〕D.M.巴斯．进化心理学：心理的新科学（第二版）．熊哲宏等，译．上海：华东师范大学出版社．2007.

〔美〕D.M.巴斯．欲望的演化（修订版）．谭黎，王叶，译．北京：中国人民大学出版社，2011.

〔美〕威廉·L.雅博等．认识性学．爱白文化教育中心，译．北京：世界图书出版公司．2012.

〔美〕玛丽·罗琦．科学碰撞“性”．何静芝，译．长沙：湖南科学技术出版社，2013.

〔英〕德斯蒙德·莫利斯．“裸猿”三部曲（裸猿，人类动物园，亲密行为）．何道宽，译．上海：复旦大学出版社，2010.

〔英〕蕾伊·唐娜希尔．人类性爱史话．李意马，译．北京：中国文联出版公司，1988.

〔英〕史蒂芬·贝利．两性生活史．余世燕，译．北京：中国友谊出版公司，2007.

〔法〕西蒙娜·德·波伏娃．第二性．郑克鲁，译．上海：上海译文出版社，2011.

〔芬兰〕E.A.韦斯特马克．人类婚姻史．李彬，译．北京：商务印书馆，2002.

〔日〕渡边淳一．男人这东西．陆求实，译．北京：作家出版社，2010.

〔日〕渡边淳一．女人这东西．陆求实，译．北京：作家出版社，2010.

李银河．西方性学名著提要．南昌：江西人民出版社，2002.

彭晓辉．性科学概论．北京：科学出版社，2002.

[illegible]　马晓年 [illegible]

潘绥铭 [illegible]

彭晓辉 [illegible]

李银河 [illegible]

方　刚 [illegible]

作者们

Albert_JIAO	香港城市大学电子工程系在读博士生
Big.D	果壳网性情站编辑
Dacong	科学传播硕士
[illegible]	[illegible]
jiefucy	医学硕士（妇产科）
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SILENTGHOST	果壳网爱宠站编辑
北斗京华	科学传播硕士
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
非处方药	科学传播硕士
非言语	进化心理学方向博士
冷月如霜	植物细胞生物学博士生
一本大叔	实习医师
渣雷维奇	某不能透露名字的果壳编辑
赵紫凌	生理医学爱好者

