



ด่วนที่สุด
ที่ พง ๐๐๒๓๓/ว ดํ๑๗๘

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา-ทับปุด พง ๔๗๐๐๐

๒๕๖๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา, นายกเทศมนตรีเมืองพังงา และ^๑
นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบรู้เสียชีวิต^๑
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑๕ ราย จาก ๓๓ จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง ๓ ราย คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ราย และจังหวัด^๒
ระยอง ๒ ราย ภาคใต้ ๓ ราย ในจังหวัดสงขลา ๑ ราย จังหวัดตรัง ๑ ราย จังหวัดพัทลุง ๑ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ^๓
๙ ราย ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ๑ ราย จังหวัดนครราชสีมา ๑ ราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ ราย จังหวัดหนองคาย ๑ ราย
จังหวัดอุดรธานี ๑ ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ราย จังหวัดมุกดาหาร ๑ ราย และภาคเหนือ ในจังหวัดตาก ๑ ราย

ผู้เสียชีวิตรับเข็ือกจากสุนัข ๑๕ ราย และแมว ๑ ราย เป็นสัตว์มีเจ้าของร้อยละ ๖๐ ไม่มีเจ้าของ
ร้อยละ ๔๐ ผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่ได้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษา และไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน^๔
โรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐ อีกทั้งการรับรู้ของประชาชนว่า เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าไม่น่ากลัว และการมีความเชื่อ^๕
ที่ผิดเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐ อีกทั้งการรับรู้ของประชาชนว่า เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าไม่น่ากลัว และ^๖
การมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น กรณีเด็กชายชาวพม่าถูกกัดที่ประเทศไทย มีประวัติเข้ารับ^๗
การรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง และถูกส่งตัวเพื่อไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาล^๘
แต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีน เนื่องจากมีความเชื่อว่ารับประทานเนื้อสุนัขตัวที่กัดจะสามารถป้องกันโรคได้รวมทั้ง^๙
ให้เหตุผลว่าไม่มีเงินค่ารักษาและเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละอี้ดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดพังงาได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ให้แก่^{๑๐}
ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการนำสัตว์เลี้ยงในความรับผิดชอบไปปรับวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติด้วยสุก^{๑๑}
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า^{๑๒}
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น^{๑๓}
อินโฟกราฟิก สถาบันวิทยุ สถาบันโทรทัศน์ ได้ที่ www.dla.go.th ในส่วนของ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ^{๑๔}
บริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคภูมิ อินทนิลวรรณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา บัญชีราชการทั่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๑๔๓๕
ผู้ประสานงาน : น.ส. จิรชยา อัลภาชน์ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๙๙ ๖๗๘๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
รับเลขที่ ๗๓๙๔
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา.....

ด่วนที่สุดฯ
ที่ นท ๐๘๑.๕/๒๖๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตศูนย์ กทม. ๑๐๓๐

๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

กตุ้นงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๗๓๙๔

วันที่รับ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑

เวลา ๖:๐๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ๑๗๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบรู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑๕ ราย จาก ๑๓ จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง ๓ ราย คือ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ราย และจังหวัดระยอง ๒ ราย ภาคใต้ ๓ ราย ในจังหวัดสงขลา ๑ ราย จังหวัดตรัง ๑ ราย จังหวัดพัทลุง ๑ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ ราย ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ๑ ราย จังหวัดนครราชสีมา ๑ ราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ ราย จังหวัดหนองคาย ๑ ราย จังหวัดยโสธร ๑ ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ราย จังหวัดมหาสารคาม ๑ ราย และภาคเหนือ ในจังหวัดตาก ๑ ราย

ผู้เสียชีวิตรับเชื้อจากสุนัข ๑๕ ราย และแมว ๑ ราย เป็นสัตว์มีเจ้าของร้อยละ ๖๐ ไม่มีเจ้าของร้อยละ ๔๐ ผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่ได้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษา และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐ อีกทั้งการรับรู้ของประชาชนว่า เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าไม่น่ากลัว และการมีความเชื่อที่ผิดเดียวกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น กรณีเด็กชายชาวพม่าถูกกัดที่ประเทศไทย มีประวัติเข้ารับรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง และถูกส่งตัวเพื่อไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีนเนื่องจากมีความเชื่อว่ารับประทานเนื้อสุนัขตัวที่กัดจะสามารถป้องกันโรคได้รวมทั้งให้เหตุผลว่าไม่มีเงินค่ารักษาและเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการนำสัตว์เดี้ยงในความรับผิดชอบไปรับวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตามเมื่อถูกสัตว์เดี้ยงลูกด้วยนมกัด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น อินโฟกราฟิก สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ ได้ที่ www.dla.go.th ในส่วนของ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนา ยันต์โภกิจ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔
ผู้ประสานงาน สาขาวรรค คล้ายจินดา
โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๗๔ ๓๗๓๘



ข่าวปลีกสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

กรมปศุสัตว์รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ 27 ส.ค.61(320/2561)

นายสัตวแพทย์สวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ว่า การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข-แมว ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 8.24 ล้านตัว ได้มีการดำเนินการสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จนถึงวันนี้รวมทั้งสิ้น 8,268,589 ตัว โดยการฉีดวัคซีนรอบๆ กิโลเมตร 5 กม. ได้ 100 % แล้ว และคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะได้ตามเป้าหมาย

สำหรับการฝ่าดัดทำหมันซึ่งมีเป้าหมาย 300,000 ตัว มีการดำเนินการสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จนถึงวันนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 281,425 ตัว และทำการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งตั้งเป้าไว้ 17,500 คน มีผลงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จนถึงวันนี้จำนวน 63,875 คน ซึ่งเป็นอาสาจากท้องถิ่นละ 1-2 ราย ทำงานร่วมกับ อสม. นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รื้น规格เป็นสุนัขและแมวแล้ว 9.1 ล้านตัว โดยยอดที่สำรวจสุนัข แมวนปีที่ผ่านมา มีประมาณ 10 ล้านตัว

ส่วนการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในช่วงมกราคม - 26 สิงหาคม 2561 มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว (ระยะเวลา 30 วัน) จำนวน 54 จังหวัด ปัจจุบันคงเหลือ 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา สุรินทร์ กำแพงเพชร มหาสารคาม บุรีรัมย์ หนองคาย หนองบัวลำภู พิจิตร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ศรีราชา ชลบุรี และสงขลา

นายสัตวแพทย์สวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มีเหตุผลความจำเป็นในการประกาศเขตโรคระบาด เพื่อสามารถกำหนดพื้นที่ควบคุมในระยะ 5 กิโลเมตรรอบๆ กิโลเมตร ทำให้สามารถระบุชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ต้องควบคุมได้ทุกชนิด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือขายสัตว์ตามประกาศเด็นแต่ได้รับอนุญาต และสัตวแพทย์สามารถสั่งดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือสังสัยว่าป่วยหรือสังสัยว่าเป็นพานะของโรคระบาดได้ทันที หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 063-2256888

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ผู้ว่า : น.ส.เพ็ญศรี ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบรู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑๕ ราย จาก ๓๓ จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง ๓ ราย คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ราย และจังหวัดระยอง ๒ ราย ภาคใต้ ๓ ราย ในจังหวัดสงขลา ๑ ราย จังหวัดตรัง ๑ ราย จังหวัดพัทลุง ๑ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ ราย ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ๑ ราย จังหวัดนครราชสีมา ๑ ราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ ราย จังหวัดหนองคาย ๑ ราย จังหวัด ยโสธร ๑ ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ราย จังหวัดมุกดาหาร ๑ ราย และภาคเหนือ ในจังหวัดตาก ๑ ราย


ผู้เสียชีวิตรับเชื้อจากสุนัข ๑๕ ราย และแมว ๑ ราย เป็นสัตว์มีเจ้าของร้อยละ ๖๐ ไม่มีเจ้าของร้อยละ ๔๐ ผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๙๐ ไม่ได้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษา และไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐

ที่มา : ข้อมูลจากการควบคุมโรคในครัวประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑



สื่อออนไลน์ โฟกราฟิกและไปสัมผัสรีวิวเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า 15 ปี




ถูกกัด ช่วง
แล้วไม่ฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเขี้ยว กัด ช่วง เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก

ระยะตีบตัน

ระยะอันพาหะ

- น้ำลายเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- หงุดหงิด เก็บตัว
- หวาดระ斡
ม่านตาขยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- ทำหอบ

- น้ำลายไหล
- คงท้อยตก
- ล้มลง ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (Rabies Virus)

บีสตัวเลี้ยงสูงด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย
ลิง หมู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ตาย 100%



คำแนะนำเมื่อถูกกัด-ช่วง-เลีย



ล้างแผล

ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง



ใส่ยา

ยาเดดบีน



กักหนา-แมว

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน



หาหมอ

หากเข็ญวัคซีนต้องมาتابบัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้ลี้ภัย



ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



เลี้ยงในรั้วบ้าน
ออกนอกบ้านต้อง ใส่ส้ายจูง



ฟิกให้ เชือฟึงคำสั่ง



กำหนัน คุกกำเนิด

คำ

5 ข.
กันสุนัขกัด

ยก อย่าแหย



ยก อย่าเหยียบ



หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ

ยก อย่าแยก



สุนัขที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า

ยก อย่าหยิบ



อาหารที่สุนัข
กำลังกิน

ยก อย่าสูบ



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่เจ้าของ

กรมสุขภาพฯ เรากำหนดทางกฎหมาย

ของมีหน้าที่ ต้องพำนัชและแมดไม่เกิดตั้งซึ่งมีองก์โรคพิษ



เครื่องหมายประจำตัวสัตว์

(หรือญ)



ใบรับรองการฉีดวัคซี

ผู้เดินทางต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒

ไม่ฉีดวัคซีน

ปรับไม่เกิน 200 บาท

ไม่ห้อยหรือ

ปรับไม่เกิน 200 บาท

ญหรือใบรับรองการฉีดหาย

ปรับไม่เกิน 200 บาท

ชี้หรือญหรือใบรับรอง
การฉีดวัคซีนปลอม


จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



แจ้งโรค 0-2653-4444 ต่อ 4144 - 4145


ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดสัตว์





คู่มือความรู้
สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง

“โรคพิษสุนัขบ้า
และโรคหวัดสัตว์และคน”



คณะผู้จัดทำ


ที่ปรึกษา

นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัชฎาวงศ์	รายอาจิน	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์รุ่งเรือง	กิตาติ	ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์วิชาญ	ปาวัน	ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ผู้จัดทำ

ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ	สำนักสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายอานุภาพ	สำนักโรคติดต่อทั่วไป
นางสาวกมลวรรณ	สำนักสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จัดพิมพ์โดย	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พิมพ์ที่	ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวน	101,500 เล่ม
ปีที่พิมพ์	2560
ISBN	978-616-11-3362-7



คำนำ

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เมื่อติดเชื้อแล้วมีอาการเสียชีวิตทุกราย ปัจจุบันทั่วโลกยังมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละ 55,000 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทวีปแอฟริกาและเอเชีย สาเหตุมาจากการไม่ได้ควบคุมโรคในสุนัข และผู้เสียชีวิตไม่ได้เข้ารับการรักษาหลังสัมผัสรอย องค์การอนามัยโลกและองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งประเทศไทยทั่วโลกมากกว่า 150 ประเทศได้เข้าร่วมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก สำหรับประเทศไทยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่จะกำจัดโรคนี้ให้หมดไป ภายในปี พ.ศ. 2563

ประเทศไทยยังมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ทุกปี ซึ่งการผลิตและพัฒนาคุ้มครองความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์และคน” จะมีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า คือ การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักร ปลูกจิตสำนึกให้มีพฤติกรรมเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง กระตุนประชาชนให้ความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด และปฏิบัติตนหลังถูกสัตว์กัดได้ถูกต้อง ลดการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป



นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค
มิถุนายน 2560



ท่านคิดว่าในภาพนกจากคนแล้วสัตว์ชนิดใด
เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้บ้าง

โรคพิษสุนัขบ้าคือโรคอะไร?

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเร比ส์ เป็นไปได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชากะ กระอก กระแต กระต่าย หรือแม่กระทั้งสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว ควาย แพะ เป็นต้น แต่พบมากที่สุดในสุนัข มากถึงร้อยละ 95 และ รองลงมาคือ แมว



คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหง่านสัตว์และคน”

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทยเป็นอย่างไร

ในแต่ละปีคนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2552 - 2559) พบรู้สี่เสียชีวิต ปีละ 5 - 24 ราย

ปีที่พบรู้สี่เสียชีวิตมากที่สุด คือ พ.ศ. 2552 จำนวน 24 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 55 - 64 ปี, อายุมากกว่า 65 ปี และ 35 - 44 ปี

อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้าง รองลงมา คือ ไม่ทราบอาชีพ ในปักษ์รอง และเกษตร ส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกสุนัขกัด




แม้ว่าจากรายงานจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่พบว่า ในหลายจังหวัดมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สงขลา เป็นต้น

ดังนั้น การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถูกสูบสูบ ก็ช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ เพราะโรคนี้ ไม่มีทางรักษาให้หายได้ หากติดเชื้อและมีอาการแล้วเสียชีวิต ทุกราย



คนเราได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากการถูกสัตว์ที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือช่ำน โดยเชื้อจะถูกขับออกมากับน้ำลายของสัตวนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขและแมว สามารถตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในน้ำลายได้ 1 - 7 วัน ก่อนแสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้า



คู่มือความรู้สำหรับบากเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคกระหัวงังสัตว์และคน”

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีอะไรบ้าง

สุนัขและแมวจะแสดงอาการหลังจากถูกสัตว์ที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือชewn ประมาณ 3 - 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการซึ่งอาการป่วยจะมีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม




คุณมีความรู้ที่ครบถ้วนเรียนและประชาน
เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างสัตว์

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

แบ่งเป็น 3 ระยะ


ระยะแรก

มีอาการประมาณ 2 - 3 วัน
สุนัข/แมวจะมีอารมณ์และนิสัย^{เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของ จะปลีกตัวออกไปหลบอยู่เงียบๆ และ มีอารมณ์หงุดหงิด เป็นต้น}



ระยะที่ 2 ระยะตื้นเต้น
เริ่มมีอาการทางประสาท

สุนัข/แมวจะกระวนกระวย ตื้นเต้นหงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดและสีงของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง ถ้ากักขังหรือล่ามโซ่ไว้จะกัดกรง หรือโซ่จันเลือดกลบปาก โดยไม่เจ็บปวด เสียงเห่า hon เปลี่ยนไป ตัวแข็ง บางตัวล้มลงซึ่กกระตุก



ระยะที่ 3 อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ระยะอัมพาตสุนัข/แมว จะมีอาการคงห้อยตก
ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล
ขยับอนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย
ทรงตัวไม่ได้ ล้มลงอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตาย
ในที่สุด



คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคกระห่วงสัตว์และคน”


การเจ็บป่วยในคนหลังถูกสัตว์ มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดข่วน

หลังถูกสัตว์ที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วนประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ก็จะปรากฏอาการป่วยแต่บางคนระยะฟักตัวอาจสั้นมากคือไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

- จำนวนเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่เข้าไปในร่างกายซึ่งบ้าดแพลที่ถูกกัดมีขนาดใหญ่ ลึกหรือมีบาดแพลงหลายแห่ง จะมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้มาก



คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดทั่วโลก”



2. ตำแหน่งที่ถูกกดหรือตำแหน่งที่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกาย เช่น ถ้าบาดแผลอยู่ใกล้สมองมาก เชื้อโรคก็จะเดินทางไปถึงสมองได้เร็ว หรือ อยู่ในบริเวณที่มีปลายประสาทมาก เช่น มือหรือเท้า เชื้อโรค ก็จะเข้าสู่ระบบประสาทได้ง่าย



คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคกระห่วงสัตว์และคน”

3. อายุของคนที่ถูกสูบขัดหรือชวน
เช่น เด็กและผู้สูงอายุจะมีความต้านทานต่อ¹
โรคพิษสูนขับ้ำต่ำกว่าคนหนุ่มสาว



4. สายพันธุ์ของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

ถ้าเป็นสายพันธุ์จากสัตว์ป่า จะมีอาการรุนแรงกว่า
สายพันธุ์จากสัตว์เลี้ยง






11

คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหง่านสัตว์และคน”

อาการป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่พบในคน

เริ่มแรก คือ เปื้ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณ ที่ถูกกัด และอาการคัน痒ไปส่วนอื่น

ต่อมา จะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อยและกล้ามเนื้อขากระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกร หรืออาจซักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด



จะรู้ได้อย่างไรว่าสุนัขหรือสัตว์ที่กัด/บุน ไม่ใช่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ต้องมีปัจจัยสนับสนุนครบทั้ง 5 ข้อ คือ

1. สุนัขหรือสัตวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายไม่เกิน 1 ปี

2. สุนัขหรือสัตวนั้นได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี อยู่ในบริเวณรั้วรอบขอบซิด มีโอกาสสัมผัสสัตว์อื่นน้อย



คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดสัตว์และคน”

3. สุนัขหรือสัตว์น้ำมีอาการปกติ ยังกินน้ำกินอาหารได้
4. การถูกสุนัขหรือสัตว์น้ำกัดหรือทำร้ายมีเหตุโน้มนำ เช่น ไปเผยแพร่หรือทำให้สุนัขโกรธ ตกใจ หรือสุนัขหรือสัตว์น้ำชอบกัดคนเป็นประจำ
5. สามารถกักขังสุนัขหรือสัตว์น้ำไว้ดูอาการได้ถ้าภายใน 10 วัน สุนัขยังคงมีอาการปกติ ถือว่าสุนัขไม่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

กรณีที่สุนัขหรือสัตว์น้ำกัดหรือข่วนแล้วหนีหายไป ไม่สามารถติดตามดูอาการได้ ไม่ปรากฏเจ้าของ ไม่ทราบประวัติที่แน่นอน ให้ถือเสมอว่าสุนัขหรือสัตว์น้ำมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า




การป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

1. การป้องกันไม่ให้สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ได้แก่

1.1 ร่วมมือกันทำให้สุนัข แมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ถ้าเก็บหรือซื้อลูกสุนัขหรือลูกแมวมาเลี้ยง ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ เพราะอาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้า

ดังนั้น ต้องรีบนำไปฉีดวัคซีน ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าของสุนัข ต้องนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขอายุ 2 - 4 เดือน และฉีดกระตุ้นอีกรอบครั้ง ตามกำหนดนัดและฉีดซ้ำทุกปี



၁၀၃

၁၃၂

၁၃၃

1.4 พบรเห็นสัตว์สงสัยเป็นโรค

พิษสุนัขบ้า ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทันที หรือช่วยกันจับ โดยระวัง
อย่าให้ถูกกัด แล้วนำหัว / ตัวสัตว์
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.5 ไม่นำสัตว์ป่วยมาเลี้ยง



2. ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัข แมว หรือ สัตว์อื่นกัด หรือข่วนเจ้าของสัตว์ต้องดูแลสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นอย่างถูกต้อง

2.1 ไม่ให้กัดคน เลี้ยงให้มีนิสัยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เลี้ยงแล้วมีความสุข ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์

2.2 การดูแลระมัดระวังคนไม่ให้ถูกสุนัข แมว หรือสัตว์อื่น กัดหรือข่วน ได้แก่ อย่าปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ตามลำพัง สอนให้เด็ก ระมัดระวัง เมื่อเล่นหรือใกล้สุนัข การป้องกันไม่ให้สุนัขกัด หรือ ทำร้าย โดยใช้คำา 5 ย ได้แก่

ย ที่ 1 คือ อย่าแหย

ให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ โกรธ



คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคหวัดสัตว์และคน”

ຍ ຖີ່ 2 ຄົວ ອຍ່າເຫັຍບ


ໜາກ ຫ້ວ ຕັ້ວ ຂາ ມີ ທີ່ ທຳໃຫ້ສຸນຂໍ ຢື່ອສັດວິຕ່າງໆ ຕາກໃຈ



ຄູ່ມືອຄວາມຮູ້ລໍາຫັກຮັບນັກຮຽນແລະປະຊາຊນ
ເຮືອງ “ໂຮຄພິເພສຸນບັນບາ ແລະໂຮຄຮະຫວ່າງສັດວິແລະຄົບ”

ຍ ຖີ່ 3 ຄື່ອ ອຍ່າແຍກ

ສຸນໜ້າຫຼືອສັຕົວຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງກັດກັນ ດ້ວຍມື່ອເປົ່າ



20

ຄູ່ມື່ອຄວາມຮູ້ສໍາເຫັນບັນດາເຮັດວຽກແລະປະຊາຍນ
ເຮືອງ “ໂຣຄົມເພື່ອປັບປຸງ ແລະໂຣຄະຫວ່າງສັງເຕິງແລະຄົນ”

ຍ ຖ້າ 4 ຄື່ອ ອຍ່າຫຍົບ

ຈານຂ້າວຫີ່ອເຄລື່ອນຍ້າຍອາຫາຮຸນະທີ່ສຸນໜ້ອສັຕິງໆ
ກຳລັງກິນອາຫາຮ



ຄູ່ເນື້ອຄວາມຮູ້ລໍາຫັນບັນດາເຮັດວຽກ
ເຮັດວຽກ “ໂຮຄພິເມຊຸນິຂຶ້ນປ້າ ແລະ ໂຮຄຮະຫວ່າງສັຕິງໆແລະ ດົບ”

ຍ ກໍ 5 ຄືວ ອຍ່າຍຸງ

ຫີ້ອ ເຂົ້າໄກລ້ສຸນ້ຫຮູ້ອສັຕວົຕ່າງໆ ທີ່ມີຮູ້ຈັກຫີ້ອໄມ້ມີເຈົາຂອງ




การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เมื่อสุนัขกัด ต้องทำดังนี้

1. ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายครั้ง ให้ถึงก้นแผล ล้างสบู่ออกให้หมด
2. เช็ดแผลให้แห้งใส่ยารักษาแผลสด
3. จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้ เพื่อสืบหาเจ้าของ เพื่อกลับสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน สอดคล้องประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4. ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ถูกต้อง

**“เมื่อสุนัขกัดต้องล้างแผล
ใส่ยา กักหมา หาหมอ”**





คำแนะนำสำหรับเด็กๆ ที่จะเลี้ยงสุนัข แมว

คำแนะนำสำหรับเด็กๆ ที่จะเลี้ยงสุนัข แมว หรือจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ เพื่อความปลอดภัยจากการถูกสัตว์ทำร้ายและการติดโรค เด็กๆ ควรปฏิบัติ ดังนี้


1. ต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้ปกครองก่อนว่าจะเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่
2. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี แรกครั้ง 2 ครั้ง



3. ไม่ปล่อยสุนัขเพ่นพ่านในที่สาธารณะทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง ไม่นำสุนัขไปปล่อยและต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป


4. ในกรณีที่จะเล่นกับสัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเท่านั้น ห้ามเล่นกับสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล และต้องล้างมือทุกครั้ง หลังสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง

5. ต้องจำไว้เสมอว่า เวลาเล่นกับสัตว์ เช่น สุนัข อย่าเหยียให้สัตว์ไม่พอใจ อย่าเหยียบหาง หัวตัว หรือขา หรืออย่าทำให้สัตว์ตกใจ อย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกัน อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สัตว์ ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ



6. ถ้าสัตว์เลี้ยงทำร้าย หรือเกิดบาดแผลจากการเล่นกับสัตว์เลี้ยง ต้องรีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแพลงสต์ หรือไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

7. ห้ามไปคลุกคลี หรือสัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของที่บ้าน เพราะเราไม่สามารถมั่นใจในความปลอดภัยทั้งจากโรคและการทำร้ายได้




โรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน ที่เด็ก ๆ ต้องรู้

คนเราติดเชื้อโรคอื่นๆ จากการกินอาหารร่วมกับสุนัข หรือแมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้จากการใช้จานชาม ช้อน สำหรับคนมาใช้กับสัตว์ หรือ การกินอาหารเครื่องดื่มร่วมกันในภาชนะเดียวกัน หรือแม้แต่การพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วนำไป เกาะตื้กบนน้ำแข็งบ้าง แล็บเอาไปใส่ในตู้แขวนน้ำดื่มบ้าง ทำให้ติดเชื้อโรคได้

เพราะทั้งสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ อาจจะมีเชื้อ สเต็ปโตคoccus และสเต็ปพิโลคoccii (Streptococcus and Staphylococci) ที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง การติดเชื้อที่ผิวหนัง รวมถึงมีไข้พยาธิตัวกลม พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย

นอกจากนี้ยังมี “protozoa” ซึ่งสามารถก่อโรคท้องร่วง ทั้งในคนและสุนัข แมว

อย่างที่เจอบ่อย ๆ คือเชื้อกลุ่ม “เจียรเดีย” (Giardia) รวมถึง เชื้อชาโนไมลาที่ก่อโรคท้องร่วงทั้งคนทั้งสัตว์





เชื้อท้อกโซพลาสโนสิส (Toxoplasmosis) มีอยู่ในสัตว์หลาย ๆ ประเภท แต่ที่ปัจจุบันคือ “แมว” เป็นสัตว์พิเศษที่สามารถนำไข่ของเชื้อนี้สู่คนได้โดยเฉพาะ “หญิงตั้งครรภ์” เมื่อรับเชื้อเข้าไปอาจทำให้แท้งได้ รวมถึงอาจทำให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ในต่างประเทศจะเข้มงวดเรื่องนี้มาก ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีรายงานมากนัก แต่ก็มีการตรวจพบเชื้อดังกล่าว เช่นกัน

อีกโรคหนึ่งที่เจอได้คือ “โรคแมวข่วน” (Cat Scratch Fever) เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ชอบเลียสิ่งต่าง ๆ รวมถึงเล็บของตัวมันเอง ทำให้ที่เล็บมีแบคทีเรียเยอะ ประกอบกับการที่เป็นสัตว์ที่ชอบข่วน

ดังนั้นคนที่ถูกข่วนอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวนังยิ่งถ้าเจอเชื้อ ባተናነሎስቲስ (Bartonellosis) อาจจะทำให้อาการรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังมี เชื้อราริงเวิร์ม (Ringworm) ก่อโรคผิวนังคล้ายกับกลากเกลื่อน คนที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้สูงอายุเด็ก คนป่วยหรือรับยากลุ่มสเตียรอยด์อยู่ เสี่ยงติดเชื้อย่างง่าย

นอกจากนี้ ยังมีโรคภูมิแพ้ขนสุนัข ขนแมว หรือโรคจากเห็บ หมัด ที่ต้องระมัดระวัง

ก้าวย่างเร็ว โนน หมาบาก



ล้าง

ทำความสะอาดบอดเพลให้สัตว์เลี้ยง
...ล้างเพลด้วยน้ำสบู่หลายครั้ง จากนั้นใช้ยาฆ่าเชื้อ



รีบ

พาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์

...เพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์



กักสัตว์เลี้ยงไว้ดูอาการ อย่างน้อย 6 เดือน

...ให้อาหารและน้ำตามปกติ

...หากสัตว์ตาย ให้เรียกปศุสัตว์เก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคพิษสุนัข



ก้าวย่างเร็ว

ปฏิบัติการ “5 ข” ป้องกันสุนัขกัด

1. ออย่าเหยี่ยบ

ไม่เหยียบสุนัข

3. ออย่าเหยียบ

ไม่เหยียบ (หาง, ตัว, ขา) สุนัข

ไม่ทำให้สุนัขเจ็บหรือตกใจ

2. ออย่าแยก

ไม่ไปแยกสุนัขที่กำลังกัด

คนหรือสุนัขด้วยกัน

ด้วยมือเปล่า



4. ออย่าหยิบ

ไม่หยิบจานข้าวขณะ

สุนัขกำลังกินอาหาร

5. ออย่ายุ่ง

ไม่ยุ่งหรือคลุกคลีกับสุนัข

ไม่มีเจ้าของ

และไม่ควรให้สุนัขเลียมือ

*** ฝากถึงผู้ปกครอง ***

หากบุตรหลานถูกสุนัขโดยเฉพาะลูกสุนัขกัด หรือ
ข่วนแม้มเพียงรอยคลอกให้พาไปพบแพทย์ทันที

วิธีสังเกตสุนัขหรือ
แมวที่เป็นโรคกลัวน้ำ

สัตว์จะมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีอาการตื่นเต้น
ตกใจง่าย กระวนกระวาย กระโดดจับลมหรือแมลง
กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า กินอาหารน้อยลง

ภาพประกอบ <http://dogcorner.com>

ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค



ด้วยความปรารถนาดีจาก..กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทำโดย...ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



โรคพิษสุนัขบ้า

สาเหตุ

เกิดจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือถูกน้ำลายที่มีเชื้อกระเด็นเข้าตา ปากหรือบาดแผล แล้วไม่ได้รับการดูแล หรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะใช้เวลาประมาณ 2 – 8 สัปดาห์ จึงแสดงอาการของโรค

สัตว์นำโรค

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หนู กระรอก กระต่าย ลิง ค้างคาว วัว ควาย แพะ เป็นต้น

โรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา

หากติดเชื้อและมีอาการแล้ว


จะเสียชีวิตทุกราย

อาการ

2-3 วันแรก ผู้ป่วยจะมีไข้ อ่อนเพลีย เจ็บคอ เปื่อยอาหาร ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ชา เจ็บเสียวหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผล และลำตัว ต่อมอาจจะมีอาการกระสับกระส่าย ไม่ชอบเสียงดัง กลัวแสง กลัวลม กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว เพื่อเจือ แน่นหน้าอก หายใจไม่อxygen กล้ามเนื้อขากระทุกหรืออาจซัก เกร็ง เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น



- ล้างและทำความสะอาดแผล ด้วยน้ำเกลือและสบู่ทันที และเช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์และโพวิดอนไอโอดีน
- รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที



ภาพประกอบ <https://www.dek-d.com/board/view/3478659>
ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ด้วยความปรารถนาดีจาก..กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทำโดย...ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ພາຍຫຼຸດ ຖະຫຼາດ ອອນແຮງໄຍກວາກວາກຄດ





1.ເສື່ອໄວ້ສພິຜສູນຂັບ
ຫີ່ອເຮັບສໄວ້ສ

ວາກາຮທາງປະສາທ ແລະ
ສີຍໜົວໃນທີສຸດ


2.ເນື່ອອຸກ
ມເສື່ອພິ
ບາກ




7.ຈົນກະທຶນເຂົາສູ່ຮະບບ
ປະສາທສ່ວນກລາງທີ່ສມອງ
ເກີດກາຮທ້າລາຍເໜລ໌ສມອງ



ເສື່ອກົຈະເຂົາສູ່
ລາຍ ທ່າໄຫແພຣ
ນທາງນໍາລາຍ



3.ເສື່ອເຂ
ບາດແພລ
ທາງນໍາລາ
ສຕົວທີ່ມີເ
4.ໄວ້ສພິຜສູນ
ເພີມຈຳນວນບ
ກລຳມານີ້ທີ່ອ
ບຣິເວນບາດແພ
ຮວດເຮົາ



5.ໜັງຈາກນັ້ນເສື່ອຈະເຂົາສູ່ເສ
ປະສາທໃນຮະບບປະສາທສ່ວນ



ຈັດທຳໂດຍ ກລຸມຄວນຄຸມນຶ່ງກັນໂຮກສັດຖິວເດືອນ
ສໍານັກຄວນຄຸມ ນຶ່ງກັນແລະນຳນັດໂຮກສັດຖິວ
ກຽມປະສຸດຖິວ ກະທຽວເກຍດອງແລະສາຫກກຽມ



ສະກັນຄົວອົບໄກ້ດໍາລັດຄວາມຮູ້ໂຮກພິຜສູນ
ແລະແຈ້ງໂຮກໄດ້ທີ່ສູນຍື່ເຜົ່າຮະວັງໂຮກພິຜ
ໂທ : 063-225-6888

