

Bondat d'ajust

Independència

Bondat d'ajust i independència

Bondat d'ajust

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Sovint desitjam saber si una mostra prové o no d'una distribució concreta

Exemples

- Llençam un dau en l'aire moltes vegades, apuntam els resultats, i d'aquests resultats en volem deduir si el dau està trucat o no
- Hem emprat unes mostres petites en un t-test: perquè el resultat del contrast tengui sentit, aquestes mostres han de provenir de poblacions normals. És el cas?

Bondat d'ajust

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

En aquests casos, farem un contrast

$$\begin{cases} H_0 : \text{la mostra prové de la distribució desitjada} \\ H_1 : \text{la mostra no prové de la distribució desitjada} \end{cases}$$

Com sempre:

- Si obtenim evidència que ens permeti rebutjar la hipòtesi nul·la, conclourem que la mostra no prové de la distribució desitjada
- Si no obtenim evidència que ens permeti rebutjar la hipòtesi nul·la, acceptarem que la mostra prové de la distribució desitjada

Bondat d'ajust

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Els tests es basaran bàsicament en

- 1 Comparar les **freqüències observades** amb les **freqüències teòriques** de la distribució que contrastam
- 2 Determinar si les freq. observades són prou diferents de les freq. teòriques com per poder rebutjar la hipòtesi nul·la

Exemple 1

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Tenim un dau i volem saber si està trucat o no

Si no està trucat, quan llençam el dau i miram el resultat X , cada resultat $x = 1, \dots, 6$ té probabilitat $P(X = x) = 1/6$

Llençam el dau 120 vegades i obtenim els resultats següents:

Resultat	1	2	3	4	5	6
Freqüència	20	22	17	18	19	24

Si el dau no estigués trucat, esperaríem obtenir 20 vegades cada resultat. Hi ha prou evidència que el dau estigui trucat?

Test χ^2 de Pearson

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Suposem que tenim n observacions. Calculam les freqüències observades de k grups de resultats (**classes**; poden ser els resultats individuals). **Aquestes classes han de cobrir tots els resultats possibles.**

Volem contrastar si aquestes observacions segueixen una distribució totalment coneguda, per a la qual coneixem la probabilitat que una observació caigui dins cada una de les classes

El contrast és

$$\begin{cases} H_0 : \text{La població té aquesta distribució} \\ H_1 : \text{La població no té aquesta distribució} \end{cases}$$

Test χ^2 de Pearson

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Per a cada classe i , diguem

- o_i : la freqüència absoluta **observada** d'aquesta classe
- p_i : la probabilitat que una observació pertanyi a aquesta classe si H_0 és certa
- e_i : la freqüència absoluta **esperada**, o **teòrica**, d'aquesta classe si H_0 és certa: $e_i = p_i \cdot n$

Rebutjarem H_0 si les o_i són prou diferents de les e_i

Test χ^2 de Pearson

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Teorema

L'estadístic de contrast

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

té aproximadament una distribució χ^2_{k-1} si

- *n gran ($n \geq 25$ o 30)*
- *Les classes cobreixen tots els resultats possibles (a la pràctica: $\sum_{i=1}^k e_i = \sum_{i=1}^k o_i$)*
- *Totes les classes tenen prou probabilitat com per tenir-les en compte (a la pràctica: $e_i \geq 5$ per a tota classe i ; això es pot relaxar una mica, però no ho farem)*

Test χ^2 de Pearson

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Sigui χ_0 el valor que pren l'estadístic de contrast

El **p-valor** del contrast és

$$P(\chi_{k-1}^2 \geq \chi_0),$$

amb el significat usual

Exemple 1

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

	Valor obtingut					
Freqüència	1	2	3	4	5	6
Observada, o_i	20	22	17	18	19	24
Esperada, e_i	20	20	20	20	20	20

$$\chi_0 = \frac{(20 - 20)^2}{20} + \frac{(22 - 20)^2}{20} + \frac{(17 - 20)^2}{20} + \frac{(18 - 20)^2}{20} + \frac{(19 - 20)^2}{20} + \frac{(24 - 20)^2}{20}$$

```
> O=c(20,22,17,18,19,24)
```

```
> E=rep(20,6)
```

```
> sum((O-E)^2/E)
```

```
[1] 1.7
```

Exemple 1

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Volem fer el contrast

$$\begin{cases} H_0 : \text{El dau dóna distribució uniforme} \\ H_1 : \text{El dau està trucat} \end{cases}$$

Estam en les condicions del teorema, per tant l'estadístic de contrast segueix una llei χ_5^2 :

p-valor: $P(\chi_5^2 \geq 1.7) = 1 - \text{pchisq}(1.7, 5) = 0.89$. Com que és més gran que 0.05, acceptam la hipòtesi nul·la.

Conclusió: No tenim proves que el dau estigui trucat.

La funció per realitzar un test χ^2 amb R és

```
chisq.test(obs,p=probs)
```

on obs és la llista de freqüències observades i probs la llista de **probabilitats** de les observacions; si no s'especifica, s'entén que totes són iguals

La suma de les probs ha de ser 1

Exemple 1

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

```
> freq.abs.obs.daus=c(20,22,17,18,19,24)
```

```
> chisq.test(freq.abs.obs.daus)
```

Chi-squared test for given probabilities

data: freq.abs.obs.daus

X-squared = 1.7, df = 5, p-value = 0.8889

Obtenim el valor de l'estadístic, X-squared, els graus de llibertat, df, i el p-valor, p-value

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Un tècnic de medi ambient vol estudiar l'augment de temperatura de l'aigua a dos quilòmetres dels abocaments d'aigua autoritzats d'una planta industrial.

El responsable de l'empresa afirma que *aquests augments de temperatura segueixen una llei normal amb $\mu = 3.5$ dècimes de grau C i $\sigma = 0.7$ dècimes de grau C.*

El tècnic ho posa en dubte. Per decidir-ho, pren una mostra aleatòria d'observacions de l'augment de les temperatures (en dècimes de grau).

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Rang de temperatures	Freqüències
1.45—1.95	2
1.95—2.45	1
2.45—2.95	4
2.95—3.45	15
3.45—3.95	10
3.95—4.45	5
4.45—4.95	3
Total	40

Hi ha evidència que la sospita del tècnic sigui vertadera, a un nivell de significació del 5%?

Exemple 2

Les classes han de cobrir tots els resultats possibles.
Afegim les cues als resultats extrems.

Rang de temperatures	Freqüències
menys de 1.95	2
1.95—2.45	1
2.45—2.95	4
2.95—3.45	15
3.45—3.95	10
3.95—4.45	5
4.45 o més	3
Total	40

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

El contrast és:

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0 : \text{La distribució dels augments de temp.} \\ \quad \text{és } N(3.5, 0.7) \\ H_1 : \text{La distribució dels augments de temp.} \\ \quad \text{no és } N(3.5, 0.7) \end{array} \right.$$

Tenim les freqüències observades, cal calcular les freqüències teòriques

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Sigui $X \sim N(3.5, 0.7)$

$$\begin{aligned} p_1 &= P(X \leq 1.95) \\ &= P\left(\frac{X - 3.5}{0.7} \leq \frac{1.95 - 3.5}{0.7}\right) \\ &= P(Z \leq -2.21) = F_Z(-2.21) = 0.0136 \end{aligned}$$

Per tant

$$e_1 = p_1 \cdot n = 0.0136 \cdot 40 = 0.54$$

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Sigui $X \sim N(3.5, 0.7)$

$$\begin{aligned}p_2 &= P(1.95 \leq X \leq 2.45) \\&= P\left(\frac{1.95 - 3.5}{0.7} \leq \frac{X - 3.5}{0.7} \leq \frac{2.45 - 3.5}{0.7}\right) \\&= P(-2.21 \leq Z \leq -1.5) \\&= F_Z(-1.5) - F_Z(-2.21) = 0.0533\end{aligned}$$

Per tant

$$e_2 = p_2 \cdot n = 0.0533 \cdot 40 = 2.13$$

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Calculam **a mà** d'aquesta manera totes les freqüències esperades

Rang de temperatures	o_i	e_i
menys de 1.95	2	0.54
1.95—2.45	1	2.13
2.45—2.95	4	5.92
2.95—3.45	15	10.29
3.45—3.95	10	10.67
3.95—4.45	5	6.97
més de 4.45	3	3.48

Tenim freqüències esperades < 5 , el test χ^2 no es pot aplicar amb garanties

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Agrupam a fi d'obtenir freqüències esperades ≥ 5 amb el màxim de classes.

Rang de temp.	o_i	o_i acum.	e_i	e_i acum.
menys de 1.95	2		0.54	
1.95—2.45	1		2.13	
2.45—2.95	4	7	5.92	8.59
2.95—3.45	15	15	10.29	10.29
3.45—3.95	10	10	10.67	10.67
3.95—4.45	5		6.97	
més de 4.45	3	8	3.48	10.45

Exemple 2

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Calculem l'estadístic de contrast amb les freqüències acumulades ($k = 4$ classes)

$$\begin{aligned}\chi_0 &= \frac{(7 - 8.59)^2}{8.59} + \frac{(15 - 10.29)^2}{10.29} \\ &\quad + \frac{(10 - 10.67)^2}{10.67} + \frac{(8 - 10.45)^2}{10.45} = 3.067\end{aligned}$$

El p-valor és

$$P(\chi_3^2 \geq 3.067) = \text{entre } 0.35 \text{ i } 0.4$$

No hi ha evidència que els augments de temperatures observats no segueixin la llei normal esmentada.

Exemple 2 amb R

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

```
> freq.abs.obs=c(2,1,4,15,10,5,3)
> n=sum(freq.abs.obs)
> lim.esq=c(-Inf,1.95+0.5*(0:5))
> lim.dret=c(1.95+0.5*(0:5),Inf)
> mu=3.5
> sigma=0.7
> prob.esp=pnorm(lim.dret,mu,sigma)
  -pnorm(lim.esq,mu,sigma)
> freq.abs.esp=n*prob.esp
> round(freq.abs.esp,2)
[1] 0.54 2.14 5.97 10.22 10.73 6.91 3.49
```

Exemple 2 amb R

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

```
> chisq.test(freq.abs.obs,p=prob.esp)
```

Chi-squared test for given probabilities

```
data:  freq.abs.obs
```

```
X-squared = 8.1337, df = 6, p-value = 0.2285
```

Warning message:

```
In chisq.test(freq.abs.obs, p = prob.esp) :
```

```
Chi-squared approximation may be incorrect
```

R ens avisa que hi ha freqüències esperades inferiors a 5, i que per tant l'aproximació de l'estadístic del test a la distribució χ^2 pot no ser correcta

Exemple 2 amb R

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Agrupem (ho haurem de fer a mà)

```
> freq.abs.obs.agrup=c(sum(freq.abs.obs[1:3]),  
  freq.abs.obs[4:5],sum(freq.abs.obs[6:7]))  
> prob.esp.agrup=c(sum(prob.esp[1:3]),  
  prob.esp[4:5],sum(prob.esp[6:7]))  
> chisq.test(freq.abs.obs.agrup,p=prob.esp.agrup)
```

Chi-squared test for given probabilities

data: freq.abs.obs.agrup

X-squared = 3.1531, df = 3, p-value = 0.3686

Test χ^2 amb paràmetres poblacionals desconeguts

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

De vegades ens interessarà contrastar si les observacions segueixen algun tipus determinat de distribució (Poisson, normal, ...) amb algun paràmetre indeterminat

En aquest cas, estimam el paràmetre a partir de les observacions

El test és exactament el mateix, excepte que alguns autors recomanen que al nombre de graus de llibertat de la χ^2 li restem el nombre de paràmetres que estimam. Nosaltres seguirem aquesta recomanació.

Exemple 3

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Es vol determinar si el nombre de vegades que apareix la seqüència GATACA en una cadena d'ADN de longitud 1000 segueix una llei Poisson

Es prenen diverses mostres de cadenes d'ADN de longitud 1000 i s'hi compten els nombres de GATACA

nombre x_i de vegades que hi apareix GATACA	0	1	2	3	4	5
frequència o_i	229	211	93	35	7	1

Hem fet $n = 229 + 211 + 93 + 35 + 7 + 1 = 576$ observacions

Exemple 3

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Volem realitzar el contrast

$$\begin{cases} H_0 : \text{La mostra prové d'una distribució } Po(\lambda) \\ H_1 : \text{La mostra no prové d'aquesta distribució} \end{cases}$$

Necessitam estimar el paràmetre λ .

Exemple 3

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

λ és el valor esperat d'una v.a. $Po(\lambda)$. El podem estimar amb la mitjana mostral:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{229 \cdot 0 + 211 \cdot 1 + 93 \cdot 2 + 35 \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 1 \cdot 5}{229 + 211 + 93 + 35 + 7 + 1} \\ &= \frac{535}{576} = 0.929\end{aligned}$$

Exemple 3

Ara calculam les probabilitats i les freqüències teòriques.
Recordem que, si X és una v.a. de Poisson,

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

x_i	0	1	2	3	4	5
o_i	229	211	93	35	7	1
p_i	0.395	0.367	0.170	0.053	0.012	0.002
$e_i = p_i \cdot n$	227.49	211.34	98.17	30.40	7.06	1.31

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Exemple 3

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Ara calculam les probabilitats i les freqüències teòriques.
Recordem que, si X és una v.a. de Poisson,

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

x_i	0	1	2	3	4	5
o_i	229	211	93	35	7	1
p_i	0.395	0.367	0.170	0.053	0.012	0.002
$e_i = p_i \cdot n$	227.49	211.34	98.17	30.40	7.06	1.31

No està bé! Recordau que les classes han de cobrir tots els resultats possibles!

Canviarem el 5 per “5 o més”

Exemple 3

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

X_j	0	1	2	3	4	≥ 5
o_j	229	211	93	35	7	1
p_i	0.395	0.367	0.170	0.053	0.012	0.003
$e_i = p_i \cdot n$	227.49	211.34	98.17	30.40	7.06	1.55

on $P(X \geq 5) = 1 - (P(X = 0) + \dots + P(X = 4))$

Hi ha freqüències esperades petites: agruparem les dues últimes columnes.

Exemple 3

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

x_i	0	1	2	3	4	≥ 5
o_i	229	211	93	35	7	1
p_i	0.395	0.367	0.170	0.053	0.012	0.003
$e_i = p_i \cdot n$	227.49	211.34	98.17	30.40	7.06	1.55

on $P(X \geq 5) = 1 - (P(X = 0) + \dots + P(X = 4))$

Hi ha freqüències esperades petites: agruparem les dues últimes columnes.

x_i	0	1	2	3	≥ 4
o_i	229	211	93	35	8
p_i	0.395	0.367	0.170	0.053	0.015
$e_i = p_i \cdot n$	227.49	211.34	98.17	30.40	8.61

Exemple 3

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

El nombre k de classes és 5, el nombre m de paràmetres estimats és 1, per tant considerarem que l'estadístic de contrast té distribució χ_3^2 .

El valor de l'estadístic és

$$\chi_0 = \sum_{i=1}^5 \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} = 1.02$$

El p-valor és

$$P(\chi_3^2 \geq 1.02) = 0.796$$

Per tant no podem rebutjar que les observacions trobades no segueixin una llei de Poisson. Això significa que no hi ha evidència que les aparicions de GATACA en cadenes d'ADN de longitud 1000 no siguin aleatòries.

Exemple 3 amb R

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Ja prenem les dades agrupades

```
> freq.obs=c(229,211,93,35,8)
> probs=c(dpois(0:3,0.929),1-ppois(3,0.929))
> chisq.test(freq.obs,p=probs)
```

Chi-squared test for given probabilities

```
data:  freq.obs
```

```
X-squared = 1.0215, df = 4, p-value = 0.9065
```

Exemple 3 amb R

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Ja prenem les dades agrupades

```
> freq.obs=c(229,211,93,35,8)
> probs=c(dpois(0:3,0.929),1-ppois(3,0.929))
> chisq.test(freq.obs,p=probs)
```

Chi-squared test for given probabilities

```
data:  freq.obs
```

```
X-squared = 1.0215, df = 4, p-value = 0.9065
```

R ha calculat el p-valor prenent χ_4^2 (no sap que hem estimat un paràmetre), nosaltres el calculam amb χ_3^2

```
> 1-pchisq(1.0215,3)
[1] 0.7960498
```

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

El **test de Kolgomorov-Smirnov** (K-S) serveix per contrastar si una mostra segueix o no una distribució contínua, sense restriccions sobre la mida de la mostra

Es pot emprar amb tota distribució contínua completament especificada

Per a distribucions concretes, mides de mostres concretes o quan estimam els paràmetres, existeixen tests específics millors, però no els veurem aquí (sí amb R)

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Partim d'una mostra x_1, x_2, \dots, x_n , amb tots els valors diferents, i volem contrastar si ha estat produïda per una variable X amb distribució F_X .

(1) Ordenam la mostra: $x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(n)}$

(2) Calculam la funció de distribució mostral F_n d'aquesta mostra, com si cada $x_{(i)}$ tingués probabilitat $1/n$

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n} & \text{si } x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} \\ 1 & \text{si } x_{(n)} \leq x \end{cases}$$

Test K-S

Bondat d'ajust


Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

(3) Comparam $F_n(x)$ amb $F_X(x)$. Si són molt diferents, podem rebutjar que la mostra prové de la variable X



Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció


Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

(3) Calculam $\sup\{|F_n(x) - F_X(x)| \mid x \in \mathbb{R}\}$. Com que F_X és creixent, aquest suprem s'assoleix al voltant de qualche escaló.



Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

(3) Per fer-ho, calculam, per a cada $x_{(i)}$, la **discrepància**

$$\begin{aligned} D_n(x_{(i)}) &= \max\{|F_X(x_{(i)}) - F_n(x_{(i)}^-)|, |F_X(x_{(i)}) - F_n(x_{(i)})|\} \\ &= \max\left\{\left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i-1}{n}\right|, \left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i}{n}\right|\right\} \end{aligned}$$

(recordau $F(a^-) = \lim_{t \rightarrow a^-} F(t)$)

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

(3) ... i prenem la **discrepància màxima**

$$D_n = \max\{D_n(x_{(h)}) \mid h = 1, \dots, n\}$$

Aquesta discrepància màxima segueix una distribució coneguda (que no depèn de la X mentre sigui contínua) que permet calcular regions de rebuig i p-valors

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Exemple: Volem decidir si els valors

5.84, 4.57, 1.34, 3.58, 1.54, 2.25

provenen d'una distribució normal amb $\mu = 3$ i $\sigma = 1.5$.

Volem fer el contrast

$$\begin{cases} H_0 : \text{aquesta mostra prové d'una } X \sim N(3, 1.5) \\ H_0 : \text{aquesta mostra no prové d'una } X \sim N(3, 1.5) \end{cases}$$

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Ordenam la mostra: $x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(n)}$

Exemple: Ordenam 5.84, 4.57, 1.34, 3.58, 1.54, 2.25

```
> x=c(5.84,4.57,1.34,3.58,1.54,2.25)
```

```
> sort(x)
```

```
[1] 1.34 1.54 2.25 3.58 4.57 5.84
```

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Calculam la **funció de distribució mostral** F_n d'aquesta mostra com si cada $x_{(i)}$ tingués probabilitat $1/n$

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n} & \text{si } x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} \\ 1 & \text{si } x_{(n)} \leq x \end{cases}$$

Exemple: Ordenats 1.34, 1.54, 2.25, 3.58, 4.57, 5.84:

$$F_6(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1.34 \\ 1/6 & \text{si } 1.34 \leq x < 1.54 \\ 2/6 & \text{si } 1.54 \leq x < 2.25 \\ 3/6 & \text{si } 2.25 \leq x < 3.58 \\ 4/6 & \text{si } 3.58 \leq x < 4.57 \\ 5/6 & \text{si } 4.57 \leq x < 5.84 \\ 1 & \text{si } 5.84 \leq x \end{cases}$$

Test K-S

Bondat d'ajust


Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència



Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

Calculam la **discrepància** de cada observació $x_{(i)}$

$$D_n(x_{(i)}) = \max\left\{\left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i-1}{n}\right|, \left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i}{n}\right|\right\}$$

Exemple: Ordenats 1.34, 1.54, 2.25, 3.58, 4.57, 5.84;

```
> round(pnorm(sort(x), 3, 1.5), 3)
```

```
[1] 0.134 0.165 0.309 0.650 0.852 0.971
```

$$\begin{aligned} D_6(x_{(1)}) &= \max\{|F_X(1.34) - 0|, |F_X(1.34) - 1/6|\} \\ &= \max\{|0.134 - 0|, |0.134 - 1/6|\} \\ &= \max\{0.134, 0.033\} = 0.134 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_6(x_{(2)}) &= \max\{|F_X(1.54) - 1/6|, |F_X(1.54) - 2/6|\} \\ &= \max\{|0.165 - 1/6|, |0.165 - 2/6|\} \\ &= \max\{0.002, 0.168\} = 0.168 \end{aligned}$$

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

Calculam la **discrepància** de cada observació $x_{(i)}$

$$D_n(x_{(i)}) = \max\left\{\left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i-1}{n}\right|, \left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i}{n}\right|\right\}$$

Exemple: Ordenats 1.34, 1.54, 2.25, 3.58, 4.57, 5.84;

```
> round(pnorm(sort(x), 3, 1.5), 3)
```

```
[1] 0.134 0.165 0.309 0.650 0.852 0.971
```

$$\begin{aligned} D_6(x_{(3)}) &= \max\{|F_X(2.25) - 2/6|, |F_X(2.25) - 3/6|\} \\ &= \max\{|0.309 - 2/6|, |0.309 - 3/6|\} \\ &= \max\{0.024, 0.191\} = 0.191 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_6(x_{(4)}) &= \max\{|F_X(3.58) - 3/6|, |F_X(3.58) - 4/6|\} \\ &= \max\{|0.65 - 3/6|, |0.65 - 4/6|\} \\ &= \max\{0.15, 0.017\} = 0.15 \end{aligned}$$

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de Pearson

Test χ^2 amb paràmetres desconeguts

Test K-S

Independència

Calculam la **discrepància** de cada observació $x_{(i)}$

$$D_n(x_{(i)}) = \max\left\{\left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i-1}{n}\right|, \left|F_X(x_{(i)}) - \frac{i}{n}\right|\right\}$$

Exemple: Ordenats 1.34, 1.54, 2.25, 3.58, 4.57, 5.84;

```
> round(pnorm(sort(x),3,1.5),3)
```

```
[1] 0.134 0.165 0.309 0.650 0.852 0.971
```

$$\begin{aligned} D_6(x_{(5)}) &= \max\{|F_X(4.57) - 4/6|, |F_X(4.57) - 5/6|\} \\ &= \max\{|0.852 - 4/6|, |0.852 - 5/6|\} \\ &= \max\{0.185, 0.019\} = 0.185 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_6(x_{(6)}) &= \max\{|F_X(5.84) - 5/6|, |F_X(5.84) - 6/6|\} \\ &= \max\{|0.971 - 5/6|, |0.971 - 1|\} \\ &= \max\{0.138, 0.029\} = 0.138 \end{aligned}$$

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Definim l'estadístic D_n com la discrepància més gran:

$$D_n = \max\{D_n(x_{(h)}) \mid h = 1, \dots, n\}$$

Exemple:

$$\begin{aligned} D_6 &= \max\{0.134, 0.168, 0.191, 0.15, 0.185, 0.138\} \\ &= 0.191 \end{aligned}$$

Test K-S

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

La **regla de decisió** és rebutjar H_0 al nivell α si

$$D_n \geq D_{n,\alpha}$$

on $D_{n,\alpha}$ és el α -quantil de la distribució del test K-S (teniu les taules a Campus Extens)

Exemple: Si prenem $\alpha = 0.05$, tenim que $D_{6,0.05} = 0.521$. Com que $0.191 < 0.521$, no podem rebutjar que la mostra provingui d'una variable $N(3, 1.5)$.

Amb R

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Per realitzar un test K-S amb R, tenim la instrucció

```
ks.test(x,"distribució",paràmetres)
```

on x és el vector que analitzam, la distribució és la distribució que contrastam, i els paràmetres són els de la distribució.

Exemple:

```
> x=c(5.84,4.57,1.34,3.58,1.54,2.25)
```

```
> ks.test(x,"pnorm",3,1.5)
```

```
One-sample Kolmogorov-Smirnov test
```

```
data: x
```

```
D = 0.1915, p-value = 0.95
```

```
alternative hypothesis: two-sided
```

Dóna el valor de l'estadístic, i un p-valor amb el significat usual

Test K-S-Lilliefors

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Quan es fa el test K-S per contrastar si una mostra prové d'una distribució **normal amb μ i σ desconegudes**, es recomana

- Estimar els paràmetres de la normal a partir de la mostra
- Calcular l'estadístic del test K-S amb aquests paràmetres
- Emprar a la decisió els α -quantils $D'_{n,\alpha}$ de la distribució del **test K-S-Lilliefors** (teniu la taules a Campus Extens)

Test K-S-Lilliefors

Bondat d'ajust

Introducció

Test χ^2 de PearsonTest χ^2 amb paràmetres
desconeguts

Test K-S

Independència

Amb R, és la funció `lillie.test` del paquet `nortest`

Exemple:

```
> install.packages("nortest",dep=TRUE)
...
> library(nortest)
> x=c(5.84,4.57,1.34,3.58,1.54,2.25)
> lillie.test(x)
      Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality
      test
data:  x
D = 0.1991, p-value = 0.6425
```

Test χ^2 d'independència en taules de contingència

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Tenim una taula de contingència que ens dona les freqüències absolutes conjuntes de dues característiques X i Y d'una població. Volem contrastar si aquestes dues característiques són variables aleatòries independents o no.

Exemple 5

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

En un estudi d'una vacuna d'hepatitis hi participen 1083 voluntaris. D'aquests, es trien aleatòriament 549 i són vacunats. Els altres, 534, no són vacunats. Després d'un cert temps, s'observa que 70 dels 534 no vacunats han agafat l'hepatitis, mentre que només 11 dels 549 vacunats l'han agafada.

	Vacunat?	
Emmalaltí?	Sí	No
Sí	11	70
No	538	464

És el fet de contreure hepatitis independent d'haver estat vacunat contra la malaltia?

Exemple 5

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

	Vacunat?	
Emmalaltí?	Sí	No
Sí	11	70
No	538	464

És el fet de contreure hepatitis independent d'haver estat vacunat contra la malaltia?

En aquest cas 2×2 és un contrast de proporcions per a dues mostres independents:

$$\begin{cases} H_0 : p_{\text{Vacunats}} = p_{\text{No vacunats}} \\ H_1 : p_{\text{Vacunats}} \neq p_{\text{No vacunats}} \end{cases}$$

Però en general ...

Test χ^2 d'independència

Considerem dues característiques X i Y d'una població que poden prendre els valors X_1, \dots, X_I i Y_1, \dots, Y_J .

Donam en una taula les freqüències absolutes de cada combinació de valors (X_a, Y_b) en una mostra aleatòria de mida n

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	\dots	Y_j	\dots	Y_J	$n_{i\bullet}$
X_1	n_{11}	n_{12}	\dots	n_{1j}	\dots	n_{1J}	$n_{1\bullet}$
X_2	n_{21}	n_{22}	\dots	n_{2j}	\dots	n_{2J}	$n_{2\bullet}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
X_i	n_{i1}	n_{i2}	\dots	n_{ij}	\dots	n_{iJ}	$n_{i\bullet}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
X_I	n_{I1}	n_{I2}	\dots	n_{Ij}	\dots	n_{IJ}	$n_{I\bullet}$
$n_{\bullet j}$	$n_{\bullet 1}$	$n_{\bullet 2}$	\dots	$n_{\bullet j}$	\dots	$n_{\bullet J}$	n

Exemple 5

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

$E \backslash V$	V_1	V_2	$n_{i\bullet}$
E_1	11	70	81
E_2	538	464	1002
$n_{\bullet j}$	549	534	1083

Test χ^2 d'independència

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

$$\begin{cases} H_0 : \text{Les variables } X \text{ i } Y \text{ són independents} \\ H_1 : \text{Les variables } X \text{ i } Y \text{ no són independents} \end{cases}$$

Si diem

$$\begin{aligned} p_{ij} &= P(X = X_i, Y = Y_j) \\ p_i &= P(X = X_i) \quad p_j = P(Y = Y_j) \end{aligned}$$

el test d'independència equival a contrastar

$$\begin{cases} H_0 : p_{ij} = p_i \cdot p_j \text{ per a tots } 1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J \\ H_1 : \text{no totes aquestes igualtats són veritat} \end{cases}$$

Test χ^2 d'independència

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Emprarem l'estadístic

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{\left(n_{ij} - \frac{n_{i\bullet} \cdot n_{\bullet j}}{n}\right)^2}{\frac{n_{i\bullet} \cdot n_{\bullet j}}{n}}$$

que compara cada **freqüència observada** n_{ij} amb la **freqüència esperada** si les variables fossin independents

$$\frac{n_{i\bullet}}{n} \cdot \frac{n_{\bullet j}}{n} \cdot n = \frac{n_{i\bullet} \cdot n_{\bullet j}}{n}$$

Si n és gran i cada freqüència esperada $\frac{n_{i\bullet} \cdot n_{\bullet j}}{n}$ és ≥ 5 , aquest estadístic segueix aproximadament una llei χ^2 amb $(I - 1) \cdot (J - 1)$ graus de llibertat

Test χ^2 d'independència

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Com sempre, si χ_0 és el valor que pren l'estadístic de contrast, el **p-valor** del contrast és

$$P(\chi_{(I-1) \cdot (J-1)}^2 \geq \chi_0),$$

amb el significat usual

Exemple 5

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

$E \backslash V$	V_1	V_2	$n_{i\bullet}$
E_1	11	70	81
E_2	538	464	1002
$n_{\bullet j}$	549	534	1083

Freqüències esperades

$$\frac{n_{1\bullet} \cdot n_{\bullet 1}}{n} = \frac{81 \cdot 549}{1083} = 41.06$$

$$\frac{n_{1\bullet} \cdot n_{\bullet 2}}{n} = \frac{81 \cdot 534}{1083} = 39.94$$

$$\frac{n_{2\bullet} \cdot n_{\bullet 1}}{n} = \frac{1002 \cdot 549}{1083} = 507.94$$

$$\frac{n_{2\bullet} \cdot n_{\bullet 2}}{n} = \frac{1002 \cdot 534}{1083} = 494.06$$

Exemple 5

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Estadístic:

$$\begin{aligned}\chi_0 &= \frac{(11 - 41.06)^2}{41.06} + \frac{(70 - 39.94)^2}{39.94} \\ &\quad + \frac{(538 - 507.94)^2}{507.94} + \frac{(464 - 494.06)^2}{494.06} \\ &= 48.24\end{aligned}$$

p-valor:

$$P(\chi_1^2 \geq 48.24) < 0.05$$

Per tant podem rebutjar la hipòtesi nul·la: vacunar-se i emmalaltir no són independents

Exemple 6

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Un investigador vol saber si el nombre de cries per lloba és independent de la zona on visqui

Considera 3 zones (X): X_1 = "Nord", X_2 = "Centre" i X_3 = "Sud"

Classifica els nombres de cries (Y) en Y_1 = "Dos o menys", Y_2 = "Entre tres i cinc", Y_3 = "Entre sis i vuit" i Y_4 = "Nou o més"

Exemple 6

Pren una mostra de 200 llobes i obté la taula següent:

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	$n_{i\bullet}$
X_1	5	8	15	22	50
X_2	20	26	46	8	100
X_3	15	10	15	10	50
$n_{\bullet j}$	40	44	76	40	200

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Exemple 6

Pren una mostra de 200 llobes i obté la taula següent:

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	$n_{i\bullet}$
X_1	5	8	15	22	50
X_2	20	26	46	8	100
X_3	15	10	15	10	50
$n_{\bullet j}$	40	44	76	40	200

Les freqüències esperades si les variables són independents són

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	$n_{i\bullet}$
X_1	10	11	19	10	50
X_2	20	22	38	20	100
X_3	10	11	19	10	50
$n_{\bullet j}$	40	44	76	40	200

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Exemple 6

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Volem fer el contrast

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0 : \text{El nombre de cries per lloba és independent} \\ \quad \text{de la zona} \\ H_1 : \text{El nombre de cries per lloba no és independent} \\ \quad \text{de la zona} \end{array} \right.$$

Empram l'estadístic de contrast

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \frac{(\text{freq.obs}_{ij} - \text{freq.esp}_{ij})^2}{\text{freq.esp}_{ij}}$$

χ^2 segueix una llei χ^2 amb $(3 - 1) \cdot (4 - 1) = 6$ graus de llibertat.

Exemple 6

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Calculam el valor de l'estadístic

$$\chi_0 = \dots = 31.6$$

Calculam el p-valor

$$P(\chi_6^2 \geq 31.6) < 0.05$$

Per tant rebutjam la hipòtesi nul·la, i concloem que el nombre de cries per lloba és dependent de la zona on visqui.

Exemple 6

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Podem emprar la funció `chisq.test`, però hi hem d'entrar la taula en format `table`:

```
> dades = as.table(matrix(c(5,8,15,22,20,26,46,
  8,15,10,15,10),nrow=4,byrow=TRUE))
> dades
      A  B  C  D
A    5  8 15 22
B   20 26 46  8
C   15 10 15 10
> chisq.test(dades)
      Pearson's Chi-squared test
data: dades
X-squared = 31.6048, df = 6, p-value =1.942e-05
```

El p -valor és molt petit, rebutjam la hipòtesi nul·la

Contrast d'homogeneïtat

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

Tenim una taula de contingència que ens dona les freqüències absolutes conjuntes de dues característiques X i Y d'una població. Volem contrastar si, per a cada valor de X , les proporcions dels valors de Y són les mateixes o no.

Exemple: En el nostre exemple de la vacuna

	Vacunat?	
Emmalaltí?	Sí	No
Sí	11	70
No	538	464

volem determinar si la proporció de malalts és la mateixa entre els vacunats que entre els que no estan vacunats

Contrast d'homogeneïtat

Bondat d'ajust

Independència

Test χ^2

Homogeneïtat

És exactament el mateix test que el d'independència (si les variables són independents, les proporcions no variaran segons la filera o segons la columna)

Però el disseny de l'experiment sol ser diferent: usualment, l'experimentador tria *a priori* el nombre d'unitats experimentals per a cada valor X_i de X (és el que hem fet a l'exemple de les vacunes, però no el que hem fet a l'exemple dels llops)