



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	KEJANG PADA NEONATUS		
	No. Dokumen 0066 /SPO/ 14/II/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Februari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Tata laksana penanganan kejang pada neonatus.		
TUJUAN	1. Mencegah terjadinya kejang berulang 2. Mencegah morbiditas dan mortalitas		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal		
PROSEDUR	1. Lakukan cuci tangan 2. Identifikasi pasien 3. Pakai alat perlindungan diri 4. Perbaiki sirkulasi udara 5. Baringkan bayi di tempat yang datar dengan posisi miring, kaki bagian atas ditekuk untuk mencegah bahaya tersedak ludah atau muntahan 6. Letakkan bantal atau selimut di bawah kepala bayi 7. Longgarkan pakaian yang ketat 8. Berikan phenobarbital 20 mg/kg BB (5 menit) IV/IM 9. Berikan phenobarbital diulang 10mg/kg BB sebanyak 2X(jarak 30 menit) maksimal 40mg/BB/hari jika tidak ada IV/IM (10-15) 10. Berikan fenitoin 20mg/kg BB IV dalam larutan garam fisiologis 1mg/kg BB/menit 11. Lakukan cuci tangan setelah tindakan 12. Dokumentasikan di RM (Rekam Medis)		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	KEJANG PADA NEONATUS		
	No. Dokumen 0066 /SPO/ 14/II/2016	Revisi 0	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. IGD PONEK2. Perinatal3. Mina		