



<p>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</p> 	<p>PENANGANAN HIPOTERMI</p>		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>No. Dokumen 0067 /SPO/ 14/II/2016</p>	<p>Revisi 0</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : 16 Februari 2016</p> <p>Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan</p> <p>drg. Said Hassan, M.Kes</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Memberikan penanganan pada bayi dengan suhu tubuh di bawah 36,5°C, pengukuran dilakukan diketiak dilakukan selama 3-5 menit (depkes)</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<p>1. Untuk mencegah terjadinya hipotermi pada bayi baru lahir.</p> <p>2. Untuk menangani kasus hipotermi</p> <p>3. Untuk mencegah komplikasi pada kasus hipotermi</p>		
<p>PROSEDUR</p>	<p>Surat keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci tangan 2. Identifikasi pasien 3. Memakai Alat Perlindungan Diri 4. Langkah <i>promotif/preventif</i> <ol style="list-style-type: none"> a. segera keringkan bayi b. Segera selimuti bayi dari seluruh tubuhnya dan di beri topi c. Jangan memandikan bayi sebelum berumur 12 jam d. Rawat bayi diruang yang hangat(tidak kurang dari 25°C dan bebas dari aliran dingin) e. Resusitasi dalam lingkungan yang hangat f. Lakukan <i>skin to skin contact</i> g. Pemberian ASI dini h. Rawat gabung i. Transposisi dalam lingkungan yang hangat 5. Asuhan bayi hipotermi 		

<p>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</p> 	<p>PENANGANAN HIPOTERMI</p>		
	<p>No. Dokumen 0067 /SPO/ 14/II/2016</p>	<p>Revisi 0</p>	<p>Halaman 2/2</p>
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat dan kering, memakai topi dan selimut hangat. b. Bila ada ibu/ibu mengganti, anjurkan menghangatkan bayi dengan melakukan kontak kulit dan kulit(MK). c. Periksa ulang suhu bayi 1 jam kemudian, bila suhu naik pada batas normal(36,5°C-37,5°C) berarti usaha menghangatkan berhasil. d. Anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering, bila tidak dapat menyusui berikan ASI peras. e. Jika telah menghangatkan setelah 1 jam tidak ada kenaikan suhu(membalik) f. Bila bayi tidak dapat minum g. Terdapat gangguan nafas atau kejang h. Bila disertai salah satu tanda mengantuk/letargis atau bagian tubuh yang mengeras. i. Rujuk apabila terdapat atau salah satu keadaan dibawah ini: j. Bila suhu tetap dalam batas normal dan bayi dapat minum dengan baik serta tidak ada masalah, bayi tidak usah di rujuk. Nasehatkan ibu cara merawat bayi melek <ol style="list-style-type: none"> 6. Cuci tangan 7. Dokumentasi 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perinatal 2. Mina 		