


<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	<div>PENATALAKSANAAN PERITONITIS</div>		
	<div>No. Dokumen</div> <div>0049 /SPO/ 14/II/2016</div>	<div>Revisi</div> <div>0</div>	<div>Halaman</div> <div>1/1</div>
<div>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</div>	<div>Tanggal Terbit :</div> <div>16 Februari 2016</div>	<div>Ditetapkan</div> <div>Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan</div> <div> drg. Said Hassan, M.Kes</div>	
<div>PENGERTIAN</div>	<div>Suatu tindakan yang diberikan untuk mengatasi komplikasi pada masa nifas karena radang pada peritoneum.</div>		
<div>TUJUAN</div>	<div>Mencegah terjadinya komplikasi lanjut pada masa nifas</div>		
<div>KEBIJAKAN</div>	<div>Surat Keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal</div>		
<div>PROSEDUR</div>	<div>Penanganan</div> <div><div>1. Lakukan cuci tangan</div><div>2. Perkenalkan diri dan identifikasi pasien</div><div>3. Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan</div><div>4. Pakai alat perlindungan diri (APD)</div><div>5. Pasang infus cairan RL</div><div>6. Berikan antibiotika kombinasi, sampai 48 jam bebas panas : ampisilin 2 g I.V setiap 6 jam, ditambah gentamisin 5 mg/kgBB I.V tiap 24 jam, ditambah metrinidazol 500 mg I.V tiap 8 jam</div><div>7. Lakukan laparotomy (jika perlu) untuk drainase.</div><div>8. Lakukan cuci tangan</div><div>9. Dokumentasi</div></div>		
<div>UNIT TERKAIT</div>	<div>Kamar Bersalin</div>		