




<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PENATALAKSANAAN ANESTESI PADA PASIEN DENGAN HIPERTENSI																							
	No. Dokumen 0012/SPO/04/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/3																					
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes																						
PENGERTIAN	Pemilihan teknik dan obat anestesi yang aman diberikan pada pasien dengan hipertensi.																							
TUJUAN	Mencegah peningkatan fluktuasi tekanan darah selama induksi anestesi dan tindakan intubasi serta mencegah kejadian iskemia perioperative.																							
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0026.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.																							
PROSEDUR	<div>1. Evaluasi klinis pasien<div>a. Penyebab hipertensi</div><div>b. Koreksi adanya disfungsi kardiovaskuler, neurovaskuler diseases</div><div>c. Pengobatan hipertensi</div><div>d. Pemeriksaan lain : elektrolit, BUN, Creatinin, CBC, ECG, Chest Film</div></div> <div>2. Premedikasi :<table><tr><th>Nama obat</th><th>Dosis (mg/kgbb)</th><th>Dosis max (mg)</th></tr><tr><td>KLONIDIN</td><td>3- 5,5 mcg / kgBB</td><td></td></tr><tr><td>DORMICUM</td><td>0,1 – 0,2</td><td>10</td></tr><tr><td>VALIUM</td><td>0,1 - 0,25</td><td>10</td></tr><tr><td>MORFIN</td><td>0,5 – 0,34</td><td>5</td></tr><tr><td>PETHIDIN</td><td>0,5 – 1</td><td>3 mg</td></tr><tr><td>FENTANYL</td><td>1-5 mcg / kgBB</td><td>6 mcg</td></tr></table><div>Premedikasi yang diberikan 15 menit sebelum induksi.</div><div>Dapat juga diberikan nifedipin titrasi 0,5 mg, observasi bila masih hipertensi dapat diberikan ulang.</div></div>			Nama obat	Dosis (mg/kgbb)	Dosis max (mg)	KLONIDIN	3- 5,5 mcg / kgBB		DORMICUM	0,1 – 0,2	10	VALIUM	0,1 - 0,25	10	MORFIN	0,5 – 0,34	5	PETHIDIN	0,5 – 1	3 mg	FENTANYL	1-5 mcg / kgBB	6 mcg
Nama obat	Dosis (mg/kgbb)	Dosis max (mg)																						
KLONIDIN	3- 5,5 mcg / kgBB																							
DORMICUM	0,1 – 0,2	10																						
VALIUM	0,1 - 0,25	10																						
MORFIN	0,5 – 0,34	5																						
PETHIDIN	0,5 – 1	3 mg																						
FENTANYL	1-5 mcg / kgBB	6 mcg																						

<p>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</p> 	<p align="center">PENATALAKSANAAN ANESTESI PADA PASIEN DENGAN HIPERTENSI</p>		
	<p>No. Dokumen</p> <p>0012/SPO/04/I/2016</p>	<p>Revisi</p> <p>0</p>	<p>Halaman</p> <p>2/3</p>
	<p>3. Induksi</p> <p>Pemberian obat-obat anestesi sampai stadium III (stadium bedah).Obat – obat yang diberikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Profopofol : 2 – 2,5 mg / kg BB Tiopental : 3 – 5 mg / kg BB Fentanyl : 1 mcg/kgbb, Pethidin : 1 mg/kgbb Masukan MR sesuaidosis <p>4. Intubasi (deep intubation)</p> <ol style="list-style-type: none"> Berikan ventilasi positif 1 - 2 menit dengan gas / volatil agent Masukan lidokain 2% IV 1 - 2 mg / kgBB atau lidokain 4% spray 0,07 – 0,1cc/kgbb, tunggu 1 – 2 menit Masukanporpofol 100 mg bolus ataupenthotal 100 mg Lakukanintubasi <p>5. Maintenance</p> <ol style="list-style-type: none"> Inhalasi : <ol style="list-style-type: none"> Gas anestesi N2O : O2 dengan perbandingan sesuai klinis pasien Volatil agent : 1 MAC ,sesuaikan dengan klinis pasien. (hati-hati interaksi Halothane dengan obat anti hipertensi) Analgetiknarkotik Cairan : lihatprotapcairan Monitoring <ol style="list-style-type: none"> H R < 100 x / menit Penurunantekanandarahtidakbolehlebihdari 20% Pulse oksimeteratauobservasiwarnakulit Palpasinadi, capilery refill Intake – output Jumlahperdarahan <p>6. Pengakhirananestesi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelangakhiroperasidosis muscle relaksan di kurangi Prostigmin + Sulfas atropin dengan perbandingan dosis 2 : 1 		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PENATALAKSANAAN ANESTESI PADA PASIEN DENGAN HIPERTENSI		
	No. Dokumen 0012/SPO/04/I/2016	Revisi 0	Halaman 3/3
	<p>c. Cegah straining akibat adanya endotracheal tube</p> <p>d. Hipertensi dpt diterapi dengan trimethapan (2- 2,5 mg) atau lidokain 2% (1 – 1,5 mg) sebelum ekstubasi.</p> <p>e. Ekstubasi dalam</p>		
UNIT TERKAIT	<p>1. Unit Kerja Kamar Operasi</p> <p>2. Instalasi Rawat Inap</p>		