



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENATALAKSANAAN ENDOMETRITIS		
	No. Dokumen 0061 /SPO/ 14/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Prosedur untuk mengatasi infeksi endometrium pada masa nifas.		
TUJUAN	Mencegah terjadinya komplikasi lanjut pada masa nifas		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal		
PROSEDUR	Penanganan 1. Lakukan cuci tangan 2. Perkenalkan diri dan identifikasi pasien 3. Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan 4. Pakai alat perlindungan diri (APD) 5. Siapkan transfusi darah jika ada perdarahan 6. Berikan antibiotik kombinasi sampai ibu bebas demam selama 48 jam: ampicilin 2 g I.V setiap 6 jam, ditambah gentamisin 5mg/kg berat badan lewat intra vena (I.V) tiap 24 jam, ditambah metronidazol 500 mg I.V tiap 8 jam 7. Kaji ulang diagnosis apabila terjadi demam dalam 72 jam setelah terapi 8. Lakukan eksplorasi digital dan keluarkan bekuan darah serta sisa kotiledon apabila diduga ada sisa plasenta, gunakan forceps ovum atau kuret besar jika perlu 9. Lakukan histerotomi total apabila uterus terinfeksi dan nekrotik 10. Lakukan cuci tangan setelah tindakan		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PENATALAKSANAAN ENDOMETRITIS		
	No. Dokumen 0061 /SPO/ 14/III/2016	Revisi 0	Halaman 2/2
	11. Lakukan dokumentasi di RM (Rekam Medis)		
UNITTERKAIT	Kamar Bersalin		