

Berdasarkan hasil statistik yang muncul, nilai rata-rata (**mean**) ada di **26,26 °C** dan nilai tengah (**median**) di **26,87 °C** . Ini menandakan bahwa baseline suhu wilayah Jabodetabek pada periode tersebut berpusat di kisaran **26–27 °C** .

Nilai minimum (~0 °C) merupakan sisa objek air/bayangan, sedangkan nilai maksimum yang mencapai >60 °C berasal dari permukaan lahan terbuka atau atap bangunan (*bare land/roofs*).

Panduan Klasifikasi Suhu (Untuk Bang Ferdi)

Berikut draf tabel klasifikasi 5 kelas yang dirancang dengan menempatkan nilai **mean** & **median** di kelas tengah (Sedang), serta memotong area suhu tinggi (≥ 32 °C) untuk mendeteksi potensi *Urban Heat Island* (UHI) .

Kelas 	Rentang Suhu (°C) 	Kategori 	Kode Warna (Hex) 
Kelas 1	< 22,0	Sangat Sejuk	#0000FF (Biru )
Kelas 2	22,0 – 25,0	Sejuk	#00FFFF (Sian )
Kelas 3	25,0 – 28,0	Sedang	#FFFF00 (Kuning )
Kelas 4	28,0 – 32,0	Panas	#FFA500 (Oranye )
Kelas 5	$\geq 32,0$	Sangat Panas	#FF0000 (Merah )

Catatan Tambahan untuk Integrasi WebGIS

- ♦ **Penerapan di Frontend:** Bang Ferdi bisa membuat fungsi *condition statement* (misalnya **if/else** atau **step expression** di MapLibre GL JS) menggunakan batas angka pada tabel di atas.
-

- **Fungsi Interaktif:** Karena file GeoTIFF yang dikirim berisi angka suhu asli, WebGIS nanti bisa menampilkan angka pasti (misal: "27,4 °C") saat peta diklik, sekaligus memberi warna sesuai kelasnya 🎨.
-

Apakah rentang batas suhu di atas sudah sesuai dengan fokus analisis ketahanan iklim yang kamu rancang, atau ada batas angka spesifik yang ingin disesuaikan lagi? 💡

Pada musim kemarau di Jabodetabek, nilai rata-rata LST umumnya bergeser lebih tinggi sekitar **3–5 °C** dibanding musim hujan ☀️. Tutupan awan yang sedikit dan kelembapan tanah yang rendah membuat rata-rata suhu permukaan naik ke kisaran **29–31 °C**, dengan suhu puncak pada lahan terbuka atau atap bangunan bisa melampaui **36–40 °C**.

📋 Tabel Klasifikasi LST Musim Kemarau (5 Kelas)

Batas *threshold* disesuaikan agar kelas "Sedang" berada di sekitar nilai rata-rata musim kemarau:

Kelas 🏷️	Rentang Suhu (°C) 🌡️	Kategori 🏷️	Deskripsi Karakteristik Area 🗺️	Kode Warna (Hex) 🎨
Kelas 1	< 26,0	Sangat Sejuk	Hutan, vegetasi sangat lebat, dan danau/sungai 🌊	#0000FF (Biru 🟦)
Kelas 2	26,0 – 29,0	Sejuk	Area RTH, taman kota, pemukiman bervegetasi 🌿	#00FFFF (Sian 🟩)
Kelas 3	29,0 – 32,0	Sedang	Area rata-rata Jabodetabek di musim kemarau (~30 °C) 🏠	#FFFF00 (Kuning 🟡)
Kelas 4	32,0 – 36,0	Panas	Kawasan pemukiman padat dan area perkotaan 🏙️	#FFA500 (Oranye 🟠)

Kelas 5	$\geq 36,0$	Sangat Panas	Lahan terbuka, kawasan industri, dan inti panas UHI 🌞	#FF0000 (Merah ●)
--------------------	-------------	-----------------	---	----------------------

Dengan skema di atas, data musim kemarau tidak akan mendominasi warna merah (*over-saturated*) di seluruh peta.

Mengapa menurutmu penting bagi Bang Ferdi untuk memisahkan logika *threshold* antara data musim hujan dan musim kemarau di dalam sistem WebGIS nanti? 💡