#### A lineáris regresszió

Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Utoljára frissítve: 2023. május 9.

#### **Tartalom**

- 1 A lineáris regressziós modell (a sokaságban)
- A lineáris regressziós modell használata
- 3 A regressziós modell használata a kauzalitás vizsgálatában
- Az elaszticitás fogalma

#### **Tartalom**

- 1 A lineáris regressziós modell (a sokaságban)
- 2 A lineáris regressziós modell használata
- 3 A regressziós modell használata a kauzalitás vizsgálatában
- Az elaszticitás fogalma

- Ha a háttéreloszlás normális, akkor  $\mathbb{E}\left(Y\mid\underline{X}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k$  és így  $Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k+\varepsilon$
- A továbbiakban általában is ebben az ún. lineáris modellben fogunk gondolkozni, függetlenül attól, hogy mit tudunk a háttéreloszlásról, ugyanis:
  - Todovartozos normalitasnai egzaktan ez a nelyzet
     Más esetekben csak közelítás, de cserében negyon kellemesek a tulajdonságai, különésen amaz interpretációt illet
     Rázdásul ez is elmondhető, kogy a Tayler-sorréjtés legilálját közetve kármi más is a jó függvényforma, legalábbis lokálisan ez is jó közelítás kell legyen
     Végszerül pedigi majd látnit fogjuk, kogy ezeretése módon egy sor nemlinsária kitorjasorás a közelítás kell legyen
- Azt fogjuk mondani, hogy ezt a modell feltételezzük a sokaságra (hogy aztán ezt jól tettük-e, azt majd különböző szempontokból persze vizsgáljuk)



- Ha a háttéreloszlás normális, akkor  $\mathbb{E}\left(Y\mid\underline{X}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k$  és így  $Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k+\varepsilon$
- A továbbiakban általában is ebben az ún. **lineáris modellben** fogunk gondolkozni, függetlenül attól, hogy mit tudunk a háttéreloszlásról, ugyanis:
  - Többváltozós normalitásnál egzaktan ez a helyzet
  - Más esetekben csak közelítés, de cserében nagyon kellemesek a tulajdonságai, különösen ami az interpretációt illeti
  - Ráadásul az is elmondható, hogy a Taylor-sorfejtés logikáját követve bármi más is a jó függvényforma, legalábbis lokálisan ez is jó közelítés kell legyen
  - Végezetül pedig: majd látni fogjuk, hogy szerencsés módon egy sor nemlineáris kiterjesztés is könnyen kezelhető ugyanebben a keretben
- Azt fogjuk mondani, hogy ezt a modell feltételezzük a sokaságra (hogy aztán ezt jól tettük-e, azt majd különböző szempontokból persze vizsgáljuk)



- Ha a háttéreloszlás normális, akkor  $\mathbb{E}\left(Y\mid\underline{X}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k$  és így  $Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k+\varepsilon$
- A továbbiakban általában is ebben az ún. **lineáris modellben** fogunk gondolkozni, függetlenül attól, hogy mit tudunk a háttéreloszlásról, ugyanis:
  - Többváltozós normalitásnál egzaktan ez a helyzet
  - Más esetekben csak közelítés, de cserében nagyon kellemesek a tulajdonságai, különösen ami az interpretációt illeti
  - Ráadásul az is elmondható, hogy a Taylor-sorfejtés logikáját követve bármi más is a jó függvényforma, legalábbis lokálisan ez is jó közelítés kell legyen
  - Végezetül pedig: majd látni fogjuk, hogy szerencsés módon egy sor nemlineáris kiterjesztés is könnyen kezelhető ugyanebben a keretben
- Azt fogjuk mondani, hogy ezt a modell feltételezzük a sokaságra (hogy aztán ezt jól tettük-e, azt majd különböző szempontokból persze vizsgáljuk)



- Ha a háttéreloszlás normális, akkor  $\mathbb{E}\left(Y\mid\underline{X}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k$  és így  $Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k+\varepsilon$
- A továbbiakban általában is ebben az ún. **lineáris modellben** fogunk gondolkozni, függetlenül attól, hogy mit tudunk a háttéreloszlásról, ugyanis:
  - 1 Többváltozós normalitásnál egzaktan ez a helyzet
  - Más esetekben csak közelítés, de cserében nagyon kellemesek a tulajdonságai, különösen ami az interpretációt illeti
  - Ráadásul az is elmondható, hogy a Taylor-sorfejtés logikáját követve bármi más is a jó függvényforma, legalábbis lokálisan ez is jó közelítés kell legyen
  - Végezetül pedig: majd látni fogjuk, hogy szerencsés módon egy sor nemlineáris kiterjesztés is könnyen kezelhető ugyanebben a keretben
- Azt fogjuk mondani, hogy ezt a modell feltételezzük a sokaságra (hogy aztán ezt jól tettük-e, azt majd különböző szempontokból persze vizsgáljuk)



- Ha a háttéreloszlás normális, akkor  $\mathbb{E}\left(Y\mid\underline{X}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k$  és így  $Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k+\varepsilon$
- A továbbiakban általában is ebben az ún. **lineáris modellben** fogunk gondolkozni, függetlenül attól, hogy mit tudunk a háttéreloszlásról, ugyanis:
  - Többváltozós normalitásnál egzaktan ez a helyzet
  - Más esetekben csak közelítés, de cserében nagyon kellemesek a tulajdonságai, különösen ami az interpretációt illeti
  - Ráadásul az is elmondható, hogy a Taylor-sorfejtés logikáját követve bármi más is a jó függvényforma, legalábbis lokálisan ez is jó közelítés kell legyen
  - Végezetül pedig: majd látni fogjuk, hogy szerencsés módon egy sor nemlineáris kiterjesztés is könnyen kezelhető ugyanebben a keretben
- Azt fogjuk mondani, hogy ezt a modell feltételezzük a sokaságra (hogy aztán ezt jól tettük-e, azt majd különböző szempontokból persze vizsgáljuk)



- Ha a háttéreloszlás normális, akkor  $\mathbb{E}\left(Y\mid\underline{X}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k$  és így  $Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k+\varepsilon$
- A továbbiakban általában is ebben az ún. **lineáris modellben** fogunk gondolkozni, függetlenül attól, hogy mit tudunk a háttéreloszlásról, ugyanis:
  - Többváltozós normalitásnál egzaktan ez a helyzet
  - Más esetekben csak közelítés, de cserében nagyon kellemesek a tulajdonságai, különösen ami az interpretációt illeti
  - Ráadásul az is elmondható, hogy a Taylor-sorfejtés logikáját követve bármi más is a jó függvényforma, legalábbis lokálisan ez is jó közelítés kell legyen
  - Végezetül pedig: majd látni fogjuk, hogy szerencsés módon egy sor nemlineáris kiterjesztés is könnyen kezelhető ugyanebben a keretben
- Azt fogjuk mondani, hogy ezt a modell feltételezzük a sokaságra (hogy aztán ezt jól tettük-e, azt majd különböző szempontokból persze vizsgáljuk)



- Ha a háttéreloszlás normális, akkor  $\mathbb{E}\left(Y\mid\underline{X}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k$  és így  $Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\ldots+\beta_kX_k+\varepsilon$
- A továbbiakban általában is ebben az ún. **lineáris modellben** fogunk gondolkozni, függetlenül attól, hogy mit tudunk a háttéreloszlásról, ugyanis:
  - Többváltozós normalitásnál egzaktan ez a helyzet
  - Más esetekben csak közelítés, de cserében nagyon kellemesek a tulajdonságai, különösen ami az interpretációt illeti
  - Ráadásul az is elmondható, hogy a Taylor-sorfejtés logikáját követve bármi más is a jó függvényforma, legalábbis lokálisan ez is jó közelítés kell legyen
  - Végezetül pedig: majd látni fogjuk, hogy szerencsés módon egy sor nemlineáris kiterjesztés is könnyen kezelhető ugyanebben a keretben
- Azt fogjuk mondani, hogy ezt a modell feltételezzük a sokaságra (hogy aztán ezt jól tettük-e, azt majd különböző szempontokból persze vizsgáljuk)



## A lineáris regressziós modell

A modellünk tehát:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

• Egyelőre még semmilyen feltételt nem kötöttünk ki, bár annyit már láttunk, hogy ha ez jó modell, akkor  $\mathbb{E}\left(\varepsilon\mid\underline{X}\right)=0$  igaz kell legyen (ez persze csak szükséges feltétel, arról még semmit nem tudunk, hogy elégséges-e) – erre a kérdésre később térünk vissza

## A lineáris regressziós modell

A modellünk tehát:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

• Egyelőre még semmilyen feltételt nem kötöttünk ki, bár annyit már láttunk, hogy ha ez jó modell, akkor  $\mathbb{E}\left(\varepsilon \mid \underline{X}\right) = 0$  igaz kell legyen (ez persze csak szükséges feltétel, arról még semmit nem tudunk, hogy elégséges-e) – erre a kérdésre később térünk vissza

#### **Tartalom**

- 1 A lineáris regressziós modell (a sokaságban)
- A lineáris regressziós modell használata
- 3 A regressziós modell használata a kauzalitás vizsgálatában
- Az elaszticitás fogalma

#### A modellünk használata: előrejelzés

- ullet Teljesen kézenfekvő, csak egy dolgot kell megbeszélni: előrejelzésnél arepsilon helyébe 0-t írunk
- (Hiszen a feltételes várható értékre lövünk)
- Azaz

$$\widehat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_k X_k$$

#### A modellünk használata: előrejelzés

- ullet Teljesen kézenfekvő, csak egy dolgot kell megbeszélni: előrejelzésnél arepsilon helyébe 0-t írunk
- (Hiszen a feltételes várható értékre lövünk)
- Azaz

$$\widehat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_k X_k$$

#### A modellünk használata: előrejelzés

- ullet Teljesen kézenfekvő, csak egy dolgot kell megbeszélni: előrejelzésnél arepsilon helyébe 0-t írunk
- (Hiszen a feltételes várható értékre lövünk)
- Azaz

$$\widehat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_k X_k$$

#### A modellünk használata: elemzés

A paraméterek értelmezésével elemezhetjük a modellünket; kérdéseket válaszolhatunk meg a modellezett jelenségről.

## A modellünk használata: elemzés (tengelymetszet)

- A  $\beta_0$  konstans értelmezése: ha valamennyi magyarázó változó nulla értékű, akkor modellünk szerint várhatóan mekkora az eredményváltozó
- Ha a minden magyarázó változó nulla kombináció kívül esik az értelmes tartományon, akkor ennek lehet, hogy nincs tárgyi értelme (ilyenkor: egyszerűen az illeszkedést javító paraméter)

#### A modellünk használata: elemzés (tengelymetszet)

- A  $\beta_0$  konstans értelmezése: ha valamennyi magyarázó változó nulla értékű, akkor modellünk szerint várhatóan mekkora az eredményváltozó
- Ha a minden magyarázó változó nulla kombináció kívül esik az értelmes tartományon, akkor ennek lehet, hogy nincs tárgyi értelme (ilyenkor: egyszerűen az illeszkedést javító paraméter)

- A meredekségek egyszerű értelmezése: ha a vizsgált magyarázó változó egy egységnyivel nagyobb lenne úgy, hogy minden más változót rögzített értéken tartunk (ceteris paribus, röviden c. p.), akkor modellünk szerint várhatóan hány egységnyit változna az eredményváltozó
- Hiszen:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l (X_l + 1) + \ldots + \beta_k X_k =$$
  
=  $(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l X_l + \ldots + \beta_k X_k) + \beta_l$ 

Figyelem:

- Mindagili válhazót a saját egysteában márva
   Mindagili válhazót lat lavasztásan
- Később precízebben is értelmezzük a meredekséget



- A meredekségek egyszerű értelmezése: ha a vizsgált magyarázó változó egy egységnyivel nagyobb lenne úgy, hogy minden más változót rögzített értéken tartunk (ceteris paribus, röviden c. p.), akkor modellünk szerint várhatóan hány egységnyit változna az eredményváltozó
- Hiszen:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l (X_l + 1) + \ldots + \beta_k X_k =$$

$$= (\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l X_l + \ldots + \beta_k X_k) + \beta_l$$

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Minnegyik valtozat a sajat egyetgetien menve
     Abezaldit valtozászásit keucsal össze
- Később precízebben is értelmezzük a meredekséget



- A meredekségek egyszerű értelmezése: ha a vizsgált magyarázó változó egy egységnyivel nagyobb lenne úgy, hogy minden más változót rögzített értéken tartunk (ceteris paribus, röviden c. p.), akkor modellünk szerint várhatóan hány egységnyit változna az eredményváltozó
- Hiszen:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l (X_l + 1) + \ldots + \beta_k X_k =$$
  
=  $(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l X_l + \ldots + \beta_k X_k) + \beta_l$ 

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Mindegyik változót a saját egységében mérve
  - Abszolút változásokat kapcsol össze
- Később precízebben is értelmezzük a meredekséget



- A meredekségek egyszerű értelmezése: ha a vizsgált magyarázó változó egy egységnyivel nagyobb lenne úgy, hogy minden más változót rögzített értéken tartunk (ceteris paribus, röviden c. p.), akkor modellünk szerint várhatóan hány egységnyit változna az eredményváltozó
- Hiszen:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l (X_l + 1) + \ldots + \beta_k X_k =$$
  
=  $(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l X_l + \ldots + \beta_k X_k) + \beta_l$ 

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Mindegyik változót a saját egységében mérve
  - Abszolút változásokat kapcsol össze
- Később precízebben is értelmezzük a meredekséget



- A meredekségek egyszerű értelmezése: ha a vizsgált magyarázó változó egy egységnyivel nagyobb lenne úgy, hogy minden más változót rögzített értéken tartunk (ceteris paribus, röviden c. p.), akkor modellünk szerint várhatóan hány egységnyit változna az eredményváltozó
- Hiszen:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l (X_l + 1) + \ldots + \beta_k X_k =$$
  
=  $(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l X_l + \ldots + \beta_k X_k) + \beta_l$ 

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Mindegyik változót a saját egységében mérve
  - Abszolút változásokat kapcsol össze
- Később precízebben is értelmezzük a meredekséget



- A meredekségek egyszerű értelmezése: ha a vizsgált magyarázó változó egy egységnyivel nagyobb lenne úgy, hogy minden más változót rögzített értéken tartunk (ceteris paribus, röviden c. p.), akkor modellünk szerint várhatóan hány egységnyit változna az eredményváltozó
- Hiszen:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l (X_l + 1) + \ldots + \beta_k X_k =$$
  
=  $(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l X_l + \ldots + \beta_k X_k) + \beta_l$ 

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Mindegyik változót a saját egységében mérve
  - Abszolút változásokat kapcsol össze
- Később precízebben is értelmezzük a meredekséget



- A meredekségek egyszerű értelmezése: ha a vizsgált magyarázó változó egy egységnyivel nagyobb lenne úgy, hogy minden más változót rögzített értéken tartunk (ceteris paribus, röviden c. p.), akkor modellünk szerint várhatóan hány egységnyit változna az eredményváltozó
- Hiszen:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l (X_l + 1) + \ldots + \beta_k X_k =$$
  
=  $(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_l X_l + \ldots + \beta_k X_k) + \beta_l$ 

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Mindegyik változót a saját egységében mérve
  - Abszolút változásokat kapcsol össze
- Később precízebben is értelmezzük a meredekséget



#### **Tartalom**

- A lineáris regressziós modell (a sokaságban)
- A lineáris regressziós modell használata
- 3 A regressziós modell használata a kauzalitás vizsgálatában
- Az elaszticitás fogalma

- Két dolgot már részletesen láttunk: a kauzalitás kutatásának problémáját, ha csak megfigyeléses adataink vannak, és a regressziós modellek alapjait
- Na de mi köze a kettőnek egymáshoz?
- Azonnal világossá válik, ha az elemzésnél látottakra gondolunk ceteris paribus
- A β<sub>I</sub> együttható úgy értendő, hogy az X<sub>I</sub> növekedésének hatása... ha minden más változatlan marad!
- Ez épp a confounding kiszűrése, hiszen ott pont az a probléma, hogy ha X, nő, akkor vele együtt más is változik!
- Voilá megoldottuk a problémát

- Két dolgot már részletesen láttunk: a kauzalitás kutatásának problémáját, ha csak megfigyeléses adataink vannak, és a regressziós modellek alapjait
- Na de mi köze a kettőnek egymáshoz?
- Azonnal világossá válik, ha az elemzésnél látottakra gondolunk ceteris paribus
- A β<sub>I</sub> együttható úgy értendő, hogy az X<sub>I</sub> növekedésének hatása... ha minden más változatlan marad!
- Ez épp a confounding kiszűrése, hiszen ott pont az a probléma, hogy ha X, nő, akkor vele együtt más is változik!
- Voilá megoldottuk a problémát

- Két dolgot már részletesen láttunk: a kauzalitás kutatásának problémáját, ha csak megfigyeléses adataink vannak, és a regressziós modellek alapjait
- Na de mi köze a kettőnek egymáshoz?
- Azonnal világossá válik, ha az elemzésnél látottakra gondolunk ceteris paribus!
- A β<sub>I</sub> együttható úgy értendő, hogy az X<sub>I</sub> növekedésének hatása... ha minden más változatlan marad!
- Ez épp a confounding kiszűrése, hiszen ott pont az a probléma, hogy ha X<sub>1</sub> nő, akkor vele együtt más is változik!
- Voilá megoldottuk a problémát

- Két dolgot már részletesen láttunk: a kauzalitás kutatásának problémáját, ha csak megfigyeléses adataink vannak, és a regressziós modellek alapjait
- Na de mi köze a kettőnek egymáshoz?
- Azonnal világossá válik, ha az elemzésnél látottakra gondolunk ceteris paribus!
- A  $\beta_I$  együttható úgy értendő, hogy az  $X_I$  növekedésének hatása... ha *minden más* változatlan marad!
- Ez épp a confounding kiszűrése, hiszen ott pont az a probléma, hogy ha X<sub>l</sub> nő, akkor vele együtt más is változik!
- Voilá megoldottuk a problémát

- Két dolgot már részletesen láttunk: a kauzalitás kutatásának problémáját, ha csak megfigyeléses adataink vannak, és a regressziós modellek alapjait
- Na de mi köze a kettőnek egymáshoz?
- Azonnal világossá válik, ha az elemzésnél látottakra gondolunk ceteris paribus!
- A  $\beta_I$  együttható úgy értendő, hogy az  $X_I$  növekedésének hatása... ha *minden más* változatlan marad!
- Ez  $\acute{e}pp$  a confounding kiszűrése, hiszen ott pont az a probléma, hogy ha  $X_l$  nő, akkor vele együtt más is változik!
- Voilá megoldottuk a problémát

- Két dolgot már részletesen láttunk: a kauzalitás kutatásának problémáját, ha csak megfigyeléses adataink vannak, és a regressziós modellek alapjait
- Na de mi köze a kettőnek egymáshoz?
- Azonnal világossá válik, ha az elemzésnél látottakra gondolunk ceteris paribus!
- A  $\beta_I$  együttható úgy értendő, hogy az  $X_I$  növekedésének hatása... ha *minden más* változatlan marad!
- Ez  $\acute{e}pp$  a confounding kiszűrése, hiszen ott pont az a probléma, hogy ha  $X_l$  nő, akkor vele együtt más is változik!
- Voilá megoldottuk a problémát

## Visszatérve a példákra

- Az oktatás β-ja a magasabb iskolai végzettség hatása, miközben minden mást (így a nem oktatással összefüggő munkaalkalmasságot is!) rögzítetten tartottuk – azaz kiszűrtük a confound-oló hatását...
- Az előadáslátogatás  $\beta$ -ja a több előadáslátogatás hatása, *miközben* minden mást (így a motivációt is!) rögzítetten tartottuk azaz kiszűrtük a confound-oló hatását...
- és így tovább, és így tovább... (érdemes végiggondolni a többi példára is!)

## Visszatérve a példákra

- Az oktatás  $\beta$ -ja a magasabb iskolai végzettség hatása, *miközben* minden mást (így a nem oktatással összefüggő munkaalkalmasságot is!) rögzítetten tartottuk azaz kiszűrtük a confound-oló hatását...
- Az előadáslátogatás  $\beta$ -ja a több előadáslátogatás hatása, *miközben* minden mást (így a motivációt is!) rögzítetten tartottuk azaz kiszűrtük a confound-oló hatását...
- és így tovább, és így tovább... (érdemes végiggondolni a többi példára is!)

#### Visszatérve a példákra

- Az oktatás β-ja a magasabb iskolai végzettség hatása, miközben minden mást (így a nem oktatással összefüggő munkaalkalmasságot is!) rögzítetten tartottuk – azaz kiszűrtük a confound-oló hatását...
- Az előadáslátogatás  $\beta$ -ja a több előadáslátogatás hatása, *miközben* minden mást (így a motivációt is!) rögzítetten tartottuk azaz kiszűrtük a confound-oló hatását...
- és így tovább, és így tovább... (érdemes végiggondolni a többi példára is!)

- Az előbbi kijelentés persze valójában túl optimista volt
- A legfontosabb probléma: valójában nem tudunk "minden másra" kontrollálni csak amit beleraktunk a modellbe!
- De mi van, ha valamit nem tudunk jól lemérni? Még jobb: mi van, ha valamiről eszünkbe sem jut, hogy confounder? (Ez a kísérlet hatalmas előnye!)
- Másrészt a regressziós modelleknek vannak előfeltevéseik (részletesen fogunk vele foglalkozni), melyeknek teljesülniük kell, hogy valós eredményt kapjunk
- Csak a példa kedvéért: a lineáris specifikáció kényelmes, de cserében kiad dolgokat a modell változóira nézve

- Az előbbi kijelentés persze valójában túl optimista volt
- A legfontosabb probléma: valójában nem tudunk "minden másra" kontrollálni csak amit beleraktunk a modellbe!
- De mi van, ha valamit nem tudunk jól lemérni? Még jobb: mi van, ha valamiről eszünkbe sem jut, hogy confounder? (Ez a kísérlet hatalmas előnye!)
- Másrészt a regressziós modelleknek vannak előfeltevéseik (részletesen fogunk vele foglalkozni), melyeknek teljesülniük kell, hogy valós eredményt kapjunk
- Csak a példa kedvéért: a lineáris specifikáció kényelmes, de cserében kiad dolgokat a modell változóira nézve

- Az előbbi kijelentés persze valójában túl optimista volt
- A legfontosabb probléma: valójában nem tudunk "minden másra" kontrollálni csak amit beleraktunk a modellbe!
- De mi van, ha valamit nem tudunk jól lemérni? Még jobb: mi van, ha valamiről eszünkbe sem jut, hogy confounder? (Ez a kísérlet hatalmas előnye!)
- Másrészt a regressziós modelleknek vannak előfeltevéseik (részletesen fogunk vele foglalkozni), melyeknek teljesülniük kell, hogy valós eredményt kapjunk
- Csak a példa kedvéért: a lineáris specifikáció kényelmes, de cserében kiad dolgokat a modell változóira nézve

- Az előbbi kijelentés persze valójában túl optimista volt
- A legfontosabb probléma: valójában nem tudunk "minden másra" kontrollálni csak amit beleraktunk a modellbe!
- De mi van, ha valamit nem tudunk jól lemérni? Még jobb: mi van, ha valamiről eszünkbe sem jut, hogy confounder? (Ez a kísérlet hatalmas előnye!)
- Másrészt a regressziós modelleknek vannak előfeltevéseik (részletesen fogunk vele foglalkozni), melyeknek teljesülniük kell, hogy valós eredményt kapjunk
- Csak a példa kedvéért: a lineáris specifikáció kényelmes, de cserében kiad dolgokat a modell változóira nézve

- Az előbbi kijelentés persze valójában túl optimista volt
- A legfontosabb probléma: valójában nem tudunk "minden másra" kontrollálni csak amit beleraktunk a modellbe!
- De mi van, ha valamit nem tudunk jól lemérni? Még jobb: mi van, ha valamiről eszünkbe sem jut, hogy confounder? (Ez a kísérlet hatalmas előnye!)
- Másrészt a regressziós modelleknek vannak előfeltevéseik (részletesen fogunk vele foglalkozni), melyeknek teljesülniük kell, hogy valós eredményt kapjunk
- Csak a példa kedvéért: a lineáris specifikáció kényelmes, de cserében kiad dolgokat a modell változóira nézve

- Eddigi definíció a meredekségre: a többi változót rögzítjük, a vizsgált egy egységgel nagyobb... de: milyen szinten rögzítjük a többit? milyen szintről indulva nő egy egységgel a vizsgált?
- A linearitás fontos következménye, hogy mindkettő mindegy
- Windery milyen szintről indulva növeljük exzyel a v
- ...mindenképp ugyanannyi lesz a növelés hatása az eredményváltozóra!
- Szemléletes tartalom: gondoljunk az egyenesre (illetve síkra)

- Eddigi definíció a meredekségre: a többi változót rögzítjük, a vizsgált egy egységgel nagyobb... de: milyen szinten rögzítjük a többit? milyen szintről indulva nő egy egységgel a vizsgált?
- A linearitás fontos következménye, hogy mindkettő mindegy!
  - Mindegy milyen szinten rögzítjük a többi változót..
  - Mindegy milyen szintről indulva növeljük eggyel a vizsgált változót...
- ...mindenképp ugyanannyi lesz a növelés hatása az eredményváltozóra
- Szemléletes tartalom: gondoljunk az egyenesre (illetve síkra)

- Eddigi definíció a meredekségre: a többi változót rögzítjük, a vizsgált egy egységgel nagyobb... de: milyen szinten rögzítjük a többit? milyen szintről indulva nő egy egységgel a vizsgált?
- A linearitás fontos következménye, hogy mindkettő mindegy!
  - Mindegy milyen szinten rögzítjük a többi változót...
  - Mindegy milyen szintről indulva növeljük eggyel a vizsgált változót..
- ...mindenképp ugyanannyi lesz a növelés hatása az eredményváltozóra
- Szemléletes tartalom: gondoljunk az egyenesre (illetve síkra

- Eddigi definíció a meredekségre: a többi változót rögzítjük, a vizsgált egy egységgel nagyobb... de: milyen szinten rögzítjük a többit? milyen szintről indulva nő egy egységgel a vizsgált?
- A linearitás fontos következménye, hogy mindkettő mindegy!
  - Mindegy milyen szinten rögzítjük a többi változót...
  - Mindegy milyen szintről indulva növeljük eggyel a vizsgált változót...
- ...mindenképp ugyanannyi lesz a növelés hatása az eredményváltozóra!
- Szemléletes tartalom: gondoljunk az egyenesre (illetve síkra)



- Eddigi definíció a meredekségre: a többi változót rögzítjük, a vizsgált egy egységgel nagyobb... de: milyen szinten rögzítjük a többit? milyen szintről indulva nő egy egységgel a vizsgált?
- A linearitás fontos következménye, hogy mindkettő mindegy!
  - Mindegy milyen szinten rögzítjük a többi változót...
  - Mindegy milyen szintről indulva növeljük eggyel a vizsgált változót...
- ...mindenképp ugyanannyi lesz a növelés hatása az eredményváltozóra!
- Szemléletes tartalom: gondoljunk az egyenesre (illetve síkra)

- Eddigi definíció a meredekségre: a többi változót rögzítjük, a vizsgált egy egységgel nagyobb... de: milyen szinten rögzítjük a többit? milyen szintről indulva nő egy egységgel a vizsgált?
- A linearitás fontos következménye, hogy mindkettő mindegy!
  - Mindegy milyen szinten rögzítjük a többi változót...
  - Mindegy milyen szintről indulva növeljük eggyel a vizsgált változót...
- ...mindenképp ugyanannyi lesz a növelés hatása az eredményváltozóra!
- Szemléletes tartalom: gondoljunk az egyenesre (illetve síkra)

#### **Tartalom**

- A lineáris regressziós modell (a sokaságban)
- 2 A lineáris regressziós modell használata
- 3 A regressziós modell használata a kauzalitás vizsgálatában
- Az elaszticitás fogalma

- A meredekséghez hasonló mutatót szeretnénk, de úgy, hogy ne abszolút, hanem relatív változásokat kössön össze
- Tehát: ha a vizsgált magyarázó változó 1 %-nyival nagyobb lenne c. p., akkor modellünk szerint várhatóan hány %-nyit változna az eredményváltozó
- Számítás:

$$\operatorname{El}_{l}(\underline{X}) = \frac{\beta_{l}/Y}{1/X_{l}} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{Y} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{\beta_{0} + \beta_{1}X_{1} + \ldots + \beta_{k}X_{k}}$$

- Figyelem
  - Minden elmozdulést relative (%-cean) mérve
- Ami új: az érték függ attól, hogy milyen pontban vagyunk, tehát, hogy az összes magyarázó változó milyen értékű (ezt tükrözi a jelölés is); teljesen logikus módon

- A meredekséghez hasonló mutatót szeretnénk, de úgy, hogy ne abszolút, hanem relatív változásokat kössön össze
- Tehát: ha a vizsgált magyarázó változó 1 %-nyival nagyobb lenne c. p., akkor modellünk szerint várhatóan hány %-nyit változna az eredményváltozó

$$\operatorname{El}_{l}(\underline{X}) = \frac{\beta_{l}/Y}{1/X_{l}} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{Y} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{\beta_{0} + \beta_{1}X_{1} + \ldots + \beta_{k}X_{k}}$$



- A meredekséghez hasonló mutatót szeretnénk, de úgy, hogy ne abszolút, hanem relatív változásokat kössön össze
- Tehát: ha a vizsgált magyarázó változó 1 %-nyival nagyobb lenne c. p., akkor modellünk szerint várhatóan hány %-nyit változna az eredményváltozó
- Számítás:

$$\operatorname{El}_{I}(\underline{X}) = \frac{\beta_{I}/Y}{1/X_{I}} = \beta_{I} \cdot \frac{X_{I}}{Y} = \beta_{I} \cdot \frac{X_{I}}{\beta_{0} + \beta_{1}X_{1} + \ldots + \beta_{k}X_{k}}$$

- Figyelem
  - Ceteris paribus
     Minden elmoydulfer relative (%...)
- Ami új: az érték függ attól, hogy milyen pontban vagyunk, tehát, hogy az összes magyarázó változó milyen értékű (ezt tükrözi a jelölés is); teljesen logikus módon



- A meredekséghez hasonló mutatót szeretnénk, de úgy, hogy ne abszolút, hanem relatív változásokat kössön össze
- Tehát: ha a vizsgált magyarázó változó 1 %-nyival nagyobb lenne c. p., akkor modellünk szerint várhatóan hány %-nyit változna az eredményváltozó
- Számítás:

$$\operatorname{El}_{I}(\underline{X}) = \frac{\beta_{I}/Y}{1/X_{I}} = \beta_{I} \cdot \frac{X_{I}}{Y} = \beta_{I} \cdot \frac{X_{I}}{\beta_{0} + \beta_{1}X_{1} + \ldots + \beta_{k}X_{k}}$$

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Minden elmozdulást relatíve (%-osan) mérve
- Ami új: az érték függ attól, hogy milyen pontban vagyunk, tehát, hogy az összes magyarázó változó milyen értékű (ezt tükrözi a jelölés is); teljesen logikus módon



- A meredekséghez hasonló mutatót szeretnénk, de úgy, hogy ne abszolút, hanem relatív változásokat kössön össze
- Tehát: ha a vizsgált magyarázó változó 1 %-nyival nagyobb lenne c. p., akkor modellünk szerint várhatóan hány %-nyit változna az eredményváltozó
- Számítás:

$$\operatorname{El}_{l}(\underline{X}) = \frac{\beta_{l}/Y}{1/X_{l}} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{Y} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{\beta_{0} + \beta_{1}X_{1} + \ldots + \beta_{k}X_{k}}$$

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Minden elmozdulást relatíve (%-osan) mérve
- Ami új: az érték függ attól, hogy milyen pontban vagyunk, tehát, hogy az összes magyarázó változó milyen értékű (ezt tükrözi a jelölés is); teljesen logikus módon



- A meredekséghez hasonló mutatót szeretnénk, de úgy, hogy ne abszolút, hanem relatív változásokat kössön össze
- Tehát: ha a vizsgált magyarázó változó 1 %-nyival nagyobb lenne c. p., akkor modellünk szerint várhatóan hány %-nyit változna az eredményváltozó
- Számítás:

$$\operatorname{El}_{l}(\underline{X}) = \frac{\beta_{l}/Y}{1/X_{l}} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{Y} = \beta_{l} \cdot \frac{X_{l}}{\beta_{0} + \beta_{1}X_{1} + \ldots + \beta_{k}X_{k}}$$

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Minden elmozdulást relatíve (%-osan) mérve
- Ami új: az érték függ attól, hogy milyen pontban vagyunk, tehát, hogy az összes magyarázó változó milyen értékű (ezt tükrözi a jelölés is); teljesen logikus módon



- A meredekséghez hasonló mutatót szeretnénk, de úgy, hogy ne abszolút, hanem relatív változásokat kössön össze
- Tehát: ha a vizsgált magyarázó változó 1 %-nyival nagyobb lenne c. p., akkor modellünk szerint várhatóan hány %-nyit változna az eredményváltozó
- Számítás:

$$\operatorname{El}_{I}(\underline{X}) = \frac{\beta_{I}/Y}{1/X_{I}} = \beta_{I} \cdot \frac{X_{I}}{Y} = \beta_{I} \cdot \frac{X_{I}}{\beta_{0} + \beta_{1}X_{1} + \ldots + \beta_{k}X_{k}}$$

- Figyelem:
  - Ceteris paribus
  - Minden elmozdulást relatíve (%-osan) mérve
- Ami új: az érték függ attól, hogy milyen pontban vagyunk, tehát, hogy az összes magyarázó változó milyen értékű (ezt tükrözi a jelölés is); teljesen logikus módon

