

example_1 | FSM | Monte Carlo final parameter errors
Shapiro-Wilk; Holm alpha = 0.05; no outlier filtering
Non-rejection does not establish normality
BI-HMC
No valid observations / unavailable
RLS
No valid observations / unavailable
Newton
n = 30 | W = 0.6074
p = 9.01e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
GI
n = 30 | W = 0.6074
p = 9.01e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
GHAM-1-dH
n = 30 | W = 0.6074
p = 9e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
GHAM-2-dH
n = 30 | W = 0.6063
p = 8.73e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
GHAM-2-H
n = 30 | W = 0.6067
p = 8.82e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
GHAM-2-I
n = 30 | W = 0.6068
p = 8.85e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
LHAM-1-TIK
n = 30 | W = 0.6074
p = 9.01e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
LHAM-3-TIK
n = 30 | W = 0.6074
p = 9.01e-08 | p_H = 7.86e-07
Reject normality
Probability density
Observed errors
Fitted normal density
Final relative parameter error (%)