

example_1 | PL | Monte Carlo final parameter errors
Shapiro-Wilk; Holm alpha = 0.05; no outlier filtering
Non-rejection does not establish normality
BI-HMC
No valid observations / unavailable
RLS
n = 30 | W = 0.6031
p = 7.97e-08 | p_H = 7.18e-07
Reject normality
WS-GNI
n = 30 | W = 0.6031
p = 7.97e-08 | p_H = 7.18e-07
Reject normality
WS-GGI
n = 30 | W = 0.8604
p = 0.00103 | p_H = 0.00206
Reject normality
GHAM-1-dH
n = 30 | W = 0.6031
p = 7.97e-08 | p_H = 7.18e-07
Reject normality
GHAM-2-dH
n = 30 | W = 0.6031
p = 7.97e-08 | p_H = 7.18e-07
Reject normality
GHAM-2-H
No valid observations / unavailable
GHAM-2-I
n = 30 | W = 0.6931
p = 1.24e-06 | p_H = 3.73e-06
Reject normality
LHAM-1-TIK
n = 30 | W = 0.6183
p = 1.23e-07 | p_H = 7.18e-07
Reject normality
LHAM-3-TIK
n = 30 | W = 0.6117
p = 1.02e-07 | p_H = 7.18e-07
Reject normality
Probability density
Observed errors
Fitted normal density
Final relative parameter error (%)