

example_1 | PL | Monte Carlo final parameter errors
Shapiro-Wilk; Holm alpha = 0.05; no outlier filtering; non-rejection does not establish normality
RLS
n = 30 | W = 0.7289
p = 4.23e-06 | p_H = 2.96e-05
Reject normality
WS-GNI
n = 30 | W = 0.7289
p = 4.23e-06 | p_H = 2.96e-05
Reject normality
WS-GGI
n = 30 | W = 0.7883
p = 4.04e-05 | p_H = 8.08e-05
Reject normality
GHAM-1-dH
n = 30 | W = 0.7289
p = 4.23e-06 | p_H = 2.96e-05
Reject normality
GHAM-2-dH
n = 30 | W = 0.7289
p = 4.23e-06 | p_H = 2.96e-05
Reject normality
GHAM-2-H
No valid observations / unavailable
GHAM-2-I
n = 30 | W = 0.7410
p = 6.53e-06 | p_H = 2.96e-05
Reject normality
LHAM-1-TIK
n = 30 | W = 0.6873
p = 1.03e-06 | p_H = 8.21e-06
Reject normality
LHAM-3-TIK
n = 30 | W = 0.9387
p = 0.0837 | p_H = 0.0837
Normality not rejected
Probability density
Observed errors
Fitted normal density
Final relative parameter error (%)