

Tabla 1. Procedencia documental de los dos puntos de corte en uso

Cada corte proviene de un estudio distinto, sobre un instrumento distinto y una población distinta.

	Corte de 86	Corte de 68
Fuente primaria	Validación argentino-chilena del ACE-III (2020) ²	Validación del ACE en comunidad rural española (2006) ⁹
Instrumento	ACE-III	ACE (versión original)
País de la muestra	Argentina y Chile	España, comunidad rural
Vía de incorporación a la práctica local	directa	protocolo impreso de la versión argentina
Grupo control	139 controles	comunidad rural
Escolaridad de los controles	14,4 años (DE 3,8)	no expresada en años
Criterio de nivel educativo	no estratifica por educación	edad de finalización de la escolaridad
Rendimiento diagnóstico informado	sensibilidad 98 % especificidad 82 %	punto óptimo en el grupo de bajo nivel
¿Propone un umbral en 12 años de escolaridad?	No	No

Ninguno de los dos estudios de origen propone la regla compuesta ni el umbral de los 12 años: cada uno derivó su corte para su propia población y lo informó con su alcance. El escalón de 18 puntos resulta de componer ambas fuentes en la práctica clínica. El vacío para baja escolaridad comenzó a cubrirse con una normatización específica sobre 500 personas con menos de 12 años de instrucción, que halló un corte óptimo de 68,5 con sensibilidad del 97 % y especificidad del 72 %.

Tabla 2. Características de las dos cohortes y flujo de participantes

Las cohortes se seleccionaron por criterios opuestos —participación voluntaria en un programa de salud cerebral frente a consulta por sospecha de deterioro—. Un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

	Comunitaria	Clínica
n analítico	758	2112
Período de reclutamiento	2023–2024	2020–2026
Mujeres, %	81,0	59,1
Edad, años, mediana [Q1–Q3]	63,0 [57,0–69,0]	73,0 [66,0–78,0]
Escolaridad, años, mediana [Q1–Q3]	10,0 [7,0–15,0]	12,0 [8,0–16,0]
escolaridad < 7 años, n	159	184
escolaridad 7–11 años, n	249	606
escolaridad ≥ 12 años, n	350	1322
ACE-III total, media (DE)	77,6 (13,3)	71,4 (18,7)
Escolaridad declarada en 7, 12 o 17 años, %	37,5	47,3
Flujo de la cohorte comunitaria	n	
registros iniciales	867	
edad ≥ 40 años	866	
con los 23 ítems completos	814	
con escolaridad válida	776	
eliminados por presencia en ambas cohortes	–18	
muestra analítica	758	

De los 90 excluidos, 52 no tenían los 23 ítems y 43 no tenían escolaridad válida; ninguno disponía de ambos datos, de modo que ninguno era recuperable. Los excluidos tenían menos escolaridad (10,34 frente a 12,03 años; p = 0,029) y menor puntaje (75,18 frente a 81,38; p = 0,001), diferencia declarada como limitación.

Tabla 3. Puntaje esperado en el ACE-III según escolaridad y edad

Cada celda: el puntaje esperado en una persona sin deterioro y, entre paréntesis, el percentil 5, por año de escolaridad y edad. El color de fondo indica dónde cae el corte vigente: en rojo, por encima del rendimiento esperado; en ámbar, entre el esperado y el percentil 5.

Años de escolaridad	Corte vigente	50 años	55 años	60 años	65 años	70 años	75 años	80 años
0	68	58 (39)	57 (37)	57 (36)	56 (34)	55 (32)	54 (31)	53 (29)
1	68	61 (42)	60 (41)	59 (39)	59 (38)	58 (36)	57 (34)	56 (33)
2	68	64 (46)	63 (44)	62 (43)	61 (41)	60 (40)	60 (38)	59 (37)
3	68	67 (49)	66 (48)	65 (46)	64 (45)	63 (43)	62 (42)	61 (40)
4	68	69 (52)	68 (51)	67 (50)	66 (48)	66 (46)	65 (45)	64 (43)
5	68	71 (55)	71 (54)	70 (53)	69 (51)	68 (50)	67 (48)	66 (47)
6	68	74 (58)	73 (57)	72 (56)	71 (54)	70 (53)	69 (51)	68 (50)
7	68	76 (61)	75 (60)	74 (58)	73 (57)	72 (55)	71 (54)	71 (52)
8	68	78 (64)	77 (62)	76 (61)	75 (59)	74 (58)	73 (57)	72 (55)
9	68	80 (66)	79 (65)	78 (63)	77 (62)	76 (61)	75 (59)	74 (58)
10	68	81 (68)	80 (67)	80 (66)	79 (64)	78 (63)	77 (62)	76 (60)
11	68	83 (70)	82 (69)	81 (68)	80 (66)	79 (65)	79 (64)	78 (62)
12	86	84 (72)	84 (71)	83 (70)	82 (69)	81 (67)	80 (66)	79 (64)
13	86	86 (74)	85 (73)	84 (72)	83 (70)	82 (69)	81 (68)	81 (66)
14	86	87 (76)	86 (75)	85 (73)	84 (72)	83 (71)	83 (70)	82 (68)
15	86	88 (77)	87 (76)	86 (75)	85 (74)	85 (72)	84 (71)	83 (70)
16	86	89 (79)	88 (78)	87 (76)	86 (75)	86 (74)	85 (73)	84 (71)
17	86	90 (80)	89 (79)	88 (78)	87 (76)	86 (75)	86 (74)	85 (73)
18	86	91 (81)	90 (80)	89 (79)	88 (78)	87 (76)	86 (75)	85 (74)
19	86	91 (82)	90 (81)	89 (80)	89 (79)	88 (77)	87 (76)	86 (75)
20	86	92 (83)	91 (82)	90 (81)	89 (79)	88 (78)	87 (77)	86 (76)


Posición del corte vigente dentro de su propio grupo, a los 65 años

Años de escolaridad	0	4	8	11	12	16	20
Corte vigente	68	68	68	68	86	86	86
Percentil que ocupa	83	56	23	7	70	48	30


El percentil que ocupa el corte equivale a la proporción de personas sin deterioro de esa escolaridad que la regla señala: un mismo número ocupa el percentil 83 entre quienes no completaron ningún año de escuela y el percentil 7 entre quienes completaron once. Modelo de posición y dispersión estimado sobre 342 participantes comunitarios que cumplen el criterio de control del estudio —reconocimiento de lista ≥ 10 , sin accidente cerebrovascular, sin traumatismo de cráneo e independiente en las actividades básicas—, promediado sobre la distribución de sexo de la muestra y con la corrección de Harvey aplicada a la varianza. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales.

Figura 1

a La asociación es curvilínea en las dos cohortes



b La ganancia cae 4,0 veces entre el año 3 y el 17



c La curvatura sobrevive sin el techo del test






Figura 2



a Posición del corte vigente respecto del rendimiento esperado, a los 65 años



b Proporción de personas sin deterioro que la regla vigente señala





Figura 4

a La regla aproxima una curva mediante un escalón



b La regla vigente señala desigualmente a personas sin deterioro

