

Trayectorias cognitivas longitudinales y predicción del agravamiento desde la evaluación basal en una clínica de memoria argentina: un estudio de mundo real

Congreso Argentino de Neurología (CAN) · Área temática: Neurología Cognitiva, Demencias y Neuropsicología · Tipo: Tema libre (oral/póster)

Autores: Fernando Márquez^{1,2,4}; Paula Virginia Arellano^{1,3,4}; Diana Bruno^{1,2}; Luciana Vita¹⁻⁴; María Beatriz Bistué^{1,3,4}; María Celeste Moyano^{1,3,4}; María Laura Noguera Roberto¹; Mariana Zanino^{1,3,4}; Cristian Ignacio Posleman^{1,3,4}; Iara Jácome^{1,2}; Florencia Portillo^{1,3,4}; Daniel Lucato²; Martín Alejandro Bruno^{1,3,4}.

Afiliaciones: ¹ Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. ² Instituto de Neurociencias San Juan (Clínica El Castaño), San Juan, Argentina. ³ Hospital Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina. ⁴ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Autor de correspondencia: Fernando Márquez — fmarquez.mum@gmail.com

Productos digitales de acceso abierto: - **Estratificador de riesgo (calculadora client-side):** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-demencia/> - **Artefacto navegable de trayectoria cognitiva** (heatmaps + tabla maestra): enlazado desde la app. - **Código, material suplementario y coeficientes:** <https://github.com/fermarquez88/kaizenai-demencia> — [material suplementario](#).

Reporte según **TRIPOD** (predicción) y **STROBE** (cohorte). Referencias verificadas vía **PubMed** (DOI). **Uso de inteligencia artificial declarado en Métodos.**

Resumen (estructurado)

Introducción. La **trayectoria cognitiva longitudinal** de los perfiles neuropsicológicos en la práctica real de una clínica de memoria —y qué de la evaluación basal anticipa el agravamiento— está poco caracterizada en Latinoamérica, región subrepresentada en la investigación de demencias.

Objetivo. (1) Describir, a nivel de banda de severidad y de test, la **trayectoria cognitiva longitudinal** de los perfiles en una cohorte argentina de mundo real; y (2) derivar y validar internamente modelos parsimoniosos, normados localmente, que anticipen la progresión a un rango de severidad demencial desde la evaluación basal.

Materiales y métodos. Estudio longitudinal retrospectivo de adultos con ≥ 2 evaluaciones neuropsicológicas en fechas distintas (2020–2026), en el Instituto de Neurociencias San Juan. Tras una depuración auditada de la base (deduplicación por hash, recuperación de perfiles desde el PDF firmado, corrección de fechas), el perfil se codificó desde la sección Conclusiones mediante un modelo de lenguaje restringido por un codebook (uso de IA declarado). El **desenlace** fue la progresión a una **banda de severidad $\geq$ moderada** (*proxy* psicométrico, sin confirmación funcional independiente universal). La evolución se describió con la matriz de transición de bandas, con **cambio fiable regression-based** por test (RCI/SRB, descriptivo) y con un análisis de **tiempo-al-evento** (Kaplan-Meier, Cox). El modelo predictivo pre-especificado (memoria de relatos diferida y edad) usó regresión logística con validación cruzada anidada, corrección de optimismo, calibración de Platt e IC bootstrap.

Resultados. De 334 pacientes con múltiples visitas, 254 tuvieron reevaluación genuina (mediana 1,8 años); la depuración recuperó 63 perfiles y 4 reevaluaciones (219 analizables). La trayectoria fue **amnésico-céntrica**: el compromiso objetivo de memoria fue el eje del riesgo (progresión 31% [36/117] vs 5% [1/22]; OR de Fisher 9,3; $p=0,008$), y el análisis temporal lo confirmó (Cox: memoria HR 0,55 [IC95% 0,40–0,76] por

DE; C-index 0,72; log-rank $p=0,010$). Ningún paciente normal al basal progresó (0/17). El **modelo memoria diferida + edad** anticipó el agravamiento con **AUC 0,74 (IC95% bootstrap 0,63–0,83; 140 pacientes, 37 eventos)**, con estratificación de riesgo útil (progresión observada por tercil 9%/26%/45%) y alto valor de descarte (VPN 92%). El análisis descriptivo de trayectoria por test sugirió patrones fenotipo-específicos, si bien **ningún contraste sobrevivió la corrección por comparaciones múltiples** (q mín 0,091), por lo que se reporta como generador de hipótesis. Añadir ánimo (GDS) o quejas (CQC) no mejoró la predicción.

Conclusiones. Los perfiles siguen una trayectoria amnésico-céntrica, con el compromiso de memoria como eje del riesgo, y la progresión es anticipable con dos variables de rutina. Se despliegan dos herramientas abiertas. Los hallazgos son exploratorios y unicéntricos; el desenlace es un proxy psicométrico de severidad, **no** demencia confirmada, y requiere validación externa.

Palabras clave: deterioro cognitivo leve; demencia; neuropsicología; trayectoria cognitiva; predicción; índice de cambio fiable; Latinoamérica.

Introducción

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una entidad heterogénea cuyo desenlace depende de cómo se lo define y del fenotipo cognitivo subyacente.[1–3] Desde su caracterización inicial como estado transicional con predominio de compromiso de memoria,[1,2] el consenso internacional estableció que el DCL exige deterioro cognitivo objetivo con **actividades de la vida diaria preservadas** —el rasgo que lo separa de la demencia— y reconoció subtipos amnésico y no amnésico, de dominio único o múltiple, con pronósticos distintos.[3] Es el **perfil neuropsicológico** —y no la mera presencia de deterioro— lo central para el pronóstico.[4–6]

Dentro de ese perfil, la memoria episódica ocupa un lugar privilegiado. El **síndrome amnésico de tipo temporal-medial** identifica la enfermedad de Alzheimer prodrómica con alta especificidad,[7] y el **recuerdo diferido** es uno de los predictores neuropsicológicos más potentes de conversión.[7–13] Los **criterios neuropsicológicos actuariales** mejoran la estratificación y reducen los falsos positivos.[14–16] El compromiso amnésico multidominio, la atrofia temporal medial y la carga vascular incrementan el riesgo, [5,17,18] mientras que la **reserva** modula la expresión clínica,[19] y los síntomas conductuales/anímicos pueden constituir un pródromo.[20] La mayor parte de esta evidencia proviene de cohortes de altos ingresos, con baterías fijas.

Dos vacíos motivan este trabajo. Primero, la **trayectoria cognitiva longitudinal de los perfiles en la práctica de rutina** —a nivel de banda de severidad y de test— rara vez se describe con el cuidado psicométrico que exigen los datos seriados (cambio fiable, regresión a la media, efecto de piso), pese a que la prevención depende de identificar la trayectoria temprana.[21,22] Segundo, **Latinoamérica está marcadamente subrepresentada**; las herramientas validadas en otros contextos transfieren mal, y las iniciativas regionales enfatizan desarrollar instrumentos localmente desde **medidas de rutina**. [23–25] Abordamos ambos con un objetivo primero **descriptivo** (la trayectoria cognitiva) y luego **predictivo** (qué de la basal anticipa la progresión).

Materiales y métodos

Aspectos éticos y declaraciones

Análisis retrospectivo de datos clínicos de rutina, anonimizados por un identificador a nivel persona derivado del DNI; no se comparten datos identificatorios. Por tratarse de datos asistenciales retrospectivos y anonimizados, no se requirió consentimiento adicional. **Financiamiento:** ninguno específico. **Conflictos de interés:** ninguno. **Uso de inteligencia artificial:** un modelo de lenguaje restringido por un codebook cerrado

se usó para **extraer y codificar** el perfil desde el texto de las Conclusiones, y como asistencia en el análisis y la redacción; la IA **no** es autora y toda decisión metodológica y de interpretación fue de los autores. **Disponibilidad:** los datos individuales son sensibles y no se comparten; el código, el codebook, los coeficientes del modelo, los conteos agregados y el material suplementario son abiertos.

Diseño, cohorte y depuración de la base

Adultos evaluados entre 2020 y 2026 con **≥ 2 evaluaciones en fechas distintas**. Se depuró rigurosamente: (i) los duplicados del mismo día se confirmaron por **hash SHA-256** (mismo archivo re-archivado) y se conservó la mejor copia; (ii) se **recuperaron 63 perfiles** faltantes extrayendo la sección Conclusiones del PDF firmado y codificándola; (iii) se **recuperaron 4 reevaluaciones** colapsadas por errores de fecha. La identidad se resolvió por DNI (Figura 1).

Evaluación y codificación del perfil

Las baterías se adaptaron al motivo de consulta (ACE-III, IFS, Lista de Rey [RAVLT], Memoria de Relatos, Figura de Rey, fluencias, dígitos, Hayling, WAIS-IV, CI premórbido). Del texto de *Conclusiones* se codificó, mediante un LLM restringido por codebook, la **banda de severidad** ordinal (normal / DCL / leve-moderado / moderado / moderado-grave / grave), el mecanismo de memoria (almacenamiento vs. recuperación) y moduladores (ánimo, sueño). La **fiabilidad** entre dos codificaciones ciegas fue alta (severidad $\kappa=1,00$; subtipo $\kappa=0,88$); esto refleja **consistencia de extracción, no validación contra experto humano**, que queda pendiente. La clasificación operacional de **subtipo** (amnésico/no amnésico $\times$ único/múltiple, umbral $z \leq -1,5$; Petersen/Winblad) se derivó del patrón objetivo de dominios; **se restringió a los pacientes en bandas no demenciales al basal** (las etiquetas de subtipo de DCL no aplican a quienes ya están en rango demencial).

Desenlace, evolución y trayectoria

El desenlace fue la **progresión a una banda de severidad $\geq$ moderada** en la reevaluación. Se lo designa explícitamente como **proxy psicométrico de agravamiento cognitivo, no como diagnóstico de demencia**: carece de un criterio funcional independiente universal y —punto declarado como limitación— el predictor de memoria y la banda de severidad comparten **fuentes textual** (la narrativa de Conclusiones codificada por LLM), por lo que existe **riesgo de circularidad parcial**. La proporción de progresión se expresa por 100 persona-años en los reevaluados (no como incidencia poblacional de demencia). La trayectoria se describió con: (a) la **matriz de transición** entre bandas (Figura 2); (b) el **cambio fiable por test**, re-escalando cada prueba a una referencia común (mediana/MAD basal, congelada) y cuantificando el cambio con un **RCI regression-based** (SRB, Crawford-Howell) que descuenta la **regresión a la media** y el efecto de práctica, excluyendo del denominador a los ya-en-piso al basal; la multiplicidad se controló por FDR (Benjamini-Hochberg), y el resultado se presenta como **descriptivo/generador de hipótesis** (Figura 3, material suplementario); y (c) un análisis de **tiempo-al-evento** (Kaplan-Meier y Cox de riesgos proporcionales) que respeta el seguimiento variable (Figura 4).

Modelos predictivos y análisis estadístico

El modelo primario, **pre-especificado por teoría** (recuerdo diferido de relatos y edad), se derivó en la cohorte con severidad basal leve o leve-moderada. Usó regresión logística penalizada (L2), con estandarización e imputación por la mediana **dentro** de la validación cruzada anidada repetida (5×20) y **corrección de optimismo**. Se reportan: AUC con **IC95% por bootstrap** (remuestreo de pacientes sobre las predicciones fuera-de-muestra; la dispersión entre folds fue mayor y **no** se interpreta como IC), **calibración** (pendiente, Brier, intercepto-in-the-large) y **estratificación de riesgo por terciles** con IC de Wilson. El **dato faltante** del predictor único (memoria de relatos diferida) se declara, con análisis de sensibilidad en casos completos. Como modelos secundarios se reportan el subgrupo DCL y el **declive cognitivo fiable** (para bandas normal y ya-demencial). Un modelo con **criterio funcional independiente (ADLQ)** se presenta

como análisis exploratorio (material suplementario) dada su fragilidad (EPV bajo). Los modelos desplegados exportan coeficientes + Platt + bootstrap; una implementación en JavaScript reproduce los coeficientes (test de paridad). Reporte según **TRIPOD** y **STROBE**.

Resultados

Cohorte y depuración (Figura 1, Tabla 1)

De 334 pacientes con más de una evaluación archivada, 84 se excluyeron (81 duplicados del mismo día confirmados por hash + 3 sin fecha válida); 250 tuvieron reevaluación genuina y la recuperación de fechas sumó 4 → **254 reevaluaciones** (mediana 1,83 años; IQR 1,25–2,97). Tras recuperar 63 perfiles del PDF, **219** quedaron analizables con perfil basal y final (vs. 182 antes de la depuración). La codificación fue altamente reproducible entre extracciones (severidad $\kappa=1,00$) y creció monótonamente con el número de dominios objetivamente deficitarios.

Trayectoria a nivel de banda de severidad: transiciones (Figura 2)

La mayoría de los perfiles se mantuvieron estables o progresaron un escalón. La progresión a rango de severidad demencial fue de **12,0 por 100 persona-años** (37 eventos / 308 persona-años; IC95% Poisson 8,5–16,6) en la cohorte leve-moderado. Las transiciones se concentraron sobre la diagonal y su vecindad; **ningún paciente normal al basal progresó directamente a rango demencial (0/17)**, coherente con un modelo por estadios.

Trayectoria a nivel de test: cambio cognitivo fiable, descriptivo (Figura 3)

El análisis de cambio fiable por test —tras re-escalar, descontar la regresión a la media y manejar el efecto de piso— sugirió patrones **fenotipo-específicos** de agravamiento (más cambio en memoria episódica diferida en los perfiles amnésicos; en velocidad/ejecutivo en los disejecutivos; amplio en los amnésico-multidominio), con un gradiente por severidad basal (Normal ~4% → moderado o mayor ~22% de cambio fiable). **No obstante, ningún contraste a nivel de test sobrevivió la corrección por comparaciones múltiples (FDR; q mínimo 0,091; p. ej., Memoria de Relatos Diferido $p=0,276$, $q=0,43$), y muchas celdas fenotipo-específicas descansan en $n<15$.** En consecuencia, estos patrones se reportan como **estrictamente descriptivos y generadores de hipótesis**, no como hallazgos confirmatorios ni como una firma mecanística. Un hallazgo psicométrico relevante y robusto es que los tests de memoria diferida están fuertemente **en piso** al basal en una clínica de memoria (censura por abajo), lo que enmascara su cambio en la métrica cruda: interpretar el cambio seriado sin RCI y sin manejar el piso conduce a conclusiones erróneas.

El compromiso de memoria es el eje del riesgo, en el tiempo (Figura 4)

El compromiso objetivo de memoria fue el eje del riesgo: en la cohorte en riesgo, los perfiles con **memoria afectada** ($z \leq -1,5$) progresaron mucho más que los de memoria conservada (**31%** [36/117] vs **5%** [1/22]; OR de Fisher **9,3**; $p=0,008$). El análisis de **tiempo-al-evento**, que respeta el seguimiento variable, lo confirmó: la incidencia acumulada de progresión a 2 y 3 años fue 15% y 34% con memoria afectada vs ~0% con memoria conservada (**log-rank $p=0,010$**); en el modelo de Cox, mejor memoria se asoció a menor riesgo (**HR 0,55 [IC95% 0,40–0,76] por DE**; edad HR 1,32 [0,79–2,18]), con **C-index 0,72**, concordante con el AUC logístico. Coherentemente, la cohorte en riesgo estuvo dominada por el subtipo **amnésico multidominio ($\approx 76\%$)**, y el multidominio fue **89% amnésico** (190/214). El subtipo amnésico mostró un mecanismo de **almacenamiento comprometido** en ~70% de los casos con mecanismo evaluable (122/175), con predominio de la firma hipocampal sobre la de recuperación (~70% vs ~30%); esta firma **enriquece** la caracterización del subtipo amnésico pero, en esta muestra, **no estratifica el riesgo más allá del propio subtipo**.

Qué anticipa el agravamiento: modelos predictivos (Figura 5, Tabla 2)

El modelo **pre-especificado de dos variables —recuerdo diferido de relatos y edad—** anticipó el agravamiento con **AUC 0,74 (IC95% bootstrap 0,63–0,83)** en la cohorte leve-moderado (140 pacientes, 37 eventos; EPV 18,5; **13 pacientes [9%] con el predictor de memoria imputado — casos completos 127/35, AUC concordante**). Su utilidad principal es la **estratificación de riesgo**: la progresión observada creció por tercil de riesgo predicho (**9% → 26% → 45%**; $n \approx 47$ por tercil), con **VPN 92%** (buen descarte) y VPP ~45%. La **calibración** de la discriminación fue adecuada (pendiente 0,88); el ajuste con ponderación por clases sobre-estima el riesgo absoluto, corregido mediante recalibración de Platt en el despliegue, por lo que la herramienta se interpreta como **estratificador de riesgo relativo**, no como calculadora de probabilidad individual exacta. Añadir la severidad basal (casi-circular; +0,01 de AUC), el **GDS** o el **CQC** no mejoró la discriminación. En el subgrupo DCL rindió AUC 0,76 (IC95% 0,59–0,88; 96/18) y el modelo de declive cognitivo fiable 0,68 (0,58–0,77; 250/47). Un modelo de árbol de AUC aparente 0,97 colapsó a ~0,66 bajo corrección de optimismo (sobreajuste). El análisis exploratorio con criterio funcional independiente (ADLQ) es frágil y se reporta en el material suplementario.

Discusión

En una clínica de memoria argentina de mundo real, los perfiles neuropsicológicos siguieron una trayectoria **amnésico-céntrica**, y la progresión se anticipó con un modelo parsimonioso, normado localmente. Discutimos los hallazgos bajo la lente de la evidencia de alto impacto y su **utilidad para el neurólogo cognitivo**.

El eje del riesgo es la memoria — y esto orienta la conducta clínica. El riesgo de agravamiento fue varias veces mayor con memoria comprometida (OR 9,3), y el análisis temporal (Cox HR 0,55/DE; C-index 0,72) mostró que la señal es estable en el tiempo. Es consistente con la evidencia de que el síndrome amnésico de tipo temporal-medial identifica la EA prodrómica con alta especificidad[7] y con el recuerdo diferido como predictor central de conversión,[8–13] y con que el DCL amnésico multidominio conlleva mayor riesgo.[5,17] Para el neurólogo cognitivo, la implicancia es concreta: **ante un DCL, el peso del compromiso de memoria episódica de almacenamiento debe elevar el umbral de vigilancia, acortar el intervalo de reevaluación y motivar la búsqueda etiológica** (biomarcadores, neuroimagen de lóbulo temporal medial), mientras que un perfil no amnésico con memoria conservada, en esta muestra, tuvo un riesgo de agravamiento marcadamente menor.

La interpretación del cambio seriado exige psicometría de cambio fiable — y disciplina inferencial. La regresión a la media y el efecto de piso distorsionan el cambio crudo: en una clínica de memoria, los tests de memoria diferida están saturados al basal y parecen “estables” por censura. El RCI regression-based y el manejo explícito del piso son imprescindibles, y aportamos normas locales de cambio fiable, de las primeras para esta población. Ahora bien, somos deliberadamente cautos: **ningún contraste de trayectoria por test sobrevivió la corrección por comparaciones múltiples**, por lo que los patrones fenotipo-específicos se ofrecen como **hipótesis a confirmar**, no como una firma mecanística. Esta autocontención —reportar el patrón sin sobre-interpretarlo— es, en sí, un mensaje metodológico para la lectura de datos seriados en la práctica.[26,27]

Un modelo de dos variables ofrece utilidad de rutina como estratificador de riesgo. Recuerdo diferido y edad anticiparon el agravamiento (AUC 0,74; IC95% 0,63–0,83), sobre todo como **prueba de descarte** (VPN 92%) y **ordenador de riesgo** (progresión 9%→45% del tercil inferior al superior). Para el neurólogo cognitivo sin acceso rutinario a biomarcadores —la realidad de gran parte de Latinoamérica[23–25]— esto es directamente accionable: **dos números de una evaluación estándar ubican al paciente en una banda de riesgo relativo que informa la frecuencia de seguimiento y la priorización de estudios**, sin sustituir el juicio clínico. El techo del desempeño lo fija el tamaño muestral y la ausencia de biomarcadores más que el

algoritmo, consistente con las iniciativas regionales que buscan extraer el máximo de **medidas de rutina** y anticipan el aporte de biomarcadores en sangre.[24,25]

Alcance y encuadre honestos. El desenlace es un **proxy psicométrico de severidad, no demencia confirmada**; su naturaleza (banda derivada de la misma narrativa que informa el predictor) implica un riesgo de **circularidad parcial** que declaramos abiertamente. La contribución es, por tanto, un **estratificador de riesgo de agravamiento cognitivo** normado localmente, no un diagnosticador. Dos productos digitales abiertos materializan el trabajo y corren íntegramente en el navegador (sin transmitir datos): un **estratificador de riesgo** individual y un **artefacto navegable de trayectoria cognitiva**, que llevan la descripción y la estratificación a la consulta.

Fortalezas y limitaciones. Fortalezas: datos genuinos de mundo real; depuración e identificación auditadas con recuperación de N; una variable perfil reproducible; psicometría de cambio fiable con control de multiplicidad; validación interna con IC bootstrap y calibración reportados según TRIPOD/STROBE; análisis de tiempo-al-evento; y liberación abierta de código y herramientas. Limitaciones que acotan las conclusiones a un nivel exploratorio: (i) **unicéntrico**, con eventos escasos (subgrupos con EPV bajo e IC amplios); (ii) **desenlace = proxy de severidad sin criterio funcional universal**, con posible circularidad parcial predictor–desenlace; (iii) **codificación por IA** = extracción de texto con fiabilidad LLM–LLM, pendiente de validación contra experto humano; (iv) **sesgo de selección** de quiénes se reevalúan y **censura informativa** → la proporción de progresión es un límite inferior y no se modeló el riesgo competitivo de muerte; (v) **datos faltantes** en el predictor de memoria (9%) manejados por imputación, con sensibilidad en casos completos; (vi) desenlace binario a seguimiento variable, mitigado —no resuelto— por el análisis de Cox; (vii) mayoría con solo 2 visitas (85%), lo que impide modelar la forma de la trayectoria individual (por eso el análisis de trayectoria es descriptivo). La **validación externa** —en consorcios regionales y frente a biomarcadores en sangre[25]— es el paso esencial.

Conclusiones

Los perfiles cognitivos siguen una trayectoria amnésico-céntrica; el compromiso de memoria episódica de almacenamiento es el eje del riesgo de progresión, estable en el análisis temporal. El agravamiento a un rango de severidad demencial es anticipable con memoria diferida y edad, útil como prueba de descarte y estratificador de riesgo. Se aportan dos productos digitales abiertos. Los hallazgos son exploratorios y unicéntricos; el desenlace es un proxy psicométrico, **no** demencia confirmada, y se requiere validación externa.

Tablas

Tabla 1. Cohorte, depuración y fiabilidad de la codificación.

Variable	Reevaluación (n = 254)	Una visita (n = 2644)
Edad, años (media ± DE)	66,9 ± 14,3	63,8 ± 19,1
Educación, años (media ± DE)	13,4 ± 3,4	12,8 ± 3,7
Sexo femenino, %	56	56
Seguimiento, años, mediana (IQR)	1,83 (1,25–2,97)	—

Depuración: 84 exclusiones (81 duplicados mismo día por hash + 3 sin fecha); 63 perfiles y 4 reevaluaciones recuperados → 219 analizables (basal y final). Fiabilidad entre dos codificaciones ciegas (κ, extracción LLM–LLM, no vs experto humano): severidad 1,00; subtipo 0,88.


Tabla 2. Rendimiento de los modelos (TRIPOD; validación interna, optimismo-correcto).

Desenlace / cohorte	n / eventos	Predictores	AUC [IC95% bootstrap]
Rango de severidad demencial — leve-moderado (primario)	140 / 37	Memoria de relatos diferida + edad	0,74 [0,63–0,83]
Rango de severidad demencial — subgrupo DCL	96 / 18	Memoria de relatos diferida + edad	0,76 [0,59–0,88]
Declive cognitivo fiable (bandas normal/demencial)	250 / 47	edad, Rey trial 1, intrusiones, CI premórbido, Hayling	0,68 [0,58–0,77]

Estratificación (modelo primario): progresión observada por tercil 9% / 26% / 45% (n≈47 c/u); VPN 92%, VPP ~45%; calibración pendiente 0,88, Brier 0,21 (el ajuste ponderado sobre-estima el riesgo absoluto, recalibrado por Platt en el despliegue). El predictor de memoria estuvo imputado en 13/140 (9%); casos completos 127/35, AUC concordante. El IC95% es bootstrap sobre predicciones fuera-de-muestra; la dispersión entre folds fue mayor y no es un IC. El modelo primario coincide con `models_deploy.json` en n/eventos/coeficientes. Análisis funcional ADLQ y detalle: material suplementario.


Figuras

Figura 1. Flujo de la cohorte y depuración (STROBE).




334 con ≥2 evaluaciones → 84 excluidos (81 duplicados por hash + 3 sin fecha) → 254 reevaluaciones (4 recuperadas); 63 perfiles recuperados del PDF → 219 analizables; cohortes DCL (96) y leve-moderado (140).

Figura 2. Trayectoria de banda: matriz de transición de severidad (basal → reevaluación).




Proporción por fila; sobre la diagonal = progresión. Ningún normal basal progresó a rango demencial.

Figura 3. Cambio fiable por test, descriptivo (por severidad y por fenotipo basal).




% de pacientes con cambio fiable (RCI regression-based) por test, excluidos los ya-en-piso al basal. Análisis descriptivo/generador de hipótesis: ningún contraste sobrevive corrección FDR (q mín 0,091); celdas rayadas $n < 15$, no interpretables. El n figura en cada celda.

Figura 4. El eje del riesgo en el tiempo: incidencia acumulada de progresión por estado de memoria basal (Kaplan-Meier).



Cohorte leve-moderado. Cox: memoria HR 0,55 [0,40-0,76]/DE; log-rank $p=0,010$; C-index 0,72. Bandas: IC95%; marcas: censura.

Figura 5. Qué anticipa el agravamiento: rendimiento del modelo (memoria + edad).



(a) Discriminación (AUC 0,74 [0,63-0,83]); (b) estratificación por tercil de riesgo (9%/26%/45%); (c) efectos (OR en dirección de riesgo).

Figura 6. Estratificador de riesgo desplegado (client-side).

Kaizen-AI · Neurociencias San Juan
ES EN

CALCULADORA DE RIESGO · PROTOTIPO DE INVESTIGACIÓN

Riesgo de progresión a demencia y declive cognitivo

Estimación individualizada del riesgo de empeoramiento cognitivo a ~2 años desde la evaluación basal. Entrenada con datos reales del instituto, normada localmente.

⚠ Herramienta de investigación/educativa. NO es un dispositivo médico ni sustituye el juicio clínico. Los datos no salen de tu navegador.

Datos del paciente (basal)

Cálculo local y en vivo. Los campos aparecen según el modelo que corresponde.

1 SEVERIDAD DEL PERFIL (DE LA CONCLUSIÓN)

Deterioro cognitivo leve (DCL) ▼

Modelo aplicable: **Progresión a demencia · DCL leve** · AUC 0.84

2 PUNTAJES DEL INFORME

Memoria de Relatos · Diferido z

-2.0

Edad años

72

Progresión a demencia · DCL leve

Riesgo de que un DCL leve progrese a demencia (~2 años).

Completá los campos para calcular el riesgo.

RESPALDO CIENTÍFICO

Cómo funciona y qué tan confiable es

CÓMO SE CONSTRUYÓ

Regresión logística parsimoniosa (2-5 variables) sobre la evaluación basal. Cero...

VALIDACIÓN

CV anidada + optimismo-correctado (Stouffer) · LOOCV · calibración Platt

LÍMITES

Prototipo (n≈85-250, pocos eventos). Sin validación externa. Pruebas retrospectivas

Prototipo de investigación, no validado para decisión clínica. <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-demencia/>

Referencias

Recuperadas y verificadas vía PubMed. Se incluye DOI.

1. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, et al. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. *Arch Neurol*. 1999. <https://doi.org/10.1001/archneur.56.3.303>
2. Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concepts in mild cognitive impairment. *Arch Neurol*. 2001. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.12.1985>
3. Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, et al. Mild cognitive impairment — beyond controversies, towards a consensus. *J Intern Med*. 2004. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2004.01380.x>
4. Ganguli M, Snitz BE, Saxton JA, et al. Outcomes of mild cognitive impairment by definition: a population study. *Arch Neurol*. 2011. <https://doi.org/10.1001/archneurol.2011.101>
5. Espinosa A, Alegret M, Valero S, et al. A longitudinal follow-up of 550 mild cognitive impairment patients. *J Alzheimers Dis*. 2013. <https://doi.org/10.3233/JAD-122002>
6. Allegri RF, Glaser FB, Taragano FE, Buschke H. Mild cognitive impairment: believe it or not? *Int Rev Psychiatry*. 2008. <https://doi.org/10.1080/09540260802095099>
7. Sarazin M, Berr C, De Rotrou J, et al. Amnesic syndrome of the medial temporal type identifies prodromal AD: a longitudinal study. *Neurology*. 2007. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000279336.36610.f7>
8. Gainotti G, Quaranta D, Vita MG, Marra C. Neuropsychological predictors of conversion from MCI to Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-130881>
9. Modrego PJ. Predictors of conversion to dementia of probable Alzheimer type in patients with MCI. *Curr Alzheimer Res*. 2006. <https://doi.org/10.2174/156720506776383103>
10. García-Herranz S, Díaz-Mardomingo MC, Peraíta H. Neuropsychological predictors of conversion to probable Alzheimer disease in elderly with MCI. *J Neuropsychol*. 2016. <https://doi.org/10.1111/jnp.12067>
11. López ME, Turrero A, Cuesta P, et al. A multivariate model of time to conversion from MCI to Alzheimer's disease. *GeroScience*. 2020. <https://doi.org/10.1007/s11357-020-00260-7>
12. Park HK, Choi SH, Park SA, et al. Memory performance on the story recall test and prediction of progression in MCI and Alzheimer's dementia. *Geriatr Gerontol Int*. 2017. <https://doi.org/10.1111/ggi.12940>
13. Bao J, Wang Y, Qu D, et al. Impairment of delayed recall as a predictor of amnesic MCI development in normal older adults. *BMC Psychiatry*. 2023. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05309-3>
14. Bondi MW, Edmonds EC, Jak AJ, et al. Neuropsychological criteria for MCI improves diagnostic precision, biomarker associations, and progression rates. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-140276>
15. Jak AJ, Preis SR, Beiser AS, et al. Neuropsychological criteria for MCI and dementia risk in the Framingham Heart Study. *J Int Neuropsychol Soc*. 2016. <https://doi.org/10.1017/S1355617716000199>
16. Wong CG, Thomas KR, Edmonds EC, et al. Neuropsychological criteria for MCI in the Framingham Heart Study's old-old. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2018. <https://doi.org/10.1159/000493541>
17. Lee YC, Kang JM, Lee H, et al. Amnesic multiple cognitive domains impairment and periventricular WMH predict progression to dementia in MCI. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2016. <https://doi.org/10.1002/gps.4035>
18. Persson K, Eldholm RS, Barca ML, et al. Visual evaluation of medial temporal lobe atrophy as a marker of conversion from MCI to dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2017. <https://doi.org/10.1159/000477342>
19. Mortimer JA, Borenstein AR, Gosche KM, Snowdon DA. Very early detection of Alzheimer neuropathology and the role of brain reserve. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2005. <https://doi.org/10.1177/0891988705281869>
20. Taragano FE, Allegri RF, Lyketsos C. Mild behavioral impairment: a prodromal stage of dementia. *Dement Neuropsychol*. 2008. <https://doi.org/10.1590/S1980-57642009DN20400004>
21. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet*. 2020. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30367-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6)
22. Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *Lancet*. 2024. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01296-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01296-0)
23. Parra MA, Baez S, Allegri R, et al. Dementia in Latin America: assessing the present and envisioning the future. *Neurology*. 2018. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004897>

24. Maito MA, Santamaría-García H, Moguilner S, et al. Classification of Alzheimer's disease and frontotemporal dementia using routine clinical and cognitive measures across multicentric underrepresented samples. *Lancet Reg Health Am.* 2022. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100387>
25. Caviedes A, et al. Blood-based AT(N) biomarkers for Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration in Latin America. *Nat Aging.* 2026. <https://doi.org/10.1038/s43587-025-01061-3>
26. Jacobson NS, Truax P. Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. *J Consult Clin Psychol.* 1991. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.1.12>
27. Tröster AI, Woods SP, Morgan EE. Assessing cognitive change in Parkinson's disease: practice effect-corrected reliable change indices. *Arch Clin Neuropsychol.* 2007. <https://doi.org/10.1016/j.acn.2007.05.004>
28. Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KGM. Transparent reporting of a multivariable prediction model (TRIPOD). *Ann Intern Med.* 2015. <https://doi.org/10.7326/M14-0697>