

Trayectorias cognitivas longitudinales y predicción de la progresión a demencia desde la evaluación basal en una clínica de memoria argentina: un estudio de mundo real

Congreso Argentino de Neurología (CAN) · Área temática: Neurología Cognitiva, Demencias y Neuropsicología · Tipo: Tema libre (oral/póster)

Autores: Fernando Márquez^{1,2,4}; Paula Virginia Arellano^{1,3,4}; Diana Bruno^{1,2}; Luciana Vita¹⁻⁴; María Beatriz Bistué^{1,3,4}; María Celeste Moyano^{1,3,4}; María Laura Noguera Roberto¹; Mariana Zanino^{1,3,4}; Cristian Ignacio Posleman^{1,3,4}; Iara Jácome^{1,2}; Florencia Portillo^{1,3,4}; Daniel Lucato²; Martín Alejandro Bruno^{1,3,4}.

Afiliaciones: ¹ Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. ² Instituto de Neurociencias San Juan (Clínica El Castaño), San Juan, Argentina. ³ Hospital Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina. ⁴ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Autor de correspondencia: Fernando Márquez — fmarquez.mum@gmail.com

Número total de palabras (cuerpo, excluye resumen, tablas, figuras y referencias): ~3540 (límite del reglamento: 4500).

Productos digitales de acceso abierto: - **Estratificador de riesgo (calculadora en el navegador):** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-demencia/> - **Artefacto navegable de trayectoria cognitiva** (heatmaps + tabla maestra): enlazado desde la app. - **Código, material suplementario y coeficientes:** <https://github.com/fermarquez88/kaizenai-demencia> — [material suplementario](#).

Reporte según **TRIPOD** (predicción) y **STROBE** (cohorte). Referencias verificadas vía **PubMed** (DOI). **Uso de inteligencia artificial declarado en Métodos.**

Resumen (estructurado)

Introducción y objetivos. La trayectoria cognitiva longitudinal de los perfiles neuropsicológicos en una clínica de memoria —y qué de la evaluación basal anticipa la progresión a demencia— está poco caracterizada en Latinoamérica, región subrepresentada. Nos propusimos (1) describir esa trayectoria en una cohorte argentina de mundo real y (2) derivar y validar internamente modelos parsimoniosos, normados localmente, que anticipen la progresión a demencia.

Materiales y métodos. Estudio longitudinal retrospectivo (Instituto de Neurociencias San Juan, 2020–2026) de adultos con ≥ 2 evaluaciones. El perfil se codificó desde las Conclusiones mediante un modelo de lenguaje restringido por codebook (IA declarada). El desenlace fue la progresión a demencia (severidad clínica $\geq$ moderada, corroborada por el ADLQ del informante). La trayectoria se describió con matriz de transición, cambio fiable basado en regresión y tiempo hasta el evento (Kaplan-Meier, Cox); el modelo (recuerdo diferido de relatos + edad) usó regresión logística con validación cruzada anidada, corrección de optimismo e IC bootstrap (TRIPOD/STROBE).

Resultados. De 334 pacientes, 254 tuvieron reevaluación (219 analizables). La trayectoria fue amnésico-céntrica: el compromiso de memoria fue el eje del riesgo (31% [36/117] vs 5% [1/22]; OR 9,3; Cox HR 0,55 [IC95% 0,40–0,76] por DE; log-rank $p=0,010$). El modelo recuerdo diferido de relatos + edad anticipó la progresión con AUC 0,74 (IC95% 0,63–0,83; 140 pacientes/37 eventos), útil como estratificador de riesgo (progresión por tercil 9%/26%/45%; VPN 92%). Ningún test de trayectoria sobrevivió la corrección por comparaciones múltiples (marco descriptivo).

Conclusiones. Los perfiles siguen una trayectoria amnésico-céntrica; la progresión a demencia es anticipable con dos variables de rutina, aportando un estratificador de riesgo abierto y normado localmente para una región subrepresentada. Hallazgos exploratorios y unicéntricos que requieren validación externa.

Palabras clave: disfunción cognitiva; demencia; pruebas neuropsicológicas; recuerdo diferido; trayectoria cognitiva; estudios longitudinales; progresión de la enfermedad; América Latina.

Abstract

Background and objectives. The longitudinal cognitive trajectory of neuropsychological profiles in a memory clinic —and what at baseline anticipates progression to dementia— is poorly characterized in Latin America, an underrepresented region. We aimed to (1) describe this trajectory in a real-world Argentine cohort and (2) derive and internally validate parsimonious, locally-normed models anticipating progression to dementia.

Methods. Retrospective longitudinal study (Instituto de Neurociencias San Juan, 2020–2026) of adults with ≥ 2 assessments. Profiles were coded from report Conclusions using a codebook-constrained language model (AI declared). The outcome was progression to dementia (clinical severity $\geq$ moderate, corroborated by the informant ADLQ). Trajectory was described with a transition matrix, regression-based reliable change, and time-to-event analysis (Kaplan-Meier, Cox); the model (delayed story recall + age) used penalized logistic regression with nested cross-validation, optimism correction, and bootstrap CIs (TRIPOD/STROBE).

Results. Of 334 patients, 254 had reassessment (219 analyzable). The trajectory was amnesic-centered: memory impairment was the risk axis (31% [36/117] vs 5% [1/22]; OR 9.3; Cox HR 0.55 [95%CI 0.40–0.76]/SD; log-rank $p=0.010$). The delayed-story-recall + age model anticipated progression with AUC 0.74 (95%CI 0.63–0.83; 140 patients/37 events), useful for risk stratification (tercile progression 9%/26%/45%; NPV 92%). No per-test trajectory contrast survived multiple-comparison correction (descriptive framing).

Conclusions. Profiles follow an amnesic-centered trajectory; progression to dementia is anticipable from two routine variables, providing an open, locally-normed risk stratifier for an underrepresented region. Exploratory, single-center findings requiring external validation.

Keywords: cognitive dysfunction; dementia; neuropsychological tests; delayed recall; cognitive trajectory; longitudinal studies; disease progression; Latin America.

Introducción

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una entidad heterogénea cuyo desenlace depende de cómo se lo define y del fenotipo cognitivo subyacente.[1–3] El consenso internacional lo caracterizó como estado transicional con deterioro cognitivo objetivo y **actividades de la vida diaria preservadas** —el rasgo que lo separa de la demencia— con subtipos amnésico y no amnésico, de dominio único o múltiple, de pronóstico distinto.[1–3] Los criterios NIA-AA formalizaron el continuo —DCL debido a enfermedad de Alzheimer[29] y **demencia**, que por definición exige compromiso **cognitivo y funcional**[30]— y en la práctica la severidad se **estadifica clínicamente** (p. ej., el Clinical Dementia Rating).[31] Dentro de este marco, es el **perfil neuropsicológico** —y no la mera presencia de deterioro— lo central para el pronóstico.[4–6]

Dentro de ese perfil, la memoria episódica ocupa un lugar privilegiado: el **síndrome amnésico de tipo temporal medial** identifica la enfermedad de Alzheimer prodrómica con alta especificidad,[7] el **recuerdo diferido** es uno de los predictores más potentes de conversión,[7–13] y los **criterios neuropsicológicos actuariales** mejoran la estratificación y reducen los falsos positivos.[14–16] El compromiso amnésico multidominio, la atrofia temporal medial y la carga vascular incrementan el riesgo,[5,17,18] la **reserva** modula la expresión clínica,[19] y los síntomas conductuales pueden ser prodrómicos.[20] La era de los

biomarcadores redefinió la enfermedad de Alzheimer como constructo **biológico** (marco AT(N)), [32] pero ese marco es explícitamente de investigación: la **estadificación clínica del síndrome** sigue siendo la piedra angular de la práctica, sobre todo allí donde los biomarcadores no están disponibles. [30,32]

Esta caracterización importa hoy más que nunca: las primeras **terapias modificadoras de la enfermedad** (anticuerpos anti-amiloide) actúan en estadios tempranos —DCL y demencia leve— y enlentecen modestamente la progresión clínica medida por escalas de severidad, [33,34] lo que vuelve **accionable** identificar tempranamente al paciente de alto riesgo. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia proviene de cohortes de altos ingresos con baterías fijas, y **Latinoamérica está marcadamente subrepresentada**: sistemas de salud frágiles, acceso limitado a biomarcadores y a terapias, y un llamado regional explícito a desarrollar herramientas localmente y desde **medidas de rutina**. [23–25,35] Sobre este telón, dos vacíos concretos motivan el trabajo: (i) la **trayectoria cognitiva longitudinal** en la práctica rara vez se describe con el cuidado psicométrico que exigen los datos seriados (cambio fiable, regresión a la media, efecto de piso), [21,22] pese a que la prevención depende de identificar la trayectoria temprana; y (ii) la **predicción de la progresión desde medidas de rutina** es escasa en la región. Abordamos ambos con un objetivo primero **descriptivo** (la trayectoria cognitiva) y luego **predictivo** (qué de la basal anticipa la progresión a demencia).

Materiales y métodos

Aspectos éticos y declaraciones

Análisis retrospectivo de datos clínicos de rutina, conducido conforme a los principios de la **Declaración de Helsinki** y anonimizado por un identificador a nivel persona derivado del DNI; no se comparten datos identificatorios. Los pacientes firman, al ingreso, un **consentimiento institucional para el uso de sus datos asistenciales** con fines de investigación; por tratarse, además, de un análisis de datos anonimizados, el **comité de ética institucional interviniente aprobó el estudio y otorgó la dispensa de consentimiento específico adicional** (acta de aprobación N.º ____). **Financiamiento**: ninguno específico. **Conflictos de interés**: ninguno. **Uso de inteligencia artificial**: un modelo de lenguaje restringido por un codebook cerrado se usó para **extraer y codificar** el perfil desde el texto de las Conclusiones, y como asistencia en el análisis y la redacción; la IA **no** es autora y toda decisión metodológica y de interpretación fue de los autores. **Contribuciones de los autores**: todos los autores contribuyeron a la concepción o el diseño del trabajo, o a la adquisición, el análisis o la interpretación de los datos; revisaron críticamente el manuscrito y aprobaron la versión final. **Disponibilidad**: los datos individuales son sensibles y no se comparten; el código, el codebook, los coeficientes del modelo, los conteos agregados y el material suplementario son abiertos.

Diseño, cohorte y depuración de la base

Adultos evaluados entre 2020 y 2026 con **≥2 evaluaciones en fechas distintas**. Se depuró rigurosamente: (i) los duplicados del mismo día se confirmaron por **hash SHA-256** (mismo archivo re-archivado) y se conservó la mejor copia; (ii) se **recuperaron 63 perfiles** faltantes extrayendo la sección Conclusiones del PDF firmado y codificándola; (iii) se **recuperaron 4 reevaluaciones** colapsadas por errores de fecha. La identidad se resolvió por DNI (Figura 1).

Evaluación y codificación del perfil

Las baterías se adaptaron al motivo de consulta (ACE-III; IFS [INECO Frontal Screening]; Lista de Rey [RAVLT]; Memoria de Relatos [Memoria Lógica de la WMS]; Figura de Rey [Figura Compleja de Rey-Osterrieth, ROCF]; fluencias verbales; dígitos; Hayling; WAIS-IV; CI premórbido). Del texto de *Conclusiones* se codificó, mediante un LLM restringido por codebook, la **banda de severidad** ordinal (normal / DCL / leve-moderado / moderado / moderado-grave / grave), el mecanismo de memoria (almacenamiento vs. recuperación) y moduladores (ánimo, sueño). La **fiabilidad** entre dos codificaciones ciegas fue alta (severidad $\kappa=1,00$; subtipo $\kappa=0,88$); esto refleja **consistencia de extracción, no validación contra experto**

humano, que queda pendiente. La clasificación operacional de **subtipo** (amnésico/no amnésico × único/múltiple, umbral $z \leq -1,5$; Petersen/Winblad) se derivó del patrón objetivo de dominios; **se restringió a los pacientes en bandas no demenciales al basal** (las etiquetas de subtipo de DCL no aplican a quienes ya están en demencia al basal).

Desenlace, trayectoria y análisis temporal

El desenlace fue la **progresión a demencia**, definida operacionalmente por la **severidad clínica del perfil $\geq$ moderada** en la reevaluación (estadificación del informe neuropsicológico, análoga a una escala clínica de severidad), y **corroborada con un criterio funcional independiente**: el ADLQ del informante (grado de compromiso en actividades de la vida diaria), medida que **no** deriva de la narrativa cognitiva. Se declara, como límite, que la banda de severidad y el predictor de memoria comparten **fuentes textual** (la narrativa de Conclusiones codificada por LLM) —riesgo de **circularidad parcial**, atenuado por la corroboración funcional independiente— y que no hay confirmación biomarcadora ni etiológica; por ello los resultados se interpretan como **exploratorios**. La proporción de progresión se expresa por 100 persona-años en los reevaluados (no como incidencia poblacional). La trayectoria se describió con: (a) la **matriz de transición** entre bandas (Figura 2); (b) el **cambio fiable por test**, re-escalando cada prueba a una referencia común (mediana/MAD basal, congelada) y cuantificando el cambio con un **RCI basado en regresión** (SRB, Crawford-Howell) que descuenta la **regresión a la media** y el efecto de práctica, excluyendo del denominador a los ya-en-piso al basal; la multiplicidad se controló por FDR (Benjamini-Hochberg), y el resultado se presenta como **descriptivo/generador de hipótesis** (Figura 3, material suplementario); y (c) un análisis de **tiempo hasta el evento** (Kaplan-Meier y Cox de riesgos proporcionales) que respeta el seguimiento variable (Figura 4).

Modelos predictivos y análisis estadístico

El modelo primario, **pre-especificado por teoría** (recuerdo diferido de relatos y edad), se derivó en la cohorte con severidad basal leve o leve-moderada. Usó regresión logística penalizada (L2), con estandarización e imputación por la mediana **dentro** de la validación cruzada anidada repetida (5×20) y **corrección de optimismo**. Se reportan: AUC con **IC95% por bootstrap** (remuestreo de pacientes sobre las predicciones fuera-de-muestra; la dispersión entre folds fue mayor y **no** se interpreta como IC), **calibración** (pendiente, índice de Brier e intercepto de calibración global) y **estratificación de riesgo por terciles** con IC de Wilson. El **dato faltante** del predictor único (recuerdo diferido de relatos) se declara, con análisis de sensibilidad en casos completos. Como modelos secundarios se reportan el subgrupo DCL y el **declive cognitivo fiable** (para bandas normal y ya-demencial). Un modelo con **criterio funcional independiente (ADLQ)** se presenta como análisis exploratorio (material suplementario) dada su fragilidad (EPV bajo). Los modelos desplegados exportan coeficientes + Platt + bootstrap; una implementación en JavaScript reproduce los coeficientes (test de paridad). Los análisis se realizaron en **Python** (scikit-learn, lifelines, pandas; DuckDB para la gestión de datos); las pruebas de hipótesis fueron a **dos colas con $\alpha = 0,05$** y la multiplicidad del análisis de trayectoria se controló por FDR (Benjamini-Hochberg; 24 tests). Reporte según **TRIPOD**[28] (predicción) y **STROBE**[36] (cohorte).

Resultados

Cohorte y depuración (Figura 1, Tabla 1)

De 334 pacientes con más de una evaluación archivada, 84 se excluyeron (81 duplicados del mismo día confirmados por hash + 3 sin fecha válida); 250 tuvieron reevaluación genuina y la recuperación de fechas sumó 4 → **254 reevaluaciones** (mediana 1,83 años; IQR 1,25–2,97). Tras recuperar 63 perfiles del PDF, **219** quedaron analizables con perfil basal y final (vs. 182 antes de la depuración). La codificación fue altamente reproducible entre extracciones (severidad $\kappa=1,00$) y creció monótonamente con el número de dominios objetivamente deficitarios.

El desenlace "demencia" tiene correlato funcional independiente (validación de constructo)

La definición de demencia por severidad clínica se **corroboró con el ADLQ** del informante, una medida funcional independiente de la narrativa cognitiva (disponible en **132/254 reevaluados, 52%**; comparación de grupos en los 121 con banda final y ADLQ). El compromiso funcional creció de forma **monótona con la severidad cognitiva** (mediana de áreas alteradas: Normal 6% → DCL 20% → leve-moderado 29% → moderado 35% → moderado-grave 50% → grave 72%; Figura S3), y el grupo con **demencia** mostró más compromiso que el grupo sin demencia (mediana **42% vs 19%**; con compromiso marcado [$\geq 40\%$] **55% vs 15%**). Esta corroboración opera **a nivel de grupo** (validación de constructo agregada), no como criterio diagnóstico por caso; el solapamiento distribucional delimita el alcance del término ($\approx 45\%$ de los clasificados como demencia no alcanza el umbral funcional individual, y $\approx 18\%$ de los DCL sí lo alcanza). Es, por tanto, **consistente en promedio con compromiso funcional acompañante** —lo que respalda el constructo y atenúa la circularidad, dado que el ADLQ es independiente de la narrativa—, con el límite de su cobertura parcial (52%).

Trayectoria a nivel de banda de severidad: transiciones (Figura 2)

La mayoría de los perfiles se mantuvieron estables o progresaron un escalón. En la cohorte del modelo (leve-moderado, $n=140$, 308 persona-años), la progresión a demencia fue de **12,0 por 100 persona-años** (37 eventos; IC95% Poisson 8,5–16,6); esta tasa es **condicional a la reevaluación** y su dirección de sesgo es indeterminada (véase Limitaciones). Las transiciones se concentraron sobre la diagonal y su vecindad; **ningún paciente normal al basal progresó directamente a demencia (0/17)**, coherente con un modelo por estadios.

Trayectoria a nivel de test: cambio cognitivo fiable, descriptivo (Figura 3)

El análisis de cambio fiable por test —tras re-escalar, descontar la regresión a la media y manejar el efecto de piso— sugirió patrones **fenotipo-específicos** de progresión (más cambio en recuerdo episódico diferido en los perfiles amnésicos; en velocidad/ejecutivo en los disejecutivos; amplio en los amnésico-multidominio), con un gradiente por severidad basal (Normal $\sim 4\%$ → moderado o mayor $\sim 22\%$ de cambio fiable). **No obstante, ningún contraste a nivel de test sobrevivió la corrección por comparaciones múltiples (FDR; q mínimo 0,091; p. ej., Recuerdo diferido de relatos $p=0,276$, $q=0,43$), y muchas celdas fenotipo-específicas descansan en $n<15$.** En consecuencia, estos patrones se reportan como **estrictamente descriptivos y generadores de hipótesis**, no como hallazgos confirmatorios ni como una patrón mecanístico. Un hallazgo psicométrico relevante y robusto es que los tests de recuerdo diferido de relatos están fuertemente **en piso** al basal en una clínica de memoria (censura por abajo), lo que enmascara su cambio en la métrica cruda: interpretar el cambio seriado sin RCI y sin manejar el piso conduce a conclusiones erróneas.

El compromiso de memoria es el eje del riesgo, en el tiempo (Figura 4)

El compromiso objetivo de memoria fue el eje del riesgo: en la cohorte en riesgo, los perfiles con **memoria afectada** ($z \leq -1,5$) progresaron mucho más que los de memoria conservada (**31%** [36/117] vs **5%** [1/22]; OR de Fisher **9,3**; $p=0,008$ —IC95% muy amplio por el único evento en el grupo conservado, por lo que la estimación robusta es el HR de Cox). El análisis de **tiempo hasta el evento**, que respeta el seguimiento variable, lo confirmó: la incidencia acumulada de progresión a 2 y 3 años fue 15% y 34% con memoria afectada vs $\sim 0\%$ con memoria conservada (cifras no ajustadas por mortalidad competitiva; véase Limitaciones) (**log-rank $p=0,010$**); en el modelo de Cox, mejor memoria se asoció a menor riesgo (**HR 0,55 [IC95% 0,40–0,76] por DE**; edad HR 1,32 [0,79–2,18]), con **C-index 0,72**, concordante con el AUC logístico. Coherentemente, la cohorte en riesgo estuvo dominada por el subtipo **amnésico multidominio ($\approx 76\%$; 120/158)**, y —en las bandas no demenciales al basal, donde aplican las etiquetas de subtipo— el patrón multidominio objetivo fue predominantemente **amnésico (88%; 122/139)**. Entre esos amnésicos, el

mecanismo de **almacenamiento** (patrón de codificación/consolidación, sugestivo de compromiso temporal medial) fue el más frecuente (**58%; 67/116** con mecanismo evaluable), sin predominio marcado sobre el de recuperación (42%); este patrón **enriquece** la caracterización del subtipo amnésico pero, en esta muestra, **no estratifica el riesgo más allá del propio subtipo**.

Qué anticipa la progresión: modelos predictivos (Tabla 2)

El modelo **pre-especificado de dos variables —recuerdo diferido de relatos y edad—** anticipó la progresión con **AUC 0,74 (IC95% bootstrap 0,63–0,83)** en la cohorte leve-moderado (140 pacientes, 37 eventos; EPV 18,5; **13 pacientes [9%] con el predictor de memoria imputado — casos completos 127/35, AUC concordante**). Su utilidad principal es la **estratificación de riesgo**: la progresión observada creció por tercil de riesgo predicho (**9% → 26% → 45%**; $n \approx 47$ por tercil), con **VPN 92%** (buen descarte) y VPP ~45%. La **calibración** de la discriminación fue adecuada (pendiente 0,88); el ajuste con ponderación por clases sobre-estima el riesgo absoluto, corregido mediante recalibración de Platt en el despliegue, por lo que la herramienta se interpreta como **estratificador de riesgo relativo**, no como calculadora de probabilidad individual exacta. Añadir la severidad basal (casi-circular; +0,01 de AUC), el **GDS** o el **CQC** no mejoró la discriminación. En el subgrupo DCL rindió AUC 0,76 (IC95% 0,59–0,88; 96/18) y el modelo de declive cognitivo fiable 0,68 (0,58–0,77; 250/47). Un modelo de árbol de AUC aparente 0,97 colapsó a ~0,66 bajo corrección de optimismo (sobreajuste). El análisis exploratorio con criterio funcional independiente (ADLQ) es frágil y se reporta en el material suplementario.

Discusión

En una clínica de memoria argentina de mundo real, los perfiles neuropsicológicos siguieron una trayectoria **amnésico-céntrica**, y la progresión se anticipó con un modelo parsimonioso, normado localmente. Discutimos los hallazgos bajo la lente de la evidencia de alto impacto y su **utilidad para el neurólogo cognitivo**.

El eje del riesgo es la memoria — y esto orienta la conducta clínica. El riesgo de progresión fue varias veces mayor con memoria comprometida (OR 9,3), y el análisis temporal (Cox HR 0,55/DE; C-index 0,72) mostró que la señal es estable en el tiempo. Es consistente con la evidencia de que el síndrome amnésico de tipo temporal medial identifica la EA prodrómica con alta especificidad[7] y con el recuerdo diferido como predictor central de conversión,[8–13] y con que el DCL amnésico multidominio conlleva mayor riesgo.[5,17] Para el neurólogo cognitivo, la implicancia es concreta: **ante un DCL, el peso del compromiso de memoria episódica de almacenamiento debe elevar el umbral de vigilancia, acortar el intervalo de reevaluación y motivar la búsqueda etiológica** (biomarcadores, neuroimagen de lóbulo temporal medial), mientras que un perfil no amnésico con memoria conservada, en esta muestra, tuvo un riesgo de progresión marcadamente menor.

La interpretación del cambio seriado exige psicometría de cambio fiable — y disciplina inferencial. La regresión a la media y el efecto de piso distorsionan el cambio crudo: en una clínica de memoria, los tests de recuerdo diferido de relatos están saturados al basal y parecen “estables” por censura. El RCI basado en regresión y el manejo explícito del piso son imprescindibles, y aportamos normas locales de cambio fiable, de las primeras para esta población. Ahora bien, somos deliberadamente cautos: **ningún contraste de trayectoria por test sobrevivió la corrección por comparaciones múltiples**, por lo que los patrones fenotipo-específicos se ofrecen como **hipótesis a confirmar**, no como una patrón mecanístico. Esta autocontención —reportar el patrón sin sobre-interpretarlo— es, en sí, un mensaje metodológico para la lectura de datos seriados en la práctica.[26,27]

Un modelo de dos variables ofrece utilidad de rutina como estratificador de riesgo. Recuerdo diferido y edad anticiparon la progresión (AUC 0,74; IC95% 0,63–0,83), sobre todo como **prueba de descarte** (VPN 92%) y **ordenador de riesgo** (progresión 9%→45% del tercil inferior al superior). Para el neurólogo cognitivo

sin acceso rutinario a biomarcadores —la realidad de gran parte de Latinoamérica[23–25]— esto es directamente accionable: **dos números de una evaluación estándar ubican al paciente en una banda de riesgo relativo que informa la frecuencia de seguimiento y la priorización de estudios**, sin sustituir el juicio clínico. Esta accionabilidad es especialmente oportuna en la **era de las terapias modificadoras**: los anticuerpos anti-amiloide actúan en estadios tempranos y su ventana depende de identificar pronto al paciente en riesgo;[33,34] cuando esa es la lógica asistencial, un estratificador basado en la evaluación de rutina —barato y sin biomarcadores— funciona como primer filtro para **priorizar derivación y vigilancia** (no como criterio de elegibilidad para anti-amiloide, que exige confirmación de amiloide y no se infiere de un modelo clínico), en línea con las iniciativas regionales (LAC-CD/ReDLat)[35] y con el énfasis de las Comisiones del Lancet en la prevención a lo largo del curso vital.[21,22] El techo del desempeño lo fija el tamaño muestral y la ausencia de biomarcadores más que el algoritmo, consistente con las iniciativas que buscan extraer el máximo de **medidas de rutina** y anticipan el aporte de biomarcadores en sangre en la región.[24,25]

Alcance y encuadre honestos. La demencia se definió **operacionalmente por la severidad clínica del perfil** ($\geq$ moderada), y esta definición se **corroboró con un criterio funcional independiente**: en el grupo con demencia, el ADLQ del informante mostró compromiso funcional (mediana 42% de áreas alteradas vs 19% en no-demencia; gradiente monótono Normal 6% $\rightarrow$ grave 72%), lo que respalda el constructo (deterioro cognitivo y funcional) y **atenúa** —sin eliminar— la preocupación por circularidad, pues el ADLQ es independiente de la narrativa cognitiva que informa el predictor. Esta operacionalización es coherente con la definición vigente de demencia —que exige compromiso **cognitivo y funcional**[30]— y con la estadificación clínica de severidad;[31] y, crucialmente, predice una **trayectoria clínica**, no la enfermedad de Alzheimer **definida biológicamente** (marco AT(N)), [32] que requeriría biomarcadores ausentes en esta cohorte. Persisten límites (cobertura del ADLQ 52%, corroboración a nivel de grupo, sin biomarcadores ni confirmación etiológica), por lo que la contribución se enmarca como un **estratificador de riesgo** normado localmente, no un diagnosticador. Dos productos digitales abiertos materializan el trabajo y corren íntegramente en el navegador (sin transmitir datos): un **estratificador de riesgo** individual y un **artefacto navegable de trayectoria cognitiva**, que llevan la descripción y la estratificación a la consulta.

Fortalezas y limitaciones. Fortalezas: datos genuinos de mundo real; depuración e identificación auditadas con recuperación de N; una variable perfil reproducible; psicometría de cambio fiable con control de multiplicidad; validación interna con IC bootstrap y calibración reportados según TRIPOD[28]/STROBE[36]; análisis de tiempo hasta el evento; y liberación abierta de código y herramientas. Limitaciones que acotan las conclusiones a un nivel exploratorio: (i) **unicéntrico**, con eventos escasos (subgrupos con EPV bajo e IC amplios); (ii) **demencia definida por severidad clínica**, con corroboración funcional independiente (ADLQ) de **cobertura parcial (52%)**, a nivel de grupo, y posible circularidad residual predictor–desenlace; (iii) **codificación por IA** = extracción de texto con fiabilidad LLM–LLM, pendiente de validación contra experto humano; (iv) **sesgo de selección** de quiénes se reevalúan y **censura informativa**: la tasa es condicional a la reevaluación y, dado que la clínica de memoria tiende a re-citar a quienes empeoran, la dirección del sesgo es **indeterminada** (no un límite inferior); además, no se dispuso de estado vital, por lo que **no se modeló el riesgo competitivo de muerte** y las cifras de incidencia acumulada del Kaplan-Meier deben leerse con esa reserva; (v) **datos faltantes** en el predictor de memoria (9%) manejados por imputación, con sensibilidad en casos completos; (vi) desenlace binario a seguimiento variable, mitigado —no resuelto— por el análisis de Cox; (vii) mayoría con solo 2 visitas (85%), lo que impide modelar la forma de la trayectoria individual (por eso el análisis de trayectoria es descriptivo). La **validación externa** —en consorcios regionales y frente a biomarcadores en sangre[25]— es el paso esencial.

Conclusiones

Los perfiles cognitivos siguen una trayectoria amnésico-céntrica; el compromiso de memoria episódica de almacenamiento es el eje del riesgo de progresión, estable en el análisis temporal. La progresión a demencia es anticipable con recuerdo diferido de relatos y edad, útil como prueba de descarte y estratificador de riesgo. Se aportan dos productos digitales abiertos. Los hallazgos son exploratorios y unicéntricos; la demencia se definió por severidad clínica, corroborada funcionalmente por el ADLQ (independiente de la narrativa cognitiva), y se requiere validación externa.

Tablas

Tabla 1. Cohorte, depuración y fiabilidad de la codificación.

Variable	Reevaluación (n = 254)	Una visita (n = 2644)
Edad, años (media ± DE)	66,9 ± 14,3	63,8 ± 19,1
Educación, años (media ± DE)	13,4 ± 3,4	12,8 ± 3,7
Sexo femenino, %	56	56
Seguimiento, años, mediana (IQR)	1,83 (1,25–2,97)	—

Depuración: 84 exclusiones (81 duplicados mismo día por hash + 3 sin fecha); 63 perfiles y 4 reevaluaciones recuperados → 219 analizables (basal y final). Fiabilidad entre dos codificaciones ciegas (κ, extracción LLM–LLM, no vs experto humano): severidad 1,00; subtipo 0,88.


Tabla 2. Rendimiento de los modelos (TRIPOD; validación interna, optimismo-corregido).

Desenlace / cohorte	n / eventos	Predictores	AUC [IC95% bootstrap]
Demencia — leve-moderado (primario)	140 / 37	Recuerdo diferido de relatos + edad	0,74 [0,63–0,83]
Demencia — subgrupo DCL	96 / 18	Recuerdo diferido de relatos + edad	0,76 [0,59–0,88]
Declive cognitivo fiable (bandas normal/demencial)	250 / 47	edad, Rey trial 1, intrusiones, CI premórbido, Hayling	0,68 [0,58–0,77]

Estratificación (modelo primario): progresión observada por tercil 9% / 26% / 45% (n≈47 c/u); VPN 92%, VPP ~45%; calibración pendiente 0,88, Brier 0,21 (el ajuste ponderado sobre-estima el riesgo absoluto, recalibrado por Platt en el despliegue). El predictor de memoria estuvo imputado en 13/140 (9%); casos completos 127/35, AUC concordante. El IC95% es bootstrap sobre predicciones fuera-de-muestra; la dispersión entre folds fue mayor y no es un IC. El modelo primario coincide con `models_deploy.json` en n/eventos/coeficientes. Análisis funcional ADLQ y detalle: material suplementario.


Figuras

Figura 1. Flujo de la cohorte y depuración (STROBE).




334 con ≥ 2 evaluaciones $\rightarrow$ 84 excluidos (81 duplicados por hash + 3 sin fecha) $\rightarrow$ 254 reevaluaciones (4 recuperadas); 63 perfiles recuperados del PDF $\rightarrow$ 219 analizables; cohortes DCL (96) y leve-moderado (140).

Figura 2. Trayectoria de banda: matriz de transición de severidad (basal $\rightarrow$ reevaluación).




Proporción por fila; sobre la diagonal = progresión. Ningún normal basal progresó a demencia.

Figura 3. Cambio fiable por test, descriptivo (por severidad y por fenotipo basal).



% de pacientes con cambio fiable (RCI basado en regresión) por test, excluidos los ya-en-piso al basal. Análisis descriptivo/generador de hipótesis: ningún contraste sobrevive corrección FDR (q mín 0,091); celdas rayadas $n < 15$, no interpretables. El n figura en cada celda.

Figura 4. El eje del riesgo en el tiempo: incidencia acumulada de progresión por estado de memoria basal (Kaplan-Meier).



Cohorte leve-moderado. Cox: memoria HR 0,55 [0,40–0,76]/DE; log-rank $p=0,010$; C-index 0,72. Bandas: IC95%; marcas: censura. El rendimiento del modelo (curva ROC, calibración) y el estratificador desplegado se muestran en el [material suplementario](#) (Figuras S4–S5).

Referencias

Recuperadas y verificadas vía PubMed. Se incluye DOI.

1. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, et al. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. *Arch Neurol*. 1999. <https://doi.org/10.1001/archneur.56.3.303>
2. Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concepts in mild cognitive impairment. *Arch Neurol*. 2001. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.12.1985>
3. Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, et al. Mild cognitive impairment — beyond controversies, towards a consensus. *J Intern Med*. 2004. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2004.01380.x>

4. Ganguli M, Snitz BE, Saxton JA, et al. Outcomes of mild cognitive impairment by definition: a population study. *Arch Neurol*. 2011. <https://doi.org/10.1001/archneurol.2011.101>
5. Espinosa A, Alegret M, Valero S, et al. A longitudinal follow-up of 550 mild cognitive impairment patients. *J Alzheimers Dis*. 2013. <https://doi.org/10.3233/JAD-122002>
6. Allegri RF, Glaser FB, Taragano FE, Buschke H. Mild cognitive impairment: believe it or not? *Int Rev Psychiatry*. 2008. <https://doi.org/10.1080/09540260802095099>
7. Sarazin M, Berr C, De Rotrou J, et al. Amnesic syndrome of the medial temporal type identifies prodromal AD: a longitudinal study. *Neurology*. 2007. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000279336.36610.f7>
8. Gainotti G, Quaranta D, Vita MG, Marra C. Neuropsychological predictors of conversion from MCI to Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-130881>
9. Modrego PJ. Predictors of conversion to dementia of probable Alzheimer type in patients with MCI. *Curr Alzheimer Res*. 2006. <https://doi.org/10.2174/156720506776383103>
10. García-Herranz S, Díaz-Mardomingo MC, Peraíta H. Neuropsychological predictors of conversion to probable Alzheimer disease in elderly with MCI. *J Neuropsychol*. 2016. <https://doi.org/10.1111/jnp.12067>
11. López ME, Turrero A, Cuesta P, et al. A multivariate model of time to conversion from MCI to Alzheimer's disease. *GeroScience*. 2020. <https://doi.org/10.1007/s11357-020-00260-7>
12. Park HK, Choi SH, Park SA, et al. Memory performance on the story recall test and prediction of progression in MCI and Alzheimer's dementia. *Geriatr Gerontol Int*. 2017. <https://doi.org/10.1111/ggi.12940>
13. Bao J, Wang Y, Qu D, et al. Impairment of delayed recall as a predictor of amnesic MCI development in normal older adults. *BMC Psychiatry*. 2023. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05309-3>
14. Bondi MW, Edmonds EC, Jak AJ, et al. Neuropsychological criteria for MCI improves diagnostic precision, biomarker associations, and progression rates. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-140276>
15. Jak AJ, Preis SR, Beiser AS, et al. Neuropsychological criteria for MCI and dementia risk in the Framingham Heart Study. *J Int Neuropsychol Soc*. 2016. <https://doi.org/10.1017/S1355617716000199>
16. Wong CG, Thomas KR, Edmonds EC, et al. Neuropsychological criteria for MCI in the Framingham Heart Study's old-old. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2018. <https://doi.org/10.1159/000493541>
17. Lee YC, Kang JM, Lee H, et al. Amnesic multiple cognitive domains impairment and periventricular WMH predict progression to dementia in MCI. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2016. <https://doi.org/10.1002/gps.4035>
18. Persson K, Eldholm RS, Barca ML, et al. Visual evaluation of medial temporal lobe atrophy as a marker of conversion from MCI to dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2017. <https://doi.org/10.1159/000477342>
19. Mortimer JA, Borenstein AR, Gosche KM, Snowdon DA. Very early detection of Alzheimer neuropathology and the role of brain reserve. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2005. <https://doi.org/10.1177/0891988705281869>
20. Taragano FE, Allegri RF, Lyketsos C. Mild behavioral impairment: a prodromal stage of dementia. *Dement Neuropsychol*. 2008. <https://doi.org/10.1590/S1980-57642009DN20400004>
21. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet*. 2020. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30367-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6)
22. Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *Lancet*. 2024. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01296-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01296-0)
23. Parra MA, Baez S, Allegri R, et al. Dementia in Latin America: assessing the present and envisioning the future. *Neurology*. 2018. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004897>
24. Maito MA, Santamaría-García H, Moguilner S, et al. Classification of Alzheimer's disease and frontotemporal dementia using routine clinical and cognitive measures across multicentric underrepresented samples. *Lancet Reg Health Am*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100387>
25. Caviades A, et al. Blood-based AT(N) biomarkers for Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration in Latin America. *Nat Aging*. 2026. <https://doi.org/10.1038/s43587-025-01061-3>
26. Jacobson NS, Truax P. Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. *J Consult Clin Psychol*. 1991. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.1.12>
27. Tröster AI, Woods SP, Morgan EE. Assessing cognitive change in Parkinson's disease: practice effect-corrected reliable change indices. *Arch Clin Neuropsychol*. 2007. <https://doi.org/10.1016/j.acn.2007.05.004>

28. Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KGM. Transparent reporting of a multivariable prediction model (TRIPOD). *Ann Intern Med.* 2015. <https://doi.org/10.7326/M14-0697>
29. Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from the NIA-AA workgroups. *Alzheimers Dement.* 2011. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.008>
30. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the NIA-AA workgroups. *Alzheimers Dement.* 2011. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.005>
31. Morris JC. The Clinical Dementia Rating (CDR): current version and scoring rules. *Neurology.* 1993. <https://doi.org/10.1212/wnl.43.11.2412-a>
32. Jack CR, Bennett DA, Blennow K, et al. NIA-AA Research Framework: toward a biological definition of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement.* 2018. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.02.018>
33. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in early Alzheimer's disease. *N Engl J Med.* 2023. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2212948>
34. Sims JR, Zimmer JA, Evans CD, et al. Donanemab in early symptomatic Alzheimer disease: the TRAILBLAZER-ALZ 2 randomized clinical trial. *JAMA.* 2023. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.13239>
35. Ibáñez A, Parra MA, Butler C, et al. The Latin America and the Caribbean Consortium on Dementia (LAC-CD): from networking to research to implementation science. *J Alzheimers Dis.* 2021. <https://doi.org/10.3233/JAD-201384>
36. von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *J Clin Epidemiol.* 2008. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.11.008>