

Logică Matematică și Computațională – SUBIECTE DE EXAMEN

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICA

Timp de lucru: 3 ore.

Materiale permise: orice material tipărit sau scris de mână.

Este interzisă folosirea dispozitivelor electronice.

Este interzisă părăsirea sălii de examen timp de o oră și jumătate din momentul primirii subiectelor.

Punctaj (maxim **11,5 puncte**; notă: $\min\{10 \text{ punctaj}\}$; observați că **nota 10** poate fi obținută, în cazul unui punctaj maxim pentru TEMELE COLECTIVE, cu două cerințe reduse de programare în Prolog, pentru **jumătate de punctaj**, dacă rezolvările sunt aproape perfecte):

- **1 punct** din oficiu;
- **3 puncte** pentru TEMELE COLECTIVE;
- fiecare dintre cele două cerințe *erotate* ale fiecărui exercițiu: **1,25 puncte**.

Pentru cerințele de programare în Prolog se poate folosi orice predicat predefinit, precum și orice predicat scris la LABORATOR sau într-o TEMĂ COLECTIVĂ, utilizând directiva pentru includerea bazelor de cunoștințe *load('lmcVer.pl')* și *temeleNr.pl* în cerință, cu condiția respectării **denumirilor predicatelor** din FIȘIERELE .PL la LABORATOR și din ENUNȚURILE TEMELOR COLECTIVE. Toate celelalte predicate auxiliare necesare pentru a defini predicatele cerute trebuie scrise pe lucrarea de examen. Pentru cerința ca predicatele auxiliare să poată fi aplicate pentru orice argumente de tipurile specificate: menționați ca acestea să fie **arbitrare**.

În fiecare coală (nu pagină) din lucrare va fi semnată cu numele și prenumele în clar. Pe prima pagină vor fi scrise și numărul grupei și data examenului.

Toate subiectele vor fi tratate pe lucrarea de examen. Dacă nu aveți nicio idee de abordare a unui exercițiu, atunci veți scrie noțiuni și/sau proprietăți teoretice din curs și/sau predicate din laborator legate de acel exercițiu pe lucrare. Dar **punctaj** în cazul în care nu știți să abordați exercițiul. Orice încercare de abordare a unui exercițiu valorează mai mult ca punctaj, decât o astfel de tratare minimală, scriind teorie sau predicate făcute la laborator, iar acestea nu se punctează în plus în cazul în care abordați acel exercițiu.

1 Lista 1 de subiecte

Exercițiul 1. Să se determine toate funcțiile strict descrescătoare $f : \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3 \rightarrow \mathcal{L}_2 \oplus \mathcal{L}_2^2$ de la produsul direct al lanțului cu exact 2 elemente cu lanțul cu exact 3 elemente la suma ordinală a lanțului cu exact 2 elemente cu, romb și să se arate că niciuna nu e injectivă:

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat unar *fctL2xL3laL2plusL2xL2(-ListaFctStrDesCresc)*, care determină în argumentul său *ListaFctStrDesCresc* lista funcțiilor strict descrescătoare de la $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$ la $\mathcal{L}_2 \oplus \mathcal{L}_2^2$, folosind un predicat auxiliar care determină lista funcțiilor strict descrescătoare între două poseturi finite arbitrare;
- un predicat zeroar *niciunainj* care întoarce *true* dacă toate funcțiile strict descrescătoare $f : \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3 \rightarrow \mathcal{L}_2 \oplus \mathcal{L}_2^2$ sunt neinjective, care apelează predicatul *fctL2xL3laL2plusL2xL2(-ListaFctStrDesCresc)*, apoi aplică listei *ListaFctStrDesCresc* un predicat care testează dacă toate funcțiile între două mulțimi finite arbitrare dintr-o listă arbitrară de funcții între aceste mulțimi sunt neinjective.

Pentru **jumătate din punctajul** de la această a doua cerință, puteți scrie doar predicatul unar *fctL2xL3laL2plusL2xL2* definit ca mai sus.

Exercițiul 2. Fie V mulțimea variabilelor propoziționale, iar E mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice. Să se demonstreze că, pentru orice $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(E)$ și orice $\alpha, \beta, \gamma \in E$, are loc următoarea regulă de deducție:

$$\frac{\Sigma \vdash \alpha \vee (\beta \rightarrow \gamma), \Delta \vdash \gamma \rightarrow \alpha}{\Sigma \cup \Delta \vdash \beta \rightarrow \alpha}$$

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat ternar *ipoteza1*(+Alfa, +Beta, +Gama), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\alpha \vee (\beta \rightarrow \gamma)$ în funcție de valorile de adevăr Alfa, Beta, respectiv Gama ale enunțurilor α , β , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat binar *ipoteza2*(+Alfa, +Gama), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\gamma \rightarrow \alpha$ în funcție de valorile de adevăr Alfa, respectiv Gama ale enunțurilor α , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat binar *concluzia*(+Alfa, +Beta), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\beta \rightarrow \alpha$ în funcție de valorile de adevăr Alfa, respectiv Beta ale enunțurilor α , respectiv β într-o interpretare arbitrară;
- un predicat zeroar *readed*, care întoarce *true* ddacă din cele două ipoteze de mai sus se deduce concluzia de mai sus pentru orice triplet de valori booleene ale enunțurilor α , β , γ într-o interpretare (astfel că, dacă acest predicat e satisfăcut atunci, în particular, considerând interpretările care satisfac pe $\Sigma \cup \Delta$, avem o demonstrație semantică, prin tabel de adevăr, pentru regula de deducție de mai sus).

Desigur, la fel ca în lecțiile de laborator, prin **valoare de adevăr** a unui enunț $\varepsilon \in E$ într-o interpretare $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$ ne referim la valoarea $f(\tilde{h}(\varepsilon))$ a funcției $f \circ \tilde{h} : E \rightarrow \{\text{false}, \text{true}\}$ în enunțul ε , unde $\tilde{h} : E \rightarrow \mathcal{L}_2$ este prelungirea lui h la mulțimea E a enunțurilor care transformă conectorii logici în operații booleene, iar $f : \mathcal{L}_2 \rightarrow \{\text{false}, \text{true}\}$ este izomorfismul boolean $f(0) = \text{false}$, $f(1) = \text{true}$.

Pentru **jumătate din punctajul de la această a doua cerință**, puteți scrie unul dintre predicatele *ipoteza1*, *ipoteza2*, *ipoteza3* și *concluzia*.

Exercițiul 3. Considerăm signatura de ordinul I: $\tau = (1; 2; \emptyset)$, simbolul de operație unară f și simbolul de relație binară R , o mulțime $A = \{a, b, c, d\}$ având $|A| = 4$ și o structură de ordinul I de semnătură τ : $\mathcal{A} = (A, f^A, R^A)$, cu mulțimea suport A , iar $f^A : A \rightarrow A$ și $R^A \subseteq A^2$, astfel încât, dacă (A, \leq) este posetul având relația de succesiune $< = \{(a, b), (b, d)\}$:

- f^A este izomorfism de poseturi de la $(A, <)$ la dualul său (A, \geq) ;
- R^A este relația de ordine \geq a posetului dual lui (A, \leq) .

Considerăm două variabile distincte $x, y \in Var$ și enunțul:

$$\varepsilon = \forall x \forall y [R(x, f(y)) \rightarrow \neg R(f(x), f(f(y)))].$$

Să se determine funcția f^A și relația binară R^A , apoi să se determine dacă $\mathcal{A} \models \varepsilon$:

- ① matematic;
- ② prin următoarele predicate în Prolog, pentru care mulțimea $A = \{a, b, c, d\}$ va fi introdusă ca listă de constante și relația de succesiune $< = \{(a, b), (b, d)\}$ ca listă de perechi de constante, iar restul argumentelor vor fi calculate în aceste predicate:

- un predicat binar *posetA*(-MultElemA, -OrdA), care instanțiază variabila *MultElemA* cu lista de constante care dă mulțimea A , iar în argumentul *OrdA* determină relația de ordine pe *MultElemA* având $< = \{(a, b), (b, d)\}$ ca relație de succesiune asociată (direct cu închiderea reflexiv-tranzitivă a lui $<$, nu selectând dintre relațiile de ordine pe *MultElemA* pe aceea a cărei relație de succesiune asociată este egală ca mulțime cu lista corespunzătoare lui $<$, deci procedați așa cum am construit la laborator, orice poset din mulțimea sa de elemente și relația sa de succesiune);

- un predicat unar *detf*(-Fctf), care întoarce în argumentul său *Fctf* funcția de la A la A care este bijectivă, crescătoare și cu inversa crescătoare de la posetul $(\text{MultElemA}, \text{OrdA})$ determinat de predicatul *posetA*(-MultElemA, -OrdA) și dualul $(\text{MultElemA}, \text{InvOrdA})$ al acestui poset, calculând inversa *InvOrdA* a relației *OrdA*, apoi aplicând poseturilor $(\text{MultElemA}, \text{OrdA})$ și $(\text{MultElemA}, \text{InvOrdA})$ un predicat care determină izomorfismele între oricare două poseturi finite;

- un predicat unar *detR*(-RelR), care calculează în argumentul său *RelR* inversa relației *OrdA* determinate de predicatul *posetA*(-MultElemA, -OrdA);

- un predicat zeroar *verifAsatepsilon*, care întoarce *true* ddacă $\mathcal{A} \models \varepsilon$, efectuând o demonstrație semantică, prin testarea perechilor de valori din mulțimea A pentru variabilele x, y într-o interpretare arbitrară (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară funcțională totală, deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură cauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții, a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul de la această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar *verifAsatepsilon*, introducând direct operația unară f^A și relația binară R^A în baza de cunoștințe

2 Lista 2 de subiecte

Exercițiul 4. Să se determine toate funcțiile strict crescătoare $f : \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3 \rightarrow \mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2$ de la produsul direct al lanțului cu exact 2 elemente cu lanțul cu exact 3 elemente la suma ordinală a rombului cu lanțul cu exact 2 elemente și să se arate că toate păstrează relația de succesiune, i.e. satisfac, pentru orice $x, y \in \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$: $x \prec y \implies f(x) \prec f(y)$, unde am notat cu \prec atât relația de succesiune a lui $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$, cât și pe cea a lui $\mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2$:

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat unar *fctL2xL3laL2xL2plusL2*(-ListaFctStrCresc), care determină în argumentul său *ListaFctStrCresc* lista funcțiilor strict crescătoare de la $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$ la $\mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2$, folosind un predicat auxiliar care determină lista funcțiilor strict crescătoare între două poseturi finite arbitrare;
- un predicat zeroar *toatepastrarecc* care întoarce *true* ddacă toate funcțiile strict crescătoare $f : \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3 \rightarrow \mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2$ păstrează relația de succesiune, care apelează predicatul *fctL2xL3laL2xL2plusL2*(-ListaFctStrCresc), apoi aplică listei *ListaFctStrCresc* un predicat care testează dacă toate funcțiile între două poseturi finite arbitrare dintr-o listă arbitrară de funcții între aceste poseturi păstrează relația de succesiune, i.e. duc relația de succesiune de pe domeniul lor în relația de succesiune de pe codomeniul lor.

Pentru **jumătate din punctaj** de la această a doua cerință, puteți scrie doar predicatul unar *fctL2xL3laL2xL2plusL2* definit ca mai sus.

Exercițiul 5. Fie V mulțimea variabilelor propoziționale, iar E mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice. Să se demonstreze că, pentru orice $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(E)$ și orice $\alpha, \beta, \gamma \in E$, are loc următoarea regulă de deducție:

$$\frac{\Sigma \vdash \alpha \rightarrow (\beta \vee \gamma), \Delta \vdash \beta \rightarrow \neg \alpha, \Sigma \cap \Delta \vdash \neg \alpha \rightarrow (\neg \beta \wedge \gamma)}{\Sigma \cup \Delta \vdash \neg \beta \wedge \gamma}$$

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat ternar *ipoteza1*(+Alfa, +Beta, +Gama), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\alpha \rightarrow (\beta \vee \gamma)$ în funcție de valorile de adevăr *Alfa*, *Beta*, respectiv *Gama* ale enunțurilor α , β , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat binar *ipoteza2*(+Alfa, +Beta), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\beta \rightarrow \neg \alpha$ în funcție de valorile de adevăr *Alfa*, respectiv *Beta* ale enunțurilor α , respectiv β într-o interpretare arbitrară;
- un predicat ternar *ipoteza3*(+Alfa, +Beta, +Gama), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\neg \alpha \rightarrow (\neg \beta \wedge \gamma)$ în funcție de valorile de adevăr *Alfa*, *Beta*, respectiv *Gama* ale enunțurilor α , β , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat binar *concluzia*(+Beta, +Gama), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\neg \beta \wedge \gamma$ în funcție de valorile de adevăr *Beta*, respectiv *Gama* ale enunțurilor β , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat zeroar *regded*, care întoarce *true* ddacă din cele trei ipoteze de mai sus se deduce concluzia de mai sus pentru orice triplet de valori booleene ale enunțurilor α , β , γ într-o interpretare (astfel că, dacă acest predicat e satisfăcut, atunci, în particular, considerând interpretările care satisfac pe $\Sigma \cup \Delta$, avem o demonstrație semantică, prin tabel de adevăr, pentru regula de deducție de mai sus).

Desigur, la fel ca în lecțiile de la anterior, prin **valoare de adevăr** a unui enunț $\varepsilon \in E$ într-o interpretare $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$ ne referim la valoarea $f(h(\varepsilon))$ a funcției $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \{\text{false}, \text{true}\}$ în enunțul ε , unde $h : E \rightarrow \mathcal{L}_2$ este prelungirea lui h la mulțimea E a enunțurilor care transformă conectorii logicii în operații booleene, iar $f : \mathcal{L}_2 \rightarrow \{\text{false}, \text{true}\}$ este izomorfismul boolean: $f(0) = \text{false}$, $f(1) = \text{true}$.

Pentru **jumătate din punctaj** de la această a doua cerință, puteți scrie unul dintre predicatele *ipoteza1*, *ipoteza2*, *ipoteza3* și *concluzia*.