

tirzepatida.

Como aplicar, em quais doses e com qual frequência. **Tudo o que você precisa saber** antes da primeira injeção — e depois dela.



NESTE GUIA.

01	o que tem no frasco	P. 02
02	como funciona o tratamento	P. 03
03	antes de aplicar	P. 04
04	quanto puxar na seringa	P. 05
05	como aplicar	P. 06
06	quando e quanto	P. 07
07	onde guardar	P. 08

O PRODUTO

o que tem no frasco.

Solução estéril injetável de tirzepatida para uso subcutâneo. Frasco multidose com **60 mg de tirzepatida no total**, em 2,4 mL — o equivalente a várias semanas de tratamento, conforme a sua dose. Conservar refrigerado entre cada aplicação.

EM CONFORMIDADE · ANVISA — NOTA TÉCNICA 200/2025

VIA SUBCUTÂNEA

APRESENTAÇÃO

60 mg no total

Cada frasco contém 60 mg de tirzepatida em solução injetável estéril. Ele é multidose: você aspira só a dose da semana e o restante fica no frasco para as próximas aplicações.

Volume 2,4 mL

VIA DE APLICAÇÃO · INDICAÇÃO PRINCIPAL

abdômen.

Aplique abaixo da linha do umbigo, **à direita ou à esquerda dele** — nunca no centro —, mantendo uns 5 cm de distância. **Alterne o lado a cada aplicação:** uma semana do lado direito, na outra do lado esquerdo. Se preferir, a coxa também pode ser usada.

A MEDICAÇÃO

como funciona o tratamento.

A tirzepatida imita a ação de dois hormônios naturais do intestino, o GIP e o GLP-1, que regulam o apetite e o açúcar no sangue. Uma aplicação por semana, com efeito contínuo.

01 Mais saciedade, menos fome.

A medicação retarda o esvaziamento do estômago e age nos centros de apetite do cérebro. Você se sente satisfeita antes, com porções menores, sem depender só de força de vontade.

02 Melhor resposta à insulina.

A tirzepatida ajuda o corpo a liberar insulina na medida certa após as refeições, melhorando o controle do açúcar no sangue ao longo do tratamento.

03 Efeito gradual e contínuo.

O resultado vem ao longo de semanas, com a constância das aplicações semanais e a evolução das doses. Não é imediato, e não precisa ser: consistência vale mais que pressa.

PONTOS DE ATENÇÃO

- 01 Náusea, enjoo, prisão de ventre e diarreia são comuns no início e a cada aumento de dose. Tendem a diminuir com o tempo.
- 02 Nos dias após a aplicação, prefira refeições menores e mais leves. Hidrate-se bem ao longo do dia.
- 03 Não use durante a gravidez ou amamentação. Se planeja engravidar, avise a equipe clínica antes.
- 04 Histórico de pancreatite, ou histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide: informe o time médico antes de iniciar.
- 05 Qualquer sintoma forte ou persistente: fale com a equipe clínica da elas. nos canais oficiais.

DETALHE TÉCNICO

o que prestar atenção.

Dois pontos da aplicação merecem cuidado extra — eles são a diferença entre uma dose limpa e um frasco contaminado.




FIGURA 01

remova só o disco central.

O elastômero — a borracha — precisa ficar exposto, mas o anel de alumínio que segura tudo permanece no frasco. Não tente arrancar a tampa inteira.




FIGURA 02

aplique no abdômen.

Abaixo da linha do umbigo, à direita ou à esquerda dele — nunca no centro —, a uns 5 cm de distância. Alterne o lado a cada semana. Se preferir, a coxa é alternativa.

ANTES DE APLICAR — CHECKLIST

- 01 A seringa é U-100, com graduação de 1 unidade?
- 02 A borracha do frasco foi limpa com álcool 70%?
- 03 O frasco está de cabeça para baixo e a agulha em 90°?
- 04 As bolhas de ar foram eliminadas da seringa?
- 05 O local de aplicação está higienizado e diferente do anterior?

CÁLCULO

quanto puxar na seringa.

Use **seringa de 100UI — 1 mL (ou 100UI)**, encontrada em qualquer farmácia. A dose é **sempre semanal**: uma aplicação por semana, na marcação exata da tabela.

Dose (mg)	Marcação na seringa de insulina U-100
2,5	10u
5,0	20u
7,5	30u
10,0	40u
12,0	48u



Seringa de 100UI - 1ml (ou 100UI)

ATENÇÃO

Use só a seringa de 100UI (1 mL). As menores não comportam as doses mais altas, e sem marcação em unidades não há como medir a dose.

PASSO A PASSO

como aplicar.

Cinco passos. Seringa de insulina U-100, frasco multidose, aplicação subcutânea. Antes de começar, separe tudo em uma superfície limpa.

01 Higienize antes de tocar no frasco.

Lave bem as mãos com água e sabão. Limpe o topo do frasco com álcool 70% e algodão, em movimentos circulares, e espere secar. Higienize também o local de aplicação — abdômen ou, se preferir, coxa.

02 Abra só o disco central da tampa.

Remova apenas o disco central de alumínio — a parte destacável que expõe o elastômero (a borracha). O anel lateral de alumínio fica fixo no frasco. Limpe o elastômero com álcool 70% antes de furar.

03 Aspire o volume exato.

Introduza a agulha no centro da borracha, em ângulo de 90°, com o frasco virado de cabeça para baixo. Aspire o volume correspondente à sua dose (ex.: 2,5 mg = 10 U = 0,1 mL). Elimine bolhas de ar antes de aplicar.

04 Aplique pinçando a pele.

Pince levemente a pele do abdômen abaixo da linha do umbigo, à direita ou à esquerda dele (nunca no centro), a uns 5 cm de distância, e injete por via subcutânea. Alterne o lado a cada aplicação. Se preferir, a coxa é alternativa.

05 Descarte e guarde.

Descarte a seringa em recipiente próprio para perfurocortantes (biossegurança). Volte com o frasco multidose para a geladeira: 2 °C a 8 °C, protegido da luz, sem congelar.

POSOLOGIA

quando e quanto.

Uma vez por semana, sempre. A dose começa baixa e evolui mês a mês, conforme tolerância e resposta clínica. Os três primeiros meses seguem o esquema abaixo.

MÊS 1
SEMANAS 1-4

2,5 mg

Dose inicial. Uma aplicação subcutânea por semana.

MÊS 2
SEMANAS 5-8

5 mg

Primeiro escalonamento, após 4 semanas na dose inicial.

MÊS 3
SEMANAS 9-12

7,5 mg

Somente se você não apresentou efeitos colaterais indesejados nas últimas 3 semanas de aplicação de 5 mg. Em caso de dúvida, fale com a equipe clínica antes de subir.

TETO Ajustes acima de 7,5 mg acontecem apenas com orientação médica, em aumentos de 2,5 mg a cada 4 semanas. A dose máxima é de 15 mg por semana — nunca ultrapasse, ainda que tenha esquecido aplicações anteriores.

REGRAS DE OURO

- 01 Aplique sempre no mesmo dia da semana. Horário livre.
- 02 Esqueceu? Você tem até 96 horas (4 dias) para aplicar a dose atrasada.
- 03 Nunca aplique duas doses na mesma semana — mesmo após esquecimento.
- 04 Ajuste de dose só com orientação médica e farmacêutica.
- 05 Efeito colateral indesejado muito forte? Chame a equipe clínica da elas. no WhatsApp ou nos canais oficiais.

CONSERVAÇÃO

onde guardar.

Refrigerador. Sempre. Nunca no congelador, nunca exposto à luz direta.
Mantenha o frasco na embalagem original entre as aplicações.

2–8°

TEMPERATURA

refrigerado

Geladeira, entre 2 °C e 8 °C. Sem congelar.



LUZ

protegido

Mantenha sempre na embalagem original.



DESCARTE

perfurocortante

Seringa usada em recipiente apropriado.

A escolha inteligente que acompanha você.

SIGA AS ORIENTAÇÕES MÉDICAS
EDIÇÃO 01 / 2026 · USO SUBCUTÂNEO
ELAS · SAÚDE DA MULHER