

tratamento capilar.


tudo o que você precisa saber sobre o seu tratamento. o que cada item faz, como tomar, o que esperar nos primeiros meses e como falar com a equipe médica.



leia antes de começar. consulte sempre que tiver dúvida.

NESTE GUIA

01	o que tomar · orais	02
02	o que aplicar · tópicos	03
03	o que muda para nós · gravidez e contracepção	04
04	como funciona o acompanhamento	05
05	o que esperar nos primeiros meses	06
06	fale com a gente	07



CAPÍTULO 01

o que tomar.

as medicações orais e o suplemento da linha capilar.



ORAL

minoxidil

cápsula · 1 mg

vasodilatador. aumenta o fluxo de sangue no folículo e prolonga a fase de crescimento do fio.

QUANDO

1 cápsula por dia, de preferência após o jantar. sempre no mesmo horário.

COMO TOMAR

engolir inteira, com água. com ou sem alimento. não abrir e não mastigar.

BOM SABER

a dose feminina é bem menor que a masculina. pode surgir leve retenção de líquido ou aumento de pelos finos no rosto — ambos dependem da dose e regredem com ajuste.



ORAL

finasterida

cápsula · 2,5 mg

reduz o dht, o hormônio que afina o fio e miniaturiza o folículo na queda de padrão hormonal.

QUANDO

1 cápsula por dia, após refeição. sempre no mesmo horário.

COMO TOMAR

engolir inteira, com água. não abrir e não partir a cápsula.

ATENÇÃO · LEIA O CAPÍTULO 03

a finasterida é teratogênica. não pode ser usada na gravidez, na tentativa de engravidar ou na amamentação. em idade fértil, exige contracepção eficaz durante todo o tratamento.



SUPLEMENTO

suporte capilar

cápsula · 90 un. · 3 meses

queratina, aminoácidos, silício, ferro, zinco, cobre e complexo b. nutre a estrutura do fio.

QUANDO

1 cápsula por dia, durante uma refeição.

COMO TOMAR

engolir inteira, com água.

BOM SABER

contém ferro: evite tomar junto com café, chá preto ou leite, que atrapalham a absorção. contém biotina, que pode alterar exames de tireoide e marcadores cardíacos — avise o laboratório e a equipe antes de coletar.

CAPÍTULO 02

o que aplicar.

os tópicos da linha capilar.

a sua receita traz **um** tópico, não os dois. eles não se somam e não se revezam por conta própria.



TÓPICO · 1 X AO DIA

tônico 2 em 1

minoxidil 6%
+ finasterida 0,3%

duas moléculas no mesmo frasco: uma estimula o crescimento, a outra reduz o dht direto no couro cabeludo.

COMO USAR

- 01 couro cabeludo limpo e seco.
- 02 reparta o cabelo em mechas até expor o couro cabeludo.
- 03 borrife nas áreas indicadas, uma vez por dia.
- 04 espalhe com a ponta dos dedos, sem massagear demais.
- 05 lave bem as mãos. deixe secar. não enxágue.

ATENÇÃO · LEIA O CAPÍTULO 03

contém finasterida. valem as mesmas regras de contracepção da versão oral, mesmo com absorção menor.



TÓPICO · 1 X AO DIA

minoxidil tópico

minoxidil 5% + cetoconazol 2%
biotina 0,1% + vit. b5 1%

estimula o crescimento e ainda equilibra o couro cabeludo. opção sem finasterida.

COMO USAR

- 01 couro cabeludo limpo e seco.
- 02 reparta o cabelo em mechas até expor o couro cabeludo.
- 03 borrife nas áreas indicadas, uma vez por dia.
- 04 espalhe com a ponta dos dedos, sem massagear demais.
- 05 lave bem as mãos. deixe secar. não enxágue.

BOM SABER

espere secar por completo antes de deitar, para não transferir o produto para o travesseiro. o cetoconazol pode ressecar um pouco o comprimento — hidrate as pontas normalmente.

REGRA DE OURO

regularidade vale mais do que quantidade. um dia esquecido não é problema. uma semana esquecida atrasa o resultado.

UMA ROTINA TÍPICA

para quem usa a linha completa. adapte ao que está na sua receita.

MANHÃ

suporte capilar
com o café da manhã.

NOITE

minoxidil oral e finasterida
após o jantar.

ANTES DE DORMIR

o seu tópico
no couro cabeludo seco.

CAPÍTULO 03

o que muda para nós.

gravidez, contracepção e segurança.

A INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE DESTE GUIA

a finasterida é teratogênica. se você está em idade fértil e a sua receita inclui finasterida — oral ou no tônico 2 em 1 — o tratamento só acontece com contracepção eficaz, do primeiro ao último dia.

01

contracepção não é detalhe

o risco é de má-formação da genitália de um feto masculino, e ele existe já nas primeiras semanas — muitas vezes antes de a gravidez ser descoberta. por isso o método precisa estar ativo antes de a primeira cápsula ser tomada, e não depois.

02

atraso menstrual é assunto de whatsapp

suspeitou de gravidez, teve atraso ou o método falhou: interrompa a finasterida no mesmo dia e mande mensagem para a equipe. não espere a próxima consulta e não decida sozinha.

03

gravidez e amamentação

finasterida e minoxidil oral não são usados em nenhuma das duas fases. se você está planejando engravidar nos próximos meses, diga antes de começar: existe protocolo capilar sem finasterida, e a equipe monta ele com você.

04

manuseio da cápsula

não abra, não parta e não triture. quem estiver grávida ou tentando engravidar não deve manusear cápsulas abertas ou danificadas — inclusive outras pessoas da casa.

CONVERSE COM A EQUIPE ANTES DE COMEÇAR SE VOCÊ

- pretende engravidar nos próximos 12 meses, está tentando ou está amamentando
- tem pressão baixa, tontura frequente ao levantar ou alguma doença cardíaca ou renal
- usa espironolactona, ciproterona ou outro antiandrógeno
- tem alteração de tireoide, anemia ou deficiência de ferro em investigação
- já teve reação a minoxidil, a cetoconazol ou a qualquer item da fórmula

CAPÍTULO 04

como funciona.

o acompanhamento médico.

todo o suporte e o acompanhamento médico acontecem pelo whatsapp da elas. a médica ajusta o tratamento conforme a sua resposta, mas isso só funciona se você também responder.

04

01

suporte por whatsapp

toda comunicação acontece por mensagem. sem fila de espera, sem horário comercial rígido. o que você escreve fica registrado no seu prontuário.

02

a médica pode ajustar

se algum efeito aparecer ou se você não estiver vendo resposta, a médica pode mudar a dose, trocar um item da prescrição ou pausar temporariamente. no capilar feminino, ajustar dose é rotina — não é sinal de que algo deu errado.

03

responder é parte do tratamento

ajustar a prescrição só é possível com informação. quando a equipe pergunta como você está, mesmo uma resposta curta já orienta a próxima decisão.

REPORTE SEMPRE QUE PERCEBER

- atraso menstrual ou qualquer suspeita de gravidez
- queda mais forte que o normal depois de 8 semanas
- inchaço em pés, tornozelos ou rosto, ou ganho rápido de peso
- palpitação, falta de ar ou tontura ao levantar
- aumento de pelos no rosto ou no corpo
- mudança no ciclo menstrual, sensibilidade nas mamas ou alteração de humor
- reação no couro cabeludo: vermelhidão, coceira, descamação ou ferida
- esquecimento de doses por mais de 5 dias seguidos

CAPÍTULO 05

o que esperar.

uma linha do tempo realista, baseada em evidência clínica.

a paciência é o ativo mais subestimado do tratamento capilar.

COMO A QUEDA APARECE EM NÓS

difusa, e não em entradas

no padrão feminino a perda é difusa: o cabelo afina por toda a região central. o sinal mais comum é a risca que vai alargando ao longo dos meses, junto com a sensação de rabo de cavalo mais fino. a linha da frente costuma ser preservada — por isso a comparação com o padrão masculino, que recua as entradas, confunde e faz muita gente demorar a procurar ajuda.

4 A 8 SEMANAS

shedding

fios fracos caem para dar lugar a novos. é normal, é sinal de que o ciclo reagiu e tende a estabilizar.

3 A 4 MESES

primeiros sinais

a queda diária diminui. o cabelo aparenta menor volume porque os fios novos ainda são curtos.

5 A 6 MESES

pico de resposta

densidade visível e risca visivelmente mais fechada em fotos comparativas. é quando a maioria nota.

6 A 12 MESES+

manutenção

o tratamento segue por tempo indefinido. interromper faz o fio voltar ao padrão de queda.

BOM SABER

paciência no início

cabelo cresce em ciclos. nenhum tratamento, oral ou tópico, mostra resultado nas primeiras semanas. a melhora visível chega no 3º ao 6º mês, não antes.

BOM SABER

continuidade depois

a queda de padrão hormonal não desaparece. o tratamento controla. parar significa voltar ao ponto de partida em alguns meses.

DOCUMENTE A EVOLUÇÃO

fotos da risca.

a diferença de uma semana para a outra é imperceptível. a de seis meses, não. cabelo seco, repartido sempre no mesmo lugar, mesma luz, mesmo ângulo, sem prender.

▪ dia 1

▪ 3 meses

▪ 6 meses

▪ 12 meses

CAPÍTULO 06

fale com a gente.

como chegar até o time médico e de atendimento.

WHATSAPP

(11) 93622-9391

canal preferencial. equipe médica e atendimento.
respostas em horário comercial.

E-MAIL

contato@eles.com.br

para assuntos administrativos, financeiros e
contratuais. respostas em até 1 dia útil.

LEMBRE-SE

- siga sempre a dose da sua receita, não a dose deste guia.
- guarde o frasco em lugar seco e fora do alcance de crianças. o suporte capilar contém ferro, e ferro é perigoso para criança pequena.
- se esqueceu uma dose, não dobre na próxima. retome no dia seguinte.
- o tópico é só para o couro cabeludo. evite olhos e mucosas. **minoxidil é tóxico para animais domésticos, sobretudo gatos** — guarde o frasco fora do alcance deles e não deixe que lambam o seu couro cabeludo, as suas mãos ou o travesseiro antes de secar.
- qualquer dúvida ou efeito novo merece uma mensagem no whatsapp.



a sua saúde pede

a escolha inteligente que acompanha você.

elas.