

Prueba de Análisis de Algoritmos – Curso 2014-2015 – 10 de abril de 2015

Diseño y Análisis de Algoritmos – Grado en Ingeniería Informática

Valor: 30 % de la nota final. Duración: **1 hora y 45 minutos**

Se compensa el examen con 12 puntos de los 30 posibles

Ejercicio 1 [3 puntos]

Demostrar **mediante la definición** de complejidad asintótica \mathcal{O} , sin usar límites, si se verifica:

$$n^2 - 3n + 1 \in O(n^2)$$

Solución:

La definición de \mathcal{O} es:

$$\mathcal{O}(g(n)) = \left\{ f(n) : \exists c > 0 \text{ y } n_0 > 0 / 0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n), \forall n \geq n_0 \right\}$$

Por tanto, tenemos que ver si es posible encontrar una pareja de constantes $c > 0$ y $n_0 > 0$ de forma que se cumpla la definición. Empezamos analizando:

$$n^2 - 3n + 1 \leq cn^2$$

Escogemos un valor de c lo suficientemente grande. En este caso $c = 1$ resulta ser suficiente. Por tanto, tenemos:

$$n^2 - 3n + 1 \leq n^2$$

En este caso podemos despejar la n :

$$-3n + 1 \leq 0$$

$$\frac{1}{3} \leq n$$

Por tanto, podemos escoger para n_0 cualquier valor superior o igual a $1/3$. Por ejemplo, $n_0 = 1$. De esta manera hemos encontrado las dos constantes c y n_0 que satisfacen la definición, y podemos afirmar que $n^2 - 3n + 1 \in O(n^2)$.

Ejercicio 2 [4 puntos]

Determinar el orden de complejidad (no es necesario hallar las constantes) de la siguiente función recursiva:

$$T(n) = 5T(n-1) - 8T(n-2) + 4T(n-3) + 3 + n^2 + n2^n$$

Solución:

Aplicamos el método general de resolución de recurrencias. Primero pasamos los términos con T del lado derecho al izquierdo, y expresamos el resto de términos de la derecha como polinomios por potencias elevadas a n :

$$T(n) - 5T(n-1) + 8T(n-2) - 4T(n-3) = (3 + n^2)1^n + n2^n$$

El polinomio característico es:

$$(x^3 - 5x^2 + 8x - 4)(x-1)^3(x-2)^2$$

Factorizamos el primer término aplicando el método de Ruffini y agrupamos términos:

$$(x-1)(x-2)^2(x-1)^3(x-2)^2 = (x-1)^4(x-2)^4$$

Por tanto, la función $T(n)$ tiene la siguiente expresión:

$$T(n) = C_1 + C_2n + C_3n^2 + C_4n^3 + C_52^n + C_6n2^n + C_7n^22^n + C_8n^32^n$$

Finalmente, el orden de complejidad es:

$$T(n) \in \theta(n^32^n)$$

Ejercicio 3 [6 puntos]

La fórmula para considerar todas las operaciones que se llevan a cabo en un bucle de tipo FOR o WHILE es:

$$T_{\text{bucle}} = 1_{\text{inicialización}} + \sum^n (1_{\text{comparación}} + T_{\text{cuerpo}} + 1_{\text{incremento}}) + 1_{\text{última comparación}}$$

Utilízala para hallar el número de operaciones ($T(n)$, simplificada) del siguiente código:

```

1  for (int i=0; i<n; i++){
2      int j=i;
3      while (j<=n){
4          for (int k=0; k<j; k++)
5              procesa(i ,j ,k);  // dos operaciones
6
7          j++;
8      }
9  }
```

Se considera que las inicializaciones, comparaciones, e incrementos siempre necesitan una sola operación.

Solución:

El código consta de 3 bucles, que podemos descomponer de la siguiente manera:

$$T(n) = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} (1 + T_{\text{For 1}} + 1) + 1$$

$$T_{\text{For 1}} = 1 + \sum_{j=i}^n (1 + T_{\text{For 2}} + 1) + 1$$

$$T_{\text{For 2}} = 1 + \sum_{k=0}^{j-1} (1 + 2 + 1) + 1 = 2 + 4j$$

Sustituyendo en $T_{\text{For 1}}$ tenemos:

$$\begin{aligned}
 T_{\text{For 1}} &= 2 + \sum_{j=i}^n (4 + 4j) \\
 &= 2 + \sum_{j=i}^n 4 + 4 \sum_{j=i}^n j = 2 + \sum_{j=i}^n 4 + 4 \left[\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^{i-1} j \right] \\
 &= 2 + 4(n - i + 1) + 4 \left[\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(i-1)i}{2} \right]
 \end{aligned}$$

Simplificando obtenemos:

$$T_{\text{For } 1} = 2n^2 + 6n + 6 - 2i^2 - 2i$$

Sustituyendo en la expresión para el primer bucle tenemos:

$$T(n) = 2 + \sum_{i=0}^{n-1} (2n^2 + 6n + 8 - 2i^2 - 2i)$$

$$T(n) = 2 + 2n^3 + 6n^2 + 8n - 2 \sum_{i=0}^{n-1} i^2 - 2 \sum_{i=0}^{n-1} i$$

Para terminar el problema hay que resolver los dos últimos sumatorios:

$$T(n) = 2 + 2n^3 + 6n^2 + 8n - 2 \frac{(2(n-1) + 1)(n-1)n}{6} - 2 \frac{(n-1)n}{2}$$

$$T(n) = 2 + 2n^3 + 6n^2 + 8n - \frac{2n^3}{3} + \frac{3n^2}{3} - \frac{n}{3} - n^2 + n$$

Finalmente:

$$T(n) = \frac{4n^3 + 18n^2 + 26n + 6}{3} \in \theta(n^3)$$

Ejercicio 4 [6 puntos]

Halla una expresión no recursiva para la siguiente recurrencia por el método de **expansión de recurrencias**:

$$T(n) = T(n/3) + n$$

donde n es una potencia de 3 ($n = 3^k$, para $k = 1, 2, \dots$), y donde $T(1) = 0$. Indica además el orden de $T(n)$.

Solución:

Procedemos a expandir la recurrencia:

$$\begin{aligned} T(n) &= n + T(n/3) \\ &= n + n/3 + T(n/3^2) \\ &= n + n/3 + n/3^2 + T(n/3^3) \\ &= n + n/3 + n/3^2 + n/3^3 + T(n/3^4) \\ &\vdots \\ &= n \left(1 + 1/3 + 1/3^2 + 1/3^3 + \dots + 1/3^{i-1} \right) + T(n/3^i) \end{aligned}$$

Resolviendo la serie geométrica obtenemos:

$$\begin{aligned} T(n) &= n \left(\frac{1/3^i - 1}{1/3 - 1} \right) + T(n/3^i) = n \left(\frac{\frac{1-3^i}{3^i}}{\frac{1-3}{3}} \right) + T(n/3^i) \\ &= n \left(\frac{(3^i - 1)3}{3^i(3 - 1)} \right) + T(n/3^i) \end{aligned}$$

Se llega al caso base cuando $n/3^i = 1$. Es decir, cuando $n = 3^i$. Sustituyendo:

$$T(n) = n \left(\frac{(n-1)3}{2n} \right) + T(1) = \frac{3}{2}n - \frac{3}{2} \in \theta(n)$$

Ejercicio 5 [6 puntos]

Halla una expresión no recursiva para la siguiente recurrencia por el método **general de resolución recurrencias**:

$$T(n) = T(n/3) + n$$

donde n es una potencia de 3 ($n = 3^k$, para $k = 1, 2, \dots$), y donde $T(1) = 0$. Indica además el orden de $T(n)$.

Solución:

Para poder aplicar el método primero tenemos que hacer el cambio de variable $n = 3^k$:

$$T(n) = T(3^k) = T(3^k/3) + 3^k = T(3^{k-1}) + 3^k$$

A continuación hacemos un cambio de función $t(k) = T(3^k)$:

$$T(n) = T(3^k) = t(k) = t(k-1) + 3^k$$

El polinomio característico de la recurrencia es:

$$(x-1)(x-3)$$

Por tanto, la recurrencia tiene la siguiente forma:

$$t(k) = C_1 1^k + C_2 3^k = C_1 + C_2 3^k$$

Para hallar las constantes necesitamos un segundo caso base. Procedemos a calcular $T(3) = T(1) + 3 = 3$. Los correspondientes casos base para $t(k)$ son:

$$T(1) = T(3^0) = t(0) = 0$$

$$T(3) = T(3^1) = t(1) = 3$$

Por tanto, el sistema de ecuaciones a resolver es:

$$\left. \begin{array}{rcl} t(0) & = & C_1 + C_2 = 0 \\ t(1) & = & C_1 + 3C_2 = 3 \end{array} \right\}$$

Las soluciones son $C_1 = -3/2$ y $C_2 = 3/2$. Por tanto:

$$t(k) = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2} 3^k$$

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos:

$$t(k) = T(3^k) = T(n) = \frac{3}{2}n - \frac{3}{2} \in \theta(n)$$

Ejercicio 6 [5 puntos]

Halla una expresión no recursiva para la siguiente recurrencia por el método de **expansión de recurrencias**:

$$T(n) = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} T(i)$$

donde $T(0) = 1$.

Solución:

En primer lugar podemos reescribir la fórmula de la siguiente manera:

$$T(n) = 1 + T(n-1) + \sum_{i=0}^{n-2} T(i) \quad (1)$$

A partir de ahora se puede resolver de varias formas.

- Primera forma (difícil). Expandimos $T(n-1)$, quedando:

$$T(n) = 1 + 1 + \sum_{i=0}^{n-2} T(i) + \sum_{i=0}^{n-2} T(i) = 2 + 2 \left[\sum_{i=0}^{n-2} T(i) \right]$$

Ahora extraemos $T(n-2)$ del sumatorio, y lo expandimos:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2 + 2 \left[T(n-2) + \sum_{i=0}^{n-3} T(i) \right] = 2 + 2 \left[1 + \sum_{i=0}^{n-3} T(i) + \sum_{i=0}^{n-3} T(i) \right] \\ &= 2 + 2 \left[1 + 2 \sum_{i=0}^{n-3} T(i) \right] = 4 + 4 \left[\sum_{i=0}^{n-3} T(i) \right] \end{aligned}$$

Hacemos lo mismo un paso más:

$$T(n) = 4 + 4 \left[T(n-3) + \sum_{i=0}^{n-4} T(i) \right] = 4 + 4 \left[1 + 2 \sum_{i=0}^{n-4} T(i) \right] = 8 + 8 \left[\sum_{i=0}^{n-4} T(i) \right]$$

Tras una serie de pasos (en este caso usamos la variable j ya que la i ya aparece en el sumatorio) tenemos:

$$T(n) = 2^{j-1} + 2^{j-1} \left[\sum_{i=0}^{n-j} T(i) \right]$$

Alcanzamos el caso base cuando el sumatorio solo suma un término $T(0)$. Esto sucede cuando $n = j$. Sustituyendo:

$$T(n) = 2^{n-1} + 2^{n-1}T(0) = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \in \theta(2^n)$$

- Segunda forma (fácil). Por la definición de T tenemos:

$$1 + \sum_{i=0}^{n-2} T(i) = T(n-1)$$

Por tanto, sustituyendo en (1) tenemos una nueva expresión simplificada de la recurrencia:

$$T(n) = 2T(n-1)$$

Ahora procederíamos a resolverla:

$$T(n) = 2T(n-1) = 4T(n-2) = 8T(n-3) = \dots = 2^i T(n-i)$$

El caso base se alcanza cuando $n-i=0$, es decir, cuando $n=i$. Sustituyendo:

$$T(n) = 2^n T(0) = 2^n \in \theta(2^n)$$