

UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Algebraic Number Theory 3

A cura di
Leonardo Gagliardoni

Titolare del corso
Prof. Tamás Szamuely

Anno Accademico 2026/2027

Ultima modifica: 23 ottobre 2026

Contents

1. p-adic extensions 3

1. p-adic extensions

Definition 1 (Brauer group)

Let k be a field and k_s be one of its separable closures. The *Brauer group* of k is

$$\mathrm{Br}(k) := H^2(k, k_s)$$

If $K|k$ is a separable subextension of $k_s|k$ we can define the *relative Brauer group* of the extension as

$$\mathrm{Br}(K|k) := \ker\left(\mathrm{Br}(k) \xrightarrow{\mathrm{Res}} \mathrm{Br}(K)\right)$$

The elements of $\mathrm{Br}(k)$ correspond to the finite dimensional division algebras D with center k. In this correspondence, the subgroup $\mathrm{Br}(K|k)$ gives those D for which $D \otimes_k K \simeq M_{n\times n}(K)$, where $n^2 = \dim_k D$.

Lemma 1

1. Banana
2. banen
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.