c'est nuit | 3h | 14:50-15h | Heure réelle : 15:00 | ou blessé? ☐ oui ☒ non | physique? ☐ oui ☒ non

EXAMEN PRÉLIMINAIRE

Êtes-vous épileptique? ☐ oui ☒ non | Êtes-vous diabétique? ☐ oui ☒ non | Prenez-vous de l'insuline? ☐ oui ☒ non | Êtes-vous suivi par un médecin ou un dentiste? ☒ oui ☐ non | Prenez-vous des médicaments? ☒ oui ☐ non Pourquoi? troubles de comportement

Observation du sujet — Attitude : agité / agressif | Coordination : chancelante | Langage : sacre | Haleine : — | Visage : rouge

Vérification des yeux — Port de verres correcteurs : ☐ Aucun ☐ Lunettes | Verres de contact : ☒ flexibles ou ☐ rigides | Yeux : ☐ Normaux ☐ Conjonctive rouge ☒ Injectés de sang ☒ Larmoyants | Cécité : ☒ Aucune ☐ Œil gauche ☐ Œil droit | Symétrie : ☒ oui ☐ non | Pupilles : ☒ Égales ☐ Inégales (pourquoi?) : | Aptes à suivre le stimulus : ☒ oui ☐ non | Paupières : ☒ Normales ☐ Lourdes

Prise de pouls (1) 88 bpm à 15:24

EXAMEN DES YEUX

Nystagmus du regard horizontal	Œil gauche oui	Œil gauche non	Œil droit oui	Œil droit non
Mouvements de poursuite irréguliers des globes oculaires	☒	☐	☒	☐
Regard périphérique extrême	☒	☐	☒	☐
Angle d'apparition	immédiat		immédiat	

Nystagmus vertical ☐ oui ☐ non

Convergence — droit ↓ | gauche ←

EXAMENS D'ATTENTION DIVISÉE

Épreuve de Romberg — Approximativement 5 cm 5 cm — Temps estimé par le sujet : 90 à 30 s

Test « marcher et se retourner » — a fermé les yeux

Perte d'équilibre	☒
Départ avant la fin des directives	☒

	Aller	Retour
Arrêt de la marche	☐	☐
Manque talon-à-orteil	☐	☐
Pas hors ligne	☐	☐
Utilisation des bras	☒	☒
Façon incorrecte de tourner		☒
Nombre de pas	9	9

Description du demi-tour : perte d'équilibre | Ne peut accomplir le test : — | Chaussures : espadrilles

Test « se tenir sur un pied » — 12/30 | 8/30 — arrêt du test

Gauche		Droit
☒	Balancement	☒
☒	Utilisation des bras	☒
☐	Sautillement	☒
☒	Dépôt du pied	☒

Épreuve doigt-nez — ○ droit | △ gauche

Examen visuel des sites d'injection — Photos prises ☐ oui ☐ non — Droit | Gauche — aucune marque

SIGNES VITAUX

Tension artérielle : 138/82 mmHG | Température : °c 36,6 °C | Prise de pouls (2) 92 bpm à 15:44

EXAMEN DANS LA CHAMBRE NOIRE

Dimension de la pupille	Éclairage ambiant (2,5 - 5,0 mm)	Noirceur presque totale (5,0 - 8,5 mm)	Lumière directe (2,0 - 4,5 mm)
Œil gauche	5,5	8,5	5,0-6,5
Œil droit	5,5	8,5	5,0-6,5

Dilatation bondissante : ☒ oui ☐ non

Réaction des yeux à la lumière : ☐ normale ☒ lente ☐ peu ou non visible

Examen des cavités : Buccale : — Nasales : —

EXAMEN DU TONUS MUSCULAIRE

☐ normal ☒ rigide ☐ flasque

Prise de pouls (3) 92 bpm à 15:59

DÉCLARATION DU SUJET ET AUTRES OBSERVATIONS

Quel(s) médicament(s) ou drogue(s) avez-vous consommé(s)? Dosyrel Seroquel

Quantité : — Quand : — Endroit : —

Autres : —

OPINION DE L'AGENT ÉVALUATEUR

☐ exclusion ☐ médical ☒ opérationnel ☐ formation ☒ Rapport complémentaire annexé

La capacité de conduire du sujet est affaiblie à la suite de l'absorption dans son organisme d'une ou de plusieurs substances liées aux catégories de drogues suivantes : ☐ alcool ☒ stimulant ☐ anesthésique dissociatif ☐ inhalant ☒ dépresseur ☐ hallucinogène ☐ narcotique analgésique ☐ cannabis

PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES

Ordre de se soumettre à 16:04 au prélèvement du ou des échantillons : ☐ liquide buccal ☒ urine ☐ sang

Heure de prélèvement à 17:00 ☐ refus ☒ demande d'expertise soumise au LSJML