高等微积分 1　第 1 周笔记

微积分简介、集合与映射、实数、确界与完备性、数列极限与它的计算
依据艾颖华《高等微积分讲义》§1.1–§1.4、§2.1–§2.2
课堂记录：2026 年 9 月 16 日、18 日、20 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》；参考书为常庚哲、史济怀《数学分析教程》与 Rudin《数学分析原理》。第 1 周（9 月 16 日、18 日、20 日）覆盖讲次 0「集合、映射、逻辑」与讲次 1 的开头「实数的定义」，并在 9 月 20 日接着讲完 §2.1 的极限性质与 §2.2「计算极限的方法」。

主题	讲义	课堂
微积分简介	§1.1（p. 7–8）	9 月 16 日
集合与映射、逻辑	§1.2（p. 8–9）	9 月 16 日
实数与戴德金分割	§1.3（p. 10–12）	9 月 16 日、18 日
确界与完备性	§1.4（p. 12–14）	9 月 18 日
数列极限的定义与性质	§2.1（p. 15–17）	9 月 18 日、20 日
计算极限的方法	§2.2（p. 17–18）	9 月 20 日

本讲的主线：从「算面积」这一个几何问题出发，逼出极限、微分、积分三个概念，再回头把「实数是什么」补上——因为极限定义里的 ϵ 与 N 必须以实数的完备性为地基。

最后一节. 第 7 节不按讲义顺序走，它汇总的是板书上多出来的内容：讲义没有出现的结论，以及讲义只列结论、而课堂把证明写全的部分。

1　微积分简介：三个概念从同一个问题里长出来

定义 1.1 (面积函数；讲义问题 1.1.1，p. 7)**.**

1. 给定非负函数 h，称之为**高度函数**；
2. 由曲线 $y=h(x)$、x 轴、y 轴与直线 $x=a$ 围成的图形记为

$$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le a,\ 0\le y\le h(x)\},$$

3. 把 D 的面积记作 $S(a)$，称之为 $S=S(x)$ 的**面积函数**。

例题 1.1 (阿基米德求抛物线弓形面积；讲义例 1.1.2，p. 7)**.** 求 $h(x)=x^2$ 对应的面积函数 $S(a)$。


1. 用 $n-1$ 条直线 $x=\frac{ia}{n}$ 把 D 剖分成 n 小块；
2. 第 i 块近似为底 $\frac{a}{n}$、高 $h\big(\frac{ia}{n}\big)$ 的矩形。

取 $h(x)=x^2$，则

$$S(a)\simeq\sum_{i=1}^{n}\frac{a}{n}h\left(\frac{ia}{n}\right)=\frac{a^3}{n^3}\sum_{i=1}^{n}i^2=\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}a^3=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2n}+\frac{1}{6n^2}\right)a^3.$$

当 n 越来越大时右端趋于 $\frac{1}{3}a^3$，故 $S(a)=\frac{1}{3}a^3$。

思路：未知图形算不动，就用已知的图形（矩形）从下方去逼近，把面积变成一个随 n 变化的 *和式*——几何问题由此化成代数问题，剩下的只是「这个和式会不会算」（平方和公式）。「当 $n\to\infty$ 时趋于 $\frac{1}{3}$」这一步，就是全课程第一次用「越来越接近」。



例题 1.2 (一般幂函数；讲义例 1.1.3，p. 7)**.** 设 $h(x)=x^k$，则

$$S(a)\simeq\sum_{i=1}^{n}\frac{a}{n}\left(\frac{ia}{n}\right)^k=a^{k+1}\chi_n,\qquad \chi_n=\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}.$$

于是问题变成：当 n 越来越大时，χ_n 是否越来越接近某个与 n 无关的数 L？若如此，则 $S(a)=a^{k+1}L$。这正是**数列的极限**要回答的问题。

1.1 牛顿的反问题：由面积求高度

设 o 是接近 0 的数（课堂记法，o 非零且很小），则

$$S(x+o)-S(x)\simeq o\cdot h(x),\qquad \text{故}\qquad h(x)\simeq\frac{S(x+o)-S(x)}{o}.$$

当 o 越来越接近 0 时，上式给出 $h(x)$ 越来越好的近似。牛顿把上述比值记为 $S'(x)$ 并称之为**流数**，现代数学中称为**导数**：


$$h(x)=S'(x).$$

例题 1.3 (讲义例 1.1.4，p. 8)**.** 设 $S(x)=x^m$，m 为正整数，则

$$\frac{S(x+o)-S(x)}{o}=\frac{(x+o)^m-x^m}{o}=\sum_{i=1}^{m}\binom{m}{i}x^{m-i}o^{i-1},$$

当 $o\to0$ 时右端趋于 $\binom{m}{1}x^{m-1}=mx^{m-1}$，故 $h(x)=mx^{m-1}$。

注 1.1 (几何图像)**.** $S(x+o)-S(x)$ 是条形阴影部分的面积，它近似等于 $o\cdot h(x)$。



S 的增量（红色小块）$\simeq$ 底 o 乘高 $h(x)$。

1.2 两个方向的互逆：微积分基本定理的雏形

牛顿注意到「由高度函数求面积函数」与「由面积函数求高度函数」互为逆操作。讲义把它写成两个恒等式（对应课堂上的 (I)、(II)）：

(I) 从 h 出发求 $S(x)=\int_0^x h$，再求导回到 h：

$$\left(\int_0^x h\right)' = h(x).$$

(II) 从 S 出发求 $h(x)=S'(x)$，再积分回到 S：

$$\int_0^a S'(x)\mathrm{d}x = S(a)-S(0)=S(a) \qquad (S(0)=0).$$

定理 1.1 (微积分基本定理；讲义 §1.1 概述，p. 8)**.** 微分与积分互为逆运算。上述 (I)(II) 两个恒等式是它的两个侧面。

注 1.2 (一元函数微积分的主体内容；讲义 p. 8)**.**

1. **极限理论**：当 n 越来越大时，$\{x_n\}$ 是否越来越接近某个固定的数；
2. **微分理论**：用导数（变化率）刻画函数的性质；
3. **积分理论**：由高度函数计算面积函数的运算；
4. **微分与积分的关系**：二者互为逆运算，即微积分基本定理。

2 集合与映射：描述函数的语言

讲义 §1.2（p. 8–9）。课堂（9 月 16 日）先铺了集合的记号，并补了限制映射这一节。本节的落点是：把「函数」定义成一种特殊的映射，此后微积分就只用集合的语言说话。

定义 2.1 (映射, map；讲义定义 1.2.1，p. 8)**.**

1. 给定集合 X、Y，从 X 到 Y 的一个**映射** $f: X\to Y$ 是指：对每个 $x\in X$，都指定唯一确定的 $y\in Y$ 与之对应；
2. 把 Y 中与 x 对应的元素记作 $f(x)$，称为 f 在 x 处的**值**（或**像**，image）。

定义中的「唯一确定」是全部约束所在：同一个 x 不能对应两个不同的 y，也不能没有对应。

例题 2.1 (恒同映射, identity map；讲义例 1.2.2，p. 9)**.** 给定集合 X，定义 X 的**恒同映射** $\mathrm{id}_X: X\to X$ 为

$$\mathrm{id}_X(x)=x, \qquad \forall x\in X.$$

定义 2.2 (映射的复合, composition；讲义定义 1.2.3，p. 9)**.** 给定映射 $f: X\to Y$、$g: Y\to Z$，定义它们的**复合映射** $g\circ f: X\to Z$ 为

$$g\circ f(x)=g(f(x)), \qquad \forall x\in X.$$


例题 2.2 (恒同映射是复合的单位；讲义例 1.2.4，p. 9)**.** 设 $f: X\to Y$，则

$$f\circ \mathrm{id}_X = f = \mathrm{id}_Y \circ f.$$

命题 2.1 (复合满足结合律；讲义命题 1.2.5，p. 9)**.** 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$、$h : Z \to W$，则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

注 2.1 (几何图像)**.** 复合就是把映射首尾相接地连起来：x 先走 f，再走 g。



沿上方两个箭头走 $x \mapsto f(x) \mapsto g(f(x))$，与沿下方一个箭头走到的是同一个点，这正是 $g \circ f$ 的定义。

定义 2.3 (像集与原像集；讲义定义 1.2.6，p. 9)**.**

1. 设 $f : X \to Y$ 是映射，令

$$f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X, \text{ 使得 } f(x) = y\},$$

   称为 f 的**像集** (*image*)；
2. 对 Y 的子集 V，令

$$f^{-1}(V) = \{x \in X \mid f(x) \in V\},$$

   称为 V（在 f 下）的**原像集** (*pre-image*)。

原像集对任何映射都有定义，这里的 f^{-1} 只是一个记号，并不预设 f 可逆。

定义 2.4 (单射、满射、双射；讲义定义 1.2.7，p. 9)**.**

1. 称 f 是**满射** (*surjection*)，如果 $f(X) = Y$；
2. 称 f 是**单射** (*injection*)，如果 $\forall x \neq x'$，有 $f(x) \neq f(x')$；
3. 称 f 为**双射**（bijection，或一一对应、可逆映射），如果 f 既单又满。

命题 2.2 (逆映射；讲义命题 1.2.8，p. 9)**.** f 是双射的充分必要条件是：存在映射 $g : Y \to X$ 使得

$$g \circ f = \mathrm{id}_X, \qquad f \circ g = \mathrm{id}_Y .$$

这样的 g 若存在则唯一，称之为 f 的**逆映射**，记作 $f^{-1} : Y \to X$。

定义 2.5 (函数；讲义定义 1.2.9，p. 9)**.** 设 $X, Y \subseteq \mathbb{R}$，从 X 到 Y 的映射 $f : X \to Y$ 称为从 X 到 Y 的**函数**。称 X 为 f 的**定义域** (*domain*)，称 Y 为 f 的**陪域** (*co-domain*)。

例题 2.3 (Dirichlet 函数；讲义例 1.2.10，p. 9)**.** 定义 $D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

它处处不连续，是讨论连续性时最省事的反例；连续性的内容属于后续讲次。

2.1 课堂补充：限制映射

设 $f: X \to Y$ 是映射，$A \subseteq X$，则把 f 在 A 上的**限制** (*restriction*) 定义为

$$f|_A : A \to Y, \qquad f|_A(x) = f(x), \quad \forall x \in A,$$

即只把定义域收缩到 A，对应关系本身一个字都不改。课堂（9 月 16 日）把它与像集、原像集放在一起讲，是为了说明「换定义域」和「换陪域」是两件不同的事：$f|_A$ 换的是前者。

2.2 要练的题

- 讲义练习 1.2.11（p. 9）：证明每一个函数 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 都可以表示成一个奇函数与一个偶函数的和。这就是第一次作业的第 3 题。
- 自检：把单射改写成「$f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$」，说明它与定义 2.4(2) 等价。

3 实数：为什么要用戴德金分割

讲义 §1.3（p. 10–12）。第 1 节把极限、微分、积分都化成了「越来越接近」，而 ϵ、N、L 都必须是实数。所以在讲极限之前，先要把实数是什么补上。

3.1 从 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 到 $\mathbb{Q}$：三次补上逆运算

讲义（p. 10）的造数过程是逐层补逆运算：

集合	已有的运算	缺什么
$\mathbb{Z}_{\geq 0}$（自然数）	加法、乘法	加法不一定有逆
$\mathbb{Z}$（整数）	加法有逆运算	乘法不一定有逆
$\mathbb{Q}$（有理数）	加法与乘法都有逆运算	描不出 $\sqrt{2}$ 这样的几何量

为保证加法有逆运算，对每个 $k \neq 0$ 引入负整数「$-k$」，要求「$-k$」$+(n+k) = n$；为保证乘法有逆运算，对每个整数对 $(m, n \neq 0)$ 引入分数「$\frac{m}{n}$」，要求「$\frac{m}{n}$」$\times n = m$，并约定 $\frac{m}{n} = \frac{mk}{nk}$（$\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$）。

例题 3.1 (有理数的两种样子；讲义例 1.3.1，p. 10–11)**.** 有理数恰好是有限小数或无限循环小数。

(1) 循环小数必是有理数。设 $x = a_n \cdots a_0.a_{-1} \cdots a_{-m}\dot{a}_{-m-1} \cdots \dot{a}_{-m-k}$，则把循环块提出来求和（等比级数 $1 + 10^{-k} + 10^{-2k} + \cdots$）得

$$x = 10^{-m}\left(b + \frac{c}{10^k - 1}\right), \qquad b, c \in \mathbb{Z},$$

右端是两个整数之比，故 $x \in \mathbb{Q}$。

(2) 有理数必是有限或循环小数。设 $x = \frac{p}{q}$，写 $q = 2^\alpha 5^\beta q_1$，其中 q_1 与 10 互素。由 Euler 定理存在 k 使 $10^k - 1 = q_1 L$。记 $m = \max\{\alpha, \beta\}$，则

$$x = \frac{pL}{2^\alpha 5^\beta (10^k - 1)} = \frac{p_1}{10^m (10^k - 1)}.$$

再用 p_1 除以 10^k-1 的带余除法 $p_1 = b(10^k-1)+c$（$0 \le c < 10^k-1$），又回到 $x = 10^{-m}\left(b + \frac{c}{10^k-1}\right)$，即有限或无限循环小数。

例题 3.2 ($\sqrt{2}$ 的无理性；讲义例 1.3.2，p. 11)**.** $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$。

证明. 反证。若 $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$，m, n 互素，则 $2m^2 = n^2$，故 n 为偶数（奇数平方被 2 除不尽）；设 $n = 2n_1$，则 $m^2 = 2n_1^2$，故 m 也为偶数。于是 m, n 有公因子 2，与互素矛盾。 □

思路：反证的标准流程——假设结论不成立，把 $2m^2 = n^2$ 当作已知等式，从奇偶性两边各推一次，逼出与「互素」的矛盾。「互素」这个假设不能省：没有它，第二步「m 也是偶数」根本推不出矛盾。

3.2 十进制小数为什么不算定义

人们自然地想「定义」实数为一个十进制小数

$$x = a_n \cdots a_0 . a_{-1} a_{-2} \cdots, \qquad a_i \in \{0, 1, \ldots, 9\},$$

它代表 $x = a_n 10^n + \cdots + a_0 10^0 + a_{-1}10^{-1} + a_{-2}10^{-2} + \cdots$。但讲义（p. 11）指出：对无限小数，这是一个**无限和**，只有先建立了级数的基本理论，这个表达式才能被定义。于是这个方案是把问题往后推，而不是解决它。


1872 年，戴德金 (*Dedekind*) 改用有理数给出实数的严格定义，这就是戴德金分割。

定义 3.1 (戴德金分割, Dedekind cut；讲义定义 1.3.3，p. 12)**.** 一个**戴德金分割**是一个有序对 (A, B)，满足

1. A, B 是有理数集合 $\mathbb{Q}$ 的非空子集；
2. $A \cap B = \varnothing$，且 $A \cup B = \mathbb{Q}$；
3. 对任何 $a \in A$ 与任何 $b \in B$，有 $a < b$；
4. A 没有最大元素。

一个实数就定义为这样的一个分割；把全体戴德金分割所构成的集合记为 $\mathbb{R}$，称为实数集合。

注 3.1 (几何图像)**.** 把 $\mathbb{Q}$ 排在一条直线上，(A, B) 就是「切点左边的全体有理数」与「切点右边的全体有理数」。第 (4) 条要求 A 没有最大元素，意思是这把刀切在有理数**之间**，而不是切在某个有理数**上**。



条件 (3) 保证 A 整体落在 B 的左边，$a < b$ 恒成立；切点本身不在 $\mathbb{Q}$ 里，它正是被定义出来的那个实数。

注 3.2 (在分割上定义大小、加法与乘法；讲义 p. 12)**.**

(i) 序：$(A_1, B_1) < (A_2, B_2)$ 当且仅当 $A_1 \subseteq A_2$ 且 $A_1 \neq A_2$；

(ii) 加法：$(A_1,B_1)+(A_2,B_2)=(A_1+A_2,\ \mathbb{Q}\setminus(A_1+A_2))$，其中对 $X,Y\subseteq\mathbb{Q}$ 令 $X+Y=\{z\mid \exists x\in X,\ \exists y\in Y,\ \text{使得 } z=x+y\}$；

(iii) 乘法：对两个戴德金正数 (A_1,B_1)、(A_2,B_2)，令

$$A=\{a\in\mathbb{Q}\mid \exists a_1\in A_1,\ a_1>0,\ \exists a_2\in A_2,\ a_2>0,\ \text{使得 } a\le a_1a_2\},$$

则 $(A_1,B_1)\cdot(A_2,B_2)=(A,\ \mathbb{Q}\setminus A)$；

(iv) 嵌入：称 (A,B) 代表一个有理数，如果 B 有最小元素。

讲义只把这些定义列出来，运算律的逐条验证并未展开——本课真正要用的不是这些运算本身，而是下面这件事：在这样的 $\mathbb{R}$ 里，上确界一定存在。

注 3.3 (要练的题)**.** 讲义 §1.3 没有配练习。自检方式是：把例题 3.1 的两个方向各默写一遍，再用定义 3.1 的四条逐条检查一个具体的分割（例如取 $A=\{a\in\mathbb{Q}\mid a<0\}\cup\{a\in\mathbb{Q}\mid a^2<2\}$），说清它为什么满足第 (4) 条。

4 确界与实数完备性

讲义 §1.4（p. 12–14）。这一节把「越来越接近」量化成「最小的上界」，并兑现戴德金分割的第一份回报：有上界的集合必有上确界。

定义 4.1 (最大值与最小值；讲义定义 1.4.1，p. 12)**.** 设 E 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集。称 $a\in E$ 是 E 的**最大值**（**最小值**），如果对任何 $x\in E$ 都有 $x\le a$（都有 $x\ge a$）。记作 $\max E$（$\min E$）。


例题 4.1 (讲义例 1.4.2，p. 12)**.** 令 $E=[0,1)$，则 $\min E=0$，而 $\max E$ 不存在：1 比 E 中每个元素都大，但 $1\notin E$，而最大值必须落在 E 内部。

定义 4.2 (有界、上界与下界；讲义定义 1.4.3，p. 12)**.** 称 E 是**有上界的**（**有下界的**），如果存在实数 c，使得对任何 $x\in E$ 都有 $x\le c$（都有 $x\ge c$）；这样的 c 称为 E 的一个**上界**（**下界**）。称 E 是**有界的**，如果它既有上界又有下界；这等价于存在实数 K，使得对任何 $x\in E$，有 $|x|\le K$。

定义 4.3 (上确界与下确界；讲义定义 1.4.4，p. 12)**.** 设 E 有上界。如果 E 的所有上界中有一个最小的数，则称 E 有**上确界**，把这个最小的上界称为 E 的上确界，记作 $\sup E$。类似地，若 E 的所有下界中有一个最大的数，则称 E 有**下确界**，记作 $\inf E$。用符号写就是

$$\sup E=\min\{c\mid x\le c,\ \forall x\in E\},\qquad \inf E=\max\{c\mid x\ge c,\ \forall x\in E\}.$$

注 4.1 (几何图像)**.** 把实数排成一条直线：E 是一段图形，它的上界是另一段图形，而 $\sup E$ 就是「上界」那段图形最靠左的端点——它自己仍是 E 的上界，再往左挪一点就不是了。



红的那段左端点就是 $\sup E$：它是上界，又是所有上界中最小的一个。

命题 4.1 (上确界的操作性刻画；讲义命题 1.4.5，p. 13)**.** c 是 E 的上确界的充分必要条件是：

1. $\forall x \in E$，$x \le c$；
2. $\forall c' < c$，$\exists x \in E$ 使得 $x > c'$。

证明. 令 $U = \{a \mid x \le a,\ \forall x \in E\}$ 为 E 的所有上界所构成的集合，则

$$c = \sup E \iff c = \min U \iff c \in U \text{ 且 } \forall c' < c \text{ 有 } c' \notin U,$$

把后一式的两个条件用 U 的定义翻译出来就是 (1) 与 (2)。 □

思路：第 (2) 条是以后每次用上确界时真正要动用的那一半：只要往 $\sup E$ 左边挪一点，就一定有 E 中的点被露出来。反过来，要证「某个数是上确界」也总是这两步——先证它是上界，再证比它小的都不是上界。

例题 4.2 (讲义例 1.4.6，p. 13)**.** 令 $E = [0, 1)$，则 $\sup E = 1$，$\inf E = 0$；注意 $1 \notin E$，所以上确界不必属于集合本身。

定理 4.2 (实数的完备性（确界定理）；讲义定理 1.4.7，p. 13)**.** (1) 有上界的非空实数集必有上确界。(2) 有下界的非空实数集必有下确界。

证明. 只证 (1)。设 $E = \{x_\alpha\}$，每个 x_α 有戴德金分割表示 $x_\alpha = (A_\alpha, B_\alpha)$；又设 c 是 E 的一个上界，$c = (A_0, B_0)$。由 $x_\alpha \le c$ 得

$$A_\alpha \subseteq A_0, \qquad \forall \alpha,$$

从而 $\bigcup_\alpha A_\alpha \subseteq A_0$；特别地，$\bigcup_\alpha A_\alpha$ 是 $\mathbb{Q}$ 的非空子集且不等于 $\mathbb{Q}$。考察有序对 $\left(\bigcup_\alpha A_\alpha,\ \mathbb{Q} \setminus \bigcup_\alpha A_\alpha\right)$，容易验证它满足戴德金分割的四条要求，因而代表一个实数，进一步可验证它是 E 的上确界。(2) 把 (1) 用在 $-E = \{-x \mid x \in E\}$ 上即可。 □

思路：要给一族实数找上确界，就把它们的左半集全部并起来——由「分割的序就是包含」，上界恰好是左半集包含它们的那些分割，所以并出来的分割正是最小的上界。这一步是整章的关键：完备性不是从天上掉下来的，它正是戴德金分割那四条要求的直接后果。

命题 4.3 (阿基米德性质与有理数的稠密性；讲义命题 1.4.8，p. 13)**.**

1. 对任何实数 x，存在 $n \in \mathbb{Z}$，使得 $x < n$；
2. 对任何实数 $a < b$，存在有理数 $\frac{m}{n}$，使得 $a < \frac{m}{n} < b$。

(1) 通常称为**阿基米德性质** (*Archimedean property*)，(2) 通常说成「有理数在实数中稠密」。

证明. (1) 反证。若每个整数都 $\le x$，则 x 是 $\mathbb{Z}$ 的上界；由定理 4.2，$\mathbb{Z}$ 有上确界，设 $M = \sup \mathbb{Z}$。注意 $M - 1$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的上界，故存在整数 n 使 $M - 1 < n$，于是整数 $n + 1 > M$，与 M 是 $\mathbb{Z}$ 的上确界矛盾。

(2) 由 (1)，存在整数 $n > \frac{1}{b-a}$。再对 $-na$ 与 na 用 (1)，得整数 k_0, k_1 满足

$$-k_0 > -na, \qquad k_1 > na, \qquad \text{即} \qquad \frac{k_0}{n} < a < \frac{k_1}{n}.$$

取 $k_0, k_0+1, \dots, k_1$ 中满足 $a < \frac{m}{n}$ 的最小的整数 m，则 $\frac{m-1}{n} \le a < \frac{m}{n}$，于是

$$\frac{m}{n} = \frac{m-1}{n} + \frac{1}{n} \le a + \frac{1}{n} < a + (b-a) = b,$$

这就找到了满足 $a < \frac{m}{n} < b$ 的 $\frac{m}{n}$。 □

注 4.2 (要练的题)**.** 练习 1.4.9（p. 14）：对任何实数 $x > 0$ 与任何正整数 n，存在唯一的正实数 y 使得 $y^n = x$。建议用「集合 $\{t > 0 \mid t^n < x\}$ 的上确界」来做，正好练一次命题 4.1(2) 与定理 4.2。


5 数列的极限：把「越来越接近」写成 ϵ-N

讲义 §2.1（p. 15–16）。第 1 节的面积问题与第 4 节的完备性在这里汇合：完备性保证确界存在，确界保证极限定义里的 N 找得到。

定义 5.1 (数列；讲义定义 2.1.1，p. 15)**.** 一个**数列** (*sequence*) 是指一个映射 $x : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$。令 $x_n = x(n)$，称为该数列的第 n 项。这个数列记作 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$。

定义 5.2 (ϵ-N 语言；讲义定义 2.1.2，p. 15)**.** 称 $L \in \mathbb{R}$ 是数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的**极限** (*limit*)，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$，如果对任何 $\epsilon > 0$，都存在正整数 N，使得 $\forall n \ge N$，有 $|x_n - L| < \epsilon$。此时称 $\{x_n\}$ **收敛到** L(*converges*)；否则称 $\{x_n\}$ **发散** (*diverges*)。

注 5.1 (几何图像)**.** $|x_n - L| < \epsilon$ 说的是 x_n 落在以 L 为中心、宽 2ϵ 的带子里。定义要求的是：无论带子多窄，只要 n 足够大（越过某个 N），数列的点就全在这条带子里。



N 之后的点全部落在带内；N 之前的点落在哪里都可以不管。

例题 5.1 ($\frac{1}{n}$ 的极限；讲义例 2.1.3，p. 15)**.** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$。

证明. 对任何 $\epsilon > 0$，由命题 4.3 存在整数 $N > \frac{1}{\epsilon}$，则对任何 $n > N$ 有

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \epsilon,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$。 □

思路：ϵ-N 的第一步永远是解不等式：把 $|x_n - L| < \epsilon$ 解成 n 的条件，解出来的界就是 N——这里 $\frac{1}{n} < \epsilon \iff n > \frac{1}{\epsilon}$。阿基米德性质只负责保证这样的整数存在，这正是第 4 节说的「完备性是极限的地基」。

例题 5.2 ($\sqrt[n]{a}$ 的极限；讲义例 2.1.4，p. 15)**.** 设 $a > 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$。

证明. 设 $a \ge 1$。对任何 $\epsilon > 0$，取正整数 $N > \frac{a-1}{\epsilon}$，则对任何整数 $n > N$ 有

$$(1+\epsilon)^n \ge 1 + n\epsilon > 1 + \frac{a-1}{\epsilon} \cdot \epsilon = a,$$

从而 $1 \le \sqrt[n]{a} < 1+\epsilon$，特别地 $|\sqrt[n]{a}-1|<\epsilon$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$。 □

思路：这里的 N 不是一眼看出来的——先假设结论成立，把 $\sqrt[n]{a}<1+\epsilon$ 两边 n 次方、解出 $n>\frac{a-1}{\epsilon}$，再回头验证这个 N 确实可行；Bernoulli 不等式 $(1+\epsilon)^n \ge 1+n\epsilon$ 负责把 $(1+\epsilon)^n$ 的下界顶过 a。「先解出 N、再验证」这个顺序适用于所有用定义验证的题。当 $0<a<1$ 时，讲义把它化归到讲义定理 2.2.4——即极限的四则运算（定理 6.2，第 6 节已证）；具体做法见注 7.16。

5.1 把定义写成符号，并且会写它的否定

讲义（p. 16）把定义与它的否定平行列出，这一页要背下来：

$$\{x_n\} \text{ 以 } L \text{ 为极限} \iff \forall \epsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{Z}^+,\ \forall n\ge N,\ |x_n-L|<\epsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 不以 } L \text{ 为极限} \iff \exists \epsilon>0,\ \forall N\in\mathbb{Z}^+,\ \exists n\ge N,\ |x_n-L|\ge\epsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \exists L\in\mathbb{R},\ \forall \epsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{Z}^+,\ \forall n\ge N,\ |x_n-L|<\epsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 发散} \iff \forall L\in\mathbb{R},\ \exists \epsilon>0,\ \forall N\in\mathbb{Z}^+,\ \exists n\ge N,\ |x_n-L|\ge\epsilon.$$

写否定的规则只有一条：$\forall$ 与 $\exists$ 逐层对调，末尾的不等号翻向。

注 5.2 (由定义立刻得到的结论；讲义 p. 16)**.** 极限只与下标充分大的各项有关，与数列前面有限项的行为无关。换句话说：只改变数列前面有限项的值，收敛或发散的性质不变，极限（如果存在）也不变。

命题 5.1 (保序性；讲义命题 2.1.5，p. 16)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$。如果 $A<B$，则存在正整数 N，使得对任何 $n\ge N$ 有 $a_n<b_n$。

证明. 取 $\epsilon=\frac{B-A}{2}>0$。由极限的定义，存在正整数 N_1,N_2，使得对任何 $n\ge N_1$ 有 $|a_n-A|<\frac{B-A}{2}$，对任何 $n\ge N_2$ 有 $|b_n-B|<\frac{B-A}{2}$。取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则对任何 $n\ge N$ 有

$$a_n < A+\frac{B-A}{2} = B-\frac{B-A}{2} < b_n.$$ □

取 ϵ 为两个极限距离的一半，是这一节唯一的新技巧；此后的唯一性、有界性都由它推出。

推论 5.2 (极限唯一；讲义推论 2.1.6，p. 16)**.** 如果数列收敛，则其极限是唯一的。

证明. 反证：设 $\{x_n\}$ 收敛到两个极限 $A<B$。取 $a_n=b_n=x_n$，由命题 5.1，存在 N 使得对任何 $n\ge N$ 有 $x_n<x_n$，矛盾。 □

定义 5.3 (数列的有界性；讲义定义 2.1.7，p. 16)**.** 称数列 $\{a_n\}$ 是**有上界的**（**有下界的**），如果存在实数 c 使对任何正整数 n 都有 $a_n\le c$（$a_n\ge c$）。称 $\{a_n\}$ 是**有界的**，如果它既有上界又有下界。

推论 5.3 (收敛必有界；讲义推论 2.1.8，p. 16)**.** 收敛的数列都是有界的。

证明. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L$。由 $L<L+1$ 及命题 5.1，存在 N 使得对 $n>N$ 有 $x_n<L+1$，于是

$$x_n \le \max\{L+1,x_1,\dots,x_N\},\qquad \forall n\in\mathbb{Z}^+,$$

即 $\{x_n\}$ 有上界。同法可证它有下界。 □

注意逆命题不成立：$x_n=(-1)^n$ 有界但不收敛。所以「有界」只是收敛的必要条件。

思路：「尾部有界 + 前面有限项取最大」——有限多个数总能取最大，这正是「有限」的好处。它的逆否命题「无界 $\Rightarrow$ 发散」是判断发散的第一招，用法见注 7.20。

例题 5.3 (几何数列的极限；讲义例 2.1.9，p. 16)**.** 给定实数 q，则

$$\lim_{n\to\infty} q^n=\begin{cases}0, & |q|<1,\\ 1, & q=1,\\ \text{不存在}, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

讲义在 §2.1 只列出这一结论；$|q|<1$ 与 $|q|>1$ 的两段证明见例题 7.4，那里用到的 Bernoulli 不等式在第 6 节还会反复出现。

例题 5.4 ($\lim_{n\to\infty} n^\alpha$；讲义例 2.1.10，p. 17)**.** 给定实数 α，则

$$\lim_{n\to\infty} n^\alpha=\begin{cases}0, & \alpha<0,\\ 1, & \alpha=0,\\ \text{不存在}, & \alpha>0.\end{cases}$$

证明. $\alpha=0$ 时 $n^\alpha\equiv 1$。$\alpha<0$ 时写 $\alpha=-\beta$（$\beta>0$）：给定 $\epsilon>0$，只要 $n>\left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{1/\beta}$ 就有 $n^\beta>\frac{1}{\epsilon}$，即 $|n^\alpha-0|=\frac{1}{n^\beta}<\epsilon$。$\alpha>0$ 时，对任何 $M>0$，只要 $n>M^{1/\alpha}$ 就有 $n^\alpha>M$，故 $\{n^\alpha\}$ 无上界，因而发散（无界必发散，见注 7.20）。 □

思路：三种情形是同一个动作——把「要它小于 ϵ」或「要它大于 M」解出 n，解出来的这个界就是 N。$\alpha>0$ 时不要用「趋于 $+\infty$」当结论，要走「无上界 $\Rightarrow$ 发散」。

推论 5.4 (极限不等式；讲义推论 2.1.11，p. 17)**.** 设 $\lim_{n\to\infty} a_n=A$、$\lim_{n\to\infty} b_n=B$。若存在 N 使对一切 $n\geq N$ 有 $a_n\leq b_n$，则 $A\leq B$。

证明. 反证：若 $A>B$，由保序性（命题 5.1）存在 N_0 使 $n\geq N_0$ 时 $a_n>b_n$，与假设矛盾。 □

思路：要比较两个极限，就去比较对应的项——但这条路只在「项的不等 $\Rightarrow$ 极限的 $\leq$」这一个方向上通。

严格不等号会退化：由 $a_n<b_n$（$\forall n\geq N$）推不出 $\lim a_n<\lim b_n$，讲义注 2.1.12（p. 17）专门给了反例：$a_n=\frac{1}{n}>b_n=\frac{1}{n+1}$，两者极限却同为 0。所以凡是要得到严格不等，都不能靠取极限，得另找理由（例如命题 7.4 里那样用单调性加严）。

注 5.3 (要练的题)**.** 讲义 §2.1 未配练习。建议默写命题 5.1 与推论 5.3 的证明，并各用 ϵ 语言验证一次 $\lim\frac{1}{n}=0$ 与 $\lim\sqrt[n]{2}=1$（给定 $\epsilon=0.01$，把 N 具体算出来）；再把例题 5.4 的三种情形各做一遍，并自己举一个「$a_n<b_n$ 但极限相等」的例子。

6 计算极限的方法

讲义 §2.2（p. 17–18）给出三条路，课堂又补了第四条：

1. 用定义直接验证——要做不少不等式估计，是基本功；
2. 夹逼定理——用得最多的一种；
3. 极限的四则运算——把复杂的式子拆成已知极限的加减乘除；
4. Stolz–Cesàro 定理——见第 7 节。

思路：拿到一个极限先问两件事。它能拆成已知极限的四则组合吗（第 3 条）？拆不动、但能看出它被夹在两个简单的界之间吗（第 2 条）？两条都不灵，才回到定义去硬估（第 1 条）。这个顺序就是本节各例题的排列顺序。再补一句更一般的：遇到没见过的式子、要问它的极限时，先代几个具体的 n 猜一猜它趋于什么，再动手证——猜想对了，证的时候该配什么上下界也就清楚了。

例题 6.1 (n^k/a^n 的极限；讲义例 2.2.1，p. 17)**.** 设 $a>1$，$k\in\mathbb{Z}^+$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{a^n}=0$。

证明. 写 $a=1+c$（$c>0$）。二项式展开只保留一项（其余项皆正，丢掉只会放大）：

$$\frac{n^k}{a^n}=\frac{n^k}{(1+c)^n}\le\frac{n^k}{\binom{n}{k+1}c^{k+1}}=\frac{(k+1)!}{c^{k+1}}\cdot\Big(\prod_{i=1}^{k}\frac{n}{n-i}\Big)\cdot\frac{1}{n}.$$

当 $n>2k$ 时 $\frac{n}{n-i}\le\frac{n}{n-k}<2$（$i=1,\dots,k$），故每个因子都被 2 控制，

$$\frac{n^k}{a^n}<\frac{(k+1)!}{c^{k+1}}\cdot 2^k\cdot\frac{1}{n}\to 0.$$

□

思路：「放大分子、缩小分母」是本节通用的动作。这里分母只留二项式的第 $k+1$ 项（恰好比分子的次数多一次），分母里于是多出一个 n，多出来的那一次 $\frac{1}{n}$ 就是收敛的全部来源。结论记一句话：**指数增长压过任何多项式增长**。

定理 6.1 (夹逼定理；讲义定理 2.2.2，p. 17)**.** 设存在 N 使对一切 $n\ge N$ 有 $a_n\le b_n\le c_n$。若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n$ 都存在且都等于 L，则 $\{b_n\}$ 也以 L 为极限。

证明. 给定 $\epsilon>0$。由 $\lim a_n=L$ 与 $\lim c_n=L$，存在 N_1,N_2 使 $n\ge N_1$ 时 $|a_n-L|<\epsilon$、$n\ge N_2$ 时 $|c_n-L|<\epsilon$，即 $a_n>L-\epsilon$、$c_n<L+\epsilon$。于是对 $n\ge\max\{N,N_1,N_2\}$ 有

$$L-\epsilon<a_n\le b_n\le c_n<L+\epsilon,$$

即 $|b_n-L|<\epsilon$。 □

思路：夹逼是「b_n 算不动」时的办法：把它塞进两个简单的界之间。把 $|x-L|<\epsilon$ 读成「x 落在以 L 为中心、宽 2ϵ 的带子里」，两个界各自落进带子，中间那个自然也落进去。课堂的比喻见注 7.21。

例题 6.2 (最大项主导；讲义例 2.2.3，p. 17)**.** 设 $a_1,\dots,a_m>0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(a_1^n+\cdots+a_m^n\right)^{1/n}=\max\{a_1,\dots,a_m\},\qquad \lim_{n\to\infty}\left(a_1^{-n}+\cdots+a_m^{-n}\right)^{-1/n}=\min\{a_1,\dots,a_m\}.$$

证明. 记 $M=\max\{a_i\}$（重标号后不妨 $M=a_1$）。一方面 $(a_1^n)^{1/n}=M$ 给出下界；另一方面每项都不超过 M^n，故 $(a_1^n+\cdots+a_m^n)^{1/n}\le(mM^n)^{1/n}=\sqrt[n]{m}\,M$ 给出上界。由 $\lim\sqrt[n]{m}=1$（例题 5.2）及夹逼定理（定理 6.1）得第一式。第二式：写 $a_i^{-n}=\left(\frac{1}{a_i}\right)^n$，对它用第一式得 $\left(\sum a_i^{-n}\right)^{1/n}=\max\{\frac{1}{a_i}\}=\frac{1}{\min\{a_i\}}$，再取倒数即可。 □

思路：「一堆正数相加，最大的那个说了算」的形式化就是上下界各配一次：下界用「和 $\ge$ 最大项」，上界用「每项 $\le$ 最大项，一共 m 项」。m 是固定的，所以 $\sqrt[n]{m}\to1$；正是这一步要求个数固定（无限多个就不行，见例题 7.6）。

定理 6.2 (极限的四则运算；讲义定理 2.2.4，p. 18)**.** 设 $\lim a_n=A$、$\lim b_n=B$，则

(1) $\lim(a_n+b_n)=A+B$，且 $\lim(a_n-b_n)=A-B$；
(2) $\lim(a_nb_n)=AB$；
(3) 若 $B\neq0$，则 $\lim\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{A}{B}$。

思路：加减乘直接套。**除法多一步**——先用保号性把分母项住：不妨 $B>0$，由 $\lim b_n=B>\frac{B}{2}$ 及命题 5.1，存在 N_0 使 $n\ge N_0$ 时 $b_n>\frac{B}{2}$，于是 $|b_nB|>\frac{B^2}{2}$，分母不再能任意小。这是商的情形唯一的额外动作，也是最容易漏掉的一步。三条的完整证明见注 7.22。

推论 6.3 (有限次四则与 lim 可交换；讲义推论 2.2.5，p. 18)**.** 设 k 是固定的正整数，则

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{k}x_{i,n}=\sum_{i=1}^{k}\lim_{n\to\infty}x_{i,n},\qquad\lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{k}x_{i,n}=\prod_{i=1}^{k}\lim_{n\to\infty}x_{i,n}.$$

思路：关键词是「k 固定」——有限多个极限可以逐个取。**无限**多个则未必：$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{\infty}$ 与 $\sum_{i=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty}$ 一般不相等，反例见例题 7.6。

例题 6.3 (多项式由首项主导；讲义例 2.2.6，p. 18)**.** 给定 $a_k\neq0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_kn^k+\cdots+a_0}{n^k}=a_k$。

证明. 提出首项：

$$\frac{a_kn^k+\cdots+a_0}{n^k}=a_k+\frac{a_{k-1}}{n}+\cdots+\frac{a_0}{n^k},$$

除 a_k 外各项都趋于 0（例题 5.4），由四则运算（定理 6.2）得极限为 a_k。 □

思路：最高次项说了算。凡是多项式之比，第一反应都是「上下同除最高次幂」。

例题 6.4 (有理式的极限；讲义例 2.2.7，p. 18)**.** 设 $k,m\in\mathbb{Z}^+$，$a_k,b_m\neq0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_kn^k+\cdots+a_0}{b_mn^m+\cdots+b_0}=\begin{cases}0, & k<m,\\ \dfrac{a_k}{b_m}, & k=m,\\ \text{不存在}, & k>m.\end{cases}$$

证明. 把分式拆成三个因子：

$$\frac{a_kn^k+\cdots+a_0}{b_mn^m+\cdots+b_0}=\frac{a_kn^k+\cdots+a_0}{n^k}\cdot\frac{n^m}{b_mn^m+\cdots+b_0}\cdot n^{k-m},$$

前两个因子分别趋于 a_k 与 $\frac{1}{b_m}$（例题 6.3），第三个因子由例题 5.4 给出：$k<m$ 时趋于 0，$k=m$ 时等于 1，再由四则运算合并。$k>m$ 时，由 $\dfrac{\text{分子}}{a_k n^k}\to 1>\frac12$ 与 $\dfrac{\text{分母}}{b_m n^m}\to 1<2$，存在 N_1,N_2 使 n 足够大时分子 $>\frac12 a_k n^k$、分母 $<2b_m n^m$，于是

$$\frac{\text{分子}}{\text{分母}}>\frac{a_k}{4b_m}\,n^{k-m}\to+\infty,$$

故无界，因而发散。 □

思路：「上下同除最高次幂」在有分母时照样有效，只是要分清谁的次数高。$k>m$ 的情形另有一招——**由极限值反推不等式**（极限是 1，所以对充分大的 n 它大于 $\frac12$、小于 2），把分子分母的大小夹出来，再得到无界。这招在别的估计里也会反复用到。

注 6.1 (要练的题)**.** 讲义 §2.2 的例题本身就是练习。建议：默写定理 6.1 与定理 6.2 的证明；用夹逼算出 $(3^n+5^n)^{1/n}$；判断 $\lim\dfrac{2n^2+1}{3n^2-n}$ 与 $\lim\dfrac{n^3+1}{n^2+1}$ 各属于例题 6.4 的哪一情形；再用定义验证一次 $\dfrac{n^2}{2^n}\to 0$，把 N 具体算出来。

7 课堂补充：板书上多出来的内容

前六节照讲义 §1.1–§2.2 的顺序整理。这一节只收板书与口述里多出来的部分：讲义没有出现的结论，以及讲义只列结论而课堂把证明写全的地方。每条都注明对应的讲义位置。

7.1 9 月 16 日：映射语言与它的几个例子

注 7.1 (原像集的运算)**.** 设 $f:X\to Y$，$V,V_1,V_2\subseteq Y$，则

$$f^{-1}(V_1\cap V_2)=f^{-1}(V_1)\cap f^{-1}(V_2),\qquad f^{-1}(V_1\cup V_2)=f^{-1}(V_1)\cup f^{-1}(V_2),\qquad f^{-1}(V^c)=\big(f^{-1}(V)\big)^c,$$

其中 $V^c=Y\setminus V$。三条都只是把 $x\in X$ 代进去改写，例如 $x\in f^{-1}(V_1\cap V_2)\iff f(x)\in V_1\cap V_2\iff x\in f^{-1}(V_1)\cap f^{-1}(V_2)$。原像集对任何 f 都有定义（定义 2.3），所以 $f^{-1}(\varnothing)=\varnothing$ 完全允许。（这三条在讲连续性时要用。）

注 7.2 (复合的顺序)**.** $g\circ f$ 有意义的前提是 f 的陪域等于 g 的定义域；交换过来 $f\circ g$ 常常根本没有定义，即使两者都有定义，一般也不相等。（紧接命题 2.1。）

注 7.3 (双射定理的两个方向)**.**

(1) ($\Rightarrow$) 设 $f:X\to Y$ 双射。对每个 $y\in Y$，由满射知 $f^{-1}(\{y\})\neq\varnothing$，由单射知它至多含一个元素，故 $f^{-1}(\{y\})$ 是单元集合；令 $g(y)$ 等于其中唯一的元素，就得到映射 $g:Y\to X$，且 $f^{-1}(\{y\})=\{g(y)\}$。于是 $f(g(y))=y$ 给出 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$，而 $g(f(x))$ 是 $f^{-1}(\{f(x)\})$ 的唯一元素、x 正是其中之一，给出 $g\circ f=\mathrm{id}_X$。

(2) ($\Leftarrow$) 设这样的 g 存在。由 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$ 得 $f(g(y))=y$，故 $y\in f(X)$，f 满；若 $f(x_1)=f(x_2)$，则 $x_1=g(f(x_1))=g(f(x_2))=x_2$，故 f 单。

命题 2.2 只列了结论，两个方向是课堂上写全的。

注 7.4 (逆映射的唯一性). 设 $g_1, g_2 : Y \to X$ 都满足 $g_i \circ f = \mathrm{id}_X$、$f \circ g_i = \mathrm{id}_Y$，则

$$g_2 = \mathrm{id}_X \circ g_2 = (g_1 \circ f) \circ g_2 = g_1 \circ (f \circ g_2) = g_1 \circ \mathrm{id}_Y = g_1,$$

中间两步分别用了结合律（命题 2.1）与两个恒等式。

注 7.5 (同一个定理在别的世界里). 课堂把「集合与映射」看成一个世界（对象是集合，关系是映射），并指出上面这条「双射 $\iff$ 有双边逆」在另外两个世界里一字不改地再出现一次：

1. 线性代数：对象是线性空间，关系是线性映射；$f : V \to W$ 是线性双射 $\iff$ 存在线性 $g : W \to V$ 使 $g \circ f = \mathrm{id}_V$、$f \circ g = \mathrm{id}_W$。
2. 微积分：对象是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，关系是连续映射；连续双射 $f : D \to E$ 的逆是否也连续，正是反函数定理与隐函数定理要回答的问题（要回答它需要额外的条件）。

三个世界里的差别只在「逆映射是否还落在同一个世界里」。

注 7.6 (为什么改用映射语言). 课堂把两种写法并列比较：

1. 变量语言：先摆出取值范围（集合 D），再说它上面满足什么关系；
2. 映射语言：先给出 $f : X \to Y$，再从 f 出发去看各个对象。

课堂取后者：「函数」「极限」在变量语言里都不好严格定义，在映射语言里可以；多元微分学里变量语言还容易导致误判。讲义 §1.2 直接用映射语言，没有解释这个选择。

注 7.7 (两个记号约定).

1. 实数集、整数集、有理数集、复数集记作 $\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$，与字母 R, Z, Q, C 必须区分；
2. 说「分数就是循环小数」（例题 3.1）时，有限小数以 0 为循环节。

7.2 9 月 18 日：实数定义里补上的几件事

注 7.8 (例题 3.1(2) 补证：$q_1 \mid 10^k - 1$ 里的 k 从哪来). 讲义用 Euler 定理说明存在 k 使 $10^k - 1 = q_1 L$，课堂给了一个只用抽屉原理的证明：$10^0, 10^1, \dots, 10^{q_1}$ 除以 q_1 的余数都落在 $\{0, 1, \dots, q_1 - 1\}$ 中，共 q_1 种可能，而这里有 $q_1 + 1$ 个数，故必有两个 $i < j$ 余数相同。于是

$$q_1 \mid 10^j - 10^i = 10^i\big(10^{j-i} - 1\big),$$

再由 q_1 与 10 互素得 $q_1 \mid 10^{j-i} - 1$，取 $k = j - i$ 即可。

例题 7.1 ($\sqrt{d}$ 无理性的一般情形). 设 $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ 不是平方数，则 $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$。

证明. 反证，设 $\sqrt{d} = \frac{n}{m}$，$m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$，则 $dm^2 = n^2$。把三者按素数分解：

$$d = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad m = \prod_i p_i^{\beta_i}, \qquad n = \prod_i p_i^{\gamma_i},$$

代入 $dm^2 = n^2$ 并按素数分解的唯一性逐项比较，得 $\alpha_i + 2\beta_i = 2\gamma_i$，于是每个 α_i 都是偶数，从而 $\sqrt{d} = \prod_i p_i^{\alpha_i/2} \in \mathbb{Z}_{>0}$，即 d 是平方数，矛盾。 □

取 $d = 2$ 就是例题 3.2；课堂把它写成了对所有非平方数 d 都成立的命题。

注 7.9 (直接拿小数定义实数的两处困难)**.** 课堂把困难写成两条：

1. $x = 0.a_1a_2a_3\cdots$ 是无限和 $\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \cdots$，要谈它得先有级数理论，是循环依赖；
2. 两个无限小数怎么写加法、乘法，也看不出来。

板书提到的参考出路是把 x 与它的一串有限位截断 $\{0.a_1,\ 0.a_1a_2,\ 0.a_1a_2a_3, \dots\}$ 对应起来——这串有理数正是 $\mathbb{Q}$ 的一个 Cauchy 列；用「Cauchy 列必收敛」定义实数，是与戴德金分割并列的另一条路（本课走分割这条路）。

注 7.10 (切点算在哪一边)**.** 把 $\mathbb{Q}$ 分成左右两半时，切点是有理数，它算 A 还是算 B 只是约定，不影响实质。课堂的约定是**算在右边**，即 B 取「$\geq$ 切点」的那一半；这正是定义 3.1 的第 (4) 条「A 没有最大元素」。在这个约定下：

$$(A, B) \text{ 代表一个有理数} \iff B \text{ 有最小元素.}$$

7.3 9 月 18 日：确界定理的几份回报

注 7.11 (确界定理的证明里补的那一行)**.** 定理 4.2 的证明要用到「$x_\alpha \leq c$」的含义。课堂把它写成左半集的包含：

$$(A, B) \leq (A', B') \iff A \subseteq A',$$

这正是讲义在分割上定义序的方式（p. 12）。由 $x_\alpha \leq c$ 得 $A_\alpha \subseteq A_0$，取并集即得 $\bigcup_\alpha A_\alpha \subseteq A_0$——这就是证明里那一步的来源。

命题 7.1 (在 $\mathbb{R}$ 上再作分割不产生新的数)**.** 设 (L, R) 是 $\mathbb{R}$ 的一个戴德金分割：$L, R \neq \varnothing$；$L \cap R = \varnothing$，$L \cup R = \mathbb{R}$；$\forall x \in L$、$\forall y \in R$ 有 $x < y$；L 没有最大元素。则存在实数 a 使

$$L = (-\infty, a), \qquad R = [a, +\infty).$$

证明. L 非空有上界（R 中任何元素都是），由定理 4.2 得 $a = \sup L$ 存在。由 a 是上界得 $L \subseteq (-\infty, a]$；再由 L 无最大元素知 $a \notin L$，故 $L \subseteq (-\infty, a)$。反过来设 $a' < a$：由 $a = \sup L$ 与命题 4.1(2)，存在 $x \in L$ 使 $x > a'$。若 $a' \in R$，则分割的第 3 条应对一切 $x \in L$ 给出 $x < a'$，矛盾，故 $a' \in L$，即 $(-\infty, a) \subseteq L$。两者合起来 $L = (-\infty, a)$，而 $R = \mathbb{R} \setminus L = [a, +\infty)$。 □

拿实数再切一刀，切出来的不是新的数，而只是原来的 $\sup L$。「再分割不产生新的数」是 $\mathbb{R}$ 完备的另一种说法。

注 7.12 (完备性的两种说法)**.** 课堂总结：$\mathbb{R}$ 称为**完备的**，是因为确界定理成立，所以**确界定理刻画了 $\mathbb{R}$ 的完备性**；后面还会出现另一种等价的说法——「$\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列在 $\mathbb{R}$ 中必收敛」。反过来，$\mathbb{Q}$ 不完备：$\{a \in \mathbb{Q} \mid a^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界，却没有上确界。

例题 7.2 (差集的确界)**.** 设 $X, Y \subseteq \mathbb{R}$，且 $\sup X$、$\inf Y$ 都存在，令 $X - Y = \{x - y \mid x \in X,\ y \in Y\}$，则

$$\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y.$$

证明. 记 $u = \sup X$，$v = \inf Y$。一方面，对任何 $x \in X$、$y \in Y$ 有 $x \leq u$、$-y \leq -v$，故 $x - y \leq u - v$，即 $u - v$ 是 $X - Y$ 的上界。另一方面，设 $\varepsilon > 0$：由命题 4.1(2) 存在 $x \in X$ 使 $x > u - \frac{\varepsilon}{2}$，而由

$v = \inf Y$ 存在 $y \in Y$ 使 $y < v + \frac{\varepsilon}{2}$，两式相减得

$$x - y > \left(u - \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(v + \frac{\varepsilon}{2}\right) = u - v - \varepsilon,$$

即 $u - v$ 左边任意近处都有 $X - Y$ 的点。由命题 4.1 得 $\sup(X - Y) = u - v$。 □

两半用的分别是命题 4.1 的 (1) 与 (2)；这道题是课堂加的。

推论 7.2 (有理数与无理数的稠密性)**.** 设 $a < b$，则 (a, b) 中有无穷多个有理数，也有无穷多个无理数。

证明. 反复用命题 4.3(2)：由它在 (a, b) 中取到一个有理数 q_1，再在 (a, q_1) 上取到 $q_2 \neq q_1$，如此继续，得到无穷多个有理数。无理数靠平移得到：$\sqrt{2} + q$ 是无理数，而

$$\sqrt{2} + q \in (a, b) \iff q \in \left(a - \sqrt{2},\ b - \sqrt{2}\right),$$

右端是开区间，取其中的有理数 q（命题 4.3(2) 保证存在）即可。 □

由此可知「(a, b) 中最左边的有理数」「离某点最近的有理数」都是不存在的说法。

7.4 9 月 18 日：极限的工具箱


注 7.13 (为什么「误差越来越小」不能当定义)**.** 课堂用仪器的比喻说明极限为什么要用 ϵ 定义：

1. 设 L 是要测的物理量，第 n 代仪器给出读数 x_n；
2. 只说「仪器越来越好、$|x_n - L|$ 越来越小」不行：单次测量总有不可避免的误差，也没有理由要求误差单调下降；
3. 正确的做法是把精度当成可以任意指定的量：先给定误差上限 ϵ，再看从第几代仪器起误差一直小于它。

把第 3 条写成符号就是定义 5.2：**精度可以任意指定，N 随精度而变**。

注 7.14 (lim 的几种写法)**.** $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$、$\lim\{x_n\}$、$\lim x_n$ 都通用，课堂建议写 $\lim\{x_n\}$。另外不要把 lim 与 $n \to \infty$ 看成两个部件：符号 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 整体就代表定义 5.2 的那句话，$n \to \infty$ 只是说明「n 越来越大的过程」。

注 7.15 (几何图像)**.** 把取极限看成一个黑箱：输入一个数列，输出它的极限。



箱子算得对不对，要用定义 5.2 来判定；ϵ-N 语言就是「算得对」的精确含义。

定义 7.1 (Gauss 符号)**.**

1. $\lfloor x \rfloor = [x]$ 表示不超过 x 的最大整数，称为**地板函数**（下取整）；
2. $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数，称为**天花板函数**（上取整）；
3. 基本性质：$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$。

课堂此后取 N 一律写成这种形式，例如 $N=\lfloor\frac{1}{\varepsilon}\rfloor+1$ 就自动满足 $N>\frac{1}{\varepsilon}$。讲义 §1.4–§2.1 没有引入这个符号。

命题 7.3 (Bernoulli 不等式的一般指数形式)**.** 设 $x>-1$，$\alpha\in\mathbb{R}$。

1. 若 $\alpha\geq 1$ 或 $\alpha\leq 0$，则 $(1+x)^\alpha\geq 1+\alpha x$；
2. 若 $0<\alpha<1$，则 $(1+x)^\alpha\leq 1+\alpha x$。

课堂上是从二项式 $(1+\varepsilon)^n\geq 1+\binom{n}{1}\varepsilon=1+n\varepsilon$（$\alpha=n$ 为整数）顺手推广出来的，并提了一句：两个方向为什么不同，用 Taylor 展开就能看出来。

例题 7.3 ($\sqrt[n]{n}$ 的极限)**.** 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$。

证明. 对任何 $\varepsilon>0$，取 $N=\lfloor 1+\frac{2}{\varepsilon^2}\rfloor+1$，则对任何 $n\geq N$ 有 $n>1+\frac{2}{\varepsilon^2}$，即 $n-1>\frac{2}{\varepsilon^2}$。由二项式展开

$$(1+\varepsilon)^n\geq\binom{n}{2}\varepsilon^2=\frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2>n,$$

于是 $1\leq\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon$，即 $\left|\sqrt[n]{n}-1\right|<\varepsilon$。 □

这道题是课堂加的，与例题 5.2 用的是同一个套路：先把 $\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon$ 反解成 $n<(1+\varepsilon)^n$，再用二项式的一二阶项去估计 $(1+\varepsilon)^n$。

注 7.16 ($\lim\sqrt[n]{a}=1$ 对一切 $a>0$)**.** 例题 5.2 只证了 $a\geq 1$，课堂把 $0<a<1$ 也补上了：写 $a=\frac{1}{b}$（$b>1$），则 $\sqrt[n]{a}=\frac{1}{\sqrt[n]{b}}\to 1$。于是结论统一成

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1,\qquad\forall a>0.$$

（讲义把它化归到讲义定理 2.2.4——即定理 6.2；两条路都行。）

7.5 9 月 20 日：极限性质的补证与两个工具箱

这一天接着 §2.1 讲性质，并进入 §2.2 的计算方法。下面按课堂顺序收两样东西：讲义只列结论、而课堂把证明写全的；以及讲义完全没有的。

注 7.17 (删掉或改动前面有限项，不影响极限)**.** $\lim a_n$ 只关心「足够靠后」的项的行为，与前面有限多项 $a_1,\dots,a_{N-1}$ 无关；删去或改动它们，既不改变极限的存在性，也不改变极限的值。所以凡是要证的结论只对 $n\geq N$ 成立时，都可以放心地说「不妨设 n 足够大」——这是 ϵ-N 论证里最常用的一个省略。

注 7.18 (保序性的两个版本，以及那个 $\frac{A-B}{2}$ 的证法)**.** 课堂把保序性写成两个等价的版本：

(1) 若 $\lim a_n=A>0$，则存在 N 使 $n\geq N$ 时 $a_n>0$；
(2) 若 $\lim a_n=A>B=\lim b_n$，则存在 N 使 $n\geq N$ 时 $a_n>b_n$。

第 (2) 条中取 $b_n\equiv 0$ 就得到第 (1) 条；反过来第 (2) 条等价于「$\lim(a_n-b_n)>0$，再对 a_n-b_n 用第 (1) 条」。课堂给的证法是画数轴：取 $\epsilon=\frac{A-B}{2}$，由定义存在 N_1,N_2 使 $n\geq N_1$ 时 $a_n>A-\epsilon$、$n\geq N_2$ 时 $b_n<B+\epsilon$，而 $A-\epsilon=B+\epsilon$，于是 $n\geq\max\{N_1,N_2\}$ 时 $a_n>b_n$。

思路：两个极限一高一低时，把中间距离的一半取作 ϵ，两条 ϵ-带子就正好错开。这是「ϵ 该取多少」的标准答案：**取成两个目标量之差的一半**。

注 7.19 (极限唯一的另一种证法)**.** 反证：设 $\{a_n\}$ 同时趋于 A 与 B，且 $A>B$。把两个极限都看成 $\{a_n\}$ 的极限，由保序性第 (2) 条（注 7.18）得 n 足够大时 $a_n>a_n$，矛盾。

思路：同一列数既是「左边那个」又是「右边那个」，保序性就把它自己逼成了矛盾——比重新写一串 ϵ 估计省事得多。凡是要证「两个极限相等」，先试反证 + 保序性。

注 7.20 (收敛必有界的完整证明，以及它的逆否命题)**.** 设 $\lim a_n=L$。由 $L<L+1$ 及保序性，存在 N 使 $n\geq N$ 时 $a_n<L+1$；于是

$$a_n\leq \max\{a_1,\dots,a_{N-1},\,L+1\},\qquad \forall n,$$

前 $N-1$ 项只有有限个、取最大即可，故有上界；同法得下界。它的逆否命题同样有用：$\{a_n\}$ **无界** $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ **发散**（逻辑上即「若 P 则 Q」与「若非 Q 则非 P」等价）。

思路：这是判断发散的第一招——数列一旦无界，连收敛的可能都没有，不必再去找极限。例题 5.4 的 $\alpha>0$ 情形正是这么用的。

命题 7.4 (单调递增且收敛，则每一项都严格小于极限)**.** 设 $\{a_n\}$ 单调递增且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$，则 $a_n<L$（$\forall n$）。

证明. 固定 n。对任何 $m>n$ 有 $a_n\leq a_m$。把两边看成关于 m 的数列、令 $m\to\infty$ 取极限，由极限不等式（推论 5.4）得 $a_n\leq\lim\limits_{m\to\infty}a_m=L$。再由单调递增 $a_n<a_{n+1}\leq L$，即得 $a_n<L$。 □

思路：两步的顺序不能倒——先由「项的不等」过渡到「极限的 $\leq$」（推论 5.4），再用单调性把 $\leq$ 加严成 $<$。直接取极限只能得到 $\leq$，这正是严格不等号会退化的那个坑。

例题 7.4 (q^n 的两段证明)**.** 例题 5.3 只列了结论，课堂上把 $|q|<1$ 与 $|q|>1$ 都证了：

(1) $|q|<1$：写 $\frac{1}{|q|}=1+a$（$a>0$），则 $|q^n|=\frac{1}{(1+a)^n}\leq\frac{1}{na}$，只要 $n>\frac{1}{a\epsilon}$ 就有 $|q^n|<\epsilon$。

(2) $|q|>1$：记 $|q|=1+c$（$c>0$），则 $|q^n|=(1+c)^n\geq nc$，对任何 M 只要 n 足够大就有 $|q^n|>M$，故无界，因而发散。

思路：两边用的是同一条 Bernoulli 不等式 $(1+x)^n\geq 1+nx$：一边把 $(1+a)^n$ 放大成 na 去顶住 ϵ，一边把它放大成 nc 去超过任意的 M。同一个不等式，一个用来证收敛、一个用来证发散。

命题 7.5 (算术平均的极限（Cesàro 平均）)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$。

证明. 给定 $\epsilon>0$，取 $\epsilon'=\frac{\epsilon}{2}$。由 $\lim a_n=a$，存在 N 使 $n\geq N$ 时 $|a_n-a|<\epsilon'$。于是当

$$n>\max\left\{N,\ \frac{2\sum_{i=1}^{N}|a_i-a|}{\epsilon}\right\}$$

时，用三角不等式 $\left|\sum_{i=1}^{n}x_i\right|\leq\sum_{i=1}^{n}|x_i|$ 得

$$\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}-a\right|=\frac{1}{n}\left|\sum_{i=1}^{n}(a_i-a)\right|\leq\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}|a_i-a|+\frac{n-N}{n}\,\epsilon'<\frac{\epsilon}{2}+\epsilon'=\epsilon.$$ □

思路：这是「用定义验证」的范本，动作只有两个：把和拆成前 N 项与后面一段——前一段是固定的常数，只要 n 够大就能被 $\frac{\epsilon}{2}$ 吸收；后一段每项都小于 ϵ'。取 $\epsilon'=\frac{\epsilon}{2}$ 是让两段各占一半。整个估计唯一用到的不等式就是三角不等式，所以「$\left|\sum x_i\right|\le\sum|x_i|$」要当成随身工具。

例题 7.5 (根号之差：$\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C}\to 0$)**.** 设 $A>0, B,C\in\mathbb{R}, B>C$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C}\right)=0$。

证明. 分子有理化：

$$0<\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C}=\frac{B-C}{\sqrt{An+B}+\sqrt{An+C}}.$$

当 n 足够大时 $\sqrt{An+B}\ge\sqrt{\frac{A}{2}n}$、$\sqrt{An+C}\ge\sqrt{\frac{A}{2}n}$（这两个不等式分别等价于 $An\ge -2B$ 与 $An\ge -2C$；由 $A>0$，只要 n 足够大便成立——这正是题面允许 B,C 取负的原因），故

$$0<\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C}\le\frac{B-C}{\sqrt{2A}}\,n^{-1/2}\to 0,$$

由夹逼定理（定理 6.1）得极限为 0。 □

思路：看到 $\sqrt{X}-\sqrt{Y}$ 就分子有理化（工具 $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$，更一般地 $x^k-y^k=(x-y)(x^{k-1}+x^{k-2}y+\cdots+y^{k-1})$），把「两个大体相当的量相减」变成「常数除以一个越变越大的量」。分母要放缩时，用「n 足够大时 $An+B\ge\frac{A}{2}n$」把常数项吃掉。

注 7.21 (夹逼的直觉：两个警察与一个醉汉)**.** 课堂的比喻：夹在中间的 $\{b_n\}$ 是醉汉，两边各有一个警察 $\{a_n\}$、$\{c_n\}$；两个警察都走向 L，醉汉也只能走到 L。

思路：凡是遇到「式子复杂、但上下界好估」的情形——一堆正数相加、带根号的差、被某个最大值控制住的和——第一反应就是夹逼。

注 7.22 (四则运算的完整证明)**.** 定理 6.2 的三条课堂上都写了完整证明（(3) 与讲义 p. 18 的证法同路，记号略异）。设 $\lim a_n=A$、$\lim b_n=B$。

(1) 给定 $\epsilon>0$，取 $\epsilon_1=\frac{\epsilon}{2}$。存在 N_1,N_2 使 $n\ge N_1$ 时 $|a_n-A|<\epsilon_1$、$n\ge N_2$ 时 $|b_n-B|<\epsilon_1$，于是对 $n\ge\max\{N_1,N_2\}$，

$$|(a_n+b_n)-(A+B)|\le|a_n-A|+|b_n-B|<\epsilon_1+\epsilon_1=\epsilon;$$

把 $+$ 换成 $-$、$A+B$ 换成 $A-B$ 同理。

(2) 先由推论 5.3 取常数 K 使 $|b_n|\le K$（$\forall n$）。核心一步是加一项减一项：

$$a_nb_n-AB=(a_n-A)\,b_n+A\,(b_n-B),$$

于是

$$|a_nb_n-AB|\le|a_n-A|\cdot|b_n|+|A|\cdot|b_n-B|\le K\,|a_n-A|+|A|\cdot|b_n-B|.$$

给定 $\epsilon>0$，取 $\epsilon_1=\dfrac{\epsilon}{2(K+|A|+1)}$，则对 $n\ge\max\{N_1,N_2\}$ 上式 $<K\epsilon_1+|A|\epsilon_1<\epsilon$。

(3) 不妨 $B>0$（$B<0$ 时把 b_n 换成 $-b_n$ 即可）。由 $\lim b_n=B>\frac{B}{2}$ 及命题 5.1，存在 N_0 使 $n\ge N_0$ 时 $b_n>\frac{B}{2}$，从而 $|b_nB|>\frac{B^2}{2}$——分母被顶住了。再拆分子：

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{A}{B}\right|=\frac{|a_nB-b_nA|}{|b_nB|}=\frac{|(a_n-A)B+A(B-b_n)|}{|b_nB|}\le\frac{|a_n-A|\cdot B+|A|\cdot|B-b_n|}{B^2/2}.$$

给定 $\epsilon>0$，取 $\epsilon'=\epsilon\cdot\dfrac{B^2/2}{B+|A|}$，并取 N_1,N_2 使 $|a_n-A|<\epsilon'$、$|b_n-B|<\epsilon'$，则对 $n\ge\max\{N_0,N_1,N_2\}$ 有

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{A}{B}\right|\le\frac{\epsilon'B+|A|\,\epsilon'}{B^2/2}=\epsilon.$$

思路：三条是同一个节奏——把误差拆成「a_n 那一份」与「b_n 那一份」，各用一次定义、各配一个 ϵ_1。(2) 的额外动作是「加一项、减一项」，以及把不是常数的 $|b_n|$ 用「收敛 $\Rightarrow$ 有界」顶成常数 K；(3) 的额外动作是先用保号性把分母顶住（$|b_nB|>\frac{B^2}{2}$），再据此解出该配的 ϵ'。

例题 7.6 (无限和与极限不可交换的反例)**.** 推论 6.3 要求个数固定；无限多个时结论失效。取

$$x_{i,j}=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{j-1}}, & 1\le i\le 2^{j-1},\\[2mm] 0, & i>2^{j-1},\end{cases}$$

则对每个固定的 i 有 $\lim\limits_{j\to\infty}x_{i,j}=0$，而每一列的和恒为 1，于是

$$\lim_{j\to\infty}\Big(\sum_{i=1}^{\infty}x_{i,j}\Big)=1\ \neq\ 0=\sum_{i=1}^{\infty}\lim_{j\to\infty}x_{i,j}.$$

思路：反例的构造方式是「让质量越来越分散」：第 j 列有 2^{j-1} 个 $\frac{1}{2^{j-1}}$，每一项都趋于 0，但每一列的总和始终是 1。凡是要交换两个极限（或极限与求和）时，先问一句：个数固定吗？

例题 7.7 ($\sin n$ 的发散性)**.** $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n$ 不存在。

证明. 反证（课堂给的证法只用四则运算）：设 $\lim\sin n=L$。由和差化积

$$\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\sin\beta$$

取 $\alpha=n$、$\beta=1$，得

$$0=L-L=\lim\big(\sin(n+1)-\sin(n-1)\big)=\lim\,(2\sin 1\cos n),$$

因 $\sin 1\neq 0$，得 $\lim\cos n=0$。同理用 $\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta$ 得 $\lim\sin n=0$。但 $1=\lim(\sin^2 n+\cos^2 n)=0^2+0^2=0$，矛盾。 □

思路：这是「反证 + 拿 L 减自己」的套路：$L-L=0$ 这个恒等式免费提供了一个新极限，再用和差化积把它翻译成 $\cos n$ 的极限。凡是要证某个三角式的极限不存在，先试这一招。（课堂上还提到 Kronecker 定理作为另一条思路的入口：对任何无理数 α、任何目标 $c\in[0,1)$ 与任何 $\varepsilon>0$，都存在 n,m 使 $|n\alpha-m-c|<\varepsilon$——$c$ 就是想逼近的那个余数，整句话说的是 $\{n\alpha\}$ 的小数部分在 $[0,1)$ 中稠密。取 $\alpha=\frac{1}{2\pi}$，则 n 除以 2π 的余数在 $[0,2\pi)$ 中稠密，于是 $\sin n$ 的取值在 $[-1,1]$ 中稠密、不可能收敛。本笔记采用上面的和差化积证法，因为它只用已证的四则运算，不必先证稠密性。）

定理 7.6 (Stolz–Cesàro 定理，$\frac{*}{\infty}$ 型)**.** 设 $\{b_n\}$ 严格单调且 $\lim b_n = +\infty$（即对任何 $K > 0$ 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $b_n > K$）。若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在且为实数，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}.$$

定理 7.7 (Stolz–Cesàro 定理，$\frac{0}{0}$ 型)**.** 设 $\lim a_n = 0 = \lim b_n$，且 $\{b_n\}$ 严格单调。若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在，则同样有 $\lim \dfrac{a_n}{b_n} = \lim \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$。

注 7.23 (Stolz 与洛必达的对应，以及一个易错点)**.** 课堂把两者逐项对照：

离散 (*Stolz*)		连续（洛必达）
$a_n = f(n)$、$b_n = g(n)$	$\leftrightarrow$	$f(x)$、$g(x)$
$a_{n+1} - a_n$（步长 $h = 1$ 的差分）	$\leftrightarrow$	$f'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$
$b_{n+1} - b_n$	$\leftrightarrow$	$g'(x)$
$\lim \dfrac{a_n}{b_n} = \lim \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$	$\leftrightarrow$	$\lim \dfrac{f}{g} = \lim \dfrac{f'}{g'}$

易错点一： $\lim b_n = +\infty$ **仍属发散**，$+\infty$ 只是一个记号，不要以为 $\{b_n\}$ 收敛。

易错点二： 中文教材把第二种写成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型容易误导；正确的记法是 $\frac{*}{\infty}$ 型——**分子任意，只要分母趋于** ∞。

思路： 凡是 $\frac{a_n}{b_n}$ 且 $b_n \to \infty$，先算差商 $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$：它往往比原式好算，这就是离散版的洛必达。

注 7.24 (展望：拓扑里的极限可以不唯一)**.** 课堂顺带提了一句：用拓扑结构可以定义数列的极限，那时一个数列可能有不止一个极限；而用距离定义时极限必唯一——把 $|a_n - L| < \epsilon$ 换成 $\operatorname{dist}(a_n, L) < \epsilon$ 即可。（**极限唯一这件事是「有距离」带来的，不是白来的**。）

8 本讲自测清单

学完第 1 周，应当能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 复述抛物线弓形面积的计算，说明 χ_n 的极限正是第 1 节要解决的问题；
2. 说清牛顿的「反流数法」为什么与求面积互逆，并写出微积分基本定理的两个恒等式 (I)(II)；
3. 写出映射、复合、像集与原像集的定义，并说明 $f^{-1}(V)$ 里的 f^{-1} 为什么不预设 f 可逆；
4. 用 $g \circ f = \mathrm{id}_X$、$f \circ g = \mathrm{id}_Y$ 刻画双射，并说清逆映射的唯一性从哪里来；
5. 把有理数说成「有限或无限循环小数」，并复述 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 的反证；
6. 写出戴德金分割的四条要求，说明第 (4) 条为什么不能删；
7. 证明实数的完备性（确界定理），并指出证明用到了分割的哪一条；
8. 写出 $\sup E$ 的充分必要条件，并用它验证 $\sup[0,1) = 1$；
9. 用 ϵ-N 语言写出 $\lim \frac{1}{n} = 0$ 的完整论证，并指出 N 是在哪一步找到的；
10. 写出数列收敛的否定叙述（注意 ϵ 与 n 的量词顺序），并证明极限唯一、收敛必有界；
11. 复述「在 $\mathbb{R}$ 上再作戴德金分割不产生新的数」的论证，说明它与完备性的关系；

12. 说出「最左边的有理数」为什么不存在，并证明任何开区间里都有无穷多个有理数与无穷多个无理数；
13. 用 ϵ-N 语言验证 $\lim \sqrt[n]{n}=1$，指出二项式估计（或 Bernoulli 不等式）用在哪一步；
14. 认出「两个极限一高一低」的情形该用保序性，并会取 $\epsilon=\frac{A-B}{2}$ 把两条 ϵ-带子错开；
15. 认出「项之间的不等式」只能过渡成极限的 $\le$，能举出 $\frac{1}{n}>\frac{1}{n+1}$ 这个反例，并会用反证把它变成推论 5.4；
16. 认出「数列无界」即可判定发散（收敛必有界的逆否），不必再去找极限；
17. 认出「式子复杂但上下界好估」就该夹逼，并会为 $(a_1^n+\cdots+a_m^n)^{1/n}$ 配出上下界；
18. 认出 $\sqrt{X}-\sqrt{Y}$ 型该分子有理化，并把分母放缩成 $\sqrt{A/2\,n}$；
19. 认出多项式之比该「上下同除最高次幂」，并说清 $k<m$、$k=m$、$k>m$ 三种结果分别怎么得到；
20. 认出 n^k/a^n 型该用二项式展开只留一项，并说清「指数压多项式」时多出来的那一次 $\frac{1}{n}$ 从哪来；
21. 认出算术平均 $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$ 的极限该拆成「固定的前 N 项 + 后段」两段来估；
22. 分清「有限个极限可交换」与「无限个未必可交换」，并能说出例题 7.6 那个反例的构造（第 j 列有 2^{j-1} 个 $\frac{1}{2^{j-1}}$，每列和恒为 1）；
23. 说出 Stolz–Cesàro 的 $\frac{*}{\infty}$ 型条件，说明为什么 $\lim b_n=+\infty$ 仍属发散，以及它与洛必达法则的离散/连续对应。

8.1 练习页码汇总

讲义位置	印刷页	内容
练习 1.2.11	p. 9	函数分解为奇函数与偶函数之和（第一次作业第 3 题）
命题 4.3	p. 13–14	阿基米德性质与有理数的稠密性，应能独立复证
练习 1.4.9	p. 14	正实数的 n 次方根的存在唯一性，用上确界来证
例题 5.1、例题 5.2	p. 15	$\lim\frac{1}{n}=0$、$\lim\sqrt[n]{a}=1$，ϵ-N 的基本训练
命题 5.1、推论 5.2、推论 5.3	p. 16	保序性、极限唯一、收敛必有界
例 2.1.10、推论 5.4	p. 17	$\lim n^\alpha$ 的三分、极限不等式与「严格不等号不保持」
例 2.2.1、定理 6.1、例 2.2.3	p. 17	指数压多项式、夹逼定理、最大项主导
定理 6.2、推论 6.3	p. 18	四则运算与「有限次才可交换」
例题 6.3、例题 6.4	p. 18	多项式首项主导、有理式极限的三分