ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ · ПАМЯТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аллергия на белок коровьего молока

Диагностика, элиминация и ступенчатый возврат продукта

Аллергия на белок коровьего молока (АБКМ) встречается у 2–3 % детей первого года жизни. Ключевой принцип — подтверждённая элиминация, а не «профилактическое» исключение молока у всех подряд.

Клинические фенотипы

- IgE-опосредованный: крапивница, ангиоотёк, бронхоспазм, симптомы в течение минут–часов после кормления.
- Не-IgE-опосредованный: гастроинтестинальные проявления — срыгивания, колики, запор, кровь в стуле, плохая прибавка веса.
- Смешанный — сочетание кожных и гастроинтестинальных симптомов.

Диагностика

- Основной метод — элиминация на 2–4 недели с оценкой динамики и последующей провокацией.
- Специфические IgE и кожные пробы информативны только при IgE-фенотипе; отрицательный результат не исключает диагноз.
- «Анализ на аллергены» без клиники не является основанием для пожизненной диеты.

Элиминационная диета

- Лёгкие и среднетяжёлые проявления — смесь на основе глубокого гидролиза белка.
- Тяжёлые проявления или неэффективность гидролиза — аминокислотная формула.
- При грудном вскармливании — элиминация молочных продуктов из рациона матери, смесь не требуется.
- Соевые смеси — не первый выбор у детей до 6 месяцев из-за перекрёстных реакций.

Ступенчатый возврат (молочная лестница)

- Начинать не ранее чем через 6 месяцев строгой элиминации и при отсутствии симптомов.
- Шаг 1 — хорошо запечённые молочные продукты; шаг 2 — кисломолочные; шаг 3 — небольшое количество цельного молока.
- Каждый шаг — 1–2 недели наблюдения; при реакции вернуться на предыдущую ступень и повторить через 3–6 месяцев.

Контроль

- Рост и масса тела — ежемесячно, гемоглобин — по показаниям.
- Дневник симптомов и питания.
- План возврата продукта обсуждается с семьёй заранее, письменно.

Демонстрационный материал. Текст подлежит утверждению медицинским отделом компании перед публикацией. Не является инструкцией по применению.