ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ · ПАМЯТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Колики и срыгивания у младенцев

Что считать нормой, когда настораживаться и какую смесь предложить

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта — одна из самых частых причин обращения на первом году жизни. В большинстве случаев они не требуют лечения, но требуют внятного объяснения родителям и контроля динамики.

Когда это вариант нормы

- Колики дебютируют в 2–3 недели, достигают пика к 6–8 неделям и обычно угасают к 3–4 месяцам.
- Плач и беспокойство более 3 часов в сутки, не менее 3 дней в неделю, при нормальном самочувствии и прибавке веса.
- Срыгивания небольшим объёмом (до 5–10 мл), 1–2 раза в день, сразу после кормления, без боли и изменения стула.

Красные флаги — обсуждать обследование

- Рвота «фонтаном», примесь желчи или крови в рвотных массах.
- Плоская весовая кривая, отказ от кормления, вялость, апноэ, судороги.
- Дебют или резкое усиление симптомов после 6 месяцев.
- Срыгивания с кровью, мелена, выраженное вздутие живота.

Что действительно помогает

- Вертикальное положение после кормления 15–20 минут; медленное кормление с паузами.
- Не перекармливать: объём и кратность — по возрасту и массе тела.
- Массаж живота по часовой стрелке, «велосипед», выкладывание на живот в бодрствовании.
- Спокойная обстановка, приглушённый свет, контакт «кожа к коже» — доказанная немедикаментозная мера.

Питание: что предложить

При преобладании срыгиваний — антирефлюксная смесь с камедью рожкового дерева; объём кормления не увеличивать, загущённая смесь не требует большего разведения.

При коликах — смесь с частичным гидролизом белка или с пониженным содержанием лактозы; кисломолочная смесь — при склонности к неустойчивому стулу.

Не менять смесь чаще одного раза в 3–5 дней: родителям нужно время оценить эффект.

План наблюдения

- Дневник кормлений, срыгиваний и стула в течение 1–2 недель.
- Контроль массы тела каждые 2 недели.
- Повторный приём через 2–4 недели; при сохранении симптомов — гастроэнтеролог.

Ситуация	Тактика
Срыгивания 1–2 раза в день, вес растёт	Антирефлюксная смесь с камедью, наблюдение 2–4 недели
Колики без других симптомов	Смесь с частичным гидролизом, немедикаментозные меры
Рвота, кровь, потеря веса	Исключить хирургическую и органическую патологию, направить к специалисту

Демонстрационный материал. Текст подлежит утверждению медицинским отделом компании перед публикацией. Не является инструкцией по применению.