ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ · ПАМЯТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Переход с одной смеси на другую

Схема постепенного введения за 5–7 дней

Резкая смена смеси повышает риск функциональных расстройств и затрудняет оценку эффекта. Ниже — рабочая схема перехода, которую можно дать родителям.

Когда действительно нужна замена

- Подтверждённая аллергия или непереносимость компонента.
- Возрастной переход (1 → 2 → 3) при отсутствии жалоб.
- Неэффективность текущей смеси при корректном режиме кормления.
- Решение о смене не должно быть «профилактическим» и частым.

Схема перехода на 5–7 дней

Каждое кормление начинают со старой смеси, новую вводят постепенно, лучше в дневные кормления. Смешивать в одной бутылочке не обязательно — допустимо докармливать новой смесью после старой.

Правила безопасности

- Не менять смесь во время болезни, прорезывания зубов и в первые дни после прививки.
- Не переходить сразу на две новые смеси.
- Готовить каждую смесь по своей инструкции; пропорции не смешивать.

Ошибки, которые чаще всего встречаются

- Резкая замена за один день — риск усиления колик и срыгиваний.
- Частые смены каждые 2–3 дня — невозможно оценить эффект.
- Смена смеси без учёта объёма и режима кормления.

День	Старая смесь	Новая смесь
1–2	3/4 объёма	1/4 объёма
3–4	1/2 объёма	1/2 объёма
5	1/4 объёма	3/4 объёма
6–7	—	Полный объём

При склонности к аллергии и выраженным реакциям шаг перехода удлиняют до 3–5 дней с оценкой состояния после каждого этапа.

Демонстрационный материал. Текст подлежит утверждению медицинским отделом компании перед публикацией. Не является инструкцией по применению.