

MECANICA CUANTICA I

Fidel Schaposnik¹

31 de octubre de 2018

¹ <https://sites.google.com/site/schaposnik/>

Clase 1

Introducción

A principios del siglo XX, la mecánica clásica cuyos cimientos fueron establecidos por Isaac Newton en 1687¹ era utilizada para describir los fenómenos ligados a la materia aun en los caso en que tenían lugar en la escala de los nanometros ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). En cuanto a la radiación, aun en esas escalase era descripta a en base a la teoría electromagnética formulada por James Clerk Maxwell en 1873². Sin embargo, eran pocos los casos en que ambas teorías podían ser utilizadas a la par sin que aparecieran dificultades, problemas como por ejemplo el de cargas eléctricas en movimiento.

En efecto, cuando se pretendía por ejemplo estudiar fenómenos que tenían lugar a escalas muy pequeñas como la de los átomos (cuya existencia había sido aceptada a partir de los trabajos de Einstein sobre el movimiento browniano en el año 1905 y confirmados experimentalmente por Jean Perrin en 1908)³ cuyo tamaño es del orden de 10^{-8} cm), se encontraban contradicciones entre la experiencia y las descripciones

¹I. Newton, (*Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, Principios matemáticos de la filosofía natural*) Copia personal de Newton de la primera edición anotada por él. Cambridge University, Cambridge, UK, (1687).

²J. C. Maxwell, *A treatise on electricity and magnetism (Un tratado sobre electricidad y magnetismo)*, Vols. I,II, Clarendon Press, Oxford, 1873.

³A. Einstein (*Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen, On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid*), *Annalen der Physik (Berlin)* Hoboken, NJ J.Perrin, (*Mouvement brownien et ralit molculaire (Movimiento browniano y realidad molecular)*, *Annales de Chimie et de Physique* 19 (8e srie) (1909) 5-104 .

clásicas dadas por el electromagnetismo y la mecánica clásica.

Ejemplos de estas contradicciones que encontraban los físicos de la época eran los resultados experimentales ligados, entre otros, a la radiación del cuerpo negro⁴, al efecto fotoeléctrico⁵, a las regularidades de los espectros de los átomos compuestos por electrones (objetos puntuales) orbitando alrededor de núcleos (objetos cuyo tamaño es del orden de 10^{-13} cm).

La mecánica cuántica fue justamente concebida y construida como una teoría capaz de describir estos y otros fenómenos microscópicos para los cuales las leyes del mundo macroscópico no eran las adecuadas.

El desarrollo de la mecánica cuántica en las dos primeras décadas del siglo 20 constituye el más grande avance en la Física desde los trabajos de Newton en el siglo 17. No fue fácil ya que las ideas básicas que hubo que introducir se apartan profundamente de la intuición humana. A la par, hubo proponer una manera completamente nueva de describir el estado de un sistema físico, cambiando manera radical las preguntas que podemos hacernos sobre tales estados. Tan profundo es este cambio que los físicos usamos la palabra clásica no para referirnos a la cultura greco-romana o a la música de Mozart, Beethoven, etc., sino para hablar de aquello que es previo a lo “cuántico”.

Todas las sofisticadas construcciones que usamos hoy para describir las fuerzas fundamentales que existen en la Naturaleza -las teorías cuánticas de campos, en particular las llamadas de gauge, las teorías de cuerdas, las de supercuerdas- se formulan en un marco cuántico. Si hay algo en nuestra comprensión de la Naturaleza que sobreviva como ingrediente fundamental en la “teoría final” con la que muchos esperamos que se podrá entender a todos los fenómenos físicos de manera unificada, ese algo será la mecánica cuántica.

Como se enseñaba en los cursos elementales de la llamada “física moderna” de la primera mitad del siglo pasado, las contradicciones en-

⁴La radiación resultante según del cuerpo negro es continua con picos de frecuencias características según la temperatura

⁵Emisión de electrones como resultado de la incidencia de radiación sobre un material solo para ciertas frecuencias características

tre la mecánica clásica y el electromagnetismo clásico llevaron, a principios de ese siglo, a una hipótesis fundamental de Max Planck⁶ sobre el intercambio de energía entre materia y radiación bajo la forma de *cuantos*⁷, cantidades discretas que Niels Bohr ligó con la existencia de niveles de energía en los átomos y las regularidades de los espectros observados⁸. Planck la introdujo como la constante de proporcionalidad entre el mínimo incremento de energía de un oscilador cargado eléctricamente en una cavidad que contiene radiación de cuerpo negro y la frecuencia de la onda electromagnética asociada a esa radiación (en términos de longitud de onda λ e cantidad de movimiento p

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (1.1)$$

Desde entonces a esa constante h se la conoce como constante de Planck y su valor es

$$h = 6.626070040(81)10^{-34} \text{ [joule} \times \text{segundo]} \quad (1.2)$$

(Como veremos más adelante, es importante notar que sus unidades son de energía $\times$ tiempo)

Siguiendo el camino de Planck, Albert Einstein propuso en 1905⁹ una explicación del llamado efecto fotoeléctrico, fenómeno que no podía comprenderse en el marco del electromagnetismo y la mecánica clásica. Para ello, propuso un carácter corpuscular para las ondas luminosas (los *fotones*) asociando a la energía de cada fotón un cuanto, el concepto propuestos por Planck para el espectro del cuerpo negro.

⁶Planck la presentó su propuesta en un encuentro de la Deutsche Physikalische Gesellschaft (Sociedad Alemana de Física) de Berlín el 14 de diciembre de 1900 por lo que ese día es considerado el del nacimiento de la mecánica cuántica [1].

⁷La palabra “quantum”, fue introducida por Helmholtz en relación a fenómenos eléctricos para describir al electrón (quantum de electricidad). Deriva de latín “quantus” que significa “cuánto”. Planck la retomó en 1901 para referirse a una cantidad mínima de materia, electricidad, gas o calor.

⁸N. Bohr . “On the Constitution of Atoms and Molecules, Part I”. Philosophical Magazine. 26 (1913) 1.

⁹A. Einstein, Einstein, Albert “Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt”, Annalen der Physik. 17 (1905) 132. “On a Heuristic Point of View about the Creation and Conversion of Light”.

En relación a los átomos, Louis de Broglie¹⁰ y otros aventuraron (nunca tan adecuada esta palabra) casi 20 años después del trabajo de Einstein el carácter ondulatorio de la materia relacionando el impulso de las partículas con la longitud de ondas con una longitud de onda relacionada con $p = mv$ según la fórmula (1.1)

Así, los aspectos ondulatorio y corpuscular de materia y radiación a nivel microscópico pasaron a entenderse de manera dual uno del otro lo que impone mutuas limitaciones. Nació así la primera de las relaciones, llamadas de dualidad, que fueron marcando la física del siglo 20 y que son hoy un ingrediente fundamental en las construcciones de teorías de cuerdas y teoría **M** que pretenden unificar todas las interacciones conocidas. La dualidad puede entenderse con el ejemplo que da Julian Barnes en su novela “Flaubert’s parrot”, (Ed. Picador, London, 1985), al afirmar que una red de pesca puede pensarse de dos maneras según el punto de vista: como una malla diseñada para atrapar peces o, sin un gran daño a la lógica, como un conjunto de agujeros unidos por una cuerda.

Una consecuencia fundamental de la dualidad onda-partícula es la siguiente. Supongamos que pretendemos describir un electrón libre de toda fuerza externa en movimiento, no como una partícula puntual sino en términos de ondas, ondas planas¹¹. También son solución de las ecuaciones de Einstein para la teoría de la relatividad general de Einstein¹² cuya existencia fue confirmada experimentalmente recién en 2016 en los experimentos interferométricos de la colaboración LIGO-

¹⁰L. de Broglie, “Ondes et quanta”, “Quanta et lumière, diffraction et interférence”, “Les quanta, la théorie cinétique des gaz et le principe de Fermat” Comptes Rendus 177 (1923) 507, 548, 620; Tesis de doctorado, 1924 (Investigaciones sobre la teoría de los cuantos).


¹¹Una onda plana es una onda de frecuencia constante cuyos “frentes de onda” -superficies de amplitud y fase constante- son planos infinitos, paralelos, normales a la dirección de propagación. Son solución de la ecuación de una cuerda vibrante en una dimensión. También aparecen como solución de las ecuaciones de Maxwell en el vacío ¡Aún en ausencia de cargas!

¹²A. Einstein, *Die Feldgleichungen der Gravitation* (las ecuaciones de campo de la gravitación, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1915) 844847; *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie* (*The Foundation of the Generalised Theory of Relativity*), Annalen der Physik, 49 (1916) 769822

Virgo resultado por el que recibieron el premio Nobel 2017 Reyner Weiss, Kip Thorne y Barry Barish¹³.

Por simplicidad consideraremos en lo que sigue una única dimensión espacial y mostraremos un aspecto fundamental ligado al carácter ondulatorio asignado en la mecánica cuántica a las partículas.

Como una onda plana no está localizada en una región finita del espacio, si pretendemos “ubicar” al electrón en una región centrada en un punto x , de extensión Δx , necesitaremos superponer ondas con impulsos diferentes (i.e. con energías y frecuencias diferentes), digamos entre el valor p y el valor $p \pm \Delta p/2$, formando un “paquete” centrado en el punto x y con un ancho Δx . Más adelante veremos que es relativamente sencillo comprobar que esta superposición corresponde a una onda cuya amplitud será no nula en una cierta región localizada del espacio, como mostramos en la figura de la página siguiente.



Resulta ser que cuanto más se pretenda achicar la “indeterminación” (el ancho) Δx de la posición del electrón representado por el paquete de onda, más se deberá agrandar Δp , la indeterminación del impulso del electrón. Según postula el principio de incerteza (también llamado de “incertidumbre” o de “indeterminación”) de Werner Heisenberg¹⁴ que discutiremos en detalle en este curso, el producto de las dos indeterminaciones debe permanecer constante y del orden de 10^{-34} Js:

$$\Delta x \Delta p \sim h = 6.62606957(29) \times 10^{-34} \text{ Js} \quad (1.3)$$

¹³Abbott BP, et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2016). "Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger". Physical Review Letters. 116 (2016) 061102

¹⁴(*Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, El verdadero contenido de la cinemática y mecánica cuántica*), Z. Phys. 43 (1927) 172.

La constante h tiene como veremos un rol central en la construcción de la mecánica cuántica. Forma, junto con otras constantes como la de gravitación y la velocidad de la luz, el conjunto de constantes de la Naturaleza que hoy consideramos fundamentales y cuyo número tiene, por supuesto, un estatus provisorio.

Como ya señalamos, debe remarcarse que las unidades de la constante de Planck h , de *energía* $\times$ *tiempo* o, lo que es lo mismo, de *densidad Lagrangiana* $\times$ *tiempo*, es decir unidades de *acción*¹⁵. Esta relación permitirá, como veremos ya en esta clase al discutir ondas planas y luego la ecuación de Hamilton-Jacobi, comprender heurísticamente el papel de la acción de la mecánica clásica a nivel cuántico.

Escalas

Ya en los cursos elementales se aprende que la constante de Planck h (o la más conveniente $\hbar = h/2\pi = 1.0545919 \times 10^{-27}$ erg seg) resulta ser una de las constantes básicas en la descripción de todos los fenómenos que tienen lugar en la Naturaleza, como lo son la velocidad de la luz, $c = 2.9979250 \times 10^{10}$ cm/seg y la constante de gravitación de Newton, $G = 6.6732 \times 10^{-8}$ dinas cm²/g².

Con estas tres constantes básicas podemos construir una con dimensiones de longitud que puede tomarse, a su turno, como una escala más natural desde el punto de vista de la física que la del metro patrón elegido en la Revolución francesa. Toda otra cantidad con unidades de longitud podrá expresarse como múltiplos adimensionales de esta escala. A esta escala de longitudes se la llama *longitud de Planck* y se la anota l_P :

$$l_P = (Gh/c^3)^{1/2} = 6.62606957(29) \times 10^{-35} \text{m} \quad (1.4)$$

Como era de esperar por entrar en juego h y G en el numerador y c en el denominador, l_P es una escala “microscópica” si las hay. Aparece como escala natural para formular una teoría microscópica capaz

¹⁵En la física clásica el concepto de acción fue introducido a fines del siglo 17 por Gottfried Leibniz, Leonhard Euler, Johann Bernoulli y fundamentalmente Pierre Louis Maupertuis. En la física cuántica fue Paul A. M. Dirac quien describió más claramente su rol, a principios de la década de 1930.

de describir fenmenos en los que por ejemplo intervienen los átomos, cuyo radio es del orden de los 10^{-10} metros¹⁶. Más aun, la longitud de Planck es la escala “natural” en todo intento de formular una teoría cuántica (microscópica) de la gravitación. O sea que una descripción clásica de la gravitación (en la que la geometría del espacio-tiempo se determina a nivel de la dinámica, no como un dato fijado de antemano) dejará de ser válida en tal escala.

La pequeñez de esta escala frente a las escalas atómica o nuclear está relacionada directamente con la debilidad de las fuerzas gravitatorias entre dos partículas frente a las otras fuerzas fundamentales, las electromagnéticas, las débiles y las fuertes. Por ejemplo, el cociente entre la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica entre un protón y un electrón tiene un valor de

$$G \frac{m_p m_e}{e^2} = 4.4 \times 10^{-40} \equiv N_1^{-1} \quad (1.5)$$

Es recién a distancias del orden de l_P cuando los efectos gravitacionales entre las partículas microscópicas son suficientemente importantes como para requerir un tratamiento cuántico. La formulación de una teoría cuántica de la gravitación es un problema que está hoy abierto.

También podemos construir una escala de tiempos fundamental a partir de G , $\hbar$ y c , el tiempo de Planck t_P :

$$t_P = l_P/c = 5.39106(32) \times 10^{-44} \text{seg} \quad (1.6)$$

En los regímenes en que los modelos cosmológicos predicen una curvatura del universo mayor que l_P^{-2} , o, lo que puede verse es equivalente, para tiempos menores que t_P , el desarrollo de una teoría *cuántica* de la gravitación se hace imprescindible.

En cuanto unidades de masa, la masa de Planck toma la forma

$$m_P = l_P c^2 / G = 2.17651(13) \times 10^{-8} \text{kg} \quad (1.7)$$

mientras que la energía de Planck es

$$E_P = m_P c^2 = 1.22 \times 10^{28} \text{eV} \quad (1.8)$$

¹⁶Una de las más antiguas unidades de longitud es el stadion del griego $\sigma\tau\acute{\alpha}\delta\iota\omicron\nu$ en latín *stadium*. De acuerdo a Herodoto, era equivalente a $600 \sim 700$ “pies” ($\pi\omicron\delta\acute{\omicron}\zeta$, pous) griegos, del orden de unos 360 metros.

Tal energía corresponde a valores mucho mayores que las que se ponen en juego en los más grandes aceleradores de partículas que existen hoy (Por ejemplo, en abril de 2015 el acelerador LHC, Large Hadron Collider del CERN, en Ginebra, llegó a acelerar protones hasta que adquirieran una energía del orden de los 6.5 TeV cada uno, de manera que al chocar la energía de colisión es de 13 TeV, i.e. 13×10^{12} eV). Sin embargo, la radiación de Hawking producida por agujeros negros de tamaños comparables a l_P corresponde a energías del orden de E_P por lo que nuevamente tenemos que el desarrollo de una teoría cuántica que incluya la gravitación es necesario si se pretende describir de manera unificada a todos los fenómenos naturales.

Constantes que varían

En agosto de 2002 apareció en la primera plana de muchos diarios la desafortunada pregunta de si la velocidad de la luz había variado en la historia cósmica.

Para entender el porqué de la palabra “desafortunada” en el contexto de la discusión de escalas que acabamos de hacer conviene empezar por distinguir entre constantes sin dimensiones (por ejemplo la llamada constante de estructura fina α que mide las interacciones entre fotones y electrones) y constantes con dimensiones (como la carga e de los electrones o la velocidad de la luz, c). Los valores de estas constantes con dimensiones, en contraste con los de aquellas que no tienen dimensiones, son construcciones humanas en el sentido de que dependen de las unidades elegidas para expresarlas.

A partir de constantes dimensionales se construyen las constantes adimensionales. Por ejemplo, veremos en este curso cómo, de manera natural, se ve la conveniencia de introducir una constante adimensional que resalta ser la de estructura fina α , en términos de constantes dimensionales:

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137} \quad (1.9)$$

Cuando números sin dimensiones como este aparecen, un físico piensa que debe haber una razón para ello. Pero además, es legítimo preguntarse si un objeto adimensional como α puede variar con el tiempo. Tal

pregunta fue planteada por P.A.M. Dirac en 1937, y ocupó (y ocupa) a muchos investigadores.

En contraste, preguntarse si constantes dimensionales con unidades arbitrariamente elegidas pueden variar es tan errado como preguntarse si el número de litros que entran en un galón varía con el tiempo. De hecho, en 1983, la Conférence Générale des Poids et Mesures (que se reunió por primera vez en Paris en 1889 cuando dio una definición definitiva del kilogramo) declaró que, por definición, el metro es la longitud del trayecto que recorre la luz en el vacío en un tiempo de $1 / 299\,792\,458$ segundos o, lo que es equivalente, que el valor c de la velocidad de la luz es de

$$c = 299.792.458 \frac{\text{metros}}{\text{segundos}} \quad (1.10)$$

Queda así claro que tal valor de c no es más que un factor de conversión de unidades arbitrarias de longitud a unidades igualmente arbitrarias de tiempo. No tiene sentido analizar si tal factor de conversión adoptado convencionalmente, cambia con el tiempo.

El planteo de Dirac sobre posibles cambios de constantes con el tiempo se refiere a constantes adimensionales que podían construirse a partir de cantidades básicas, tal como α puede construirse a partir de e y $\hbar$. Estas constantes no dependen de ninguna convención o construcción humana.

Brevemente, lo que planteó Dirac es lo siguiente: existe un número sin dimensiones N_1 (que ya introdujimos), que resulta de comparar las fuerzas gravitatorias y las eléctricas,

$$N_1 \simeq 10^{40} \quad (1.11)$$

Este número muy grande y como no tiene unidades es la naturaleza la que lo dicta. Dirac pensaba que debía buscarse la razón para tal número.

Otro número muy grande puede obtenerse dividiendo una cantidad de naturaleza cosmológica y una de naturaleza atómica. Tiene que ver con el número de átomos de hidrógeno que pueden observarse en el Universo. A partir de datos astronómicos, una estimación grosera de este número es:

$$N_3 \simeq 10^{80} \quad (1.12)$$

Las cantidades N_1 y N_3 comparan de alguna manera, el objeto más grande de la naturaleza, el Universo con porciones muy pequeñas de materia, los átomos.

Según observó Dirac, puede construirse otro número muy grande comparando la edad del Universo con un tiempo característico de los fenómenos atómicos. El tiempo atómico característico que eligió Dirac es el que tarda la luz en atravesar un átomo de hidrógeno. El radio del átomo de hidrógeno (radio de Bohr) es igual a:

$$a_B = 5 \times 10^{-11} \text{m} \quad (1.13)$$

A la velocidad c (cuyo valor dimos) antes, la luz tarda en recorrer a_B un tiempo t_B igual a

$$t_B = 1.7 \times 10^{-19} \text{s} \quad (1.14)$$

La edad del Universo puede estimarse con métodos astronómicos. Expresada en términos de la escala atómica de tiempos T_b corresponde a un número que llamaremos N_2 (la *edad del Universo en unidades de tiempo atómico*) que vale

$$N_2 \simeq 3 \times 10^{40} \quad (1.15)$$

Dirac observó que N_1 y N_2 eran *grandes números* del mismo orden de magnitud. Ahora bien, a medida que el Universo envejece, su edad N_2 aumenta. Que hoy N_2 sea aproximadamente igual a N_1 ¿será apenas una coincidencia? ¿La época en que nos tocó vivir será tan especial que dos números enormes coinciden aproximadamente y no lo harán pasado un tiempo, pues mientras N_2 seguirá aumentando, N_1 se mantendrá en su valor actual? ¿O la coincidencia esconde una ley de la naturaleza y también N_1 crecerá al pasar el tiempo y la similitud entre N_1 y N_2 se mantendrá todo el tiempo? Dirac eligió esta segunda posibilidad y propuso como ley de la naturaleza una “*Ley de los grandes número*”. Para comprenderla, observando las ecuaciones anteriores podemos escribir

$$N_1 \sim N_2 \quad (1.16)$$

$$N_3 \sim N_2^2 \quad (1.17)$$

Estas relaciones nos dicen que el número grande N_1 crece como la edad del Universo y que N_3 crece como el cuadrado de la edad del Universo, es decir, mucho más rápidamente.

En base a estas sencillas ideas Dirac enunció su *Ley de los grandes números*:

Los Grandes Números (formados como cociente de una cantidad cosmológica y otra cantidad atómica) son funciones simples de la edad del Universo.

Los postulados de la Mecánica Ondulatoria

Si bien más adelante dedicaremos varias clases a una formulación cuidadosa de los postulados básicos de la mecánica cuántica, -presentaremos a continuación una versión simplificada de los mismos de manera de poder comenzar a calcular, actividad que distingue a los físicos de quienes se ocupan de problemas metafísicos y filosóficos ligados a la mecánica cuántica.

Presentaremos entonces solo 3 postulados fundamentales (a comparar con los 9 que discutiremos en las clases 6 a 12) y consideraremos un sistema que consiste en una sola partícula de masa m :

1. En cada instante t el estado cuántico de una partícula de masa m está caracterizado por una función compleja $\psi(\vec{x}, t)$, llamada función de onda, que depende también de las coordenadas que anotaremos como $\vec{x}$ (en este $\vec{x}$ determina un punto en un espacio de 3 dimensiones).
2. La probabilidad dP de que en el instante t la partícula con función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ se encuentre localizada en un elemento de volumen d^3x centrado en el punto $\vec{x}$ es

$$dP = |\psi(\vec{x}, t)|^2 d^3x = \psi(\vec{x}, t)^* \psi(\vec{x}, t) d^3x \quad (1.18)$$

3. La evolución temporal de una partícula de masa m está regida por una ecuación diferencial para $\psi(\vec{x}, t)$, llamada la ecuación de Schrödinger.

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right) \psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (1.19)$$

Aquí $\hbar \equiv h/(2\pi)$, $V(\vec{x})$ corresponde a la energía potencial de la partícula (una función que por ahora supondremos sólo depende de $\vec{x}$, ver nota 4) y ∇^2 es el “operador diferencial” laplaciano, que en coordenadas cartesianas toma la forma

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.20)$$

De manera compacta escribiremos a la ecuación (1.19) en la forma

$$\hat{H}\psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \quad (1.21)$$

donde

$$\hat{H} \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \quad (1.22)$$

es un operador diferencial que será identificado como una versión cuántica del hamiltoniano que fue introducido por William Rowan Hamilton en 1834 en el marco de la mecánica clásica¹⁷.

Nota 1: $\psi(\vec{x}, t)$ encierra *toda* la información accesible del sistema físico, es decir, que permite calcular cantidades medibles, pero no es en sí misma medible. Sustituye a la noción clásica de trayectoria pero no es una trayectoria.

Nota 2: $\psi(\vec{x}, t)$ se suele designar como *amplitud de probabilidad*. Se pretende recalcar con ello que para calcular a partir de ella una probabilidad finita de encontrar a la partícula en una cierta región, debe integrarse su módulo cuadrado sobre el volumen de esa región. Así, si queremos hallar la probabilidad $P[\mathcal{V}]$ de encontrar a la partícula descrita por la función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ en un volumen finito $\mathcal{V}$ debemos calcular

$$P[\mathcal{V}] = \int_{\mathcal{V}} d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 \quad (1.23)$$

Si $\mathcal{V}$ corresponde a todo el espacio, es decir $\mathcal{V} = R^3$, es evidente que debe cumplirse que $P[R^3] = 1$ por lo que el postulado 2 implica que la función de onda debe ser *de cuadrado integrable*¹⁸:

$$\int_{R^3} d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1 \quad (1.24)$$

¹⁷W. R. Hamilton, *Second Essay n a General Method in Dynamics*, (*Segundo ensayo sobre un método general en la dinámica*) Phil. Trans. R. Soc. Lond. 125 (1835) 95-144.

¹⁸La mecánica cuántica que estudiaremos en este curso supone que las partículas no pueden aniquilarse ni crearse, fenómenos que son estudiados por la Teoría cuántica de campos basada en la llamada “segunda cuantificación”.

Nota 3: La función de onda fue introducida por Erwin Schrödinger en 1926¹⁹. En su publicación propuso la ecuación de ondas que hoy lleva su nombre²⁰. Se trata de una ecuación lineal de segundo orden en lo que respecta a las coordenadas espaciales y de primer orden en el tiempo. Veremos más adelante, en el marco de la mecánica cuántica de Heisenberg²¹ su relación con la invarianza de la teoría cuántica frente a traslaciones temporales $t \rightarrow t + T$ ²².

Dos características esenciales de la ecuación de Schrödinger son:

- Por tratarse de una ecuación lineal, vale para las soluciones de la ecuación de Schrödinger el principio de superposición.
- Por tratarse de una ecuación de primer orden en el tiempo, basta conocer $\psi(\vec{x}, t_0)$ en un instante inicial dado t_0 para determinar $\psi(\vec{x}, t)$ para todo t .

Finalmente notemos que la ecuación de Schrödinger tiene la forma de una ecuación de difusión (por ejemplo de átomos o moléculas que se mueven de una región de mayor a otra de menor concentración, en el caso de fluidos compresible, etc.) pero con una constante de difusión imaginaria. También en el caso del flujo de calor, bastaría escribir $\psi = cT$, con c la capacidad calorífica del material por unidad de volumen y T la temperatura para identificar la ecuación de Schrödinger con la que rige el flujo de calor. En este caso, es la conductividad calorífica del material la que resultaría imaginaria.

¹⁹E. Schrödinger, “Quantisierung als Eigenwertproblem”. *Annalen der Physik* 79 (1926) 273; *ibid* 79 (1926) 409. (*Cuantización como un problema de autovalores, partes I y II.*)

²⁰Schrödinger concibió su idea durante una (hoy famosa) “escapada” con una ex-novia a una estación de esquí suiza en la Navidad de 1925.

²¹W. Heisenberg, “Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen”, *Zeitschrift für Physik*, 33 (1925) 879. (Título en castellano: *Reinterpretación teórico-cuántica de relaciones cinemáticas y mecánicas.*)

²²La formulación cuántica de Werner Heisenberg también fue concebida durante un viaje a Helgoland, una isla del Mar del Norte también durante una “escapada” que permitió poner distancia de su director Niels Bohr quien ponía objeciones que retrasaban los avances de Heisenberg.

Nota 5: En un principio, Schrödinger y otros pensaron que las funciones de onda representaban partículas que se esparcían en analogía con las perturbaciones que se producen por la presión en un fluido. Fue Max Born quien, estudiando en el marco de la ecuación de Schrödinger la dispersión de partículas en términos de paquetes de onda y usando la ecuación de Schrödinger, notó que cuando una partícula chocaba un blanco pequeño como un átomo o un núcleo la función de onda asociada a la partícula irradiaba en todas direcciones con una flujo que disminuía como $1/r$ (con r la distancia medida desde el blanco), lo que contradecía la experiencia clásica en la que la partícula, si no se rompe, podía dispersarse en cualquier dirección pero no en todas a la vez.

Por lo anterior, Born propuso en 1926²³ una interpretación probabilística de la función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ que no mide, a partir de su módulo cuadrado, cuánta parte de la partícula está en el entorno del punto $\vec{x}$ en el instante t sino la probabilidad de encontrar a la partícula en el entorno del punto $\vec{x}$ en el instante t . Fue Born entonces quien propuso la fórmula (1.18) para la densidad de probabilidad en un sistema que consiste en una sola partícula.

Nota 6: Debe remarcarse que la energía potencial (habitualmente denominada en el marco de la física cuántica “el potencial”) aparece en la ecuación de Schrödinger como una función $V(\vec{x})$ que no depende del tiempo. Esto implica, como en el caso clásico, aceptar que el sistema físico descrito por la ecuación de Schrödinger es conservativo (i.e., existe una constante de movimiento, la energía, asociada a la invarianza del sistema frente a traslaciones temporales). Sin embargo, no hay razón para excluir casos en que $V = V(\vec{x}, t)$ y de hecho el estudio de sistemas cuánticos que son perturbados de manera dependiente del tiempo (por ejemplo sometiendo a un átomo a la acción de un campo eléctrico dependiente del tiempo) es un asunto importante que se discute en detalle en un segundo curso de mecánica cuántica. En esta primera etapa, sin embargo, nos restringiremos a potenciales independientes del tiempo.

²³M. Born, “Zur Quantenmechanik der Stovorgnge”. Zeitschrift fr Physik. 37 (1926) 863 (*Quantum Mechanics of Collision*).

Reglas de cuantificación canónica

Presentaremos en lo que sigue las reglas que permiten asociar las cantidades físicas de la mecánica clásica con los correspondientes objetos de la mecánica cuántica²⁴

Mecánica clásica $\longrightarrow$ Mecánica cuántica

$$\begin{aligned} \text{impulso } \vec{p} = m\vec{v} &\longrightarrow \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \equiv \hat{\vec{p}} \\ \text{posición } \vec{x} &\longrightarrow \vec{x} = \hat{x} \\ \text{potencial } V(\vec{x}) &\longrightarrow V(\vec{x}) \\ \text{energía } E &\longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \end{aligned}$$

Debe señalarse que la última de estas correspondencias no tiene el mismo carácter que el de las anteriores sino que sirve para tener una idea preliminar de la conexión cuántica entre evolución temporal y la energía (volveremos con más precisión al asunto en la clase 9).

A partir de estas reglas podemos ligar el hamiltoniano de la mecánica clásica con el operador diferencial hamiltoniano que aparece en la ecuación de Schrödinger:

$$\begin{aligned} H(\vec{p}, \vec{x}) = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{x}) &\longrightarrow \hat{H}(\hat{\vec{p}}, \hat{\vec{x}}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \\ H = E &\longrightarrow \hat{H}\psi = \hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t} \end{aligned}$$

En la ec.(1.3) presentamos el principio de incerteza (o incertidumbre o indeterminación). Esta ecuación está en el origen de la no existencia del concepto de trayectoria en la mecánica cuántica y tiene, en

²⁴Se las denomina “canónicas” en relación a la formulación hamiltoniana de la mecánica clásica, establecida en el espacio de fases de las coordenadas canónicas p_i, q_j que satisfacen los corchetes de Poisson. Fue Paul Dirac quien en su tesis doctoral presentada en 1926 relacionó la formulación de Heisenberg con un “método de analogía clásica” para describir fenómenos cuánticos [P. A. M. Dirac, “The Fundamental Equations of Quantum Mechanics”. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 109 (1925) 642].

cierto sentido, un contenido negativo desde el punto de la física clásica. En contraste, son las reglas de la cuantificación canónica -a las que volveremos de manera detallada más adelante- las que constituyen las proposiciones afirmativas que están en la base de la teoría cuántica.

El que no se pueda precisar a nivel cuántico la trayectorias de por ejemplo un electrón, priva a su movimiento de cualquier otra característica dinámica que pueda describirse de manera precisa (i.e., que sirva para describir su movimiento). Por ello, con solamente objetos cuánticos no se puede construir una mecánica lógicamente cerrada. Es necesario aceptar además objetos físicos que, con precisión suficiente, obedezcan las leyes de la mecánica clásica y sirvan como aparatos de medida. Pero cuando el electrón entra en interacción con tales “objetos clásicos” su estado cambia. El carácter y la magnitud de este cambio sirve entonces para caracterizarlo cuantitativamente. Esta es una particularidad de la física cuántica que no encontramos en otras teorías: a pesar de que como veremos la física clásica puede entenderse como un caso particular (que corresponde al límite de $\hbar \rightarrow 0$) la teoría más general (la cuántica) requiere de la particular (a través de los aparatos de medida) para poder comprobar sus predicciones.

A los objetos clásicos que utilizamos para medir se los llama aparatos. Y al proceso de interacción entre electrón y aparato se lo llama “medida”. La medición en el marco de la mecánica cuántica plantea muchas preguntas. Una de importancia es:

¿Cuándo un objeto físico obedece con precisión suficiente a la mecánica clásica? Cuando, por ejemplo su masa, es suficientemente grande respecto de la del electrón, si de fenómenos donde intervienen electrones se trata. Es el caso de las gotas de líquido que se forman por condensación en la cámara de niebla de Wilson, que marcan la traza del paso del electrón. La dimensión de las gotas es grande comparada con las del electrón. Si nos conformamos con este grado de precisión, podemos describir el movimiento del electrón de una manera totalmente clásica y referirnos a su trayectoria.

Este asunto pone de manifiesto el carácter peculiar de la relación entre la mecánica cuántica y la clásica. Habitualmente la teoría más general puede formularse de manera lógicamente cerrada y de manera

independiente de la teoría menos general que constituye un caso particular o límite de la primera. Por ejemplo, la mecánica relativista puede construirse a partir de principios fundamentales que no hacen referencia alguna a la mecánica newtoniana. Una vez formulada, existe un *límite no relativista* ($c \rightarrow \infty$) en el que la mecánica newtoniana es recuperada.

En resumen, la mecánica cuántica tiene, en contraste, un carácter muy particular dentro de las teorías físicas: contiene a la mecánica clásica pero a la par necesita de ella para su propia formulación.

De la ecuación de Schrödinger a la de Hamilton-Jacobi

El análisis más preciso y elegante de los sistemas mecánicos clásicos se basa en las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana en las cuales la acción del sistema juega un rol central. En este contexto, una ecuación fundamental de la mecánica clásica es la de Hamilton-Jacobi para un sistema con hamiltoniano H_{clas} y acción S :

$$H_{clas}\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}\right) = -\frac{\partial S}{\partial t} \quad (1.25)$$

A partir de esta ecuación se establece una formulación alternativa a las lagrangiana y hamiltoniana que es muy útil cuando se conocen integrales de movimiento. Fue Dirac quien en 1930 estableció la conexión entre la función de onda cuántica y la acción clásica apoyándose justamente en la ecuación de Hamilton-Jacobi²⁵. Y a partir de esto hizo una propuesta²⁶ para estudiar fenómenos cuánticos superponiendo trayectorias clásicas. Esta propuesta de Dirac fue retomada en los años 40 por Feynman²⁷ y así surgió el método de cuantificación más eficaz con el que hoy contamos, llamado de la *Integral funcional*.

Siguiendo los pasos del maestro Dirac veremos que escribiendo a la

²⁵P. A. M. Dirac, *The principles of Quantum Mechanics*, Oxford, 1930.

²⁶P. A. M. Dirac, *The Lagrangian in Quantum Mechanics*, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion*, **3** (1933) 64.

²⁷R. P. Feynman, *Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics*, *Review of Modern Physics* **20** (1948) 367.

función de onda en términos de una amplitud A y una fase Φ ,

$$\psi = A \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \quad (1.26)$$

e insertándola en la ecuación de Schrödinger se obtiene para Φ una ecuación que corresponde a la de Hamilton-Jacobi para la física clásica siempre que se identifique a Φ con la acción clásica.

Consideraremos por simplicidad notacional el caso de una única dimensión espacial (pero el resultado vale para un número de dimensiones espaciales arbitrario). Tenemos

$$\psi(x, t) = A(x, t) \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi(x, t)\right) \quad (1.27)$$

donde la amplitud A y la fase Φ son funciones reales que varían lentamente con x y t (condición necesaria para poder llevar a cabo el análisis de Dirac).

Ya que ψ obedece la ecuación de Schrödinger (1.21),

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(x, t) \quad (1.28)$$

se tiene

$$i\hbar \frac{\partial A(x, t)}{\partial t} - A(x, t) \frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial t} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{H} A \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \quad (1.29)$$

Ahora bien, $\hat{H} = \hat{H}(\hat{p}, \hat{x})$ y

$$\begin{aligned} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{x} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) &= \hat{x} \\ \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{p} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) &= \hat{p} + \frac{\partial \Phi}{\partial x} \end{aligned} \quad (1.30)$$

de manera que

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{H}(\hat{p}, \hat{x}) \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) = H\left(\hat{p} + \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \hat{x}\right) \quad (1.31)$$

o

$$i\hbar \frac{\partial A(x, t)}{\partial t} - A(x, t) \frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial t} = H\left(\hat{p} + \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \hat{x}\right) A \quad (1.32)$$

Como dijimos, el límite clásico corresponde a $\hbar \rightarrow 0$. Esto puede verse recordando la relación de de Broglie $\lambda = h/p$ donde λ es la longitud de onda asociada a la partícula de impulso p . Cuando la longitud de onda es despreciable (y esto sucede en el límite de $\hbar \rightarrow 0$) podemos asimilar la onda a un punto y entrar en el dominio de la mecánica clásica.

De lo anterior, como $\hat{p} = (\hbar/i)\partial/\partial x$, en el límite clásico la ecuación (1.32) se reduce a

$$-A(x, t) \frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial t} = H\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}, x\right) A \quad (1.33)$$

Nótese que H en el lado derecho de esta ecuación no es más que una función de sus argumentos, no ya un operador. Podemos entonces cancelar el factor A que aparece en ambos lados obteniendo

$$-\frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial t} = H\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}, x\right) \quad (1.34)$$

que no es otra cosa que la ecuación de Hamilton-Jacobi siempre que se identifique a la fase Φ con la acción clásica S , como función de las coordenadas (una vez que se reemplazó el momento por $\partial S/\partial x$). Es decir, se puede escribir (1.27) en la forma

$$\psi(x, t) = A \exp\left(\frac{i}{\hbar} S\right) \quad (1.35)$$

con S obedeciendo

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = H\left(\frac{\partial S}{\partial x}, x\right) \quad (1.36)$$

Que las unidades de $\hbar$ (energía $\times$ tiempo) sean las de acción dan otra pista para la conexión (1.35) que, según la propuesta de Dirac-Feynman, lleva a una formulación cuántica a través de la llamada integral funcional.

Para dar un ejemplo de la conexión (1.35)-(1.36) consideremos el caso de una partícula libre, un electrón, por caso. Dada la dualidad partícula onda implica que un electrón libre moviéndose en el espacio con energía E e impulso $\vec{p}$ puede ser descrito por una función del

tipo *onda plana* que por ejemplo describe el movimiento de las ondas electromagnéticas en el vacío

$$\Psi(\vec{x}, t) = A \exp\left(\frac{2\pi i}{h}(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)\right) \quad (1.37)$$

Si reemplazamos esta forma funcional en la ecuación de Schrödinger para el caso en que no hay potencial (¡partícula libre!) resulta

$$\frac{|\vec{p}|^2}{2m} = E \quad (1.38)$$

Vemos que obtenemos una relación natural entre la constante E y el módulo de $\vec{p}$ que reproduce justamente la relación entre impulso y energía (cinética por tratarse de una partícula libre) clásica.

Es fácil entonces encontrar las relaciones entre la longitud de onda λ y el impulso $|\vec{p}|$, la energía E y la frecuencia ν comparando la forma exponencial (1.37) con la exponencial que describe una onda de longitud de onda λ y frecuencia ν :

$$|\vec{p}| = \frac{h}{\lambda}, \quad E = h\nu \quad (1.39)$$

Notemos que escribiendo $E = H$ donde H es el hamiltoniano clásico que describe al electrón, se tiene, en lugar de (1.37),

$$\Psi(\vec{x}, t) = A \exp\left(\frac{2\pi i}{h} \int^t (\vec{p} \cdot \dot{\vec{x}} - H) dt'\right) = A \exp\left(\frac{2\pi i}{h} \int^t L dt'\right) \quad (1.40)$$

o

$$\Psi(\vec{x}, t) = A \exp\left(\frac{2\pi i}{h} S\right) \quad (1.41)$$

donde S , la integral temporal del Lagrangiano no es otra cosa que la acción clásica que describe al electrón. Llegamos entonces a la fórmula que da la conexión entre la acción clásica de una partícula libre y su función de onda cuántica en el límite de $\hbar \rightarrow 0$, según lo planteado por Dirac para el caso general.

Evidentemente el carácter ondulatorio que se le asigna a las partículas en el marco de la mecánica cuántica hace perder la noción de trayectoria e introduce en su reemplazo un carácter probabilístico caracterizado por el principio de incerteza.

Clase 2

Estados estacionarios

Cuando en mecánica clásica se considera un hamiltoniano que no depende del tiempo, puede verse que existe una constante de movimiento que llamamos energía. Hay distintas maneras de probar este resultado, la más elegante a partir del teorema de Noether²⁸ que asocia a cada invarianza que tiene un sistema físico frente a una transformación (continua) dada, una cantidad conservada. En el caso de la energía, se trata de la invarianza frente a traslaciones en el tiempo.

El teorema de Noether tiene en general validez a nivel cuántico²⁹ y puede verse que en la mecánica cuántica ello implica para el caso de la energía poder hallar fácilmente la dependencia temporal de la función de onda.

Notemos que en el caso sistemas clásicos conservativos el potencial $V(\vec{x})$ es independiente del tiempo, propiedad que se mantiene una vez aplicadas las reglas de cuantificación canónica al hamiltoniano de tal sistema.

En el caso cuántico, cuando uno analiza la ecuación de Schrödinger con un potencial independiente del tiempo, las variables (las coordenadas espaciales $\vec{x}$) pueden separarse de la del tiempo t trivialmente. En efecto, si escribimos $\psi(\vec{x}, t) = \psi(\vec{x})T(t)$ es fácil ver que la parte

²⁸E. Noether, *Invariante Variationsprobleme*. Nachr. D. Knig. Gesellsch. D. Wiss. Zu Göttingen, Math-phys. Klasse **3** (1918) 235.

²⁹Hay sin embargo casos en que la cuantificación consistente del sistema clásico “rompe la simetría” e implica que la cantidad conservada a nivel clásico deja de serlo cuánticamente. Se habla entonces de la existencia de una “anomalía” causada por el pasaje de la teoría clásica a la cuántica.

temporal $T(t)$ resulta ser (a menos de una constante multiplicativa A)

$$T(t) = A \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \quad (2.1)$$

y entonces $\psi_E(\vec{x}, t)$ toma la forma

$$\psi_E(\vec{x}, t) = \psi_E(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \quad (2.2)$$

Aquí E es la constante introducida al separar variables que, en principio, es arbitraria. En cuanto a $\psi(\vec{x})$, es la función a determinar a partir de la ecuación resultante para la dependencia espacial de la función de onda adecuadamente normalizada.

Vale la pena señalar que una dependencia oscilatoria respecto del tiempo de la forma de la de la ec.(2.2) coincide en particular con la de la onda plana con que representamos la función de onda de un electrón libre.

Dada la ecuación (2.2), queda por resolver la ecuación que determina la dependencia espacial de la función de onda:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x})\right) \psi_E(\vec{x}) = E \psi_E(\vec{x}) \quad (2.3)$$

o, escribiendo el operador diferencial del lado izquierdo de manera compacta como $\hat{H}$ (el operador hamiltoniano, según vimos al enunciar las reglas de cuantificación canónica),

$$\hat{H}\psi_E(\vec{x}) = E \psi_E(\vec{x}) \quad (2.4)$$

Escrita en esta forma, vemos que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es una típica ecuación de autovalores y autofunciones (E y ψ_E respectivamente) en la que el operador diferencial es el operador hamiltoniano. Es por esta razón que hemos incluido el subíndice E en la función de onda espacial.

Sugestivamente hemos llamado E a la constante introducida al separar la variable temporal de las espaciales. Esa letra es la que habitualmente se utiliza en mecánica clásica para representar el valor de la energía del sistema físico en estudio. Cuando veamos la formulación

de Heisenberg de la mecánica cuante, veremos que la constante E de separación de variables en la ecuación de Schrödinger es justamente la energía del sistema cuántico descrito por la función de onda ψ_E (como es el caso para la partícula libre).

En mecánica cuántica, entonces, los valores posibles de la energía corresponden a los autovalores de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo.

Como en todo problema de autovalores, estos pueden ser discretos o continuos. En el primer caso corresponden a los “cuantos” de energía de los que hablamos en la primera clase.

Debemos aceptar por un momento que E toma solo valores reales (hecho que será probado más adelante). En tal caso, vemos que la densidad de probabilidad correspondiente a la solución (2.2) es independiente del tiempo

$$|\psi(\vec{x}, t)|^2 = |\psi_E(\vec{x})|^2 \quad (2.5)$$

Más precisamente lo anterior significa que la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en una volumen d^3x centrado en el punto $\vec{x}$ es independiente del tiempo y por ello se dice que

$\psi_E(\vec{x}, t)$ describe en tal caso una partícula en un estado estacionario.

La ecuación de continuidad

Dada la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo (1.19), podemos obtener una ecuación de continuidad para la densidad de probabilidad que definimos como $|\psi(\vec{x}, t)|^2$ siguiendo por ejemplo un camino análogo al del llamado método de Green. Para ello comenzamos por conjugar la ecuación (1.19) aceptando que el potencial $V(\vec{x})$ es real, como resulta de las reglas de cuantificación canónica de uno clásico,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right) \psi^*(\vec{x}, t) = -\hbar i \frac{\partial \psi^*(\vec{x}, t)}{\partial t} \quad (2.6)$$

O, de manera contacta,

$$\hat{H}\psi^*(\vec{x}, t) = -\hbar i \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \quad (2.7)$$

Nótese que el operador $\hat{H}$ no se ve afectado por la conjugación.
Ahora analizaremos la cantidad

$$\psi^*(\vec{x}, t)\hat{H}\psi(\vec{x}, t) - \psi(\vec{x}, t)\hat{H}\psi^*(\vec{x}, t) \quad (2.8)$$

de la que obtenemos, usando las ecs.(2.6) y (2.7),

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(\psi(\vec{x}, t)\nabla^2\psi^*(\vec{x}, t) - \psi^*(\vec{x}, t)\nabla^2\psi(\vec{x}, t) \right) = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} (\psi^*(\vec{x}, t)\psi(\vec{x}, t)) \quad (2.9)$$

que se epuede escribir como

$$\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \left(\psi(\vec{x}, t)\vec{\nabla}\psi^*(\vec{x}, t) - \psi^*(\vec{x}, t)\vec{\nabla}\psi(\vec{x}, t) \right) = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} (\psi^*(\vec{x}, t)\psi(\vec{x}, t)) \quad (2.10)$$

Si llamamos

$$\vec{J}(\vec{x}, t) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^*(\vec{x}, t)\vec{\nabla}\psi(\vec{x}, t) - \psi(\vec{x}, t)\vec{\nabla}\psi^*(\vec{x}, t) \right) \quad (2.11)$$

podemos escribir (2.10) en la forma

$$\nabla \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (2.12)$$

donde $\rho(\vec{x}, t)d^3x$ es la densidad de probabilidad dP introducida más arriba,

$$\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)^*\psi(\vec{x}, t)| \quad (2.13)$$


Nótese que tanto ρ como $\vec{J}$ son reales.

La ecuación (2.12) tiene la forma de una ecuación de continuidad, formalmente idéntica a la que en el electromagnetismo relaciona a la densidad de carga eléctrica con la corriente salvo que, en este caso, no hemos especificado a qué tipo de energía potencial corresponde $V(x)$, que no tiene por que corresponder a un potencial electromagnético. ρ es simplemente una densidad de probabilidad de encontrar una partícula por lo que $\vec{J}$ será interpretada como una *corriente de probabilidad*.

Si integramos la ecuación (2.12) sobre un volumen $\mathcal{V}$ tendremos

$$\frac{d}{dt}P[\mathcal{V}] = \int_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3x = - \int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot \vec{J} d^3x = - \int_{\partial \mathcal{V}} \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (2.14)$$

donde $\partial \mathcal{V}$ es el borde de $\mathcal{V}$. Vemos que tiene sentido haber llamado a $\vec{J}$ corriente de probabilidad pues de la ecuación anterior resulta que la disminución o aumento de probabilidad de encontrar a la partícula en $\mathcal{V}$ se asocia con un flujo de $\vec{J}$ a través de $\partial \mathcal{V}$. Por ejemplo si en el volumen $\mathcal{V}$ la probabilidad disminuye podemos representarlo con la siguiente figura en la que las flechas representan la corriente de probabilidad que sale del volumen $\mathcal{V}$,



Si $\mathcal{V}$ es todo el espacio, $\mathcal{V} = R^3$, $P[R^3] = 1$ pues en mecánica cuántica las partículas no pueden desaparecer. Luego el lado izquierdo de (2.14) es nulo. En cuanto al lado derecho, esto está asegurado si $\vec{J}$ va a cero suficientemente rápido en el infinito, lo cual impone condiciones asintóticas para la función de onda.

Ahora estamos en condiciones de probar que cuando consideramos estados estacionarios, la constante de separación E es real. Para ello, calculemos la densidad de probabilidad para un estado estacionario tomando en principio a E como un número complejo:

$$\rho = |\psi_E|^2 \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(E - E^*)t\right) \quad (2.15)$$

con lo que

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}(E - E^*)\rho \quad (2.16)$$

Si integramos esta ecuación sobre un volumen $\mathcal{V}$ tendremos

$$\frac{dP[\mathcal{V}]}{dt} = -\frac{i}{\hbar}(E - E^*)P[\mathcal{V}] \quad (2.17)$$

Esta ecuación es válida para un volumen $\mathcal{V}$ arbitrario de manera que si consideramos el caso $\mathcal{V} = R^3$, siendo que $P[R^3] = 1$, para que el lado derecho sea nulo asegurando la conservación de la probabilidad cuando el volumen corresponde a todo el espacio, deberá cumplirse que

$$E = E^* \quad (2.18)$$

Principio de superposición y paquetes de onda

Volvamos a la solución (2.2) de la ecuación de Schrödinger,

$$\psi(\vec{x}, t) = \psi_E(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \quad (2.19)$$

con $\psi_E(\vec{x})$ solución de la ecuación independiente del tiempo (2.4)

$$\hat{H}\psi_E(\vec{x}) = E\psi_E(\vec{x}) \quad (2.20)$$

Como señalamos anteriormente, esta ecuación puede tener diferentes soluciones $\psi_{E_n}(\vec{x}) = \psi_n(\vec{x})$ para distintos valores de $E = E_n$ (n puede corresponder a un índice discreto o continuo). Ya notamos que tiene la misma forma que la ecuación con que se calculan los autovalores de una matriz salvo que, en este caso, en lugar de una matriz se tiene un operador diferencial ($\hat{H}$) y los vectores propios (autovectores) corresponden a funciones de onda (“autofunciones”) y no a un vector con un dado número de componentes³⁰. La consideraremos entonces como una ecuación de autovalores (E_n) y autofunciones $\psi_n(\vec{x})$ que puede tener

³⁰Veremos ms adelante que se trata de un vector en un espacio vectorial llamado “espacio de Hilbert.”

muchas soluciones, tanto para valores discretos como continuos de E_n . Esto dependerá, evidentemente, de la forma del potencial y de las condiciones de contorno que deban imponerse a la ecuación diferencial.

De ahora en más escribiremos a la ecuación la eq.(2.20) en la forma

$$\hat{H}\psi_n(\vec{x}) = E_n \psi_n(\vec{x}) \quad (2.21)$$

Designarmos a esta ecuación como “ecuación de Schrödinger independiente del tiempo”.

Dado que la ecuación de Schrödinger es lineal, una superposición de soluciones es también solución por lo que podemos escribir como solución general

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{x}) \exp(-\frac{i}{\hbar} E_n t) \quad (2.22)$$

donde c_n son coeficientes complejos que deben ser calculados de acuerdo a cuál sea la condición impuesta en un instante dado (por ejemplo un instante “inicial”). Veremos más adelante cuáles son las condiciones para poder asegurar que $\{\psi_n\}$ forma una base completa en el “espacio” de las funciones de onda.

Aceptando por ahora lo anterior, podemos pensar a (2.22) como un desarrollo de Bessel-Fourier en términos de la base proporcionada por las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Estas autofunciones $\{\psi_n\}$ se eligen de manera de ser ortonormales,

$$\int d^3x \psi_n^*(\vec{x}) \psi_m(\vec{x}) = \delta_{nm} \quad (2.23)$$

y entonces, dada una condición inicial para el estado del sistema, por ejemplo en $t = 0$,

$$\psi(\vec{x}, t = 0) = \varphi(\vec{x}) \quad (2.24)$$

los coeficientes c_n quedan determinados de acuerdo a la fórmula habitual

$$c_n = \int d^3x \psi_n^*(\vec{x}) \varphi(\vec{x}) \quad (2.25)$$

Llamábamos a cada estado que aparece como término de la suma (2.22) “estacionario” porque para ellos la densidad de probabilidad es, como vimos, independiente del tiempo. Pero es evidente que la combinación

lineal completa no corresponde a un estado estacionario. Solo si existe un solo término (con índice que denotamos n_0) que sea el único no nulo en la suma ($c_{n_0} \neq 0$ y $c_n = 0 \forall n \neq n_0$) el sistema se hallará en un estado estacionario con energía bien definida E_{n_0} .

Al estado estacionario al que corresponde el menor de los valores posibles de la energía se lo llama estado *fundamental* del sistema.

Un caso muy simple para discutir todo lo anterior es el de una partícula libre. En ese caso el potencial $V(\vec{x}) = 0$ y es fácil ver que la solución de la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{x},t) = \hbar i \frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t) \quad (2.26)$$

tiene la forma

$$\psi_k(\vec{x},t) = C_k \exp\left(i\vec{k}\cdot\vec{x} - i\frac{E}{\hbar}t\right) \quad (2.27)$$

donde para que se satisfaga la ecuación, la energía E debe relacionarse al “vector de onda” $\vec{k}$ a través de la igualdad

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}|\vec{k}|^2 \quad (2.28)$$

En cuanto a C_k , se trata constante compleja, en principio arbitraria dada la linealidad de la ecuación.

Confirmamos entonces que la solución de la ecuación de Schrödinger para una partícula libre de masa m corresponde a una onda plana de frecuencia angular ω ,

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \quad (2.29)$$

impulso $\vec{p}$

$$\vec{p} = \hbar\vec{k} \quad (2.30)$$

frecuencia ν

$$\nu = \frac{E}{h} \quad (2.31)$$

y longitud de onda λ ,

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (2.32)$$

Es evidente que esta solución no es de cuadrado integrable puesto que

$$|\psi_k(\vec{x}, t)|^2 = |C_k|^2 \quad (2.33)$$

La densidad de probabilidad es la misma en todo el espacio y su integral sobre todo el espacio diverge. Este problema se puede resolver si superponemos soluciones de onda plana con distintos impulsos,

$$\psi(\vec{x}, t) = \int d^3k C(\vec{k}) \exp\left(i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\frac{E(k)}{\hbar}t\right) \quad (2.34)$$

Hemos escrito aquí $C_k = C(\vec{k})$ porque $\vec{k}$ corresponde a 3 “índices”. La ec.(2.34) no es otra cosa que la que escribimos como (2.22) cuando los autovalores E_k son continuos. Corresponde a una solución general con norma

$$\begin{aligned} \int d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 &= \int d^3x d^3k d^3k' C^*(\vec{k}) C(\vec{k}') \exp\left(i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\frac{E(k)}{\hbar}t\right) \times \\ &\quad \exp\left(-i\vec{k}' \cdot \vec{x} + i\frac{E(k')}{\hbar}t\right) \end{aligned} \quad (2.35)$$

La integral sobre $\vec{x}$ se puede resolver usando la identidad

$$\int d^3x \exp\left(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{x}\right) = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{k} - \vec{k}') \quad (2.36)$$

por lo que terminamos finalmente con

$$\int d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = (2\pi)^3 \int d^3k |C(\vec{k})|^2 \quad (2.37)$$

Basta entonces elegir $C(k)$ adecuadamente para tener un “paquete de ondas” de cuadrado integrable.

Por analogía con el caso clásico, se llama *velocidad de fase* v_f a la velocidad que tendría cada onda de la superposición,

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m} \quad (2.38)$$

Podemos comparar este resultado con el que da el electromagnetismo para la velocidad de fase de una onda en un medio dispersivo con índice de refracción $n(k)$,

$$v_f^{EM} = \frac{c}{n(k)} \quad (2.39)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío ($n = 1$) y todas las ondas del paquete viajan con la misma velocidad $v_f^{EM} = c$ que entonces coincide con la llamada velocidad de grupo $v_G = c$. Para el caso en que $n \neq 1$ hay una velocidad de fase distinta para cada una. En general, algunas ondas viajan con velocidad menor que la velocidad de fase, otras con velocidad mayor y por ello es conveniente definir la velocidad de grupo que da una idea de cómo se mueve el paquete como un todo. También para las ondas de la mecánica cuántica conviene definir una velocidad de grupo, lo que se hace como en el caso de las ondas luminosas

$$v_G = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m} \quad (2.40)$$

donde k_0 es el valor de k correspondiente al “centro” de la función $|C(k)|^2$.

En los problemas de la práctica veremos que un paquete de ondas como el discutido arriba puede siempre escribirse en la forma

$$\psi(\vec{x}, t) = \exp\left(i(\vec{k}_0 \cdot \vec{x} - \omega_0 t)\right) M(\vec{x}, t) \quad (2.41)$$

El primer factor del lado derecho de (2.41) representa una onda plana de longitud de onda $\lambda = (2\pi)/k_0$ mientras que M modula a esta onda y la hace un “paquete”.

Valores medios

Adelantándonos a un aspecto muy importante relacionado con las cantidades que se calculan en mecánica cuántica para comparar con las medidas experimentales, describiremos aquí brevemente y de manera heurística³¹ el cálculo de *valores medios de operadores*.

Comenzaremos por el operador hamiltoniano. Dada la ecuación para estados estacionarios,

$$\hat{H}\psi_n(\vec{x}) = E_n\psi_n(\vec{x}) \quad (2.42)$$

³¹Heurística: del griego $\epsilon\upsilon\rho\acute{\iota}\sigma\chi\omega$, hallar, inventar: la manera en algunas ciencias de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.

señalamos que era razonable asociar la energía del estado con el autovalor E_n . Para apuntalar esta idea, multipliquemos ambos miembros de la ecuación (2.42) por ψ_n^* para luego integrar el resultado sobre todo el espacio. Podemos entonces escribir

$$\frac{\int d^3x \psi_n^* \hat{H} \psi_n}{\int d^3x \psi_n^* \psi_n} = \frac{\int d^3x \psi_n^* E_n \psi_n}{\int d^3x \psi_n^* \psi_n} = E_n \quad (2.43)$$

Si recordamos que las autofunciones de la ecuación de Schrödinger deben ser normalizadas (al valor 1) por consistencia con su interpretación en término de probabilidades, la igualdad toma la forma más sencilla:

$$E_n = \int d^3x \psi_n^* \hat{H} \psi_n \quad (2.44)$$

Esta fórmula muestra que al menos en el caso de estados estacionarios, la energía del sistema puede calcularse como una integral que recuerda a los valores medios de la mecánica estadística y que por ello se conoce como *valor medio* o *valor de expectación*, en este caso del hamiltoniano.

Veremos luego que en general (y no solo para estados estacionarios) el valor medio del hamiltoniano para estados cualesquiera corresponderá a la energía de esos estados (esto se describirá de manera precisa cuando estudiemos los postulados de la mecánica cuántica de manera cuidadosa). Hasta entonces nos conformaremos con una formulación heurística para dar una lista de valores medios de cantidades físicas que caracterizan a un estado ψ y cómo calcularlos. Supondremos en todos los casos que la función de onda ψ esta normalizada,

$$\int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \psi(\vec{x}, t) \equiv \langle \psi | \psi \rangle = 1 \quad (2.45)$$

Entonces, definiremos como valores medios del operador hamiltoniano, posición e impulso correspondientes al estado $\psi(x, t)$ a las cantidades

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \equiv \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \hat{H} \psi(\vec{x}, t) \quad (2.46)$$

$$\langle \hat{\vec{x}} \rangle = \langle \psi | \vec{x} | \psi \rangle \equiv \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \vec{x} \psi(\vec{x}, t) \quad (2.47)$$

$$\langle \hat{\vec{p}} \rangle = \langle \psi | \vec{p} | \psi \rangle \equiv \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \psi(\vec{x}, t) \quad (2.48)$$

En las fórmulas anteriores hemos introducido una notación inventada por Dirac para los valores medios cuya justificación en un contexto matemático más elaborado se aclarará cuando estudiamos los posibles estados de una partícula en términos de vectores en un espacio de Hilbert.

Veremos más adelante que estos valores medios pueden entenderse en términos de la noción ordinaria de valor medio en teoría de probabilidades. Pero ya a esta altura podemos ver que estos valores medios o *valores de expectación* confirman la racionalidad de las reglas de cuantificación canónica pues establecen, vía un “principio de correspondencia”, una conexión con la física clásica. Tomemos por ejemplo el caso del valor medio de la coordenada x y derivémoslo respecto al tiempo

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \int d^3x x \frac{\partial}{\partial t} (\psi^*(\vec{x}, t) \psi(\vec{x}, t)) = \int d^3x x \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (2.49)$$

donde hemos tenido en cuenta que en la formulación cuántica de la ecuación de Schrödinger x y t son variables independientes. A partir de la ecuación de continuidad (2.12) podemos escribir

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = - \int d^3x x (\vec{\nabla} \cdot \vec{J}) = - \int d^3x \vec{\nabla} \cdot (x \vec{J}) + \int d^3x J_x \quad (2.50)$$

Usando el teorema de Gauss-Stokes y que, como vimos, el flujo de $\vec{J}(\vec{x})$ debe ir a cero en el infinito suficientemente rápido en todas las direcciones, solo contribuirá a la integral el segundo término,

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \int d^3x J_x = \frac{\hbar}{2mi} \int d^3x \left(\psi^*(\vec{x}, t) \frac{\partial}{\partial x} \psi(\vec{x}, t) - \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi^*(\vec{x}, t) \right) \psi(\vec{x}, t) \right)$$

o, integrando por partes el segundo término del lado izquierdo,

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\hbar}{mi} \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \frac{\partial}{\partial x} \psi(\vec{x}, t) \quad (2.51)$$

lo mismo sucede para los valores medios de y, z lo que permite establecer la siguiente identidad entre valores de expectación,

$$m \frac{d}{dt} \langle \vec{x} \rangle = \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \psi(\vec{x}, t) = \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \hat{p} \psi(\vec{x}, t) = \langle \vec{p} \rangle \quad (2.52)$$

El lado izquierdo es simplemente el producto de la masa de la partícula veces lo que podemos asociar con la velocidad de una partícula clásica. El lado derecho es el valor de expectación del momento o impulso $\vec{p}$. La relación clásica entre velocidad y momento es entonces reproducida por los valores de expectación de los operadores cuánticos asociados vía las reglas de cuantificación canónica.

Más sobre el principio de superposicion

La linealidad de la ecuación de Schrödinger nos llevó a escribir la solución más general en la forma (2.22)

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \quad (2.53)$$

donde $\psi_n(\vec{x})$ son las autofunciones de la ecuación independiente del tiempo (2.21)

$$\hat{H}\psi_n(\vec{x}) = E_n \psi_n(\vec{x}) \quad (2.54)$$

y c_n coeficientes complejos a determinar a partir de la condición inicial $\psi(\vec{x}, 0)$ según (2.25).

Cuando decimos que un sistema cuántico está en un estado $\psi(\vec{x}, t)$ se trata en realidad de que el estado es el resultado de la superposición de muchos posibles “autoestados”, como llamaremos a las autofunciones de los operadores asociados a las distintas cantidades físicas, según sean los valores de los coeficientes c_n que aparezcan en los desarrollos en serie de Bessel-Fourier.

Evidentemente lo anterior no puede ser pensado en términos de conceptos de la física clásica. Enfrentamos una idea totalmente nueva a la que habrá que acostumbrarse.

Si un sistema se encuentra en un estado que es la superposición de otros dos, sus propiedades serán, expresándolo por ahora de manera vaga, una combinación de las de los dos estados originales y serán más o menos cercanas a las de uno de los dos (digamos ψ_1) cuando el módulo $|c_1|$ del correspondiente coeficiente sea mayor o menor.

Supongamos que la medida de un dado observable da como resultado el valor o_1 cuando se lo mide para el estado “puro” ψ_1 y o_2 cuando

se lo mide para el estado puro ψ_2 . ¿Cuál sera el resultado de la medida cuando ésta se hace para el estado $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$? En algunos casos será o_1 y en otros será o_2 , de acuerdo a una ley de probabilidad que depende de los pesos relativos $|c_1|$ y $|c_2|$. No se trata de que el resultado en si mismo sea un valor intermedio entre los valores o_1 y o_2 sino que la probabilidad de que la medida dé un resultado particular es la que depende de $|c_i|$.

Lo discusión anterior deviene más transparente en el caso en que la magnitud a medir es la energía. Para un estado como el (2.53), debemos calcular

$$\begin{aligned}\langle \hat{H} \rangle &= \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \hat{H} \psi(\vec{x}, t) = \sum_{n,m} c_n^* c_m \int d^3x \psi_n^*(\vec{x}) \hat{H} \psi_m(\vec{x}) \\ &= \sum_{n,m} c_n^* c_m E_m \int d^3x \psi_n^*(\vec{x}) \psi_m(\vec{x}) = \sum_n |c_n|^2 E_n\end{aligned}\quad (2.55)$$

Vemos que las cantidades $|c_n|^2$ pesan la contribución de cada autovalor de energía E_n al valor medio del hamiltoniano (Recordemos que $\sum_n |c_n|^2 = 1$).

Clase 3

Problemas en una dimensión espacial

Comenzaremos por estudiar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el caso en que el potencial, por simplicidad, solo depende de una coordenada espacial x . Es decir, $V = V(x)$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x)\right) \psi_E(\vec{x}) = E \psi_E(\vec{x}) \quad (3.1)$$

En este caso, podemos escribir la función de onda en la forma

$$\psi_E(\vec{x}) = \psi(x)\chi(y)\varphi(z) \quad (3.2)$$

y así obtener tres ecuaciones solo ligadas a través de las constantes de separación de variables,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = e_1\psi \quad (3.3)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\chi}{dy^2} = e_2\chi \quad (3.4)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\varphi}{dz^2} = e_3\varphi \quad (3.5)$$

$$e_1 + e_2 + e_3 = E \quad (3.6)$$

Tanto (3.4) como (3.5) corresponden al movimiento de una partícula libre en las direcciones y y z respectivamente por lo que sin más podemos escribir a las soluciones como la parte espacial de ondas planas

$$\chi_{\pm} = \exp(\pm i \sqrt{\frac{2me_2}{\hbar^2}} y) \quad , \quad \varphi_{\pm} = \exp(\pm i \sqrt{\frac{2me_3}{\hbar^2}} z) \quad (3.7)$$

Queda entonces por resolver un problema en *una dimensión* espacial, representado por la ecuación (3.3). Conviene para comenar definir

$$\frac{2mV(x)}{\hbar^2} = U(x) \quad , \quad \frac{2me_1}{\hbar^2} = \varepsilon \quad (3.8)$$

con lo que la ecuación de Schrödinger en una dimensión se puede escribir de manera compacta así:

$$\psi'' - (U(x) - \varepsilon)\psi = 0 \quad (3.9)$$

donde $\psi' = d\psi/dx$, $\psi'' = (\psi')'$. Esta ecuación corresponde a un caso particular del llamado problema de Sturm-Liouville³², cuyas soluciones finitas, continuas y derivables son las que en general interesan en la mecánica cuántica (ver Apéndice).

Aún para el caso en que el potencial $U(x)$ tenga “saltos” pueden obtenerse soluciones regulares. Por tratarse de una ecuación de segundo orden, para determinar completamente la solución debemos conocer ψ y ψ' en un punto (esto porque el potencial depende de una sola variable espacial, siendo las otras dos irrelevantes para la solución del problema).

Las condiciones que deben satisfacer las soluciones de la ecuación de Schrödinger son de un carácter muy general. Ante todo, la función debe ser “uniforme” y continua en todo el espacio³³. La condición de continuidad debe (y puede) mantenerse aún en los casos en que el potencial $V(\vec{x})$ no es continuo. En aquellos puntos (superficies en el caso de más dimensiones) en que V no sea continuo se mantiene la condición de que deben ser continuas tanto la función de onda como sus derivadas. Reescribiendo (??) en la forma

$$\psi'' = (U(x) - \varepsilon)\psi \quad (3.10)$$

³²Entre 1836 y 1837 Joseph Liouville y Charles Sturm publicaron separadamente una serie de trabajos complementarios sobre desarrollo de funciones y ecuaciones diferenciales que dieron la solución al problema que hoy lleva sus nombres.

³³La práctica de permitir que las funciones puedan ser multivaluadas (multiformes) y no solo monovaluadas o uniformes se abandonó en algún momento de la primera mitad del siglo 20. Este concepto amplio de función había sido introducido por Peter Gustav Lejeune Dirichlet en 1854, quien incluía como funciones a aquellas que podían tomar más de un valor para ciertos valores de la variable independiente, una parábola “acostada”, por ejemplo. Persistió en la teoría de funciones especiales.


vemos que a cada discontinuidad del potencial, la función U y por consiguiente ψ'' en el lado izquierdo da un salto brusco pero la integral de ψ'' permanece constante en esos puntos. ψ' y *a fortiori* ψ son entonces funciones continuas en esos puntos.

En muchos problemas de interés resulta que el potencial debe tomarse en alguna región del espacio como infinito para representar una situación en que esa región es *impenetrable* para la partícula. Es decir que en tal caso la función de onda debe ser cero en esa región prohibida y, por continuidad, esto impone una condición de borde nula en la frontera con la otra región. La derivada (normal) queda en este caso indeterminada: da un “salto” (en general la discontinuidad de la derivada es finita) que nos está indicando que la partícula no puede pasar a la región prohibida. Otra manera de entender esto es notando que por (3.10) la derivada logarítmica de ψ se hace infinita cuando el potencial es infinito y por ende la función de onda debe anularse.

Resumamos entonces la estrategia para resolver problemas estacionarios en presencia de potenciales del tipo “escalón”: en los puntos en que el potencial da “saltos” se exige la continuidad de la función de onda y de su derivada, lo que implica consistencia en la ecuación de continuidad y por ello en la interpretación probabilística de la función de onda. Un caso especial, como adelantamos, es el de un salto infinito que describiremos en lo que sigue.

El pozo infinito

Consideremos un potencial como el de la figura



región **III**,

$$\psi_{III}(x) = 0, \quad x \geq L \quad (3.14)$$

Un análisis similar en la región **I** nos lleva a concluir que

$$\psi_I(x) = 0, \quad x \leq 0 \quad (3.15)$$

De esta manera, solo nos resta por resolver la ecuación (3.9) en la región **II** donde el potencial es nulo,

$$\psi_{II}'' + \varepsilon \psi_{II} = 0 \quad (3.16)$$

cuya solución en la región **II** corresponde, como vimos ya, a una combinación de dos ondas planas que viajan en direcciones opuestas,

$$\psi_{II}(x) = c \exp(+i\sqrt{\varepsilon}x) + b \exp(-i\sqrt{\varepsilon}x) \quad (3.17)$$

La continuidad de la solución implica que, dadas las soluciones (3.14) y (3.15) debe cumplirse

$$\psi_{II}(0) = 0 \quad (3.18)$$

$$\psi_{II}(L) = 0 \quad (3.19)$$

De la primera resulta que $a = -b$; imponiendo luego la segunda se tiene

$$\psi_{II}(L) = a \sin(\sqrt{\varepsilon}L) = 0 \quad (3.20)$$

Las condiciones (3.18)-(3.19) imponen que el argumento del seno se anule y de ello resulta que la energía debe estar *cuantificada* según la condición

$$\varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3.21)$$

Adecuadamente normalizada, la solución dentro del pozo toma entonces la forma

$$\psi_{II n}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(\sqrt{\varepsilon_n}x) \quad (3.22)$$

Volviendo a las variables originales, los autovalores de la energía toman la forma

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} n^2 \quad (3.23)$$




Este es el primer ejemplo en que vemos cómo la energía de una partícula resulta cuantificada. La razón matemática para ello es que las condiciones en los bordes $x = 0$ y $x = L$ han forzado a las autofunciones de la ecuación de Schrödinger a anularse en los extremos del pozo infinito. Ello, a su vez, ha hecho que los valores aceptables para la energía de la partícula no puedan ser cualquier número real sino que toman la forma

$$E_n = Cn^2, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.24)$$

con $C = \hbar^2\pi^2/(2mL^2)$.

Es importante notar que la función de onda correspondiente a cada *nivel de energía* resulta tener (ver figura 1) distinto número de nodos: descartada la trivial (cuando $n = 0$) la del estado fundamental, ($n = 1$) no tiene nodos, la del primer estado excitado tiene un nodo, la del segundo estado excitado tiene dos ($n = 2$) y así siguiendo. Como veremos en la clase siguiente esto no es una peculiaridad del caso particular que hemos estudiado sino que se encuadra dentro de lo que podemos llamar *teorema de nodos* de la ecuación de Schrödinger en una dimension espacial.

En las figuras siguiente representamos $|\psi|^2$ como función de x para los primeros tres niveles de energía (tomamos $L = 2$)



Efecto Túnel


Ya estamos en condiciones de discutir un fenómeno muy importante conocido como el del “efecto túnel” con importantes aplicaciones (como por ejemplo es el caso del microscopio electrónico).

De hecho, el efecto túnel puede tomarse como paradigma de fenómenos que solo pueden comprenderse en términos de la mecánica cuántica. Se trata de una situación en la que la aplicación de la mecánica clásica daría como resultado que una partícula con cierta energía cinética no podría superar la fuerza de repulsión producida por un potencial siendo que, en condiciones que requieren una descripción cuántica sucede lo contrario, hecho que se comprueba experimentalmente.

En una temprana aplicación de la ecuación de Schrödinger, George Gamow (1928) e independientemente Ronald Gurney y Edward Condon (1929)³⁴ mostraron cómo el efecto túnel explicaba el decaimiento radioactivo de partículas alfa emitidas por núcleos atómicos pesados como por ejemplo el uranio 238.

Las partículas alfa están constituidas por dos protones y dos neutrones que forman un “paquete” que no es otra cosa que un núcleo de helio. Si se supone que las partículas α existen como tales dentro del núcleo de elementos pesados como el uranio y se mide la energía con que son emitidas por el uranio se plantea la siguiente paradoja: por experimentos de dispersión puede determinarse que la energía potencial producida por las “fuerzas nucleares” a la que está sometida una partícula alfa cuando forma parte del núcleo es del tipo de un “pozo de potencial” cuya profundidad es tal que duplica la energía cinética que tienen las partículas alfa que son emitidas. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, la emisión sería entonces imposible, como se ve en la figura siguiente.

³⁴G. Gamow, “Zur Quantentheorie des Atomkernes” (“Sobre la teoría cuántica de los núcleos atómicos”) Z. Physik 51 (1928) , 204.
R. W. Gurney and E. U. Condon, “Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration” Nature 122, (1928) 439 ; Phys. Rev 33 (1929) 127.



Una representación de la imposibilidad de emisión de partículas alfa desde el punto de vista de la física clásica.

Gamow, Curney y Cohen aplicaron, apenas meses después de que Schrödinger propusiera la ecuación que lleva su nombre al problema de la emisión α . Utilizaron para ello un potencial que combinaba el “pozo” dentro del núcleo (las fuerzas nucleares que mantienen al núcleo empaquetado a pesar de la repulsión coulombiana entre los protones) y la repulsión coulombiana entre los dos protones que formaban a la partícula fuera y encontraron una probabilidad no nula de emisión de partícula. El resultado obtenido reproducía muy bien las medidas experimentales.

Otro ejemplo es el de un electrón que atraviesa un plasma formado por un gas de átomos ionizados negativamente en un tubo de descarga. En este caso se puede representar a la barrera (energía de repulsión coulombiana) que impediría al electrón desde el punto de vista de la física clásica seguir su camino por un potencial constante como el de la figura siguiente. Nuevamente se obtiene un resultado no nulo para la probabilidad de transición, por ejemplo cuando la energía del electrón incidente es la mitad de la altura de la barrera.

La elección de la palabra “túnel” no es quizás demasiado afortunada porque parece indicar que la partícula “cava” un túnel para escapar de la fuerza que le impediría seguir su camino. Como veremos, no se trata de eso.

Para estudiar el efecto túnel consideraremos el caso de proyectiles

(electrones) que inciden sobre un blanco lanzados con una energía cinética tal que clásicamente no podrían atravesarlo. La repulsión del blanco puede ser descrita de manera simple eligiendo en la ecuación de Schrödinger representarlo por una “barrera de potencial” como la de la figura siguiente.

A pesar de ser tan simple, esta energía potencial reproduce un resultado cualitativamente similar al obtenido por Gamow, Curney y Cohen para el caso de las partículas α .

Como para el caso del pozo infinito, conviene definir


$$\frac{2mV(x)}{\hbar^2} = U(x) \quad , \quad \frac{2mE}{\hbar^2} = k^2 \quad (3.25)$$

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo que debemos estudiar es entonces (ver la ec.(3.10))

$$\psi'' + (U(x) - k^2)\psi = 0 \quad (3.26)$$

Llamaremos I a la región en la que $x \leq -a$, II a aquella en la que $-a < x < +a$ y III a aquella en la que $x \geq a$. Entonces, $U(x) = 0$ en las regiones I y III . y $U(x) = U_0 \equiv 2mV_0/\hbar^2$ en la región II.

Consideremos el caso en que la energía es menor que la altura de la barrera, $E < V_0$ (o $k^2 < U_0$). Es fácil ver que en este caso las soluciones



en cada región son:

$$\psi_I(x) = A \exp(ikx) + B \exp(-ikx) \quad (3.27)$$

$$\psi_{II}(x) = C \exp(-\kappa x) + D \exp(\kappa x) \quad (3.28)$$

$$\psi_{III}(x) = F \exp(ikx) + G \exp(-ikx) \quad (3.29)$$

donde

$$\hbar k = \sqrt{2mE}, \quad \hbar \kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)} \quad (3.30)$$

Las condiciones de contorno imponen

$$\begin{aligned} \psi_I(-a) &= \psi_{II}(-a) & \psi'_I(-a) &= \psi'_{II}(-a) \\ \psi_{II}(a) &= \psi_{III}(a) & \psi'_{II}(a) &= \psi'_{III}(a) \end{aligned} \quad (3.31)$$

Podemos expresar las relaciones lineales que resultan de (3.31) de manera matricial. Para la frontera entre I y II obtenemos:

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1 + \frac{i\kappa}{k}) \exp(\kappa a + ika) & (1 - \frac{i\kappa}{k}) \exp(-\kappa a + ika) \\ (1 - \frac{i\kappa}{k}) \exp(\kappa a - ika) & (1 + \frac{i\kappa}{k}) \exp(-\kappa a - ika) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}$$

mientras que para la frontera entre II y III resulta:

$$\begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1 - \frac{ik}{\kappa}) \exp(\kappa a + ika) & (1 + \frac{ik}{\kappa}) \exp(\kappa a - ika) \\ (1 + \frac{ik}{\kappa}) \exp(-\kappa a + ika) & (1 - \frac{ik}{\kappa}) \exp(-\kappa a - ika) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix}$$

Podemos entonces relacionar los coeficientes en la región I con los correspondientes a la región III simplemente multiplicando las matrices de 2×2 de los lados derechos de las ecuaciones anteriores llegando a la siguiente relación en que desaparecieron las constantes C y D :

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} \quad (3.32)$$

con

$$M_{11} = (\cosh 2\kappa a + \frac{i\epsilon}{2} \sinh 2\kappa a) \exp(2ika) = M_{22}^* \quad (3.33)$$

$$M_{12} = \frac{i\eta}{2} \sinh 2\kappa a = M_{21}^* \quad (3.34)$$

Aquí

$$\epsilon = \frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \quad \eta = \frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \quad (3.35)$$

Una solución de mucho interés corresponde al caso en que consideramos $G = 0$. Es un caso que corresponde a una onda que incide de la izquierda con amplitud A , en parte se refleja con amplitud B y en parte aparece transmitida en la derecha con amplitud F , como se representa en la figura siguiente:

Definimos los coeficiente de transmisión T y reflexión R por las expresiones

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \quad R = \frac{|B|^2}{|A|^2} \quad (3.36)$$

Es tedioso pero trivial calcular estos coeficientes usando la relación (3.32) para el caso $G = 0$. Para simplificar, consideremos el caso de una barrera muy ancha y muy alta; en este caso $\kappa a \gg 1$ y se puede aproximar

$$\cosh 2\kappa a \approx \sinh 2\kappa a \approx \frac{1}{2} \exp(2\kappa a) \quad (3.37)$$

con lo que T toma una forma muy simple:


$$T \approx 16 \exp(-4\kappa a) \left(\frac{k\kappa}{k^2 + \kappa^2} \right)^2 \quad (3.38)$$

o

$$T \approx 16 \exp \left(-\sqrt{\frac{32m}{\hbar^2} (V_0 - E)} a \right) \left(\frac{E}{V_0} \right)^2 \quad (3.39)$$

Análogamente podemos resolver el caso en que la energía de la partícula incidente es mayor que la altura de la barrera. No repetiremos

el análisis pero representaremos en la figura que sigue el coeficiente de transmisión como función de la energía de la partícula incidente en todo el rango de energías.



(En la figura hemos elegido una barrera tal que $2mV_0a^2/\hbar^2 = 10$)

Utilicemos estos resultados para comparar lo que sucede con una partícula clásica y su equivalente cuántico que, vimos, corresponde a un paquete de ondas (para el que podríamos repetir el análisis que hicimos con una única onda plana).


Contrariamente a lo que sucedería con la partícula clásica que, de incidir con menor energía que el alto de la barrera, rebotaría sin poder atravesarla, el paquete de ondas que representa a la partícula cuántica es en parte reflejado y en parte transmitido. La intensidad del paquete transmitido no es nunca nula: cuando la energía crece de 0 a U_0 el coeficiente de transmisión crece regularmente hasta un valor máximo igual a $(1 + U_0a^2)^{-1}$.

Vemos por qué a este efecto se lo llama *efecto túnel*. Debe notarse que cuanto más baja y más angosta es la barrera, más notable es la proporción transmitida.

Para el caso en que la energía de la partícula incidente es mayor que la altura de la barrera, la partícula clásica atraviesa la zona II. No hay posibilidad de rebote. En cambio, en el caso cuántico, el coeficiente de reflexión no se anula lo que significa que siempre hay una parte del paquete de ondas que es reflejada. La transmisión completa solo ocurre para valores particulares de la energía, que corresponden a los

ceros del $\sin(ka)$. Esto se ve fácilmente de calcular el coeficiente de transmisión en el caso en que $E > V_0$ o de prolongar analíticamente el resultado para el caso estudiado en que $E < V_0$: el signo de $E - V_0$ cambia y el seno hiperbólico deviene seno trigonométrico. Los ceros del seno son aquellos que corresponden al máximo posible del coeficiente de transmisión, $T = 1$.

En la figura siguiente mostramos el resultado de utilizar el potencial propuesto para describir la la emisión de partículas alfa por parte de núcleos pesados.



El cálculo de Gamow, Curney y Cohen para calcular la probabilidad de emisión fue similar al que acabamos de hacer para el caso de la barrera rectangular.

Es importante insistir en que el efecto túnel no consiste en que un haz de partículas “pase por intersticios” que hay, en la materia, por ejemplo entre los átomos que forman el blanco, un efecto que podría ser interpretado de manera clásica pensando en partículas clásicas “colándose por agujeros” de una pared. Se trata de un verdadero efecto cuántico en el cual en un dado instante hay cierta probabilidad no nula de encontrar partículas del haz en el espesor del material y también de hacerlo en el lado opuesto a aquel por el que el haz incidió.

Un aspecto interesante del efecto túnel concierne a su interpretación a la luz del principio de incerteza: señalamos que la indeterminación de la posición de una partícula cuántica y la de su impulso están ligadas

según la relación:

$$\Delta x \Delta p \sim \hbar \quad (3.40)$$

Clásicamente no podemos encontrar a una partícula en la región II si su energía es menor que U_0 . Cuánticamente, si bien la función de onda ψ_{II} es no nula, su valor será apreciable solo si κx es apreciable, digamos $\kappa x \sim 1$. Esto quiere decir que la región Δx en que la función de onda difiere de cero es

$$\Delta x \sim 1/\kappa \quad (3.41)$$

Entonces la relación (3.40) implica que el impulso correspondiente será

$$\Delta p \sim \hbar \kappa \quad (3.42)$$

Tal impulso corresponde a una indeterminación de la energía de

$$\Delta E = (\hbar \kappa)^2 / 2m \quad (3.43)$$

o, usando el valor explícito de κ ,

$$\Delta E = V_0 - E \quad (3.44)$$

Pero esto quiere decir que la indeterminación en la medida de la energía de la partícula cuando está atravesando la barrera es justamente igual a la diferencia entre el valor del alto de la barrera y la energía que suponemos menor. Esto es, hablamos de efecto túnel porque la energía de la partícula es menor que la altura de la barrera pero la indeterminación en el valor de la energía es tal que ¡No podemos afirmar si la energía no es en realidad igual a la de la barrera!

Veamos algunos números que nos permitan apreciar el orden de magnitud del efecto túnel. Consideremos primero el caso de un electrón que enfrenta una barrera de potencial como la discutida más arriba (por ejemplo producida por el plasma de átomos ionizados negativamente mencionado al comienzo de la clase) . Reemplazando el valor de la masa del electrón en la fórmula (3.30) se encuentra que $1/\kappa$, asociado al alcance de la onda del electrón toma la forma

$$\kappa^{-1} = \frac{1.96}{\sqrt{V_0 - E}} \text{ \AA} \quad (3.45)$$

Consideremos una barrera de potencial de una altura de 2 electrón voltios ($V_0 = 2$ eV) y un ancho de 1 Å ($2a = 1$ Å)³⁵. Supongamos que el electrón incide sobre la barrera con una energía de 1 electrón voltio ($E = 1$ eV). Tenemos

$$\kappa^{-1} = 1.96 \text{ Å} = 1.96 \times 10^{-8} \text{ cm} \quad (3.46)$$

Vemos que el alcance de la onda asociada al electrón es del mismo orden que el ancho de la barrera por lo que es de esperar que el coeficiente de transmisión sea apreciable. Para comprobarlo, insertamos los valores numéricos apropiados en la expresión (3.39) para el coeficiente de transmisión, obteniéndose

$$T \approx 0.78 \quad (3.47)$$

lo que nos muestra que el electrón tiene 8 chances sobre 10 de atravesar la barrera.

Si en lugar de un electrón consideramos un protón, cuya masa es unas 1840 veces más grande que la electrónica, tendremos

$$\kappa^{-1} = \frac{1.96}{\sqrt{1840(V_0 - E)}} \text{ Å} \approx \frac{4.6}{\sqrt{V_0 - E}} 10^{-2} \text{ Å} = \frac{4.6}{\sqrt{V_0 - E}} 10^{-10} \text{ cm} \quad (3.48)$$

lo que nos da, para la misma barrera de 2 eV de alto y 1 Å de ancho, para un protón con la misma energía de 1 eV,

$$T \approx 4 \times 10^{-19} \quad (3.49)$$

lo que muestra que en este caso prácticamente todo el flujo de protones es reflejado.

Terminaremos esta sección dando una definición más precisa de los coeficientes de reflexión y transmisión. Recordando la definición de corriente de probabilidad que dimos mas arriba, tendremos, para problemas en una dimensión:

$$j = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \psi' - \psi \psi'^*) \quad (3.50)$$

³⁵1 ångström o angstrom = 10^{-10} m.

Si calculamos esta corriente para las ondas incidente, reflejada y transmitida, tendremos:

$$j_{inc} = \frac{\hbar k}{m}|A|^2, \quad j_{ref} = -\frac{\hbar k}{m}|B|^2, \quad j_{trans} = \frac{\hbar k}{m}|F|^2 \quad (3.51)$$

El signo negativo en la definición de la corriente reflejada indica que tiene un sentido contrario al de las incidente y transmitidas.

Tiene sentido definir los coeficientes de transmisión y reflexión en términos de estas corrientes:

$$T = \left| \frac{j_{trans}}{j_{inc}} \right|, \quad R = \left| \frac{j_{ref}}{j_{inc}} \right| \quad (3.52)$$

De (3.51) se ve que estas definiciones son equivalentes a las que hicimos en términos de las amplitudes A , B y F . Además, utilizando la ecuación de continuidad, la definición (3.52) permite comprobar que, como era de esperar,

$$R + T = 1 \quad (3.53)$$


Para obtener esta fórmula basta integrar la expresión de la conservación de la corriente, $dj/dx = 0$ en el intervalo $(-a, a)$.

El microscopio de efecto túnel

El diseño de un microscopio no convencional que usa electrones en lugar de luz le valió a tres físicos, dos alemanes y uno suizo, el premio Nobel del año 1986: Ernst Ruska se llevó la mitad del premio por sus estudios de óptica electrónica y el diseño del primer microscopio de electrones; Gerd Binnig y Heinrich Rohrer se repartieron la otra mitad por el diseño de un microscopio de escaneo túnel.

Todo microscopio tiene un límite de aumento que no puede ser excedido y que tiene que ver con la longitud de onda de las ondas que se usan para “iluminar” el objeto a agrandar: no se pueden distinguir detalles más pequeños que la longitud de onda utilizada. Para un microscopio convencional que use luz del espectro visible, la resolución (distancia mínima de dos detalles distinguibles) será entonces de unos 4000 Å ($1 \text{ Å} = 10^{-8} \text{ cm}$).

El gran avance en la microscopía se produjo cuando, establecido el carácter ondulatorio de los electrones, pudieron desarrollarse técnicas para enfocar electrones usando campos magnéticos como lentes. Así, se los podía irradiar sobre objetos para luego obtener las imágenes sobre placas fluorescentes o fotográficas. Como el electrón tiene asociada una longitud de onda que depende de su energía, ésta puede ser ajustada de manera de lograr longitudes de onda mucho menores que las de la luz, de manera de tener resoluciones de, en principio, unos pocos Armstrongs. Este fue el tipo de microscopio, llamado de transmisión, que diseñó Ruska.



El microscopio de escaneo túnel difiere sustancialmente tanto del que usa luz como del de transmisión de electrones. En él, una aguja con una punta muy aguda, de un material conductor, se mueve sobre la superficie del objeto a estudiar, también conductor, estableciéndose una diferencia de potencial entre la punta y la superficie.

Esta diferencia de potencial establece una corriente túnel en el hueco (no conductor) que separa la punta de la muestra. Clásicamente, esta corriente en el hueco estaría prohibida pero como vimos, es posible a nivel cuántico.

Como la corriente tiene un decaimiento exponencial con el ancho del hueco, pequeños cambios en la distancia entre la punta y la superficie inducen grandes cambios en la corriente. Para mantener a la corriente constante la distancia entre la punta y la superficie debe ser constante. Esto da una manera muy precisa de controlar la distancia proveyendo de una información topográfica de la superficie. Como la corriente se


establece casi totalmente entre el electrón más exterior de la aguja, la superficie es prácticamente escaneada por un único átomo y la superficie medida átomo a átomo!

El potencial periódico

Consideremos el caso de potencial periódico como el de la figura, que es de interés para describir a la interacción de los electrones moviéndose en una estructura cristalina. El ejemplo que discutiremos corresponde a una idealización en el que las barreras se suceden indefinidamente (En el caso de un cristal verdadero el número de átomos y por lo tanto de barreras es finito, si bien muy grande). El período del potencial es $l = 2a + 2b$.

Aquí $V(x)$ debe reemplazarse por $V = 0$ en los valles y por $V = V_0$ en las barreras. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo toma la forma

$$\psi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi(x) = 0 \quad (3.54)$$



Consideraremos el caso en que $0 < E < V_0$. En los valles, donde el potencial se anula, la solución puede escribirse como

$$\psi(x) = A_n \exp(ik(x - nl)) + B_n \exp(-ik(x - nl)) \quad (3.55)$$

donde

$$\hbar k = \sqrt{2mE} \quad (3.56)$$

con

$$a - l < x - nl < -a, \quad n \in Z \quad (3.57)$$

Esta última fórmula se obtiene facilmente a partir de la que resulta para la primera región, $a < x < l - a$ restando l de cada uno de los términos de la desigualdad y repitiendo esto en cada tramo.

Como vimos en el caso de la barrera simple, en la región en que el potencial toma el valor V_0 la solución es de la forma

$$\psi(x) = C \exp(\kappa x) + D \exp(-\kappa x) \quad (3.58)$$

con

$$\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)} \quad (3.59)$$

Los coeficientes correspondientes A_n, B_n y A_{n+1}, B_{n+1} a uno y otro lado de cada barrera pueden relacionarse matricialmente como en el caso de una única barrera,

$$\begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + i\beta_1 & i\beta_2 \\ -i\beta_2 & \alpha_1 - i\beta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n+1} \exp(-ikl) \\ B_{n+1} \exp(ikl) \end{pmatrix} \quad (3.60)$$

donde

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \cosh 2\kappa a \cos 2ka - \frac{\epsilon}{2} \sinh 2\kappa a \sin 2ka \\ \beta_1 &= \frac{\epsilon}{2} \sinh 2\kappa a \cos 2ka + \cosh 2\kappa a \sin 2ka \\ \beta_2 &= \frac{\eta}{2} \sinh 2\kappa a \end{aligned} \quad (3.61)$$

y, como antes,

$$\epsilon = \frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa}, \quad \eta = \frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}, \quad \alpha_1^2 + \beta_1^2 - \beta_2^2 = 1 \quad (3.62)$$

Podemos ahora escribir, en lugar de (3.60) una relación inversa

$$\begin{pmatrix} A_{n+1} \\ B_{n+1} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} \quad (3.63)$$

donde

$$P = \begin{pmatrix} (\alpha_1 - i\beta_1) \exp(ikl) & -i\beta_2 \exp(ikl) \\ i\beta_2 \exp(-ikl) & (\alpha_1 + i\beta_1) \exp(-ikl) \end{pmatrix} \quad (3.64)$$

Como aplicaremos esta fórmula al potencial periódico infinito, al cabo de n iteraciones aparecerá la potencia enésima de P , P^n , que

debe existir y ser finita en los límites $n \rightarrow \pm\infty$. Para analizar esto, consideremos la ecuación de autovalores de P escrita en la forma

$$p^2 - p \operatorname{tr} P + \det P = 0 \quad (3.65)$$

que toma en este caso la forma

$$p^2 - 2(\alpha_1 \cos kl + \beta_1 \sin kl)p + 1 = 0 \quad (3.66)$$

Sus raíces son

$$p^\pm = \frac{1}{2} \left(\operatorname{tr} P \pm \sqrt{(\operatorname{tr} P)^2 - 4} \right) \quad (3.67)$$

Para el caso en que las dos raíces son distintas tendremos dos autovectores linealmente independientes y dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de Schrödinger. Si identificamos estos autovectores con los valores iniciales,

$$P \begin{pmatrix} A_0^\pm \\ B_0^\pm \end{pmatrix} = p^\pm \begin{pmatrix} A_0^\pm \\ B_0^\pm \end{pmatrix} \quad (3.68)$$

tendremos para los coeficientes n -ésimos

$$P \begin{pmatrix} A_n^\pm \\ B_n^\pm \end{pmatrix} = p^{\pm n} \begin{pmatrix} A_0^\pm \\ B_0^\pm \end{pmatrix} \quad (3.69)$$

En el caso en que $|\operatorname{tr} P| > 2$, p^+ y p^- son reales y o bien $\lim_{n \rightarrow \infty} |p^{\pm n}| \rightarrow \infty$ o bien $\lim_{n \rightarrow -\infty} |p^{\pm n}| \rightarrow \infty$ con lo que tal solución debe ser descartada. Luego, para que la solución sea aceptable debe cumplirse que

$$\frac{1}{2} |\operatorname{tr} P| = |\alpha_1 \cos kl + \beta_1 \sin kl| \leq 1 \quad (3.70)$$

Cuando valga esta condición, definiremos un parámetro K a través de la relación

$$\cos Kl = \alpha_1 \cos kl + \beta_1 \sin kl \quad (3.71)$$

lo que nos permite escribir

$$p_+ = \exp(iKl), \quad p_- = \exp(-iKl) \quad (3.72)$$

La forma explícita de K en términos de los parámetros del potencial es

$$\cos Kl = \cosh 2\kappa a \cos 2kb + \frac{\epsilon}{2} \sinh 2\kappa a \sin 2kb \quad (3.73)$$

Siendo $|\cosh 2\kappa a| \geq 1$ todos los valores de la energía para los cuales $|\cos 2kb| = 1$ están prohibidos o corresponden al borde de una “banda de energía”. La condición para el coseno implica


$$2kb = N\pi, \quad N \in \mathbb{Z} \quad (3.74)$$

Por continuidad de la función de onda y sus derivadas concluimos que en la vecindad de cada uno de los valores discretos habrá rangos prohibidos.

Los valores permitidos de la energía pueden ser calculados de (3.71) en términos de las constantes del potencial y de $k = \sqrt{2mE}$. Se muestra en la figura siguiente un gráfico de E como función del parámetro K viéndose que el espectro consiste de bandas de niveles de energía separados por brechas o saltos (usualmente llamados por el término inglés *gaps*) prohibidos.

En lo que respecta a las funciones de onda, en los valles toman la forma (3.55) y los coeficientes de las dos soluciones fundamentales con la misma energía están dados por

$$\begin{pmatrix} A_n^+ \\ B_n^+ \end{pmatrix} = \exp(inKl) \begin{pmatrix} A_0^+ \\ B_0^+ \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} A_n^- \\ B_n^- \end{pmatrix} = \exp(inKl) \begin{pmatrix} A_0^- \\ B_0^- \end{pmatrix} \quad (3.75)$$



Como el problema presenta una invarianza frente a inversiones temporales (lo que equivale a una conjugación en la ecuación de Schrödinger

dependiente del tiempo), puede suponerse que

$$\frac{A_0^-}{B_0^-} = \left(\frac{B_0^+}{A_0^+} \right)^* \quad (3.76)$$

(en el lado derecho el cociente aparece invertido ya que la conjugación invierte el rol de los coeficientes).

De la ecuación de autovalores para P se tiene que

$$\frac{A_0^+}{B_0^+} = \frac{\beta_2 \exp(ikl)}{\alpha_1 \sin kl - \beta_1 \cos kl - \sin Kl} \quad (3.77)$$

A partir de estos resultados podemos ya construir las funciones de onda que toman la forma siguiente

$$\begin{aligned}
\psi^+ &= (\psi^-)^* \\
&= \exp(inKl) \left(\beta_2 \exp(ik[x - (n - \frac{1}{2})l]) \right) \\
&+ (\alpha_1 \sin kl - \beta_1 \cos kl - \sin Kl) \exp(-ik[x - (n - \frac{1}{2})l])
\end{aligned} \tag{3.78}$$

para $a - l < x - nl < -a$. Podemos escribir de manera compacta

$$\psi^+ = (\psi^-)^* = \exp(iKx)u_K(x) \tag{3.79}$$


donde u_K es una función periódica

$$u_K(x + l) = u_K(x) \tag{3.80}$$

Dentro de las barreras las ondas planas son reemplazadas por exponenciales crecientes y decrecientes.

Las dos soluciones $\psi^\pm$ son linealmente independientes salvo cuando $Kl = N\pi$ ya que en esos valores se vuelven idénticas. Para estos valores de K el paréntesis del exponencial negativo se hace igual al del positivo y la solución representa ondas estacionarias.

En la figura siguiente se representa la densidad de probabilidad $|\psi|^2$ para un potencial periódico en el caso en que $E = V/2$. La curva consiste en una sucesión alternada de funciones trigonométricas e hiperbólicas unidas de manera suave en las discontinuidades de V .



Apéndice: Breve descripción del problema de Sturm Liouville

La ecuación de Sturm-Liouville es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, de la forma

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{df}{dx} \right] + q(x)f = -\lambda \rho(x)f \quad (3.81)$$

donde f es una función de la variable real x . Las funciones $p(x)$, $q(x)$ y $\rho(x) > 0$ son dadas a priori. En el caso más simple los coeficientes son continuos en un intervalo cerrado finito $[a, b]$, y p tiene derivada continuas.

En general la función f debe satisfacer ciertas condiciones de contorno en los puntos $x = a$ y $x = b$. La función $\rho(x)$ es llamada “peso” o “densidad”

Se trata de un problema de autovalores y puede demostrarse que:

Para condiciones dadas en a, b los autovalores λ de la ecuación (3.81), ordenados respecto a su valor forman una secuencia numerable $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 \dots$ y el correspondiente sistema de autofunciones $f_1, f_2, f_3, \dots$ es un conjunto completo ortogonal normalizado según

$$\int_a^b dx \rho(x) f_n(x) f_m(x) = \delta_{mn} \quad (3.82)$$

Más aun, toda función continua $F(x)$ con derivadas primera y segunda continuas a trozos y que satisface las condiciones de contorno del problema de autovalores puede ser desarrollada en una serie absoluta y uniformemente convergente,

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n f_n(x), \quad c_n = \int_a^b \rho F(x) f_n(x) \quad (3.83)$$

Todos los autovalores de la ecuación Sturm-Liouville son simples, es decir que no existen dos autofunciones linealmente independientes con el mismo autovalor (excepto cuando se trata de condiciones de contorno periódicas).

Las ecuaciones de Bessel y de Legendre son casos típicos del problema de Sturm-Liouville.

Clase 4

Propiedades generales de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión

Vimos que la ecuación de Schrödinger para una partícula de masa m en un potencial $V(x)$ en una dimensión espacial toma la sencilla forma

$$\psi''(x) + (\varepsilon - U(x))\psi(x) = 0 \quad (4.84)$$

donde

$$\varepsilon = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad U(x) = \frac{2mV(x)}{\hbar^2} \quad (4.85)$$

con E la energía. En este caso el operador diferencial que aparece en la ec.(4.84)

$$\frac{d^2}{dx^2} + (\varepsilon - U(x)) \quad (4.86)$$

es real pero está aplicado a una función compleja de manera que tal ecuación es satisfecha separadamente por las partes real e imaginaria. En lo que sigue trataremos entonces solo la parte real de la función de onda ya que todas nuestras conclusiones pueden extenderse trivialmente a la parte imaginaria. Antes de comenzar el análisis del tipo de soluciones de esta ecuación, definiremos


Estado ligado: aquel en que la probabilidad de que las coordenadas de la partícula sometida al potencial $V(x)$ puedan tomar un valor infinito es nula. Un estado ligado es entonces uno en el que la dinámica de la partícula está restringida a una región finita del espacio de volumen $\mathcal{V}$.

Puede probarse que los estados ligados tienen un espectro discreto. Esto tiene que ver con el hecho de que las soluciones de la ecuación de Schrödinger que corresponden al espectro discreto se anulan fuera de un volumen finito y eso solo puede suceder para ciertos valores de la energía a los que llamamos espectro discreto. La prueba de esta afirmación es muy elaborada y puede encontrarse por ejemplo en el libro de trabajos recopilados por James Glimm y Arthur Jaffe en un libro de Teoría cuántica de campos constructiva³⁶.

Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimension para un caso genérico de potencial, como el de la figura que sigue. Si el potencial se mantiene finito en todo su dominio, la función de onda será finita. Su concavidad dependerá del signo de $U(x) - \varepsilon$. Analicemos a continuación las distintas posibilidades:

Caso I

Consideremos un potencial genérico, con un mínimo U_{min} y el caso en que la energía de la partícula es tal que $\varepsilon < U_{min}$ en todo el dominio.



³⁶J. Glimm, A. Jaffe, *Collected papers, Volume 2: Constructive Quantum Field Theory*, pág. 590, Birkhauser, Boston, 1985.

En estas condiciones, vemos de la ecuación (4.84) que

$$\frac{\psi''}{\psi} = U(x) - \varepsilon > 0$$


lo que implica que si

$$\psi > 0 \Rightarrow \psi'' > 0$$

o si

$$\psi < 0 \Rightarrow \psi'' < 0$$

Las posibles formas funcionales de la función de onda que caracteriza el estado de la partícula con energía ε son entonces las de la figura siguiente. En ella vemos que en ningún caso la función de onda va a cero en $\pm\infty$. Luego ψ no es una función de cuadrado integrable y la partícula descrita por tal función de onda no puede estar localizada en un lugar finito del espacio pues la probabilidad de encontrarla fuera de ese lugar es siempre infinita.



Concluimos entonces del análisis de este Caso 1 que:

- si $\varepsilon < U_{min}(x)$ no hay estados ligados.

No existen estados ligados con energía menor que el mínimo del potencial

Aún considerando paquetes de onda como estudiamos en el caso de una partícula libre, de manera de hacer finita a la probabilidad de encontrar a la partícula en una región finita, al pasar el tiempo la región de localización se mueve hacia el infinito. Para ver esto, consideremos un tal paquete. En este problema en una dimensión espacial, en lugar de utilizar la variable de impulso k para hacer la superposición, emplearemos la energía $E = \hbar^2 k^2 / 2m^2$ lo que simplifica el análisis que no se trata de un vector de onda con 3 componentes,

$$\psi(x, t) = \int dE C(E) \exp(-\frac{i}{\hbar} Et) \psi_E(x) \quad (4.87)$$

con $C(E)$ adecuadamente elegida para tratar de hacer converger a la probabilidad. Pero tenemos que

$$|\psi|^2 = \int dE dE' C^*(E') C(E) \exp(-\frac{i}{\hbar} (E - E')t) \psi_{E'}^*(x) \psi_E(x) \quad (4.88)$$

Si ahora promediamos en el tiempo durante un intervalo $(-T, T)$

$$\widehat{|\psi|^2} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T dt |\psi|^2 \quad (4.89)$$

es fácil ver que al tomar el límite $T \rightarrow \infty$ la integral en la variable t resulta proporcional a la δ de Dirac, con lo que $E = E'$ y se tiene en región de volumen finito del espacio

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \widehat{|\psi|^2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\pi \hbar}{T} \int_{V \text{ finito}} dE |C(E)|^2 |\psi_E(x)|^2 = 0 \quad (4.90)$$


Caso 2, $\varepsilon > U_{\min}(x)$

Caso 2a: $\varepsilon < 0$

Vemos en la figura de la página siguiente que en (a, b) , $\varepsilon > U$ y fuera de (a, b) , $\varepsilon < U$. En (a, b) , como $U - \varepsilon < 0$ ψ'' y tienen distinto signo

$$\frac{\psi''}{\psi} < 0$$

Puede suceder como en la figura superior que la función de onda que cumple con tal condición resulta no ser de cuadrado integrable. Pero también podemos tener un caso en que la función de onda se acomode como en el dibujo inferior y resulte de cuadrado integrable. En tal caso tenemos un estado ligado que está localizado en el intervalo (a, b) .



Caso 2b: $\varepsilon > 0, \varepsilon > U_{max}$

Dado que tenemos $U < \varepsilon$ y energía positiva, la ecuación

$$\psi'' = (U - \varepsilon)\psi$$

tiene solo soluciones con un comportamiento ondulatorio. No hay entonces estados ligados.

Antes de resumir lo que hemos aprendido para el caso de una partícula en presencia de un potencial que depende de una sola coordenada, reveamos lo que ya conocemos sobre el movimiento de una partícula libre en que la ecuación de Schrödinger se reduce a

$$\psi'' = -\varepsilon\psi$$

y las soluciones son ondas planas

$$\psi = A \exp(ikx) + B \exp(-ikx)$$

con $k^2 = \varepsilon$. Dimos por sentado siempre que $\varepsilon > 0$. Si no ocurriera, k no sería real y entonces la función de onda podría estar localizada. Pero entonces estaría ligada y esto es absurdo pues se trata de una partícula libre, es decir no ligada por potencial alguno. Luego la energía de una partícula libre es siempre, como en el caso clásico, positiva. El espectro de valores posibles para la energía se extiende en este caso desde 0 hasta ∞ .

Ahora consideremos el caso en que la partícula está sometida a un potencial que va a cero en el infinito y que tiene un mínimo negativo. Si la energía es $U_{min} < E < 0$ se trata de estados ligados y se puede mostrar que el espectro es discreto. Si el potencial fuera siempre positivo, no puede haber estados ligados en este caso aún para energías negativas (Notar la diferencia entre el pozo de profundidad infinita cuya altura crecía más y más y los potenciales que discutimos arriba, de profundidad finita en los que el nivel de referencia es elegido en la región asintótica que es donde el potencial tiende a cero. Es fácil ver que

Los autovalores del espectro discreto en una dimensión espacial son no degenerados.

Supongamos que sucediera lo contrario. Entonces para un dado problema existirían dos soluciones con la misma energía ε

$$\frac{\psi_1''}{\psi_1} = (U - \varepsilon) = \frac{\psi_2''}{\psi_2} \quad (4.91)$$

o

$$\psi_1''(x)\psi_2(x) - \psi_2''(x)\psi_1(x) = 0 \quad (4.92)$$

Integrando esta ecuación tenemos:

$$\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = C \quad (4.93)$$

El lado izquierdo de esta ecuación es el llamado wronskiano de las soluciones de una ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden. Tiene un rol muy importante para determinar si el conjunto de soluciones de la ecuación generan una base completa para el espacio de funciones.

Como se trata de estados ligados, ambas funciones de onda deben anularse en el infinito por lo que la constante C debe anularse. Luego

$$\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = 0 \Rightarrow \frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2} \quad (4.94)$$

Integrando esta igualdad se llega a que

$$\psi_1(x) = A\psi_2(x) \quad (4.95)$$

La normalización implica que $A = 1$ y las dos funciones de onda coinciden.

Teorema de los nodos: Si el potencial es acotado, la $n + 1$ -ésima autofunción del espectro discreto se anula n veces.

No daremos una demostración completa pero indicaremos cómo puede hacerse. Se comienzan por ordenar los (auto)valores de las energías del espectro discreto:

$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \dots < \varepsilon_n < \dots$$

Para dos energías consecutivas se tiene

$$\begin{aligned} \psi_1'' + (\varepsilon_1 - U)\psi_1 &= 0 \\ \psi_2'' + (\varepsilon_2 - U)\psi_2 &= 0 \end{aligned} \quad (4.96)$$

o multiplicando a la primera por ψ_2 y a la segunda por ψ_1 y restando

$$\psi_2\psi_1'' - \psi_1\psi_2'' = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)\psi_1\psi_2 \quad (4.97)$$

Integrando esta ecuación en (a, b) se tiene:

$$(\psi_2\psi'_1 - \psi_1\psi'_2)\Big|_a^b = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \int_a^b dx \psi_1 \psi_2 \quad (4.98)$$

Supongamos que a, b son dos nodos consecutivos de ψ_1 . En tal caso la fórmula anterior se reduce a

$$\psi_2\psi'_1\Big|_a^b = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \int_a^b dx \psi_1 \psi_2 \quad (4.99)$$

Por tratarse de dos nodos consecutivos en el intervalo (a, b) ψ_1 debe tener en ambos extremos el mismo signo y sus derivadas el signo opuesto:

$$\psi_1 > 0 \text{ en } (a, b) \Rightarrow \psi'_1(a) > 0, \quad \psi'_1(b) < 0 \quad \text{Caso A}$$

$$\psi_1 < 0 \text{ en } (a, b) \Rightarrow \psi'_1(a) < 0, \quad \psi'_1(b) > 0 \quad \text{Caso B}$$

Supongamos que ψ_2 no tuviera nodos en (a, b) . Por ejemplo que fuera siempre positiva. Para el caso A tendríamos

$$\underbrace{\psi_2(b)\psi'_1(b)}_{<0} - \underbrace{\psi_2(a)\psi'_1(a)}_{>0} = \underbrace{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}_{>0} \underbrace{\int_a^b dx \psi_1 \psi_2}_{>0}$$

El lado izquierdo es negativo y el lado derecho es positivo. Esto es absurdo. Luego no puede ser que ψ_2 sea siempre positiva en el intervalo entre dos nodos de ψ_1 . En algún punto debe cambiar de signo por lo que ψ_2 debe tener un nodo entre los dos nodos consecutivos de ψ_1 . El mismo análisis se puede hacer suponiendo a ψ_2 negativa en todo el intervalo y también para el caso B.

Los n_1 nodos de ψ_{n_1+1} dividen al intervalo $(-\infty, \infty)$ en $n_1 + 1$ zonas. En cada una de estas zonas ψ_{n_1+1} tiene un nodo. Usando inducción completa se muestra el teorema para todo n y además establecer que la función de onda $n + 1$ -ésima tiene $n - 1$ nodos.

El oscilador armónico

En mecánica cuántica (y luego en teoría cuántica de campos), los potenciales del tipo oscilador juegan un papel central. Aquí nos referiremos más específicamente al caso en una partícula de masa m está sometida a un potencial tal que su movimiento es un movimiento oscilatorio, periódico que, en el caso armónico, contribuye a la energía total de la partícula con una energía potencial que puede escribirse como

$$V = \frac{1}{2}kx^2 \quad (4.100)$$

También son de interés los potenciales anarmónicos, aquellos cuya energía potencial está dada, por ejemplo, por la expresión

$$V = \frac{1}{2}k(x^2 - a^2)^2 \quad (4.101)$$

Antes de comenzar el estudio cuántico del oscilador armónico en una dimensión, recordaremos brevemente cómo se resuelve el problema en el contexto de la mecánica clásica.

El oscilador clásico en una dimensión espacial

Cuando una partícula de masa m que se mueve en una sola dimensión espacial está sometida a una fuerza proporcional y opuesta a su desplazamiento³⁷,

$$F = -kx \quad (4.102)$$

³⁷Esta forma funcional fue propuesta por quien es considerado el Leonardo de los británicos, Robert Hooke, físico contemporáneo de Isaac Newton. Hooke fue quien acuñó la palabra “célula” para el constituyente (más pequeño, según se entendía en su época) de los seres vivos, diseñó el Observatorio de Greenwich y concibió otras importantes obras arquitectónicas. Como temía que otros pudieran apoderarse de sus descubrimientos en las más diversas ramas del conocimiento, utilizaba anagramas para publicarlos. A la ley del resorte Hooke la publicó en su obra *Helioscopes* en 1676 en forma de un hoy famoso anagrama,

ceiinossttuv

Reveló su contenido solo un par de años más tarde en otra obra, *De Potentia Restitutiva*, traducida al inglés como *Of Spring*. El anagrama original significaba

Ut Pondus sic Tensio

como el peso, así la tensión

la segunda ley de Newton toma la forma

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \quad (4.103)$$

cuyas soluciones son

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \quad (4.104)$$

con

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (4.105)$$

con ω la frecuencia angular del movimiento oscilatorio. La energía potencial asociada con la fuerza (4.102) es

$$V(x) = \frac{1}{2} kx^2 \quad (4.106)$$

El tratamiento cuántico del oscilador armónico

Cuánticamente, debemos resolver la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo para la energía potencial (4.106)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + \frac{1}{2} kx^2 \psi(x) = E \psi(x) \quad (4.107)$$

Una propiedad importante a la que volveremos más adelante tiene que ver con que el potencial es una función par de x . En general, cuando

pero en lenguaje más moderno se lo describa como

Ut tensio sic vis

Como la extensión, así la fuerza

No existe imagen de cómo era Hooke porque Newton, con quien tuvo innumerables disputas científicas, se ocupó que nada quedara de él a su muerte. De hecho, cuando presidía la Royal Society, Newton logró que el único cuadro de Hooke se “perdiera” en una mudanza de sede... Entre esas disputas se cuenta una sobre la paternidad de la ley de gravitación, otra sobre óptica -Newton pensaba que los colores se combinaban para formar la luz, Hooke que los colores eran una distorsión de la luz... Se reconciliaron epistolarmente varias veces (fue en una de esas cartas que Newton escribió su famosa frase “If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants.”). Pero el enfrentamiento solo terminó con la muerte de Hooke.

$V(x) = V(-x)$, si $\varphi(x)$ es una solución $\varphi(-x)$ también lo es y por lo tanto las combinaciones pares e impares,

$$\begin{aligned}\psi_p(x) &= \frac{1}{2}(\varphi(x) + \varphi(-x)) \\ \psi_i(x) &= \frac{1}{2}(\varphi(x) - \varphi(-x))\end{aligned}\quad (4.108)$$

también lo son. Se habla entonces de estados de paridad par e impar respecto a la transformación $x \rightarrow -x$ (si se tratar de un sistema en tres dimensiones espaciales, la transformación sería $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$). Para construir soluciones generales de la ecuación de Schrödinger es claro que uno se puede restringir a estudiar las autofunciones que son pares y a las que son impares separadamente.

Comencemos por definir

$$u = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \quad (4.109)$$

y proponer una solución de la forma

$$\psi = \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)\chi(u) \quad (4.110)$$

Con esto, la ecuación a resolver en términos de la nueva incógnita $\chi(u)$ toma la forma

$$\chi''(u) + 2\lambda\chi(u) - 2u\chi'(u) = 0 \quad (4.111)$$

con

$$2\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} - 1 \quad (4.112)$$

y $u'' = d^2\chi/du^2$. Proponemos ahora un desarrollo en serie para χ con solo potencias positivas o nula de u de manera de asegurar una solución regular en el origen, como debe serlo la función de onda,

$$\chi = \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n \quad (4.113)$$

La relación de recurrencia que resulta de reemplazar (4.113) en (4.111) es:

$$a_{n+2} = 2 \frac{(n-\lambda)}{(n+1)(n+2)} a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.114)$$

Quedan dos coeficientes indeterminados, a_0 y a_1 , como corresponde a una ecuación de segundo orden que en tanto que tal requiere de dos condiciones de contorno. Conocidos estos dos coeficientes, la relación de recurrencia permite calcular todos los restantes.

Estudiemos el comportamiento de dos coeficientes consecutivos para n grande. Se tiene

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} \sim \frac{2}{n}, \quad n \gg 1 \quad (4.115)$$

Pero este es justamente el comportamiento de los coeficientes b_n del desarrollo en serie de $\exp(u^2)$:

$$\exp(u^2) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n u^n, \quad \frac{b_{n+2}}{b_n} \sim \frac{2}{n} \quad \text{si } n \gg 1 \quad (4.116)$$

Siendo los coeficientes con $n \gg 1$ aquellos que dominan a grandes distancias, si se aceptara la serie infinita (4.113) como solución, ψ se comportaría entonces de la siguiente manera:

$$\psi \sim \exp\left(\frac{u^2}{2}\right) \quad \text{cuando } u \rightarrow \infty \quad (4.117)$$

Un comportamiento así no es aceptable en mecánica cuántica por lo que la serie (4.113) deberá interrumpirse para algún valor de n finito. La solución no será entonces una serie infinita sino un polinomio; pero para que esto suceda, debe ser, según (4.114)

$$n = \lambda$$

o, utilizando (4.112),

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \quad (4.118)$$

Vemos que se tiene espectro discreto, con niveles igualmente espaciados,

$$E_{n+1} - E_n = \hbar \omega$$

siendo la energía del estado fundamental (i.e. el de energía más baja)

$$E_0 = \frac{\hbar \omega}{2} \quad (4.119)$$

Como en el caso del pozo infinito, son las condiciones de contorno necesarias para que la función de onda sea de cuadrado integrable las que fuerzan la cuantificación de la energía.

Debe remarcarse que, clásicamente, el estado de energía más baja corresponde al caso en que la partícula se encuentra en reposo ($p = 0$) en $x = 0$. Pero en mecánica cuántica no podemos asegurar con certeza absoluta tal impulso y tal posición pues:

$$\Delta x \Delta p \sim \hbar \quad (4.120)$$

No podemos entonces afirmar, en el marco de la mecánica cuántica, que la energía de la partícula sea más baja que $\bar{E}$,

$$\bar{E} = \frac{\Delta p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \Delta x^2 \quad (4.121)$$

Usando (4.120) podemos poner todo en términos de Δp ,

$$\bar{E} = \frac{\Delta p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \frac{\hbar^2}{\Delta p^2} \quad (4.122)$$

Busquemos el mínimo valor posible de $\bar{E}$ como función de Δp :

$$\frac{\partial \bar{E}}{\partial \Delta p} = 0 \Rightarrow \Delta p^2 = m\omega\hbar \quad (4.123)$$

Con esto, el mínimo de $\bar{E}$ deviene

$$\bar{E}_{min} \simeq \hbar\omega \quad (4.124)$$

que es un valor del orden del nivel de energía más bajo que encontramos resolviendo la ecuación de Schrödinger.

Los polinomios solución de la ecuación diferencial habían sido estudiados en la segunda mitad del siglo 19 por los matemáticos Pafnuty Chebychev y Charles Hermite³⁸ y suele llamárselos polinomios de Hermite. Como es costumbre, los anotaremos H_n . Si escribimos la solución

³⁸Notablemente, ambos matemáticos, uno ruso (1821-1894) y el otro francés (1822-1901) tenían problemas de renguera. Esto hizo que el ruso no pudiera jugar demasiado con otros niños de su edad y se concentrara, desde la infancia, en las matemáticas. Y que el francés no fuera aceptado como alumno en la prestigiosa Ecole Polytechnique, a la que solo pudo volver como profesor.

en la forma

$$\psi_n(x) = C_n \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right) \quad (4.125)$$

con C_n una normalización adecuada, tendremos

$$\begin{aligned} H_{2k}(u) &= (-1)^k \frac{(2k)!}{k!} v_1(u; k) \\ H_{2k+1}(u) &= (-1)^k \frac{2(2k+1)!}{k!} v_2(u; k) \end{aligned} \quad (4.126)$$

Terminamos dando una lista de algunos polinomios de Hermite:

$$\begin{aligned} H_0(u) &= 1 & H_3(u) &= -12u + 8u^3 \\ H_1(u) &= 2u & H_4(u) &= 12 - 48u^2 + 16u^4 \\ H_2(u) &= -2 + 4u^2 & H_5(u) &= 120u - 160u^3 + 32u^5 \end{aligned} \quad (4.127)$$


Conociendo los polinomios de Hermite, podemos construir las funciones de onda de la partícula de masa m sometida a un potencial de oscilador armónico, en un autoestado de energía E_n utilizando la formula (4.110),

$$\psi_n(u) = C_n \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right) \quad (4.128)$$

con C_n una adecuada constante de normalización. Por ejemplo, tendremos

$$\begin{aligned} \psi_0(x) &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \\ \psi_1(x) &= \left(\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^3\right)^{1/4} x \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \\ \psi_2(x) &= \left(\frac{m\omega}{4\pi\hbar}\right)^{1/4} \left(2\frac{m\omega}{\hbar}x^2 - 1\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \end{aligned} \quad (4.129)$$

Gráficamente tendremos



Clase 5

La aproximación semiclásica

Discutiremos en esta clase una manera aproximada de resolver la ecuación de Schrödinger originada en ideas propuestas en 1912 por Lord Raleigh (John William Strutt hasta 1873; recibió el premio Nobel de Física por descubrir el Argón en 1904). Fue aplicada a la resolución de ecuaciones diferenciales por H. Jeffreys en 1923 y desarrollada independientemente por Léon Brillouin, Hendrik Kramers y Gregor Wentzel en 1926 para construir soluciones de la ecuación de Schrödinger.

El método se conoce a veces como *método BKW* (o alternativamente *WKB* o *KBW* si la nacionalidad de quien usa el nombre no es francesa como la de Marcel Louis Brillouin sino alemana como la de Gregor Wentzel u holandesa como la de Hendrik Kramers). Estos tres autores, de manera independiente y con ligeras variaciones fueron los creadores del método que hoy lleva sus iniciales³⁹.

A fines de la década de 1970, en el marco de la cuantificación vía el método de la integral funcional se logró generalizar el método semiclásico WKB para aplicarlo a las teorías de campos cuánticos con las que se han unificado tres de las cuatro interacciones fundamentales. En particular, se estudió el confinamiento de los quarks de las

³⁹L. Brillouin, “*La mécanique ondulatoire de Schrödinger; une méthode générale de résolution par approximations successives*”, C. r. hebd. séances Acad. sci., **183** (1926) 24. G. Wentzel, “*Eine Verallgemeinerung der Quantenbedingungen für die Zwecke der Wellenmechanik*” (*Una generalización de las condiciones cuánticas a los efectos de la mecánica ondulatoria*), Z. Physik, **38** (1926) 518.

H. A. Kramers, “*Wellenmechanik und halbzahlige Quantisierung*” (*La mecánica cuántica y la cuantificación semientera*), Z. Physik, **39** (1926) 828.

interacciones fuertes a partir de la cuantificación de soluciones clásicas llamadas solitones (de energía finita y localizadas en el espacio) e instantones (de acción finita y localizados en el espacio-tiempo) ideas que no pueden ser testeadas en la formulación canónica de las teorías de campos.

Volviendo a la mecánica cuántica, para evitar discusiones sobre el orden de las iniciales del acrónimo la llamaremos *aproximación semiclásica* pues, como veremos, el método consiste en ir mejorando la aproximación con términos de un desarrollo en potencias crecientes de $\hbar$. De hecho veremos que la serie de potencias debe comenzar al menos en un orden $\hbar^{-1}$ para satisfacer la ecuación de Schrödinger de manera que tanto la parte real como la parte imaginaria de la función de onda tengan expansión en que aparecen términos $1/\hbar$. Es decir, casos en que la solución toma la forma de una serie asintótica en ese límite⁴⁰

$$\begin{aligned}\mathcal{R}e\psi &= \frac{1}{\hbar} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \hbar^n \\ \mathcal{I}m\psi &= \frac{1}{\hbar} \sum_{n=0}^{\infty} b_n \hbar^n\end{aligned}\tag{5.130}$$

Vimos que en el caso en que $\hbar \rightarrow 0$ corresponde al límite clásico y que Dirac había relacionado en ese límite a la función de onda con la acción asociada a la ecuación de Schrödinger,

$$\psi \sim A \exp\left(\frac{i}{\hbar}S\right)\tag{5.131}$$

Veremos de qué manera que el método semiclásico WKB corresponde a ir más allá de esta fórmula.

⁴⁰Una serie asintótica o de Stieltjes-Poincaré (fueron Thomas Stieltjes y Henri Poincaré quienes las introdujeron, el primero en sus trabajos sobre el problema de N cuerpos en mecánica celeste) es una serie formal de funciones que tiene la propiedad de que al cortar la serie a partir de un número finito de términos, se obtiene una aproximación de la función cuando su argumento tiende a un valor particular, generalmente infinito. Debe notarse que el límite formal de la serie cuando se suman todos sus elementos de hecho diverge, o sea que no es el resultado obtenido por la serie asintótica.

Th. Stieltjes, Ann. de l'Éc.Nor. **3** (1886)201; H. Poincaré, Acta Math. **8** (1886) 295

Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión espacial,

$$\psi''(x) + (\varepsilon - U(x))\psi(x) = 0 \quad (5.132)$$

donde como siempre hemos escrito

$$\varepsilon = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad U(x) = \frac{2mV(x)}{\hbar^2} \quad (5.133)$$

Si el potencial fuera aproximadamente constante en todo el rango, $U(x) \approx \tilde{U}$, con $\tilde{U}$ constante sería razonable aproximar ψ por una onda plana

$$\psi(x) = \exp(\pm i(\varepsilon - \tilde{U})^{1/2}x) \quad (5.134)$$

que corresponde a una solución exacta en el caso en que el potencial fuera constante en todo el espacio (no incluimos su amplitud). Para potenciales que no varían demasiado es natural entonces proponer el siguiente cambio de variables

$$\psi(x) = \exp(iu(x)) \quad (5.135)$$

con lo que el problema pasa a ser el de determinar la función $u(x)$. Introduciendo (5.135) en la ec.(5.132) se tiene

$$iu''(x) - u'^2(x) + k^2(x) = 0 \quad (5.136)$$

con $k(x)$ definida como

$$k^2(x) = \varepsilon - U(x) \quad (5.137)$$

Según sea la relación entre la energía y el potencial escribiremos

$$k(x) = \sqrt{\varepsilon - U} \quad \text{si } \varepsilon > U \quad (5.138)$$

$$k(x) = i\sqrt{U - \varepsilon} \quad \text{si } \varepsilon < U \quad (5.139)$$

Podría pensarse que el hecho de haber pasado de la ecuación lineal de Schrödinger para ψ a la ecuación no lineal (5.136) para $u(x)$ ha complicado el problema pero justamente tal no linealidad es la que nos permitirá desarrollar un método de aproximación muy efectivo (esto ya

fue utilizado cuando estudiamos el oscilador armónico, solo que en ese caso se encontró la solución “exacta”).

Para comenzar, notemos que si el potencial fuera exactamente constante y $\varepsilon > \tilde{U}$, se tendría que $k(x) = k = \text{constante}$ y $u = kx$. La expresión (5.135) resultaría entonces una onda plana,

$$\psi = \exp(\pm ikx) \quad (5.140)$$

es decir, ondas planas para el caso en que $k(x)$ es la constante que llamamos número de onda. Por ello, en general, se puede pensar a $k(x)$, cuando el potencial no varía demasiado, como un “número de onda que depende suavemente de la posición”.

Ahora bien, cuando $u = \pm kx$ resulta que $u'(x) = \pm k$ y $u'' = 0$. Entonces si el potencial es “suavemente” variable podemos escribir en primera aproximación $u_0''(x) = 0$ con lo que la ecuación (5.136) se reduce a

$$u_0'(x) = \pm k(x) \quad (5.141)$$

o

$$u_0(x) = \pm \int^x dx' k(x') + C_0 \quad (5.142)$$

Entonces, a este orden “cero” en la aproximación, la solución puede escribirse así:

$$\psi_0 = A_+ \exp\left(i \int^x dx' k(x')\right) + A_- \exp\left(-i \int^x dx' k(x')\right) \quad (5.143)$$

Para mejorar esta aproximación busquemos una solución $u_1(x)$ más precisa utilizando para $u''(x)$ en (5.136) el valor correspondiente a la solución “de orden cero” u_0 (en lugar de anularla como hicimos en el orden más bajo):

$$u_1'^2(x) = k^2(x) + iu_0''(x) = k^2(x) \pm ik'(x') \quad (5.144)$$

Por integración es fácil obtener la solución de orden 1:

$$u_1(x) = \pm \int^x dx' \sqrt{k^2(x') \pm ik'(x')} + C_1 \quad (5.145)$$

En esta ecuación los dobles signos deben ser tomados por consistencia iguales a los que se tomaron en u_0 de manera que u_1 de realmente una mejor aproximación a u_0 .

Ya a esta altura podemos poner en términos más precisos la condiciones de validez de la aproximación. Comparando u_0 y u_1 vemos que la aproximación será válida si

$$|k'| \ll |k^2| \quad (5.146)$$

Ahora bien, derivando la ecuación (5.138) y ligando el resultado a objetos clásicos se tiene que

$$k'(x) = -\frac{m}{\hbar^2 k} V'(x) = \frac{mF}{\hbar p} \quad (5.147)$$

con $p = \hbar k$. Con esto, la condición (5.146) deviene

$$\left| \frac{\hbar m F}{p^3} \right| \ll 1 \quad (5.148)$$

O sea que la aproximación es válida para impulsos $|p|$ grandes. En las regiones en que fuerza e impulso son pequeños (en lo que en mecánica clásica llamamos *puntos de retorno* del potencial), la aproximación deja de ser buena. Si asociamos una longitud de onda λ a la partícula de masa m con número de onda k , $k = 2\pi/\lambda$, vemos que la condición (5.146), que se puede escribir como

$$|(\frac{1}{k})'| \ll 1 \quad (5.149)$$

implica

$$|\frac{d\lambda}{dx}| \ll 2\pi \quad (5.150)$$

o sea que la aplicabilidad del método semiclásico también puede verse como dependiendo de que no haya cambios apreciables en la escala de la longitud de onda de la partícula. Volviendo a (5.145), podemos escribir

$$u_1(x) = \pm \int^x dx' k(x') \sqrt{1 \pm i \frac{k'(x')}{k^2(x')}} + C_1 \quad (5.151)$$

Ahora, si la desigualdad (5.146) es válida, podemos desarrollar la raíz cuadrada y obtenemos

$$u_1(x) = \pm \int^x dx' k(x') + \frac{i}{2} \log k(x) + C_1 \quad (5.152)$$

(notar que el segundo término de la derecha tiene signo definido pues proviene de multiplicar entre sí dos $\pm$).

La solución aproximada de la ecuación de Schrödinger toma entonces la forma

$$\psi_1(x) = \tilde{C}_+ \frac{1}{\sqrt{k}} \exp(+i \int^x dx' k(x')) + \tilde{C}_- \frac{1}{\sqrt{k}} \exp(-i \int^x dx' k(x')) \quad (5.153)$$

Vemos que la solución de orden cero dada por la ec.(5.143) se ve corregida por el factor $1/\sqrt{k}$ delante de cada exponencial.

A esta altura podemos reintroducir la constante de Planck $\hbar$ recordando que para la onda plana se relacionaba el número de onda k con el autovalor de impulso p según la definición $p = \hbar k$. En este caso escribiremos $p(x) = \hbar k(x)$ con lo que se tiene de (5.138)

$$\frac{p(x)^2}{2m} = E - V(x) \quad (5.154)$$

La ecuación (5.153) toma así la forma

$$\psi(x) = C_+ \frac{1}{\sqrt{p}} \exp(+\frac{i}{\hbar} \int^x dx' p(x')) + C_- \frac{1}{\sqrt{p}} \exp(-\frac{i}{\hbar} \int^x dx' p(x')) \quad (5.155)$$

Lo primero a notar de la solución (5.155) es que $|\psi|^2 \propto 1/p$. Si pensamos que a nivel clásico el tiempo dt en que podemos encontrar a la partícula clásica en la región dx es $dt \propto (1/p)dx$ resulta razonable que la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula cuántica en la región dx obedezca la misma relación, $|\psi|^2 dx \propto (1/p)dx$. También podemos señalar que dado que el Lagrangiano clásico de una partícula con impulso p y hamiltoniano H es

$$L = p\dot{x} - H \quad (5.156)$$

resulta, de integrar sobre t , una acción de la forma


$$S = \int p dx - Et \quad (5.157)$$

Vemos entonces que los argumentos en los exponenciales de la solución (5.155), que es una solución independiente del tiempo, corresponden al

primer término de la acción de la partícula según (5.157). En cuanto al segundo término de esta fórmula, se corresponde con la dependencia temporal de la función de onda, $\exp(-iET/\hbar)$ que separamos al enfrentar la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Como anunciamos al comenzar la clase, nos encontramos entonces con la fórmula propuesta por Dirac que nos permitió relacionar la ecuación de Schrödinger con la de Hamilton-Jacobi:

$$\psi \sim A \exp\left(\frac{i}{\hbar} S\right) \quad (5.158)$$

Vamos a discutir ahora cómo determinar los coeficientes $C_{\pm}$ de la aproximación WKB de la función de onda, ec. (5.155). Consideremos un potencial como el de la figura siguiente



A la derecha de x_a (como también a la izquierda de x_b) el movimiento clásico de la partícula sería imposible pues la energía total de la partícula es menor que la energía potencial. Cuánticamente ya aprendimos que la probabilidad de encontrar a la partícula en esta región no es nula. En la aproximación WKB la función de onda en la región $x > x_a$ está dada por

$$\psi_d = \frac{C_d}{2\sqrt{|p|}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_a}^x dx' |p(x')|\right) \quad (5.159)$$

(Como la función de onda debe ser de cuadrado integrable, hemos seleccionado, necesariamente, la solución que se anula para $x \rightarrow \infty$.)

En el intervalo (x_b, x_a) tenemos en cambio soluciones oscilatorias

$$\psi(x) = \frac{C_+}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(+\frac{i}{\hbar} \int_{x_a}^x dx' p(x')\right) + \frac{C_-}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_{x_a}^x dx' p(x')\right) \quad (5.160)$$

Ahora, para asegurar el buen comportamiento y derivabilidad de la función de onda debemos relacionar las constantes como lo hicimos en el caso del efecto túnel, utilizando las condiciones de frontera, es decir, conectar el coeficiente en la región $x > x_a$ con los coeficientes $C_{\pm}$ en el intervalo (x_b, x_a) . Con ello, junto al equivalente en la región $x < x_b$ podremos conectar los coeficientes a la izquierda y derecha del potencial, como hicimos por ejemplo en el caso de la barrera cuadrada de potencial.

Pero tal conexión enfrenta el problema de que la región $x \sim x_a$ en la que deberíamos igualar función de onda y derivada a un lado y otro corresponde a los puntos de retorno del potencial, aquellos en los que p es muy pequeño y por ende la aproximación semiclásica se vuelve mala (Recordemos que la ec.(5.148) nos permitió determinar que la aproximación WKB es buena solo para valores de p grandes).

Quienes resolvieron tal conundrum⁴¹ fueron Brillouin, Krammers y Wentzel y este fue su aporte fundamental a un problema matemático que ya había sido resuelto anteriormente en el contexto del estudio de ecuaciones diferenciales⁴².


La solución es la siguiente: en lugar de utilizar la variable real x , trabajaremos con una variable compleja z cuya parte real sea x . De esta manera, al acercarnos a la región “prohibida” en el entorno de x_a , lo haremos siguiendo un camino adecuado que nos permita mantenernos en la zona de validez de la aproximación. Este método es habitual en

⁴¹*conundrum*: cuestión intrincada cuyo origen burlesco imita una palabra que proviene de una supuestamente latina.

⁴²Se considera que Joseph Liouville y George Green fueron quienes establecieron originalmente el método en 1837, por lo que en textos de matemática se lo conoce como método de Liouville-Green o método LG. Las publicaciones son: J. Liouville, *Sur le développement des fonctions et séries*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 1 (1837) 16; G. Green, *On the motion of waves in a variable canal of small depth and width*, Transactions of the Cambridge Philosophical Society. 6 (1837) 457.

el estudio de integrales en un dominio real aprovechando el resultado del teorema de Cauchy para una variable compleja.

Consideremos por ejemplo el camino por el semiplano superior, representado en la figura siguiente:



La idea es que el tramo del camino de integración que es una semicircunferencia evite acercarse al punto de retorno lo suficiente para evitar que la aproximación semiclásica dejara de ser válida.

Reescribamos la solución a la derecha de x_a en términos de energía y potencial:

$$\psi_d = \frac{C_d}{2[2m(V-E)]^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \int_{x_a}^x dx' \sqrt{V(x') - E}\right) \quad (5.161)$$

Al pasar al lado izquierdo por el contorno de la figura, caeremos en el exponencial negativo de la solución válida en el intervalo (x_b, x_a) . En efecto, tenemos, habiendo hecho $x \rightarrow z = x + iy$

$$\exp(\pm iz) = \exp(\pm ix) \exp(\mp y) \quad (5.162)$$

y luego, en el semiplano superior ($y > 0$), el exponencial oscilante positivo correspondería al exponencial real decreciente en y , que es dominado por el creciente en y , correspondiente al oscilante negativo que es el que representa uno de los dos de la solución válida.

Ahora bien, al pasar de derecha a izquierda por el semiplano superior la diferencia $V - E$ cambia de signo ganando una fase π (positiva porque el la semicircunferencia es recorrida en el sentido positivo -contrario a las agujas del reloj- que es de derecha a izquierda). Ello implica que la raíz cuarta en el denominador gana una fase de $\pi/4$ generando un $\exp i\pi/4$ en el denominador. En cuanto al exponencial, pasa, como dijimos de ser real a ser imaginario guardando el signo $-$. Poniendo todo esto junto vemos que por continuidad, los coeficientes C_- y C_d deben estar relacionados según

$$C_- = \frac{C_d}{2} \exp(-i\frac{\pi}{4}) \quad (5.163)$$

Un análisis similar pero eligiendo un camino por el semiplano inferior nos hubiera permitido relacionar a C_d con C_+ a través de una fórmula análoga

$$C_+ = \frac{C_d}{2} \exp(i\frac{\pi}{4}) \quad (5.164)$$

(El signo de la fase es opuesto porque en este caso el recorrido sería negativo dando una fase negativa en el denominador)

Con todo esto podemos escribir a la solución en el intervalo (x_b, x_a) en términos de la constante C_d que caracterizaba a la amplitud de la función de onda a la derecha de x_z

$$\psi(x) = \frac{C_d}{\sqrt{p}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_a}^x dy p(y) + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{C_d}{\sqrt{p}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_a} dy p(y) + \frac{\pi}{4}\right) \quad (5.165)$$

Un análisis similar pero en la región $x < x_b$ nos hubiera llevado a que el coeficiente C_i de la solución a la izquierda de x_b ,

$$\psi_i = \frac{C_i}{2\sqrt{|p|}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_b} dy |p(y)|\right) \quad (5.166)$$

se relaciona con $C_{\pm}$ de manera que la solución (5.165) escribirse:

$$\psi(x) = \frac{C_i}{\sqrt{p}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_b} dy p(y) + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{C_i}{\sqrt{p}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_b}^x dy p(y) + \frac{\pi}{4}\right) \quad (5.167)$$

Vemos que hemos logrado relacionar entre sí a los coeficientes de la solución en las tres regiones que caracterizan al potencial. Si suponemos que se conoce la forma asintótica de la solución a la izquierda del potencial y en particular el coeficiente C_i , podemos entonces, a partir de la ecuación (5.167), conocer en la aproximación dada la solución en la región oscilatoria.

Clase 6

La aproximación BKW es una aproximación semiclásica

Vimos que para problemas en una dimensión espacial, la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo

$$\psi'' + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi = 0 \quad (6.168)$$

podía resolverse de manera aproximada usando un método iterativo, el método semiclásico o método BKW. Para ello se escribía a la función de onda en la forma

$$\psi = \exp(iu(x)) \quad (6.169)$$

de manera de pasar a una ecuación no lineal para $u(x)$

$$iu''(x) - u'^2(x) + \frac{1}{\hbar^2}p^2(x) = 0 \quad (6.170)$$

Hemos llamado $p^2(x)$ a la diferencia entre la energía total y la energía potencial con el factor adecuado como para poder interpretar a la función $p(x)$ como la cantidad de movimiento en el límite clásico ($\hbar \rightarrow 0$):

$$p^2(x) = 2m(E - V(x)) \quad (6.171)$$

Partiendo de una aproximación en la que se despreciaba a u'' (potenciales con variaciones espaciales “suaves”) fuimos iterando (cuando obtuvimos las fórmulas, trabajábamos en términos de $k(x)$, ligado a $p(x)$)

por la típica relación *impulso-número de onda*, $p(x) = \hbar k(x)$,

$$\begin{aligned} u_0 &= \pm \frac{1}{\hbar} \int^x p(y) dy + C_0 \\ u_1 &= \pm \int^x \sqrt{\frac{1}{\hbar^2} p^2 \pm \frac{i}{\hbar} p'} + C_1 \\ &\approx \pm \frac{1}{\hbar} \int^x p(y) dy + \frac{i}{2} \log p + C_1 \\ u_2 &= \dots \end{aligned} \tag{6.172}$$

Es fácil ver que estas iteraciones corresponden a un desarrollo en potencias de $\hbar$ del argumento de la exponencial. (¡Incluida una potencia $\hbar^{-1}$!). En efecto, si escribimos

$$u(x) = \frac{\sigma(x)}{\hbar} \tag{6.173}$$

la ecuación (6.168) deviene

$$i\hbar\sigma''(x) - \sigma'^2(x) + p^2(x) = 0 \tag{6.174}$$

de manera que la aproximación más grosera que consistía en despreciar el término con la derivada segunda corresponde a despreciar el término que tiene un factor de $\hbar$. Luego, si pensamos en un desarrollo en serie de potencias de $\hbar$,

$$\sigma(x) = \sigma_0(x) + \hbar\sigma_1(x) + \hbar^2\sigma_2(x) + \dots \tag{6.175}$$

obtendremos, al insertar (6.175) en (6.174) y comparar potencias de $\hbar$, un resultado idéntico al que resulta de (6.172)

$$\begin{aligned} \sigma_0 &= \int^x p(y) dy \\ \sigma_1 &= \frac{i}{2} \log p \\ \sigma_2 &= \dots \end{aligned} \tag{6.176}$$

Podemos entonces ver a la aproximación BKW como al resultado de considerar, orden a orden, un desarrollo en potencias de $\hbar$, la constante que permite estudiar el límite clásico haciendo $\hbar \rightarrow 0$. Es decir que el

incorporar correcciones en esta aproximación es estar incorporando correcciones “más y más cuánticas” en una aproximación conocida como semiclásica. Recordar que tal aproximación lleva a obtener como resultado una “serie asintótica”. Se trata de series que si bien son divergentes, sus sumas parciales permiten calcular con mucha precisión a la función que se desarrolla.

En el libro “Asymptotic Expansions” de E. Copson que mencionamos en la clase pasada, se da como primer ejemplo la serie infinita obtenida por J. Stirling en 1730 para el $\log(m!)$,

$$\log(m!) = \left(m + \frac{1}{2} \log m\right) - m + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \sum_1^{\infty} \frac{B_{2n}(0)}{(2n-1)(2n)z^{2n-1}} \quad (6.177)$$


donde $z = m + 1/2$ y $B_{2n}(x)$ es el polinomio de Bernoulli definido como

$$\frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \sum_0^{\infty} B_n(x) \frac{z^n}{n!} \quad (6.178)$$

Esta serie es divergente pero Stirling consiguió calcular $\log_{10}(1000!)$, un número entre 2567 y 2568 con 10 decimales tomando solo unos pocos primeros términos de la serie. El error de una suma parcial de esta serie es del orden del primer término omitido y como los términos decrecen muy rápido inicialmente, la suma de unos pocos da una muy buena aproximación.

Regla de Wilson-Ishiwara-Sommerfeld (Bohr-Sommerfeld)

En un pozo de potencial como el que tratamos en la clase pasada,



cuando una partícula de masa m se mueve entre x_a y x_b con energía E , según las leyes de movimiento de la mecánica clásica, el movimiento resultante es periódico con período T , dado por

$$T = 2 \int_{t_b}^{t_a} dt = 2 \int_{x_b}^{x_a} \frac{dx}{v} = 2m \int_{x_b}^{x_a} \frac{dx}{p} \quad (6.179)$$

Nos preguntamos ahora qué sucede con el movimiento de la partícula según las leyes de la mecánica cuántica.

Vimos que a la función de onda en la región (x_b, x_a) la podíamos escribir de dos maneras: en términos del coeficiente C_i , a la izquierda de x_b (ver fórmula (5.34))

$$\psi(x) = \frac{C_i}{\sqrt{p}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_b}^x dy p(y) + \frac{\pi}{4} \right) \quad (6.180)$$

o en términos de C_d , a la derecha de x_a (ver fórmula (5.34)):

$$\psi(x) = \frac{C_d}{\sqrt{p}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_a} dy p(y) + \frac{\pi}{4} \right) \quad (6.181)$$

Para que ambas soluciones sean consistentes debe cumplirse que

1. la suma de las fases que aparecen como argumento en ambos senos, llamémosla α , sea un múltiplo de π , i.e. $\alpha = k\pi$.
2. $C_i = (-1)^k C_d$

Esto implica

$$\frac{1}{\hbar} \int_{x_b}^{x_a} p dx + \frac{\pi}{2} = k\pi \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.182)$$

Nótese que $k = 0$ está excluido pues p es semidefinido positivo en el intervalo (x_b, x_a) . Escribiendo $k = n + 1$ se tiene

$$\frac{1}{\hbar} \int_{x_b}^{x_a} p dx = (n + \frac{1}{2})\pi \quad n = 0, 1, \dots \quad (6.183)$$

Si ahora consideramos el movimiento en que la partícula va de x_b a x_a para luego regresar a x_b tendremos

$$\oint p dx = 2(n + \frac{1}{2})\hbar\pi \quad n = 0, 1, \dots \quad (6.184)$$

o en términos de $h = 2\pi\hbar$,

$$\oint p dx = (n + \frac{1}{2})h \quad n = 0, 1, \dots \quad (6.185)$$

Esta fórmula había sido derivada de manera heurística por Woodrow Wilson, Jun Ishiwara y Arnold Sommerfeld en los inicios de la mecánica cuántica, que hoy llamamos “antigua mecánica cuántica”⁴³. Se la conoce como *regla de cuantificación de Bohr-Sommerfeld*. Permite determinar, en una aproximación semiclásica, los estados estacionarios de la partícula. Cuando Heisenberg concibió en 1925 su trabajo fundacional de la “nueva” mecánica cuántica, comenzó por reemplazar esta fórmula semiclásica heurística por una obtenida a partir de datos empíricos, llamada “regla de suma de Thomas-Kuhn”.

⁴³W. Wilson, “The quantum theory of radiation and line spectra”, Philosophical Magazine 29 ((1915).) 795.

J. Ishiwara, Toyku Sugaku Buturigakkawi 8 (1915)106;163;318.

A. Sommerfeld, “Zur Quantentheorie der Spektrallinien”. Annalen der Physik 51 (1916) 1.

Es fácil ver que el entero n en (6.185) es igual al número de ceros de la función de onda y luego da el número de orden del estado estacionario en cuestión. En efecto, la fase de (6.180) pasa de $\pi/4$ en $x = x_b$ a $\pi/4 + (n + 1/2)\pi = (n + 3/4)\pi$ en $x = x_a$. O sea que el seno se anula n veces en ese intervalo, de acuerdo con lo que aprendimos con el número de nodos de la función de onda del n -ésimo estado estacionario.

La integral $\oint p dx$ lleva el nombre de integral de acción y puede extenderse a cualquier movimiento periódico, apareciendo en ese caso las variables adecuadas y sus momentos conjugados, entrando en juego tantos enteros como coordenadas fueran necesarias.

Notemos finalmente que el área de la curva en el plano (x, p) (el espacio de fases de la mecánica) crece en h al pasar de un estado estacionario al siguiente. Luego podemos concluir que “cada estado estacionario ocupa un área h en el espacio de fases”.

Mecánica cuántica: el formalismo general

Comenzamos aquí una formulación alternativa de la mecánica cuántica en base a postulados más precisos que los establecidos al comienzo del curso. Esta formulación es más cercana a la que originalmente propuso Heisenberg

En los postulados que presentaremos se introducen

- los objetos básicos de la formulación cuántica
- su interpretación física
- las ecuaciones fundamentales que obedecen tales objetos

Enunciaremos primero postulados **a tiempo fijo** para luego considerar la **evolución temporal** del sistema cuántico. Finalmente daremos **las reglas de cuantificación canónica** que nos permitirán hacer contacto con las cantidades físicas que aprendimos a calcular y medir en los cursos de física clásica.

Postulado 1

De los estados cuánticos y del principio de superposición

A todo estado de un sistema físico cuántico, en un instante dado t , le corresponde un vector normado ψ de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$.

nota 1: por abuso de lenguaje se habla de *estado* ψ

nota 2: ψ contiene toda la información accesible del sistema

nota 3: Vector normado quiere decir de norma unitaria, $||\psi|| = 1$, con $|| \cdot ||$ definido de alguna manera. Obviamente importa que la norma $||\psi||$ sea finita, no cuál sea su valor específico.

Un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial, i.e. un espacio donde hay una operación de suma conmutativa y asociativa:

$$\begin{aligned}\psi \oplus \eta &= \eta \oplus \psi \\ \psi \oplus (\eta \oplus \chi) &= (\psi \oplus \eta) \oplus \chi\end{aligned}\tag{6.186}$$

$\psi, \eta, \chi \in \mathcal{H}$

El producto por un complejo $\lambda \in C$ obedece

$$\lambda(\psi \oplus \eta) = \lambda\psi \oplus \lambda\eta \quad (6.187)$$

Existe un “cero”, e , para la suma

$$e \oplus \psi = \psi \quad (6.188)$$

junto a la unidad, I , para el producto

$$I\psi = \psi \quad (6.189)$$

Está dotado ademas de un producto escalar $(\ , \)$:

$$\begin{aligned} (\psi_1, \psi_2) &= (\psi_2, \psi_1)^* \\ (\lambda\psi_1, \psi_2) &= \lambda^*(\psi_1, \psi_2), \quad (\psi_1, \lambda\psi_2) = \lambda(\psi_1, \psi_2) \\ (\psi_1 + \lambda\psi_2, \psi_3) &= (\psi_1, \psi_3) + \lambda^*(\psi_2, \psi_3) \\ \|\psi\|^2 &= (\psi, \psi) \geq 0 \quad (= 0 \Leftrightarrow \psi = 0) \end{aligned} \quad (6.190)$$

Dada la norma de un vector definida como

$$\|\psi\| \equiv +\sqrt{\|\psi\|^2} = +\sqrt{(\psi, \psi)} \quad (6.191)$$

vale la desigualdad de Schwartz (que juega un rol fundamental en relación al principio de incerteza),

$$|(\psi, \eta)| \leq \|\psi\| \|\eta\| \quad (6.192)$$

siendo la igualdad en (6.192) solo válida si y solo si $\psi = \lambda\eta = \eta$ para vectores normados a 1. También podemos definir una “distancia” $d_{\psi\eta}$ entre dos vectores ψ y η

$$d_{\psi\eta} = \|\psi - \eta\| = \sqrt{(\psi - \eta, \psi - \eta)} \quad (6.193)$$


Ademas de las condiciones mencionadas más arriba, para que $\mathcal{H}$ sea un espacio de Hilbert debe ser un espacio completo.

Tomamos una sucesión de elementos $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ todos en $\mathcal{H}$. Será una sucesión de Cauchy si


$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} d_{\psi_m, \psi_n} = 0 \quad (6.194)$$

podemos afirmar entonces que la sucesión de Cauchy converge a un cierto vector ψ y escribir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n = \psi \quad (6.195)$$



Los puntos azules representan una sucesión de Cauchy: todos los términos se acercan unos a otros.



Los puntos azules no representan una sucesión de Cauchy: los términos de algunas sub-sucesiones no se acercan unos a otros.

Entonces, si $\psi \in \mathcal{H}$ para toda sucesión de Cauchy se dice que $\mathcal{H}$ es completo.

Recíprocamente, si todo $\psi \in \mathcal{H}$ es el límite de alguna sucesión de Cauchy, diremos que $\mathcal{H}$ es separable.

Puede mostrarse (a partir de completitud y separabilidad) que en todo espacio de Hilbert existe una base ortonormal.


Resumiendo, el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$:

- es un espacio vectorial
- está dotado de un producto interior
- es completo
- es separable
- existe una base ortonormal

El principio de superposición, de hondo contenido físico, está implícitamente enunciado en el postulado puramente matemático que indica que los estados del sistema corresponden a vectores de un espacio de Hilbert. En efecto, si un sistema tiene dos estados cuánticos posibles,

$\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{H}$ (cada uno con norma 1), la combinación lineal $\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2 \in \mathcal{H}$. Esta combinación será entonces un estado posible del sistema que tendrá norma $||\psi|| = 1$, si α y β se ajustan adecuadamente.

Es un postulado absolutamente necesario en el contexto de la física cuántica. Aún no introdujimos rigurosamente la noción de probabilidad pero a partir de lo discutido en el comienzo del curso sabemos de qué se trata. Consideremos el caso de un haz de electrones que pasan por dos rendijas R_1 y R_2 como en la figura:



Si tapamos la rendija R_2 y llamamos $\psi_1(x)$ a la función de onda que describe en tal caso a los electrones, que solo pueden pasar por R_1 , la densidad de probabilidad de encontrar a los electrones en un “entorno” dx de x será

$$dP_1 = |\psi_1(x)|^2 dx \quad (6.196)$$

Si en cambio tapamos la rendija R_1 , con una notación evidente tendremos

$$dP_2 = |\psi_2(x)|^2 dx \quad (6.197)$$

Consideremos ahora el caso en que ambas rendijas están destapadas. Por analogía clásica podríamos concluir que

$$dP_{clas} = dP_1 + dP_2$$

Sin embargo, experimentalmente lo que se mide es una densidad de probabilidad dP_{exp} de la forma

$$dP_{exp} = \frac{1}{|N|^2} \left(|\psi_1(x)|^2 + |\psi_2(x)|^2 + 2||\psi_1|| ||\psi_2|| \cos(\alpha) \right) dx \quad (6.198)$$


Aquí $1/N^2$ se ajusta para dar una normalización adecuada a la probabilidad. El tercer término del lado derecho de (6.198) es un término de interferencia que no tiene explicación desde el punto de vista clásico en que los electrones son tomados como partículas.

Es importante notar que α es una fase medible experimentalmente. Es fácil comprender su origen a partir de lo que ya aprendimos en el postulado 1: el estado del sistema cuando ambas rendijas están destapadas es la superposición (adecuadamente normalizada) de los estados con una sola rendija destapada,

$$\psi = \frac{1}{N}(\psi_1 + \psi_2)$$

La densidad de probabilidad asociada con esta función de onda es justamente la dada por (6.198). Puede concluirse (pero no lo analizaremos todavía) que $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$ con α_1 la fase de la función de onda ψ_1 y α_2 la de ψ_2 .

Lo que se observa experimentalmente es lo que se muestra en la figura siguiente. En lugar de verse dos manchas correspondientes a los electrones que pasan por una u otra rendija, se ve una figura de interferencia típica del comportamiento ondulatorio.



Pero lo más extraordinario de este experimento es que puede hacerse ¡con un solo electrón! O para ser más precisos, haciendo que los electrones vayan pasando por las rendijas uno por uno con tiempo como

para que se pueda registrar la sucesiva llegada de cada uno. Este experimento de la doble rendija fue seleccionado como uno de los más bellos de la física, junto a los realizados por Galileo, Newton, Millikan,...

Cuando Feynman discute el asunto de la doble rendija en su libro [4], escribe textualmente que

...elegimos examinar un fenómeno que es imposible, absolutamente imposible explicar de manera clásica y que esta en el corazón de la mecánica cuántica. En realidad contiene su único misterio.


Y sigue:

... Debemos decir ya mismo que ustedes no deben tratar de hacer este experimento ... Este experimento nunca fue hecho hasta ahora de esta manera. El problema es que habría que hacer un aparato en una escala imposiblemente pequeña para ver los efectos en los que estamos interesados. Estamos haciendo un "experimento mental" que elegimos porque es simple pensar en él. Conocemos el resultado que hubiéramos obtenido porque hay muchos experimentos que fueron hechos en los que la escala y las proporciones fueron elegidas para mostrar los efectos que describiremos...

Para Feynman se trataba entonces de un "gedanken experiment", un experimento mental. Ignoraba que ya en 1961, el año en que Feynman inició sus famosas clases, el experimento había sido realizado ([5]). Pero más sorprendente aún, Feynman no insiste en el hecho de que el patrón de interferencia se produce aún cuando un único electrón pasara por vez por el aparato. El experimento en este caso fue hecho por Akira Tonomura y sus colaboradores de la empresa Hitachi en 1989, utilizando una fuente muy débil de electrones y un biprisma de electrones. En la óptica un biprisma está formado por dos prismas unidos por las bases con el objeto de dividir el frente de las ondas luminosas en dos. Se utiliza para hacer experimentos de interferencia.

Como mostramos en la página siguiente mostramos se trata de un "biprisma" para separar el frente de onda de electrones que consiste de un delgado filamento de cobre (de $1\ \mu\text{m}$ de diámetro) cargado positivamente, situado en medio de dos electrodos conectado a tierra, que

en la figura siguiente están representados por dos placas paralelas. Es el filamento de cobre quien separa en dos partes al frente de onda de cada electrón emitido por la fuente, un cátodo muy pequeño de donde los electrones son eyectados.



Como el filamento está cargado positivamente, atrae a los electrones que parecen emerger de dos fuentes virtuales, una a la izquierda y otra a la derecha de la fuente real.

El dispositivo permite detectar electrones *uno a uno* con 100% de eficiencia como si fueran partículas (que lo son). Los electrones son acelerados por una diferencia de potencial de 50,000 V, con lo que adquieren una velocidad que es del orden de un 40 % de la de la luz, unos 120,000 km/s (podrían dar la vuelta a la tierra 3 veces en 1 segundo).


Si pasaran dos electrones simultáneamente, uno a cada lado del biprisma, aceptado el carácter dual ondulatorio que la mecánica cuántica asigna a partículas como los electrones, no resultaría demasiado extraño si en la pantalla del detector se viera una figura de interferencia. Pero sucede que en el experimento los electrones pasan uno a uno y sin embargo se ve tal figura.

Hay que ser entonces cuidadoso en la comprensión de este experimento. La interferencia tiene lugar para la función de onda de **cada electrón** que pasa **individualmente**. Porque esa función de onda implica la probabilidad de que ese electrón pase por una u otra rendija. Pero las líneas de interferencia recién se ven cuando se acumula un gran número de pasajes de electrones.

Existe un video que muestra el experimento y que puede encontrarse en el sitio web de la empresa Hitachi:

<http://rdg.ext.hitachi.co.jp/rd/moviee/doubleslite-n.wmv>

Para comprender lo que sucede solo hace falta repetir, en el contexto de la mecánica cuántica los cálculos del experimento de Young para ondas luminosas. Solo que aquí se trata de funciones de onda que describen el estado del electrón.



Si la ranura F_2 esta cerrada, el electrón pasa por la ranura F_1 siguiendo el camino r_1 . Representemos la correspondiente función de onda por un seno, que en el punto en que cruza la pantalla tendrá la forma.

$$\psi_1 = A(r_1) \sin(kr_1 - \omega t) \quad (6.199)$$

El subíndice 1 en la función de onda indica que se trata de una onda que pasa por la ranura 1.

Si en cambio la que esta abierta es la ranura F_2 (mientras que la ranura F_1 está cerrada), la función de onda correspondiente se escribe

$$\psi_2 = A(r_2) \sin(kr_2 - \omega t) \quad (6.200)$$

donde $A(r)$ es la amplitud en el punto r .

Si la pantalla está suficientemente alejada de las rendijas ($r_i \gg a$), podemos aproximar $A(r_1) \simeq A(r_2) = A_0$ y, llamando

$$\delta = |r_2 - r_1| = a \sin \theta \simeq a\theta \quad (6.201)$$

podemos poner $r_1 = r$, $r_2 = r + \delta$.

Con las dos rendijas abiertas tendremos, para describir el estado del electrón al llegar a la pantalla una función de onda que es la superposición de las anteriores

$$\Psi = \psi_1 + \psi_2 \quad (6.202)$$

donde hemos elegido para simplificar coeficientes idénticos para ambos senos. El módulo cuadrado será entonces (en realidad aquí se trata simplemente del cuadrado pues tomamos una función de onda es real)

$$\begin{aligned} |\Psi|^2 &= A_0^2 \sin^2(kr - \omega t) + A_0^2 \sin^2(kr + k\delta - \omega t) \\ &\quad + 2A_0^2 \sin(kr - \omega t) \sin(kr + \delta - \omega t) \end{aligned} \quad (6.203)$$

Promediaremos esta expresión en el tiempo, utilizando la fórmula

$$\overline{\chi(\omega t)} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T dt \chi(\omega t) \quad (6.204)$$

donde el período T está ligado a la frecuencia angular ω según la relación $\omega T = 2\pi$. Se tiene entonces,

$$I \equiv \overline{|\Psi|^2} = \frac{1}{2}A_0^2 + \frac{1}{2}A_0^2 + A_0^2 \cos k\delta = A_0^2(1 + \cos k\delta) \quad (6.205)$$

Sobre la pantalla, la probabilidad será máxima allí donde valga que

$$k\delta = 2n\pi \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.206)$$

Dado que la longitud de onda λ está relacionada con k según

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (6.207)$$

los máximos se producirán allí donde la diferencia de caminos sea

$$\delta = n\lambda \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.208)$$

Si a la posición x sobre la pantalla la aproximamos según

$$x \simeq D \tan \theta \quad (6.209)$$

tenemos

$$\delta = \frac{a}{D}x \quad (6.210)$$

con lo que la intensidad en el punto x de la pantalla será

$$I = A_0^2 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda D} x \right) \right) = I_{max} \cos^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda D} x \right) \quad (6.211)$$

con los máximos ubicados en

$$x_n = n \frac{\lambda}{a} D \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.212)$$

Espacio Dual; Notación de Dirac.

- Sea χ una funcional lineal definida sobre los vectores ψ del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de los estados de un sistema cuántico.
- χ asigna a cada $\psi \in \mathcal{H}$ un número complejo:

$$\chi : \psi \rightarrow \chi[\psi] \in C \quad (6.213)$$

- Que χ sea una funcional lineal significa que

$$\chi[\psi_1 + \lambda\psi_2] = \chi[\psi_1] + \lambda\chi[\psi_2] \quad (6.214)$$

- El conjunto de funcionales lineales $\chi_I, \chi_{II}, \dots$ definidas sobre las $\psi \in \mathcal{H}$ forman un espacio vectorial $\mathcal{H}^*$ que se llama el dual de $\mathcal{H}$.

Vimos que $\mathcal{H}$ está dotado de un producto escalar que para dos vectores de estado ψ y ϕ anotamos (ϕ, ψ) . Si cambiáramos la notación de la siguiente forma


$$(\phi, \psi) = \phi^d[\psi] \in C$$

podríamos pensar al número complejo $\phi^d[\psi]$ como el resultado de una aplicación $\phi^d : \mathcal{H} \rightarrow C$ tal que

$$\phi^d[\psi] = (\phi, \psi)$$

Por las propiedades del producto escalar se trata de una aplicación lineal que nos permite definir vectores de $\mathcal{H}^*$ que serían, en este caso, los vectores que designaremos por $\phi^d[]$. Esos vectores se obtienen encerrando entre los corchetes a todos los vectores de $\mathcal{H}$

En la figura siguiente damos una versión gráfica de la relación entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}^*$. Notar que en la figura hemos abandonado la notación ϕ^d y que en ella anotamos χ_I, χ .



La notación que inventó Dirac para trabajar con estos espacios (y de la que estaba justificadamente orgulloso) consiste en escribir

- a los vectores ψ del espacio $\mathcal{H}$ como “kets” $|\psi\rangle$
- a los vectores χ del dual $\mathcal{H}^*$ como “bras” $\langle\chi|$.

Tomemos ahora dos kets $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$. Definimos el bra $\langle\phi| \in \mathcal{H}^*$ a través del producto escalar que introdujimos al especificar un espacio de Hilbert (el *bracket*)

$$\langle\phi|\psi\rangle = \phi^d[\psi] \equiv (\phi, \psi)$$

De esta manera, a todo ket le hacemos corresponder un bra vía el producto escalar.

¿Puedo a todo bra hacerle corresponder un ket? La respuesta es negativa. En efecto consideremos una función de onda que no puede estar en un espacio de Hilbert por no ser normada, como por ejemplo $\psi_0 = \exp(ikx)$. Sin embargo con esta función de onda y otra que sí sea normada, digamos ψ_1 puedo construir un producto escalar que que en ciertos casos de un resultado finito,

$$\langle\psi_0|\psi_1\rangle = \int dx \exp(-ikx)\psi_1$$

Es decir que, a través de este producto escalar que hemos definido, se tiene un bra $\langle\psi_0| \in \mathcal{H}^*$ cuyo ket asociado no pertenece a $\mathcal{H}$.

Clase 7

Postulado 2

De los observables

A toda cantidad física observable $\mathcal{A}$ le corresponde un operador lineal hermítico $\hat{A}$ que actúa sobre $\mathcal{H}$.

$$\hat{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \quad (7.1)$$

Nota 1: Con la letra cursiva $\mathcal{A}$ estamos dando un “nombre” genérico a la cantidad física. Por ejemplo $\mathcal{A}$ = energía, $\mathcal{A}$ = impulso, etcétera. Con $\hat{A}$ indicamos el objeto matemático asociado por la mecánica cuántica a esa cantidad, como vimos por ejemplo en el caso del operador impulso $\hat{p} = (\hbar/i)\nabla$, el operador hamiltoniano $\hat{H} = (-\hbar^2/2m)\hat{p}^2$, etcétera (Por supuesto, en esta segunda formulación aún no se ha establecido la fórmula matemática específica correspondiente a cada operador).

Nota 2: Que el operador sea lineal implica que

$$\hat{A}(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) = \hat{A}|\psi_1\rangle + \hat{A}|\psi_2\rangle \quad (7.2)$$

El producto de operadores debe definirse de manera de ser asociativo:

$$(\hat{A}\hat{B})|\psi\rangle = \hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle) \quad (7.3)$$

pero no tiene porqué ser conmutativo

$$\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle \stackrel{?}{\neq} \hat{B}\hat{A}|\psi\rangle \quad (7.4)$$

Por ello, conviene introducir un operador llamado *conmutador*, que será anotado $[\ , \]$ y que se define así:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (7.5)$$

Definición: Llamaremos elemento de matriz de $\hat{A}$ entre dos estados $|\psi\rangle$ y $|\varphi\rangle$ al producto interior (o producto escalar)

$$(\varphi, \hat{A}\psi) = \langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle \equiv a \in C \quad (7.6)$$

Cuando los estados $|\psi\rangle$ y $|\varphi\rangle$ coinciden, hablaremos de *valor medio* del operador,

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \quad (7.7)$$

Debe notarse la diferencia entre el objeto definido en la ecuación (7.6) y

$$(\hat{A}\varphi, \psi) = b \in C \quad (7.8)$$

En principio a y b no tienen porqué coincidir. Por lo tanto la notación de la ec.(7.6) sería ambigua. Veamos por qué esta ambigüedad es irrelevante desde el punto de vista físico.

Para indicar, utilizando la notación de “bras” y “kets”, que un operador actúa sobre un bra y no sobre un ket definiremos el operador adjunto $\hat{A}^\dagger$ de un operador dado $\hat{A}$. Lo haremos a partir del bra que se obtiene del ket resultado de la acción de $\hat{A}$ sobre un estado:

$$\hat{A}|\psi\rangle \Rightarrow \langle\psi|\hat{A}^\dagger \quad (7.9)$$

Esta última expresin indica que si $\hat{A}$ cuando actúa sobre el ket $|\psi\rangle$ da da como resultado $\hat{A}|\psi\rangle$ entonces el bra asociado a este último será $\langle\psi|\hat{A}^\dagger$. Veremos que esta operacin puede asociarse a conjugar y transponer una matriz compleja de $N \times N$, es decir, calcular la adjunta.

También puede definirse al adjunto de un operador a través de la igualdad

$$(\varphi, \hat{A}\psi) = (\hat{A}^\dagger\varphi, \psi) \quad (7.10)$$

Si bien para las discusiones que se darán en este curso las definiciones (7.9) y (7.10) son equivalentes, vale la pena aclarar que existen situaciones en las que esto no sucede. En esos casos a los efectos de cálculo tomaremos (7.10), definida sobre los “estados físicos”, como la manera de definir el adjunto.

Como ya señalamos, en principio la notación $\langle| | \rangle$ no permite indicar sobre quién actúa el operador, si sobre el bra o sobre el ket. En cambio

la notación $(\ , \)$ sí lo permite. Por eso afirmamos más arriba que podría pensar que la notación de Dirac es de alguna manera incompleta. Se verá enseguida que justamente en el contexto de la mecánica cuántica este no es el caso.

Es en este punto que discutiremos la definición de operador hermítico requerida en el postulado 2. De manera simbólica la definición esta dada por la igualdad

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger \quad (7.11)$$

Cuando un operador $\hat{A}$ es hermítico se tiene entonces

$$(\varphi, \hat{A}\psi) = (\hat{A}^\dagger\varphi, \psi) = (\hat{A}\varphi, \psi) \quad (7.12)$$

Por otro lado, como $(\varphi, \psi) = (\psi, \varphi)^*$

$$(\varphi, \hat{A}\psi)^* = (\hat{A}\psi, \varphi) \quad (7.13)$$

Luego, si consideramos el caso en que los dos estados coinciden, $|\psi\rangle = |\varphi\rangle$, los lados derechos de (7.12) y (7.13) coinciden por lo que los izquierdos también,

$$(\psi, \hat{A}\psi)^* = (\psi, \hat{A}\psi) \quad (7.14)$$

O sea que:

el elemento de matriz de un operador hermítico entre estados idénticos es real,

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle^* \quad (7.15)$$

Es decir, los “valores medios” de operadores hermíticos son reales,

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\hat{A}\rangle^* \quad (7.16)$$

Nota 1: $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$

Nota 2: De manera mnemotécnica podemos anotar en relación con la operación de conjugación *:

$$\begin{array}{ccc} |\rangle & \xrightarrow{*} & \langle| \\ \langle| & \xrightarrow{*} & |\rangle \\ \hat{A} & \xrightarrow{*} & \hat{A}^\dagger \end{array} \quad (7.17)$$

¡Pero cuidado, las fórmulas anteriores no igualdades! Debe notarse, por ejemplo, que en la primera línea el ket y el bra pertenecen a espacios diferentes ($\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}^*$ respectivamente).

Nota 3: Con la notación de Dirac, la norma al cuadrado de un vector se escribe $\langle\psi|\psi\rangle$,

$$||\psi||^2 = (\psi, \psi) = \langle\psi|\psi\rangle \quad (7.18)$$

Consideremos también el objeto $\mathcal{P}$ definido como

$$\mathcal{P} \equiv |\psi\rangle\langle\psi| \quad (7.19)$$

Vemos que si $\mathcal{P}$ actúa sobre un elemento de $\mathcal{H}$ da como resultado otro elemento de $\mathcal{H}$. En efecto

$$\mathcal{P}|\varphi\rangle = |\psi\rangle\langle\psi|\varphi\rangle = (\langle\psi|\varphi\rangle)|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle, \lambda \in \mathbf{C} \quad (7.20)$$

o sea

$$\mathcal{P} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \quad (7.21)$$

También se puede aplicar $\mathcal{P}$ sobre elementos de $\mathcal{H}^*$ de la siguiente manera:

$$\mathcal{P}(\langle\varphi|) \equiv \langle\varphi|\mathcal{P} = (\langle\varphi|\psi\rangle)\langle\psi| = \langle\psi|\varphi\rangle, \varphi \in \mathbf{C} \quad (7.22)$$

y se tiene entonces

$$\mathcal{P} : \mathcal{H}^* \rightarrow \mathcal{H}^* \quad (7.23)$$

Notemos que λ y ρ no son otra cosa que la proyección de un vector sobre el otro. En efecto, si se tratara de vectores en un espacio de dimensión finita se tendría

$$(\psi, \varphi) = ||\psi|| ||\varphi|| \cos(\check{\phi}, \check{\varphi}) \quad (7.24)$$

O sea que $\mathcal{P}$ representa un proyector sobre el estado $|\psi\rangle$. Es fácil ver que $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$ si $|\psi\rangle$ está normalizado, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$:

$$\mathcal{P}^2|\varphi\rangle = (|\psi\rangle \underbrace{\langle\psi| \langle\psi|}_{\langle\psi|\psi\rangle=1})|\varphi\rangle = (|\psi\rangle\langle\psi|)|\varphi\rangle = \mathcal{P}|\varphi\rangle \quad (7.25)$$

En lugar de un proyector sobre un vector dado, se puede definir al proyector sobre un subespacio $\mathcal{S} \subset \mathcal{H}$,

$$\mathcal{P}_{\mathcal{S}} = \sum_{i \in \mathcal{S}} |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (7.26)$$

Hemos considerado el caso en que un índice discreto i caracteriza los distintos vectores del subespacio y por eso hemos utilizado una suma en la definición de $\mathcal{P}_S$. En el caso del espectro continuo, la suma debe ser reemplazada por una integral,

$$\mathcal{P}_S = \int_{\mu \in S} d\mu |\psi(\mu)\rangle \langle \psi(\mu)| \quad (7.27)$$

Postulado 3

De la medida de un observable

Si se tiene un número muy grande de sistemas cuánticos idénticos, cada uno en el mismo estado $|\psi\rangle$ y se hace la medida de un observable $\mathcal{A}$ en cada uno de los sistemas, obteniéndose un conjunto de valores $\{a_i\}$ asociados con las medidas $i = 1, 2, \dots$, la cantidad

$$\langle \mathcal{A} \rangle \equiv \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (7.28)$$

coincide con el valor medio de las medidas⁴⁴,

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \sum_i P_i a_i \quad (7.29)$$

donde P_i es el número de veces que se mide el resultado a_i normalizado de manera que

$$\sum_i P_i = 1 \quad (7.30)$$

A P_i se lo interpreta entonces como la “*probabilidad*” de obtener a_i al hacer una medida del observable $\mathcal{A}$.

Nota 1: Como $\mathcal{A}$ es un observable, $\hat{A}$ es hermítico por lo que $a_i \in \mathbb{R}$. Luego $\langle \mathcal{A} \rangle$ es real.

Nota 2 : Si dos estados difieren en una fase constante, la medida de un observable en las condiciones del Postulado 3 dará el mismo resultado para ambos (veremos más adelante cómo esto puede extenderse al caso de fases no constantes).

⁴⁴En el contexto de la matemática y en particular de la estadística se suele usar el nombre “media aritmética para distinguirlo de otras “medias”.

En efecto, consideremos dos estados

$$|\psi\rangle \quad y \quad |\psi'\rangle = \exp(i\alpha)|\psi\rangle \quad (7.31)$$

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A} \rangle_{\psi'} &= \langle \psi' | \hat{A} | \psi' \rangle = \langle \psi | \exp(-i\alpha) \hat{A} \exp(i\alpha) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \mathcal{A} \rangle_{\psi} \end{aligned} \quad (7.32)$$

Nota 4: ¿Cómo definir, de manera general, un número que tenga en cuenta la dispersión de resultados de la medida $\langle \mathcal{A} \rangle$? Es decir, cuánto se apartan las medidas que se van haciendo del resultado que da el valor medio.

Se podría pensar que el calculo de la dispersión podría hacerse a partir de la diferencia entre el operador y su valor medio

$$\widehat{\Delta A} \equiv \hat{A} - \langle \mathcal{A} \rangle \quad (7.33)$$

Pero puede probarse fácilmente que así definida la dispersion $\widehat{\Delta A}$ tiene valor medio cero. En efecto,

$$\Delta \mathcal{A} \equiv \langle \widehat{\Delta A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle - \langle \mathcal{A} \rangle \langle \psi | \psi \rangle = \langle \mathcal{A} \rangle - \langle \mathcal{A} \rangle = 0 \quad (7.34)$$

En este caso resultaría entonces una “dispersión” $\widehat{\Delta A}$ que sería siempre nula.

Vamos entonces a definir una dispersión que en general no se anule como en el caso anterior a partir de la fórmula

$$(\Delta \mathcal{A})^2 \equiv \langle (\widehat{\Delta A})^2 \rangle = \langle \psi | (\hat{A} - \langle \mathcal{A} \rangle)^2 | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2 \quad (7.35)$$

En general $(\Delta \mathcal{A})^2$ no se anula y a partir de ella podemos definir una dispersión no trivial de la manera siguiente

$$\Delta \mathcal{A} \equiv +\sqrt{\langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2} \quad (7.36)$$

Para que esta dispersión de las medidas se anule debería cumplirse que

$$\langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2 \quad (7.37)$$

Ahora bien, el lado izquierdo de esta igualdad puede escribirse de la siguiente manera

$$\langle \psi | A^2 | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} \hat{A} | \psi \rangle = (\hat{A} \psi, \hat{A} \psi) = \|\hat{A} \psi\|^2 \quad (7.38)$$

En cuanto al lado izquierdo,

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2 = (\psi, \hat{A} \psi)^2 \leq \|\psi\|^2 \|\hat{A} \psi\|^2 \quad (7.39)$$

o, usando que $|\psi\rangle$ está normalizado,

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2 \leq \|\hat{A} \psi\|^2 \quad (7.40)$$

La igualdad solo vale cuando los vectores $|\psi\rangle$ y $\hat{A}|\psi\rangle$ son paralelos.

$$\hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle \quad (7.41)$$

Con a un número real. Pero esto implica que para que en un dado estado la dispersión $(\Delta \mathcal{A})^2 = 0$ el estado debe ser una autofunción del operador $\hat{A}$. En ese caso, al hacer una medida de $\mathcal{A}$ en el estado podemos decir que el valor está bien determinado. En ese estado, la medida dará siempre a como resultado de calcular el valor medio de $\hat{A}$.

En la teoría de probabilidades a la diferencia $\langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2$ se la conoce como “varianza”. También se la denomina “error cuadrático” o “dispersión cuadrática”. En cuanto a la dispersión (7.36) que corresponde a la raíz cuadrada de la cuadrática se la suele llamar “desviación estandard” (“standard deviation” en inglés).

Vemos entonces que es muy importante estudiar el espectro de autovalores y autofunciones de los operadores asociados con magnitudes físicas. Determinar los autoestados es importante porque son aquellos estados en los que podemos tener precisión absoluta en el resultado de la medida. En cuanto a los autovalores, justamente corresponden a los valores que podemos predecir de una medida de la cantidad física $\mathcal{A}$ sobre ese estado con precisión absoluta.

Empecemos por considerar dos autofunciones $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ de un operador hermitico $\hat{A}$, con autovalores a_1 y a_2 ,

$$\begin{aligned} \hat{A}|\psi_1\rangle &= a_1|\psi_1\rangle \\ \hat{A}|\psi_2\rangle &= a_2|\psi_2\rangle \end{aligned} \quad (7.42)$$

Multiplicando la primer ecuación por $\langle\psi_2|$ y la segunda por $\langle\psi_1|$ tendremos

$$\begin{aligned}\langle\psi_2|\hat{A}|\psi_1\rangle &= a_1\langle\psi_2|\psi_1\rangle \\ \langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle &= a_2\langle\psi_1|\psi_2\rangle\end{aligned}\quad (7.43)$$

Conjugando la segunda ecuación y restando tendremos que los lados izquierdo se anulan por lo que

$$0 = (a_1 - a_2^*)\langle\psi_2|\psi_1\rangle = (a_1 - a_2)\langle\psi_2|\psi_1\rangle \quad (7.44)$$

(En la última igualdad hemos usado que los autovalores asociados a un operador hermítico son reales). Concluimos entonces que o bien los autovalores coinciden o bien las autofunciones son ortogonales.

Cuando los autovalores de un operador son todos distintos diremos que su espectro es no degenerado. En general, los operadores hermíticos tienen

- Un espectro discreto de autovalores a_n con $n = 0, 1, 2, \dots$. Las autofunciones $|\psi_n\rangle$ son normalizables. Algunas veces las anotaremos $|n\rangle$.
- Un espectro continuo con autovalores $a(\nu)$, $\nu \in R$. Las autofunciones $|\psi_\nu\rangle$ ($|\nu\rangle$) son en general de norma infinita.
- Puede que haya degeneración de autovalores discretos o continuos. En ese caso para distinguir las distintas autofunciones correspondientes a un autovalor escribiremos $|nr\rangle$ para el caso del discreto ($r = 1, 2, \dots$) con $|nr_i\rangle$ la r_i -ésima autofuncion del autovalor a_n . En el caso del continuo puede que la degeneración sea discreta o continua así que en general anotaremos $|\nu r\rangle$, con $r \in Z$ y $\rho \in R$.

Tenemos entonces

$$\begin{aligned}\hat{A}|nr\rangle &= a_n|nr\rangle \\ \hat{A}|\nu r\rangle &= a(\nu)|\nu r\rangle\end{aligned}\quad (7.45)$$

Según el caso la normalización será

$$\begin{aligned}\langle nr|n'r'\rangle &= \delta_{nn'}\delta_{rr'} \\ \langle \nu r\rangle|\nu' r'\rho'\rangle &= \delta(\nu - \nu')\delta(\rho - \rho')\delta_{rr'}\end{aligned}\quad (7.46)$$

En cuanto a los proyectores, sobre cierto subespacio de autofunciones,

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= \sum_{n,r} |nr\rangle\langle nr| \\ \mathcal{P} &= \sum_r \int d\nu d\rho |\nu r\rho\rangle\langle \nu r\rho|\end{aligned}\quad (7.47)$$

También se pueden definir proyectores sobre subespacios de una degeneración dada. Por ejemplo,

$$\mathcal{P}_n = \sum_r |nr\rangle\langle nr| \quad (7.48)$$

y análogamente en el continuo.

Un ingrediente importante: Consideraremos que los observables $\mathcal{A}$ tienen siempre asociados operadores hermíticos $\hat{A}$ con un **conjunto completo de autofunciones**.

Lo anterior nos permite escribir un vector cualquiera de $\mathcal{H}$ (un estado cualquiera del sistema) como un desarrollo (en serie de Bessel-Fourier) utilizando las autofunciones del operador $\hat{A}$ como base. En el caso más general, un estado cualquiera $|\psi\rangle$ podrá escribirse como

$$|\psi\rangle = \sum_{n,r} C_n^r |nr\rangle + \sum_r \int d\nu \int d\rho C^r(\nu\rho) |\nu r\rho\rangle \quad (7.49)$$

Podría suceder que no todo vector de $\mathcal{H}$ fuera desarrollable en términos de la base dada por $\hat{A}$. Es decir que el subespacio $\mathcal{H}_A$ generado por $\hat{A}$ fuera más pequeño que $\mathcal{H}$, $\mathcal{H}_A \subset \mathcal{H}$. Por ello hemos debido agregar el ingrediente importante de más arriba que podría ser enunciado de manera más matemática escribiendo:

Diremos que un operador hermítico $\hat{A}$ está asociado con un observable físico $\mathcal{A}$ si y solo si $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A$.

Notemos que el proyector sobre $\mathcal{H}_A$ es (para simplificar la notación consideramos un caso sin degeneración)

$$\mathcal{P}_A = \sum_n |n\rangle\langle n| + \int d\nu |\nu\rangle\langle \nu| \quad (7.50)$$

Aquí la suma se extiende sobre todas los autoestados que generan $\mathcal{H}_A$. Sólo si $\mathcal{P}_A = 1$ será $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A$, dado que en tal caso

$$\mathcal{P}_A|\psi\rangle = \left(\sum_n |n\rangle\langle n| + \int d\nu |\nu\rangle\langle\nu| \right) |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (7.51)$$

Identificados entonces $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}_A$, tenemos de (7.51) la *relación de clausura*:

$$\sum_n |n\rangle\langle n| + \int d\nu |\nu\rangle\langle\nu| = 1 \quad (7.52)$$

De ella podemos obtener la identidad de Parseval:

$$\sum_n |\langle n|\psi\rangle|^2 + \int d\nu |\langle\nu|\psi\rangle|^2 = 1 \quad (7.53)$$

Clase 8

Postulado 4

Del resultado de una única medida

Si se efectúa una única medida del observable $\mathcal{A}$ solo puede tenerse como resultado un autovalor a_n de $\hat{A}$ ($\hat{A}|n\rangle = a_n|n\rangle$).

Postulado 5

De las probabilidades

- (i) Espectro discreto no degenerado
- (ii) Espectro discreto degenerado
- (iii) Espectro continuo no degenerado
- (iv) Espectro continuo degenerado

Caso (i) Cuando se mide el observable A (con operador hermítico $\hat{A}$ asociado) en un sistema físico que está en el estado $|\psi\rangle$, la probabilidad de que tal medida de como resultado a_n ($\hat{A}|n\rangle = a_n|n\rangle$) es

$$P_n = |\langle n|\psi\rangle|^2 = c_n^* c_n = |c_n|^2. \quad (8.1)$$

donde hemos definido $c_n = \langle n|\psi\rangle$.

Nota 1: ¿Se puede obtener al medir la cantidad $\mathcal{A}$ otra cosa que no sea un autovalor de $\hat{A}$? No, por el postulado 4.

Nota 2: Dado que el operador $\hat{A}$ provee una base $\{|n\rangle\}$ del espacio de Hilbert de los estados del sistema, tenemos

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \quad (8.2)$$

donde hemos usado $\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$.

De este desarrollo del vector de estado en serie de Bessel-Fourier usando como base ortonormal a la de las autofunciones de $\hat{A}$ tenemos (identidad de Parseval):

$$\sum_n c_n^* c_n = 1 \quad (8.3)$$

lo que nos asegura que las probabilidades P_n de encontrar al sistema en el estado $|n\rangle$ suman a 1,

$$\sum_n P_n = 1 \quad (8.4)$$

Caso (ii) Cuando se mide el observable $\mathcal{A}$ (con operador hermítico $\hat{A}$ asociado) en un sistema que está en el estado $|\psi\rangle$, la probabilidad de que tal medida de como resultado a_n ($\hat{A}|n\rangle = a_n|n\rangle$) es

$$P_n = \sum_{r=1}^N |\langle nr|\psi\rangle|^2 = \sum_{r=1}^N |c_n^r|^2 \quad (8.5)$$

donde r ($r = 1, 2, \dots, N$) es el índice que indica la degeneración N del estado con autovalor a_n . Un estado general en ese subespacio se puede escribir como

$$|\psi\rangle_{sub} = \sum_{r=1}^N c_n^r |nr\rangle \quad (8.6)$$

Es fácil ver que la probabilidad P_n no depende de la base que elegimos:

$$P_n = \sum_{r=1}^N \langle\psi|nr\rangle\langle nr|\psi\rangle = \langle\psi|\mathcal{P}_n|\psi\rangle \quad (8.7)$$

donde como antes indicamos con $\mathcal{P}_n$ al proyector sobre el subespacio de autofunciones con autovalor a_n , que como proyector es independiente de la base usada.

Caso (iii) Cuando se mide el observable $\mathcal{A}$ (con operador hermítico $\hat{A}$ asociado) en un sistema que está en el estado $|\psi\rangle$, la probabilidad

de que tal medida de como resultado un valor entre $a(\nu)$ y $a(\nu) + d\nu$ ($\hat{A}|\nu\rangle = a_\nu|\nu\rangle$) es

$$dP(\nu) = |\langle\nu|\psi\rangle|^2 d\nu = |c(\nu)|^2 d\nu \quad (8.8)$$

Nota: En este caso, como se trata de un espectro continuo, debemos definir una densidad diferencial de probabilidad $dP(\nu)$ tal como lo hicimos cuando introdujimos de manera heurística la noción de densidad de probabilidad de encontrar una partícula en un punto $\vec{x}$ en un diferencial de volumen d^3x .

Caso (iv) Cuando se mide el observable $\mathcal{A}$ (con operador hermítico $\hat{A}$ asociado) en un sistema que está en el estado $|\psi\rangle$, la probabilidad de que tal medida de como resultado un valor entre $a(\nu)$ y $a(\nu) + d\nu$, ($\hat{A}|\nu\rangle = a_\nu|\nu\rangle$) es

$$dP(\nu) = \left(\sum_{r=1}^N \int d\rho |\langle\nu r \rho|\psi\rangle|^2 \right) d\nu = \left(\sum_{r=1}^N \int d\rho |c^r(\nu, \rho)|^2 \right) d\nu \quad (8.9)$$

Una consecuencia importante: Vemos nuevamente que el resultado de cualquier medida será el mismo para el sistema en el estado $|\psi\rangle$ o en el estado $|\psi'\rangle = \exp(i\alpha)|\psi\rangle$. La prueba es la que ya explicamos para valores medios. En particular para la probabilidad P_n ,

$$\begin{aligned} P_n &= |\langle n|\psi\rangle|^2 = |\langle n|\exp(-i\alpha)|\psi'\rangle|^2 \\ &= |\exp(-i\alpha)\langle n|\psi'\rangle|^2 = |\langle n|\psi'\rangle|^2 = P'_n \end{aligned} \quad (8.10)$$

Consideremos ahora dos estados posibles del sistema, I y II , caracterizados por vectores de onda $|\psi_I\rangle$ y $|\psi_{II}\rangle$. No requeriremos que sean autoestados de algún operador ligado a un observable. Pero sí que sean ortogonales, $\langle\psi_I|\psi_{II}\rangle = 0$. De acuerdo a los postulados anteriores, la probabilidad de que al medir el observable $\mathcal{A}$ en el estado I obtengamos el valor a_n es

$$P_n^I = |\langle n|\psi_I\rangle|^2 \quad (8.11)$$

En el estado II será

$$P_n^{II} = |\langle n|\psi_{II}\rangle|^2 \quad (8.12)$$

Consideremos ahora un estado $|\psi\rangle$ combinación lineal de $|\psi_I\rangle$ y $|\psi_{II}\rangle$:

$$|\psi\rangle = b_I|\psi_I\rangle + b_{II}|\psi_{II}\rangle \quad (8.13)$$

con los coeficientes b_I y b_{II} tales que $|\psi\rangle$ es un estado normalizado:

$$|b_I|^2 + |b_{II}|^2 = 1 \quad (8.14)$$

Podemos interpretar entonces a $|b_I|^2$ como dando la probabilidad de encontrar al sistema en el estado I y a $|b_{II}|^2$ en el estado II .

La probabilidad de obtener a_n al medir $\mathcal{A}$ en el estado $|\psi\rangle$ puede entonces escribirse:

$$P_n = |\langle n|\psi\rangle|^2 = |b_I\langle n|\psi_I\rangle + b_{II}\langle n|\psi_{II}\rangle|^2 \quad (8.15)$$

Después de un poco de álgebra llegamos a que

$$P_n = |b_I|^2 P_n^I + |b_{II}|^2 P_n^{II} + 2\text{Re}(b_I^* b_{II} \langle \psi_I|n\rangle \langle n|\psi_{II}\rangle) \quad (8.16)$$

Los dos primeros términos dan el resultado esperable desde un punto de vista clásico de la mezcla estadística de los estados I y II . El tercero en cambio es un típico término cuántico de interferencia.

Estamos ahora en condiciones de analizar la:

Reducción del paquete de ondas

Con este nombre casi culinario o químico (disciplinas similares)⁴⁵ se describe la siguiente situación que se plantea en la mecánica cuántica. Sea un sistema en el estado $|\psi\rangle$. Sea un observable $\mathcal{A}$, un operador asociado $\hat{A}$ y una base por él provista $\{|n\rangle\}$. Puedo entonces escribir

$$|\psi\rangle = \sum c_n |n\rangle, \quad c_n = \langle n|\psi\rangle \quad (8.17)$$

Supongamos que alguien que todo lo sabe se comunica con nosotros y nos da los valores de todos los c_n :

$$c_1 = \frac{1}{8}, \quad c_2 = \frac{i}{12}, \dots \quad (8.18)$$

⁴⁵Se reduce una salsa, se reduce un óxido...

No conformes, medimos el observable $\mathcal{A}$. Sabemos que si tuviéramos muchos sistemas idénticos en el mismo estado, la probabilidad de obtener a_n es $|c_n|^2$. De acuerdo a la información que tenemos, podemos entonces escribir

$$P_1 = \frac{1}{64}, \quad P_2 = \frac{1}{144}, \dots \quad (8.19)$$

Pero si no pretendemos hacer un *gedankenexperiment* sino una experiencia real, contaremos con un único sistema y hacemos una única medida sobre él. Si bien trabajamos a tiempo fijo, podemos hablar de un “inmediatamente antes” y un “inmediatamente después” de la medida. Digamos que el instante en que hacemos la medida es t_0 y el instante inmediatamente posterior es t . En el instante de hacer la medida el estado está descrito por

$$|\psi(t_0)\rangle = \sum c_m(t_0)|m\rangle \quad (8.20)$$

Sabemos que el aparato no puede indicar otra cosa que un autovalor de $\hat{A}$. Digamos que en t_0 indica como valor de la medida a_n . Quiere decir que a un instante inmediatamente posterior t_0^+ (el sistema no “tiene tiempo” de evolucionar) es natural pensar que el estado del sistema es

$$|\psi(t_0^+)\rangle = |n\rangle \quad (8.21)$$

Es decir que nuestro aparato **modificó** al sistema que se encontraba en el estado (8.20) y lo llevó al estado (8.21). Se trata de un cambio no causal, de una perturbación incontrolable. Este fenómeno producido por la medida se llama *reducción del paquete de ondas* en el sentido que reduce la combinación lineal a uno solo de sus términos. Y no podemos predecir a cuál puesto que el término que queda depende del resultado de la medida y éste no puede ser predicho antes de efectuarla. El aparato funciona como un filtro perfecto que, del desarrollo en serie, “solo deja pasar” los términos en el subespacio de las autofunciones con autovalor a_n (suponiendo que haya varias, en caso de degeneración).


En la página siguiente representamos en una figura lo que acabamos de describir.

El concepto de reducción del paquete de ondas está ligado al de “colapso del paquete de ondas” al que John von Neumann le dio, por vez

primera, un tratamiento matemático consistente⁴⁶. Ligado a este proceso existe otro, llamado “decoherencia cuántica” que le ha ido ganando en popularidad a partir de la década de 1970⁴⁷.

La decoherencia permite explicar de manera consistente la transición entre las reglas de la física cuántica y las de la clásica tales como las conocemos a nivel macroscópico.

Según el postulado 4, la medida de un observable dado en sistema físico solo puede dar como resultado un autovalor del operador asociado. Es decir que si el estado ψ en el que pretendemos medir era una superposición de autofunciones asociados a los distintos autovalores, el acto de medida produce el colapso de la función de onda ψ a uno y solo uno de los estados de la superposición. Este es el problema central que trata la teoría de la decoherencia.



La idea básica de la decoherencia es que los sistemas cuánticos no deben considerarse como aislados sino en interacción con el medio en el que se encuentran, medio que tiene un número muy grande de grados de libertad. Es esa interacción la que provoca la desaparición rápida de la superposición de estados que establece la mecánica cuántica. El número muy grande y la complejidad de las interacciones del sistema cuántico con su entorno hace que las diferentes posibilidades se vuelvan incoherentes: cada interacción desfasa los estados unos respecto de otros y muy rápidamente lo que era un estado superpuesto deviene un estado puro.

⁴⁶J. von Neumann, “The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics” (1932) Princeton Univ. Press., 1996.

⁴⁷H. D. Zeh, “On the interpretation of measurement in quantum theory” Foundations of Physics, 1 (1970) 69.

La ventaja de la decoherencia sobre la reducción del paquete de ondas es que la segunda no requiere de un observador y en ese sentido es una reducción espontánea, “objetiva”.

Nosotros no profundizaremos estas ideas sino que daremos un postulado (que por supuesto deja asuntos sin resolver -como también los deja la decoherencia...)

Postulado 6

De la acción de la medida

Si la medida de una cantidad física $\mathcal{A}$ en un sistema en el estado $|\psi\rangle$ da como resultado el valor a_m , inmediatamente después de la medida el estado del sistema será

$$|\psi\rangle_{desp} = \frac{\mathcal{P}_m|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\mathcal{P}_m|\psi\rangle}} \quad (8.22)$$

donde $\mathcal{P}_m$ es el proyector sobre el autoestado con autovalor a_m . Si se trata de un estado no-degenerado, será

$$\mathcal{P}_m = |m\rangle\langle m| \quad (8.23)$$

mientras que si es un estado degenerado tendremos

$$\mathcal{P}_m = \sum_{i=1}^N |mi\rangle\langle mi| \quad (8.24)$$

O sea que si antes de la medida se tenía

$$|\psi\rangle_{ant} = \sum_{n,i} c_n^i |ni\rangle \quad (8.25)$$

después de la medida se tendrá

$$|\psi\rangle_{desp} = \frac{1}{\sum_i |c_m^i|^2} \sum_i c_m^i |mi\rangle \quad (8.26)$$

El gato de Schrödinger⁴⁸

Erwin Schrödinger ideó un experimento imaginario (*Gedankenexperiment* en alemán) en el cual un gato está encerrado en una caja opaca que contiene un átomo radioactivo y dispositivo que mata al animal cuando el dispositivo detecta el decaimiento del átomo. Por ejemplo, el dispositivo puede ser un detector Geiger que al medir un decaimiento mueve un interruptor que, al conducir la electricidad hace caer un martillo que rompe un frasco que contiene ácido cianídrico en estado líquido que, al vaporizarse, por ser altamente venenoso, mata al gato.

Supongamos que la probabilidad de desintegración del átomo al cabo de un minuto es $1/2$. La mecánica cuántica indica que hasta que no se haga una medida el átomo se encuentra en un estado que es la superposición de uno intacto y uno desintegrado. En notación de Dirac

$$\text{átomo : } \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{intacto}\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|\text{desintegrado}\rangle \quad (8.27)$$

(Se eligió un coeficiente imaginario para resaltar que los coeficientes de la probabilidad no tienen por qué ser reales. Solo deben cumplir para que la probabilidad sea la misma que sus módulos lo sean).

El mecanismo ideado por Schrödinger liga el estado del gato (vivo/muerto) con el estado del átomo radioactivo (intacto/desintegrado), por lo que también podremos escribir en el caso del gato:

$$\text{gato : } \frac{e^{i\alpha}}{\sqrt{2}}|\text{vivo}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{muerto}\rangle \quad (8.28)$$

(la elección de coeficientes subraya que los coeficientes no tienen por qué ser los mismos que los de la función de onda del átomo, pero sí sus módulos.)

El que el gato este en un estado que es combinación del estado $|\text{vivo}\rangle$ y el estado $|\text{muerto}\rangle$ es difícil de aceptar por más que, por lo que ya hemos aprendido, no lo sea respecto del átomo en la superposición (intacto/desintegrado).

Antes de abrir la caja (es decir, antes de hacer una observación, una medida) no podemos afirmar entonces cuál es el estado del gato al cabo

⁴⁸E. Schrödinger, "Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik (La situación presente en mecánica cuántica)". *Naturwissenschaften* 23 (1935)807.

de un minuto. Recién al abrirla podremos decidir sobre si está vivo o muerto. Debe insistirse que si está muerto no es porque la apertura de la caja lo mató.

Schrödinger y Einstein (que discutieron entre ellos el asunto) pensaban que la posibilidad de que el estado del gato, la función de onda del gato, fuera vivo/muerto demostraba que la interpretación probabilística de Max Born era incompleta.

A la hora actual, la explicación que tiene más adeptos es la de la decoherencia: finalmente no se puede percibir simultáneamente los dos estados.

Wigner diseñó el siguiente experimento que hoy se conoce como

El amigo de Wigner⁴⁹

Se trata de otro experimento imaginario conectado al del gato: un amigo de Wigner preparó el experimento ideado por Schrödinger con su gato en presencia de Wigner. Recién cuando Wigner salió de la habitación tap

ó la caja, inició el experimento y midió el resultado abriendo la caja. Recién al regresar a la habitación Wigner pudo enterarse si el gato estaba vivo o muerto.

La cuestión es: ¿A partir del momento en que su amigo hizo la medida y hasta que Wigner fue informado era el estado del sistema una superposición de $|\text{amigo contento/gato vivo}\rangle$ y $|\text{amigo triste/gato muerto}\rangle$? ¿El estado solo quedara reducido a uno de los dos superpuestos recién cuando Wigner conoce el resultado?

Esto plantea el asunto de “conciencia y medida”. ¿Un observador conciente como el amigo de Wigner estará en uno de los dos estados antes de que Wigner regrese? Para Wigner los observadores concientes son distintos de los aparatos materiales de medida. Hay quienes afirman que la conciencia causa colapso pero hay muchas más paradojas con este experimento.

⁴⁹E.P. Wigner “Remarks on the mind-body question”, en: I.J. Good, “The Scientist Speculates”, Heinemann, London, 1961.

Clase 9

Cambios de base

Consideremos dos operadores lineales hermíticos $\hat{A}$ y $\hat{B}$ asociados con los respectivos observables $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$. Cada operador nos provee de una base completa en el espacio de Hilbert de los estados del sistema cuántico,

$$\hat{A}|\psi_n\rangle = a_n|\psi_n\rangle, \quad \hat{B}|\phi_\nu\rangle = b(\nu)|\phi_\nu\rangle \quad (9.1)$$

Hemos elegido como ejemplo un caso de dos bases no degeneradas una con autovalores “en el discreto” y la otra en “el continuo” pero los resultados que obtendremos valen en general.

Dado un estado $|\eta\rangle$ de nuestro sistema físico, podemos expresarlo como desarrollo en serie de Bessel-Fourier en términos de cualquiera de las dos bases:

$$|\eta\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle \quad c_n = \langle \psi_n | \eta \rangle \quad (9.2)$$

o

$$|\eta\rangle = \int d\nu d_\nu |\phi_\nu\rangle \quad d_\nu = \langle \phi_\nu | \eta \rangle \quad (9.3)$$

De acuerdo con los postulados que estudiamos, si conocemos el conjunto de coeficientes $\{c_n\}$ del desarrollo del vector de estado (??) del sistema, conoceremos todo lo relativo a tal estado del sistema. Alternativamente, deberemos conocer $\{d(\nu)\}$ para tener toda la información de nuestro sistema a partir del desarrollo (9.3).

Comencemos por calcular los elementos de matriz del operador $\hat{A}$ en el estado $|\eta\rangle$. Por tratarse de $\hat{A}$, lo razonable es expresar a $|\eta\rangle$ en términos del desarrollo (??) en la base del propio $\hat{A}$:

$$\langle \eta | \hat{A} | \eta \rangle = \sum_{n,m} c_n^* c_m \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_m \rangle = \sum_n |c_n|^2 a_n \quad (9.4)$$

La elección de base fue razonable porque con ella la matriz $A_{nm} = \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_m \rangle$ resulta diagonal.

Análogamente, si se trata de los elementos de matriz del operador $\hat{B}$ en el estado $|\eta\rangle$, lo razonable es usar el desarrollo (9.3),

$$\langle \eta | \hat{B} | \eta \rangle = \int d\nu d\mu d(\nu)^* d(\mu) \langle \phi_\nu | \hat{B} | \phi_\mu \rangle = \int d\nu |d(\nu)|^2 b_\nu \quad (9.5)$$

En general, para un operador distinto de $\hat{A}$ y de $\hat{B}$, digamos $\hat{O}$, cuyas autofunciones no conocemos, tendremos la opción de usar la base $\{\psi_n\}$ o la base $\{\phi_\nu\}$ sin que una elección sea más natural que la otra:

$$\langle \eta | \hat{O} | \eta \rangle = \sum_{n,m} c_n^* c_m \langle \psi_n | \hat{O} | \psi_m \rangle = \sum_{n,m} c_n^* O_{nm} c_m \quad (9.6)$$

o

$$\langle \eta | \hat{O} | \eta \rangle = \int d\nu d\mu d^*(\nu) d(\mu) \langle \phi_\nu | \hat{O} | \phi_\mu \rangle = \int d\nu d\mu d^*(\nu) O_{\nu\mu} d(\mu) \quad (9.7)$$

En ambos casos los elementos de matriz no solo serán los diagonales sino que habrá también elementos no-diagonales.

Evidentemente, tiene que ser posible hacer cambios de base para ligar los elementos de matriz de los operadores en una y otra base, pues se trata del valor medio del mismo operador para un sistema en un dado y mismo estado y el resultado no puede depender de la base que elijamos. Comencemos por escribir, usando la clausura de la base $\{\phi_\nu\}$,

$$I = \int d\nu |\phi_\nu\rangle \langle \phi_\nu|, \quad (9.8)$$

$$|\psi_n\rangle = \int d\nu |\phi_\nu\rangle \langle \phi_\nu | \psi_n \rangle = \int d\nu S_{\nu n} |\phi_\nu\rangle \quad (9.9)$$

donde hemos escrito

$$S_{\nu n} = \langle \phi_\nu | \psi_n \rangle \quad (9.10)$$

O sea que $S_{\nu n}$ nos permite pasar de los autovectores de la base discreta $\{|\psi_n\rangle\}$ del espacio de Hilbert a los de la base de autovectores del continuo $\{|\phi_\nu\rangle\}$ del espacio de Hilbert.

Análogamente, en el caso de los autovectores en el espacio dual se tiene

$$\langle \psi_n | = \int d\nu \langle \psi_n | \phi_\nu \rangle \langle \phi_\nu | = \int d\nu S_{\nu n}^* \langle \phi_\nu | \quad (9.11)$$

Aquí escribimos

$$S_{n\nu} = S_{\nu n}^* = \langle \psi_n | \phi_\nu \rangle \quad (9.12)$$

Entonces podemos escribir

$$\begin{aligned} O_{in} &= \langle \psi_i | \hat{O} | \psi_n \rangle = \int d\nu d\mu \langle \psi_i | \phi_\nu \rangle \langle \phi_\nu | \hat{O} | \phi_\mu \rangle \langle \phi_\mu | \psi_n \rangle \\ &= \int d\nu d\mu S_{\nu i}^* \langle \phi_\nu | \hat{O} | \phi_\mu \rangle S_{\mu n} = \int d\nu d\mu S_{\nu i}^* O_{\nu\mu} S_{\mu n} \end{aligned} \quad (9.13)$$

Ahora bien, si utilizmos la notación que conocemos del álgebra de matrices podemos escribir

$$S_{i\nu}^\dagger = S_{\nu i}^* \quad (9.14)$$

podemos escribir:

$$O_{in} = \int d\nu d\mu S_{i\nu}^\dagger O_{\nu\mu} S_{\mu n} \quad (9.15)$$

La fórmula (9.15) es la expresión que nos da el cambio de base de los elementos de matriz de un operador cualquiera. Es fácil probar que (usamos una notación evidente)

$$S^\dagger S = 1 \quad (9.16)$$

Esta fórmula se prueba a partir del producto

$$\begin{aligned} \int d\mu S_{i\mu}^\dagger S_{\mu n} &= \int d\mu S_{\mu i}^* S_{\mu n} = \int d\mu (\langle \phi_\mu | \psi_i \rangle)^* \langle \phi_\mu | \psi_n \rangle \\ &= \int d\mu \langle \psi_i | \phi_\mu \rangle \langle \phi_\mu | \psi_n \rangle = \delta_{in} \end{aligned} \quad (9.17)$$

(Hemos usado la clausura de la base $\{\phi_\nu\}$ y la ortonormalidad de la base $\{\psi_n\}$).

Además de saber cómo cambiar de una base a otra los elementos de matriz de un operador, podemos fácilmente establecer el cambio de base de los estados de un sistema:

$$|\eta\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle = \sum_n \langle \psi_n | \eta \rangle |\psi_n\rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_n \int d\nu \langle \psi_n | \phi_\nu \rangle \langle \phi_\nu | \eta \rangle | \psi_n \rangle \\
&= \sum_n \int d\nu S_{n\nu} d(\nu) | \psi_n \rangle
\end{aligned} \tag{9.18}$$

De (9.2) vemos que

$$c_n = \int d\nu S_{n\nu} d(\nu) \tag{9.19}$$

lo que nos da la conexión entre los coeficientes que permiten contruir al estado $|\eta\rangle$ en una y otra base. Análogamente podemos obtener la relación inversa:

$$d(\nu) = \sum_n S_{\nu n}^\dagger c_n \tag{9.20}$$

Un ejemplo importante: los operadores $\hat{p}$ y $\hat{q}$

Sean dos operadores, que llamaremos $\hat{p}$ y $\hat{q}$, que están asociados a dos observables y que satisfacen las siguientes tres condiciones:

- (i) $[\hat{p}, \hat{q}] = -\hbar i$
- (ii) $\hat{q}$ tiene un espectro no degenerado de autovalores reales q
- (iii) Todos los otros observables del sistema pueden escribirse en términos de $\hat{p}$ y $\hat{q}$.

Si bien hemos utilizado una notación sugestiva que nos induce a pensar que $\hat{q}$ es el operador posición y $\hat{p}$ el operador impulso en una dimensión espacial, por ahora los tomamos como dos operadores cualquiera que satisfagan las condiciones (i)-(iii). Luego nos convenceremos de que en efecto tal identificación es posible.

Comencemos por establecer algunas propiedades importantes de estos operadores. A partir de la igualdad

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \tag{9.21}$$

si elegimos

$$\hat{A} = \hat{q}, \quad \hat{B} = \hat{p}^n, \quad \hat{C} = \hat{p} \tag{9.22}$$

tenemos

$$[\hat{q}, \hat{p}^{n+1}] = [\hat{q}, \hat{p}^n]\hat{p} + \hat{p}^n[\hat{q}, \hat{p}] = [\hat{q}, \hat{p}^n]\hat{p} + \hbar i \hat{p}^n \quad (9.23)$$

Iterando el procedimiento llegamos fácilmente a

$$[\hat{q}, \hat{p}^{n+1}] = [\hat{q}, \hat{p}]\hat{p}^n + n\hbar i \hat{p}^n = (n+1)\hbar i \hat{p}^n \quad (9.24)$$

o

$$[\hat{q}, \hat{p}^{n+1}] = \hbar i \frac{d}{d\hat{p}} \hat{p}^{n+1} \quad (9.25)$$

Ahora podemos considerar el conmutador de $\hat{q}$ con una función cualquiera de $\hat{p}$, $F[\hat{p}]$. Para ello, desarrollamos $F[\hat{p}]$ en potencias de $\hat{p}$,

$$F[\hat{p}] = \sum_n F_n \hat{p}^n \quad (9.26)$$

y utilizamos el resultado (9.25):

$$[\hat{q}, F[\hat{p}]] = \sum_n F_n [\hat{q}, \hat{p}^n] = \hbar i \sum_n F_n \frac{d\hat{p}^n}{d\hat{p}} = \hbar i \frac{d}{d\hat{p}} F[\hat{p}] \quad (9.27)$$

O sea que simbólicamente podemos escribir

$$[\hat{q},] = \hbar i \frac{d}{d\hat{p}} \quad (9.28)$$

Dada la simetría de la regla de conmutación de $\hat{p}$ con $\hat{q}$ (a menos de un signo), podemos escribir sin más

$$[\hat{p},] = -\hbar i \frac{d}{d\hat{q}} \quad (9.29)$$

El lado derecho de esta ecuación nos recuerda la regla de cuantificación canónica que asociaba el impulso al operador gradiente respecto de las coordenadas, precisamente con el factor que aparece en el lado derecho. En cuanto a la ecuación (9.28), nos indica que el rol de p y q puede invertirse lo que permitiría asociar a la coordenada con el gradiente respecto del impulso, con un factor de signo opuesto.

Podemos usar estos resultados para estudiar un operador muy importante, que llamaremos $\hat{T}$,

$$\hat{T}[a] = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} a \hat{p}\right) \equiv \sum_n \left(-\frac{ia}{\hbar}\right)^n \frac{\hat{p}^n}{n!} \quad (9.30)$$

Es fácil ver que

$$[\hat{q}, \hat{T}[a]] = \hbar i \frac{d\hat{T}[a]}{d\hat{p}} = a\hat{T}[a] \quad (9.31)$$

Consideremos ahora un ket $|q_0\rangle$, autofunción de $\hat{q}$ con autovalor q_0 ,

$$\hat{q}|q_0\rangle = q_0|q_0\rangle \quad (9.32)$$

Analicemos el ket $\hat{T}[a]|q_0\rangle$. Comencemos por calcular

$$\hat{q}(\hat{T}[a]|q_0\rangle) = (\hat{q}\hat{T}[a] - \hat{T}[a]\hat{q} + \hat{T}[a]\hat{q})|q_0\rangle = (q_0 + a)(\hat{T}[a]|q_0\rangle) \quad (9.33)$$

Quiere decir que $\hat{T}[a]|q_0\rangle$ es una autofunción de $\hat{q}$ con autovalor $q_0 + a$ o, lo que es lo mismo,

$$\hat{T}[a]|q_0\rangle = |q_0 + a\rangle \quad (9.34)$$

Es decir que $\hat{T}$ es un operador de traslación respecto del autovalor q pues corre el valor de q_0 en la cantidad a y esto vale para cualquier valor de q . Por ello, cualquier estado $|q\rangle$ podrá ser escrito en términos de $|q_0\rangle$ eligiendo $a = q - q_0$:

$$|q\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(q - q_0)\hat{p}\right)|q_0\rangle \quad (9.35)$$

Es fácil ver que

$$\begin{aligned} \langle q|q'\rangle &= \langle q_0|\exp\left(\frac{i}{\hbar}(q - q_0)\hat{p}\right)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}(q' - q_0)\hat{p}\right)|q_0\rangle \\ &= \langle q_0|\exp\left(-\frac{i}{\hbar}(q - q')\hat{p}\right)|q_0\rangle = \langle q_0|q' - q + q_0\rangle \end{aligned} \quad (9.36)$$

Vemos que para que esta igualdad tenga sentido debemos poner $q = q'$ lo que implica que

$$\langle q|q'\rangle = \delta(q - q') \quad (9.37)$$

lo cual se completa con la relacion de clausura que debe obedecer toda base

$$\int dq|q\rangle\langle q| = 1 \quad (9.38)$$

Un estado cualquiera $|\psi\rangle$ puede ser expresado en términos de la base $\{|q\rangle\}$ así:

$$|\psi\rangle = \int dq' \langle q'|\psi\rangle |q'\rangle \equiv \int dq' \psi(q') |q'\rangle \quad (9.39)$$

donde hemos llamado

$$\psi(q') = \langle q'|\psi\rangle \quad (9.40)$$

Con esto,

$$\hat{q}|\psi\rangle = \int dq' \psi(q') \hat{q}|q'\rangle = \int dq' \psi(q') q' |q'\rangle \quad (9.41)$$

Multiplicando por el bra $\langle q|$ ambos miembros, tenemos

$$\langle q|\hat{q}|\psi\rangle = q\psi(q) \quad (9.42)$$

Por otra parte, usando la ec.(9.39) para escribir a $|\psi\rangle$, su producto escalar de con otro estado $|\phi\rangle$ de como resultado

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int dq' \psi(q') \langle\phi|q'\rangle = \int dq' \phi^*(q') \psi(q') \quad (9.43)$$

vemos que en el lado derecho tenemos el producto escalar que consideramos para las funciones de onda. Esto nos induce a considerar que $\psi(q)$, el “coeficiente” del desarrollo de $|\psi\rangle$ en la base $\{|q\rangle\}$, no es otra cosa que la función de onda que introdujimos al inicio del curso, si además identificamos a q con la coordenada asociada con la posición.

Todo lo que acabamos de hacer con la base $\{|q\rangle\}$ lo podemos repetir con la base $\{|p\rangle\}$ por lo que también podríamos escribir:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int dp' \phi^*(p') \psi(p') \quad (9.44)$$

La matriz de cambio de base es:

$$\begin{aligned} S_{qp} &= \langle q|p\rangle = \langle q_0| \exp\left(\frac{i}{\hbar}(q - q_0)\hat{p}\right) |p\rangle \\ &= \exp\left(\frac{i}{\hbar}(q - q_0)p\right) \langle q_0|p\rangle \end{aligned} \quad (9.45)$$

De la ecuación anterior tenemos que

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}q_0p\right) \langle q_0|p\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}qp\right) \langle q|p\rangle \quad (9.46)$$

A p fijo, el lado izquierdo solo depende de q_0 y el derecho de q . Concluimos entonces que

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}qp\right)\langle q|p\rangle = h(p) \quad (9.47)$$

Para determinar $h(p)$ hagamos

$$\begin{aligned} \delta(p-p') &= \langle p'|p\rangle = \int dq \langle p|q\rangle \langle q|p'\rangle \\ &= h(p')h(p)^* \int dq \exp\left(-\frac{i}{\hbar}q(p-p')\right) = h(p')h(p)^* 2\pi\hbar \delta(p-p') \end{aligned} \quad (9.48)$$

O sea,

$$|h(p)|^2 = (2\pi\hbar)^{-1} \quad (9.49)$$

y

$$S_{qp} = \langle q|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar}pq\right) \quad (9.50)$$

Es importante ahora estudiar los elementos de matriz de $\hat{p}$ en la base $\{|q\rangle\}$.

$$\langle q|\hat{p}|q'\rangle = \int dp \langle q|\hat{p}|p\rangle \langle p|q'\rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp p \exp\left(\frac{i}{\hbar}p(q'-q)\right) \quad (9.51)$$

Podemos entonces escribir

$$\langle q|\hat{p}|q'\rangle = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dq} \delta(q-q') = \langle q|\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dq}|q'\rangle \quad (9.52)$$

De esta manera tenemos en la base $\{|q\rangle\}$

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dq} \quad (9.53)$$

Esta es la fórmula que usábamos para expresar al operador impulso en mecánica ondulatoria. En cuanto a la acción de $\hat{p}$ sobre un estado $|\psi\rangle$,

$$\hat{p}|\psi\rangle \equiv |\phi\rangle \quad (9.54)$$

$$\begin{aligned}
\langle q|\phi\rangle &= \langle q|\hat{p}|\psi\rangle = \int dp \langle q|\hat{p}|p\rangle \langle p|\psi\rangle \\
&= \int dp p \langle q|p\rangle \langle p|\psi\rangle \\
&= \int dp dq' p \langle q|p\rangle \langle p|q'\rangle \langle q'|\psi\rangle \\
&= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp dq' p \psi(q') \exp\left(-\frac{i}{\hbar}p(q-q')\right) \\
&= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dq} \int dq' \psi(q') \delta(q-q') \quad (9.55)
\end{aligned}$$

O sea que podemos poner

$$\phi(q) = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dq} \psi(q) \quad (9.56)$$

Concluimos esta sección conectando las siguientes relaciones importantes:

$$\begin{aligned}
[\hat{q},] &= \hbar i \frac{d}{d\hat{p}} \Leftrightarrow \hat{p}\psi(q) = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dq} \psi(q) \\
[\hat{p},] &= -\hbar i \frac{d}{d\hat{q}} \Leftrightarrow \hat{q}\phi(p) = -\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dp} \phi(p) \quad (9.57)
\end{aligned}$$

Una partícula en un campo homogéneo: representación de impulsos

Un campo homogéneo en la dirección del eje x corresponde a una energía potencial

$$V(x) = -Fx \quad (9.58)$$

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en representación de coordenadas se reduce a

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - Fx\right) \psi(x) = E\psi(x) \quad (9.59)$$

con F constante.

Si decidimos trabajar en la representación de impulsos debemos utilizar para el operador $\hat{x}$

$$\hat{x} = \hbar i \frac{\partial}{\partial p} \quad (9.60)$$

Llamando $\phi(p)$ a la función de onda en esta representación, la ecuación de Schrödinger se escribe

$$\left(\frac{p^2}{2m} - \hbar i F \frac{\partial}{\partial p} \right) \phi(p) = E \phi(p) \quad (9.61)$$

o

$$\frac{\partial \phi}{\partial p} = \frac{i}{\hbar F} \left(\frac{p^2}{2m} - E \right) \phi(p) \quad (9.62)$$

cuya solución hallamos fácilmente:

$$\phi_E(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar F}} \exp \left(\frac{i}{\hbar F} (Ep - p^3/6m) \right) \quad (9.63)$$

normalizada de manera que valga

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi_E^*(p) \phi_E(p') dp = \delta(E' - E) \quad (9.64)$$

La solución en espacio de configuración puede escribirse transformando Fourier:

$$\psi_E(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi_E(p) \exp \left(\frac{i}{\hbar} px \right) \quad (9.65)$$

Puede verse que esta función corresponde a la llamada función de Airy $A_i(t)$ ⁵⁰ que es solución de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden llamada de Airy-Stokes

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - ty = 0 \quad (9.66)$$

Esta solución puede escribirse como

$$A_i(t) = \int_0^{\infty} du \cos \left(\frac{u^3}{3} + tu \right) \quad (9.67)$$

⁵⁰El nombre de Airy fue dado en honor al astrónomo y matemático inglés George Biddel Airy (1801-1892) que la encontró en estudios de óptica en 1838, , "On the intensity of light in the neighbourhood of a caustic", Transactions of the Cambridge Philosophical Society, University Press, 6 (1838) 379

Clase 10

En clases pasadas vimos que cuando se mide un observable $\mathcal{A}$ en un sistema en el estado $|\psi\rangle$ se obtiene necesariamente, como resultado de la medida, un autovalor a_n del operador hermítico $\hat{A}$ asociado a $\mathcal{A}$. Inmediatamente después de la medida, postulamos que el sistema queda en el estado

$$|\psi\rangle_{\text{desp}} = \frac{1}{\|\mathcal{P}_n|\psi\rangle\|} \mathcal{P}_n|\psi\rangle \quad (10.1)$$

donde $\mathcal{P}_n$ es el proyector sobre el subespacio $\{|ni\rangle\}$ de autofunciones de $\hat{A}$ con autovalor a_n , suponiendo que éstas tengan una degeneración especificada por un índice i ($i = 1, 2, \dots, r$),

$$\mathcal{P}_n = \sum_i |ni\rangle\langle ni| \quad (10.2)$$

En esta clase trataremos de responder a las preguntas: ¿Podemos medir a la par el observable $\mathcal{A}$ y otro observable $\mathcal{B}$ con absoluta precisión? ¿Cuántos observables podemos medir a la par con tal precisión? ¿En qué estado queda el sistema inmediatamente después de medirlos?⁵¹

Consideremos entonces dos observables $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ cuyos operadores asociados tienen, por simplicidad, autovalores en el discreto y son no de-

⁵¹Conviene señalar que como, estrictamente, estamos trabajando a tiempo fijo, hemos preferido en lo que sigue utilizar la terminología *a la par* en lugar de la palabra *simultáneamente*, que es la que suele aparecer en los textos habituales de Mecánica Cuántica al tratar estas cuestiones. En realidad el término *simultáneo* puede ser empleado si se lo toma no en el sentido temporal que le damos en castellano sino en el sentido de su raíz latina, *simul* juntamente. Otra manera apropiada será escribir de dos medidas hechas *a la vez*.

generados.

$$\begin{aligned}\hat{A}|\psi_n\rangle &= a_n|\psi_n\rangle \\ \hat{B}|\phi_m\rangle &= b_m|\phi_m\rangle\end{aligned}\tag{10.3}$$

Estudiaremos un vector de estado $|\phi\rangle$ en el que, al hacer una medida, se tiene certeza absoluta en la medida, es decir que la dispersion cuadrática se anula. Es decir que para el operador $\hat{A}$ debe ser

$$(\Delta A)^2 \equiv \langle\phi|(\hat{A}^2 - \langle\hat{A}\rangle^2)|\phi\rangle = 0$$

Ahora bien, a partir de la desigualdad de Scwharz válida par vectores del espacio de Hilbert vimos que $(\Delta A)^2 = 0$ implica que $|\phi\rangle$ debe ser una autofunción de $\hat{A}$. Si lo mismo sucede al medir $\mathcal{B}$ ($(\Delta B)^2 = 0$) para un sistema en el mismo estado deberá suceder que $|\phi\rangle$ también sea autofunción de $\hat{B}$. Tenemos entonces

$$\begin{aligned}\hat{A}|\phi\rangle &= a_n|\phi\rangle \\ \hat{B}|\phi\rangle &= b_n|\phi\rangle\end{aligned}\tag{10.4}$$

Es evidente entonces que $|\phi\rangle$ tiene que ser una autofunción comn a los dos operadores que podríamos escribir como $|\phi\rangle = |a_nb_n\rangle$ o simplemente $|\phi_n\rangle$ recordando que según cuál sea el operador el autovalor será a_n o b_n . Con el primer índice indicamos cuál es el “número cuántico” correspondiente a $\hat{A}$ y el segundo cuál el correspondiente a $\hat{B}$ (por ejemplo un número cuántico puede estar asociado a la energía y el otro al momento angular).

Concluimos entonces que para tener certeza absoluta en la medida simultánea de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ es necesario que los operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$ tengan una base común de autofunciones $\{|\phi_n\rangle\}$. Como veremos, el caso degenerado es apenas más complicado de demostrar.

Teorema: $\hat{A}$ y $\hat{B}$ tienen una base común de autofunciones si y solo si $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

(i) Si la base es común a $\hat{A}$ y $\hat{B} \Rightarrow [\hat{A}, \hat{B}] = 0$

Para probarlo, consideremos

$$\hat{A}\hat{B}|\phi_n\rangle = b_n\hat{A}|\phi_n\rangle = b_na_n|\phi_n\rangle\tag{10.5}$$

Por otro lado

$$\hat{B}\hat{A}|\phi_n\rangle = a_n\hat{B}|\phi_n\rangle = a_nb_n|\phi_n\rangle \quad (10.6)$$

de manera que sustrayendo ambas ecuaciones tenemos

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})|\phi_n\rangle = 0 \quad (10.7)$$

Dado que a cualquier estado $|\Psi\rangle$ lo puedo escribir como

$$|\Psi\rangle = \sum_n c_n |\phi_n\rangle \quad (10.8)$$

la ecuación (10.7) implica que para todo estado

$$[\hat{A}, \hat{B}]|\Psi\rangle = 0 \quad (10.9)$$

es decir que en todo el espacio de Hilbert del sistema vale que

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad (10.10)$$

(ii) Si $[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Rightarrow \hat{A}$ y $\hat{B}$ tienen una base común.

(ii-a) Caso no-degenerado

Consideremos a las autofunciones ϕ_n de $\hat{A}$,

$$\hat{A}|\phi_n\rangle = a_n|\phi_n\rangle \quad (10.11)$$

Como los operadores conmutan,

$$\hat{A}(\hat{B}|\phi_n\rangle) = \hat{B}(\hat{A}|\phi_n\rangle) = a_n(\hat{B}|\phi_n\rangle) \quad (10.12)$$

Es decir que $\hat{B}|\phi_n\rangle$ es autofunción de $\hat{A}$ con autovalor a_n y por ser un caso no degenerado, no puede más que diferir en una constante de $|\phi_n\rangle$.

Llamando a tal constante λ_n tendremos que los autovalores de $\hat{B}$ serán $b_n = \lambda_n a_n$,

$$\hat{B}|\phi_n\rangle = b_n|\phi_n\rangle \quad (10.13)$$

(ii-b) Caso degenerado

Escribamos la ecuación de autovalores y autofunciones del operador $\hat{A}$

$$\hat{A}|\phi_n^j\rangle = a_n|\phi_n^j\rangle, \quad j = 1, 2, \dots, r \quad (10.14)$$

Consideremos

$$\langle \phi_n^i | \hat{B} | \phi_m^j \rangle = \frac{1}{a_n} \langle \phi_n^i | \hat{A} \hat{B} | \phi_m^j \rangle \quad (10.15)$$

Tenemos también

$$\langle \phi_n^i | \hat{B} | \phi_m^j \rangle = \frac{1}{a_m} \langle \phi_n^i | \hat{B} \hat{A} | \phi_m^j \rangle \quad (10.16)$$

Como los operadores conmutan, los elementos de matriz en los lados derechos de (10.15) y (10.16) coinciden. Restándolos obtenemos

$$0 = (a_n - a_m) \langle \phi_n^i | \hat{B} | \phi_m^j \rangle \quad (10.17)$$

Vemos que si $n \neq m$ entonces $\langle \phi_n^i | \hat{B} | \phi_m^j \rangle \equiv B_{nm}^{ij} = 0$. Entonces, B_{nm}^{ij} nos define, a i, j fijos, una matriz diagonal por bloques,

$$\begin{pmatrix} (B_{11}^{ij}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & (B_{22}^{ij}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & (B_{nn}^{ij}) \end{pmatrix} \quad (10.18)$$

Tomemos un bloque dado, digamos el B_{NN}^{ij} ,

$$B_{NN}^{ij} = \begin{pmatrix} B_{NN}^{11} & \cdots & B_{NN}^{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{NN}^{r1} & \cdots & B_{NN}^{rr} \end{pmatrix} \quad (10.19)$$

Como $\hat{B}$ es hermítico, podemos diagonalizar el bloque y llevarlo a la forma

$$B_{NN}^{ij} = b_N \delta^{ij} \quad (10.20)$$

Así podemos diagonalizar uno a uno cada bloque y finalmente llegamos a que $\hat{B}$ es diagonal en una base $|\tilde{\phi}_n^j\rangle$, con los nuevos vectores de la base relacionados con la vieja por alguna matriz S ,

$$|\tilde{\phi}_n^j\rangle = S |\phi_n^j\rangle \quad (10.21)$$

Es evidente que en esta nueva base $\hat{A}$ sigue siendo diagonal como lo era antes del cambio de base por lo que encontramos una base común a

ambos. En efecto, en el subespacio $\{|\phi_N^i\rangle\}$, el operador $\hat{A}$ es equivalente a $a_N I$ con I el operador identidad,

$$\hat{A} \equiv a_N I \quad (10.22)$$

Multiplicando ambos miembros, a izquierda por S^{-1} y a derecha por S se tiene, siempre en el mismo subespacio,

$$S^{-1} \hat{A} S \equiv a_N I \quad (10.23)$$

con lo que

$$\langle \phi_N^i | S^{-1} \hat{A} S | \phi_N^j \rangle = a_N \langle \phi_N^i | \phi_N^j \rangle \quad (10.24)$$

o

$$\langle \tilde{\phi}_N^i | \hat{A} | \tilde{\phi}_N^j \rangle = a_N \delta^{ij} \quad (10.25)$$

Se dice que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son operadores compatibles ($\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ observables compatibles) si ambos se pueden medir con certeza absoluta a la par.

Por lo que vimos más arriba, para ser compatibles los operadores deben conmutar.

Nota: Vemos entonces que $\hat{p}$ y $\hat{q}$ no son operadores compatibles.

Para simplificar la notación llamemos $|a_n b_m i\rangle$ a la base común a los operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$, con autovalores a_n y b_m respectivamente y con degeneración $i = 1, 2, \dots, r$. Un estado $|\psi\rangle$ del sistema podrá entonces escribirse como

$$|\psi\rangle = \sum_{m,n,i} c_{nm}^i |a_n b_m i\rangle \quad (10.26)$$

La probabilidad de que al medir $\mathcal{A}$ sobre el estado $|\psi\rangle$ obtengamos el valor a_n es

$$P(a_n) = \sum_{m,i} |c_{nm}^i|^2 \quad (10.27)$$

Inmediatamente después de hecha la medida el sistema estará en un estado

$$|\psi\rangle_{desp} = \frac{1}{\mathcal{N}} \mathcal{P}_n |\psi\rangle \quad (10.28)$$

con $\mathcal{N} = \|\mathcal{P}_n|\psi\rangle\|$. Es fácil ver que

$$|\psi\rangle_{desp} = \frac{1}{\mathcal{N}} \sum_{p,j} |a_n b_p j\rangle \langle a_n b_p j | \psi \rangle = \frac{1}{\mathcal{N}} \sum_{p,j} c_{np}^j |a_n b_p j\rangle \quad (10.29)$$

Como el estado $|\psi\rangle_{desp}$ está normalizado, vemos que $\mathcal{N}$ está dado por

$$\mathcal{N}^2 = \sum_{pj} |c_{np}^j|^2 = P(a_n) \quad (10.30)$$

Si ahora medimos $\mathcal{B}$ sobre $|\psi\rangle_{desp}$, la probabilidad de obtener b_m es

$$P(b_m) = \frac{1}{\mathcal{N}^2} \sum_j |c_{nm}^j|^2 \quad (10.31)$$

Usando este resultado y la fórmula (10.30) vemos que la probabilidad de obtener como resultado de la medida a la par de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ los valores a_n y b_m será entonces

$$P(a_n, b_m) = P(a_n)P(b_m) = \sum_j |c_{nm}^j|^2 \quad (10.32)$$

En cuanto al estado final, está dado por

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_{desp \ desp} &= \frac{1}{\mathcal{N}'} \mathcal{P}_m |\psi\rangle_{desp} \\ &= \frac{1}{\mathcal{N}\mathcal{N}'} \sum_{q,k,j,r} |a_r b_m k\rangle \langle a_r b_m k | a_n b_q j \rangle c_{nq}^j \end{aligned} \quad (10.33)$$

o

$$|\psi\rangle_{desp \ desp} = \frac{1}{\tilde{\mathcal{N}}} \sum_j c_{nm}^j |a_n b_m j\rangle \quad (10.34)$$

con

$$\tilde{\mathcal{N}} = \sum_j |c_{nm}^j|^2 \quad (10.35)$$

Concluiremos definiendo un conjunto completo de observables que conmutan (CCOC):

Cuando los observables $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \dots$ poseen una y solo una base en común se dice que los operadores asociados $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$ forman un conjunto completo de operadores que conmutan (CCOC). Se los llama operadores compatibles.

El CCOC es un conjunto de operadores que conmutan dos a dos tal que la base es única en $\mathcal{H}$. Cualquier otro observable $\mathcal{R}$ tendrá asociado un operador $\hat{R}$ que podrá escribirse como

$$\hat{R} = \hat{R}(\hat{A}, \hat{B}, \dots) \quad (10.36)$$

Operadores que no conmutan

Consideremos dos operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$ asociados a dos observables, tal que su conmutador está dado por:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C} \quad (10.37)$$

(Hemos definido a $\hat{C}$ de manera que $\hat{C} = \hat{C}^\dagger$). También será útil definir un “anticonmutador”:

$$\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = \hat{F} \quad (10.38)$$

Las dispersiones cuadráticas de estos operadores para un sistema cuántico en un estado $|\psi\rangle$ estan dadas por:

$$\Delta A^2 = \langle \psi | (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 | \psi \rangle = \|(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)|\psi\rangle\|^2 \quad (10.39)$$

$$\Delta B^2 = \langle \psi | (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)^2 | \psi \rangle = \|(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)|\psi\rangle\|^2 \quad (10.40)$$

Para simplificar la notación sobrentenderemos que el sistema está en el estado $|\psi\rangle$ y escribiremos simplemente

$$\Delta A^2 = \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle = \|\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle\|^2 \quad (10.41)$$

$$\Delta B^2 = \langle (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)^2 \rangle = \|\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle\|^2 \quad (10.42)$$

Por la desigualdad de Schwartz podemos escribir

$$\begin{aligned} \Delta A^2 \Delta B^2 &= \|\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle\|^2 \|\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle\|^2 \\ &\geq |(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle, \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)|^2 \end{aligned} \quad (10.43)$$

Al producto escalar a la derecha de la segunda línea de la ecuación anterior podemos escribirlo así:

$$\begin{aligned} (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle, \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle + \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle - 2 \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \\ &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \end{aligned} \quad (10.44)$$

El producto $\hat{A}\hat{B}$ puede ser escrito en términos de $\hat{C}$ y $\hat{F}$ en la forma

$$\hat{A}\hat{B} = \frac{1}{2}\hat{F} + \frac{i}{2}\hat{C} \quad (10.45)$$

de manera que (10.44) puede ponerse como

$$(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle, \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) = \frac{1}{2}\langle \hat{F} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle + \frac{i}{2}\langle \hat{C} \rangle \quad (10.46)$$

y luego

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \left| \frac{1}{2}\langle \hat{F} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle + \frac{i}{2}\langle \hat{C} \rangle \right|^2 \quad (10.47)$$

Como los dos primeros términos del lado derecho de la desigualdad son reales,

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \left(\frac{1}{2}\langle \hat{F} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \right)^2 + \left(\frac{1}{2}|\langle \hat{C} \rangle| \right)^2 \quad (10.48)$$

o

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \frac{1}{4}\langle \hat{C} \rangle^2 \quad (10.49)$$

Si consideramos por ejemplo $\hat{A} = \hat{p}$ y $\hat{B} = \hat{q}$, entonces $|\langle \hat{C} \rangle| = \hbar$ y llegamos a la desigualdad (principio de incerteza):

$$\Delta p^2 \Delta q^2 \geq \frac{1}{4}\hbar^2 \quad (10.50)$$

o

$$\Delta p \Delta q \geq \frac{1}{2}\hbar \quad (10.51)$$

Clase 11

Cambios de observador

Dado el operador posición $\hat{q}$, que satisface las condiciones siguientes

$$\hat{q}|q\rangle = q|q\rangle, \quad q \in \mathbf{R} \quad (11.1)$$

$$\langle q|q'\rangle = \delta(q - q') \quad (11.2)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dq |q\rangle \langle q| = 1 \quad (11.3)$$

vimos que los estado físicos $|\psi\rangle$ de un sistema cuántico pueden ser escritos en términos de la base $\{|q\rangle\}$ como

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dq \psi(q) |q\rangle \quad (11.4)$$

donde $\psi(q)$ es la función de onda asociada al estado $|\psi\rangle$ en la “representación de coordenadas, $\psi(q) = \langle q|\psi\rangle$.”

Consideremos ahora dos observadores, $\mathcal{O}$ y $\mathcal{O}'$ (como siempre trabajamos a tiempo fijo $t = t_0$) que utilizan para hacer sus medidas sistemas de referencia diferentes (por ejemplo uno rotado respecto del otro, o trasladado, o con una escala diferente, etc).

El espacio de Hilbert del sistema que estos dos observadores van a estudiar es el mismo, los operadores asociados con los observables son formalmente los mismos (por ejemplo, si en un sistema el operador es proporcional a la derivada respecto de q en el otro, digamos “primado” será proporcional a la derivada respecto de q'). Obviamente al hacer una medición, los observadores obtendrán resultados distintos. En particular, si por ejemplo miden la posición, o la miden sobre el

mismo estado y obtienen resultados distintos o, si pretendieran obtener el mismo número, deben medirla sobre otro estado. Nosotros seguiremos en nuestro desarrollo teórico este segundo camino. (Para relacionarlo con algo conocido basta recordar el caso de una rotación de vectores: nos enseñaron a rotar al sistema o, alternatively, rotar a los vectores siendo ambos procesos equivalentes).

Llamemos $\hat{q}$ al operador posición en el sistema del observador $\mathcal{O}$ y $\hat{q}'$ a aquel del observador $\mathcal{O}'$, $|q\rangle$ y $|q'\rangle$ a los dos autofunciones diferentes que dan el mismo resultado al medir usando sistemas de referencia distintos,

$$\hat{q}|q\rangle = q|q\rangle, \quad \hat{q}'|q'\rangle = q|q'\rangle \quad (11.5)$$

Podemos relacionar a los autoestados $|q\rangle$ con $|q'\rangle$ proponiendo un cambio de base entre ellos

$$|q'\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dq \langle q|q'\rangle |q\rangle \quad (11.6)$$

Esta relación entre $|q\rangle$ y $|q'\rangle$ puede ser escrita en la forma

$$|q'\rangle = U|q\rangle \quad (11.7)$$

con U la operación que cambia los estados según los observadores $\mathcal{O}$ y $\mathcal{O}'$,

$$\langle q|q'\rangle = \langle q|U|q\rangle \quad (11.8)$$

Insertando $U^{-1}U = 1$ a la izquierda y a la derecha del operador $\hat{q}$ en la ec.(11.5) izquierda tenemos

$$\hat{q}|q\rangle = U^{-1}U\hat{q}U^{-1}U|q\rangle = U^{-1}U\hat{q}U^{-1}|q'\rangle \quad (11.9)$$

Tomando esta igualdad y multiplicándola a izquierda por U podemos escribir

$$qU|q\rangle = U\hat{q}U^{-1}|q'\rangle = q|q'\rangle \quad (11.10)$$

de manera que si escribimos

$$\hat{q}' \equiv U\hat{q}U^{-1} \quad (11.11)$$

la ecuación (11.10) se hace consistente con la segunda de las ecuaciones (11.5):

$$\hat{q}'|q'\rangle = q|q'\rangle \quad (11.12)$$

Es decir que a partir del cambio de base de las autofunciones del operador posición establecimos una relación entre los operadores en cada base. Es fácil ver que U es un operador unitario. En efecto, a partir de la definición (11.7) tenemos

$${}'\langle q_1| = \langle q_1|U^\dagger \quad (11.13)$$

Como la ortonormalidad debe ser satisfecha en ambas bases se tiene

$$\delta(q_1 - q_2) = {}'\langle q_1|q_2\rangle' = \langle q_1|U^\dagger U|q_2\rangle \quad (11.14)$$

por lo que necesariamente

$$U^\dagger U = 1 \quad (11.15)$$

Tenemos entonces dos fórmulas básicas para el cambio de un sistema al otro sistema. Una da el cambio del autovector y la otra la del operador. Son formalmente idénticas a las que corresponden a un cambio de base para autovectores y matrices de dimensión finita:

$$|q\rangle' = U|q\rangle, \quad \hat{q}' \equiv U\hat{q}U^{-1} \quad (11.16)$$

Un ejemplo: las traslaciones

Un ejemplo de operador U con el que ya tratamos es el de traslación

$$U(a) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}\right) \quad (11.17)$$

$$U(a)|q\rangle = |q+a\rangle \quad (11.18)$$

Supongamos que $\mathcal{O}$ y $\mathcal{O}'$ representan observadores midiendo en sistemas trasladado uno respecto del otro en una cantidad a . Entonces si $\mathcal{O}$ mide q_0 ,

$$\hat{q}|q_0\rangle = q_0|q_0\rangle \quad (11.19)$$

es fácil ver que para obtener el mismo número que $\mathcal{O}$, $\mathcal{O}'$ debe medir sobre un estado

$$|q_0\rangle' = |q_0 + a\rangle \quad (11.20)$$

Así se obtiene el mismo resultado q_0 . En efecto, tenemos

$$\hat{q}' = U(a)\hat{q}U^{-1}(a) \quad (11.21)$$

de manera que

$$\begin{aligned} \hat{q}'|q_0 + a\rangle &= U(a)\hat{q}U^{-1}(a)|q_0 + a\rangle = U(a)\hat{q}|q_0\rangle \\ &= q_0U(a)|q_0\rangle = q_0|q_0\rangle' = q_0|q_0 + a\rangle \end{aligned} \quad (11.22)$$

Cualquiera sea la operación que efectúa U , dependerá de uno o más parámetros (como el parámetro a en el caso de las traslaciones). Si consideramos un parámetro infinitesimal ϵ , podemos pensar en un desarrollo en serie

$$U(\epsilon) = U(0) + \hat{A}\epsilon + \hat{B}\epsilon^2 + \dots \quad (11.23)$$

Por convención diremos que cuando el parámetro es 0 no hay operación por lo que $U(0) = I$. Entonces, si trabajamos a orden ϵ tendremos

$$U(\epsilon) = I + \hat{A}\epsilon \quad (11.24)$$

$$U^{-1}(\epsilon) = I - \hat{A}\epsilon = U^\dagger \quad (11.25)$$

por lo que

$$\hat{A}^\dagger = -\hat{A} \quad (11.26)$$

Vemos entonces que conviene escribir $\hat{A} = -\frac{i}{\hbar}\hat{G}$ de manera de trabajar con operadores hermíticos y, también por conveniencia, una potencia negativa de $\hbar$ como en el caso de las traslaciones

$$\hat{G}^\dagger = \hat{G} \quad (11.27)$$

(en el caso de las traslaciones vemos que $\hat{G} = \hat{p}$). Tenemos entonces

$$U = 1 - \frac{i}{\hbar}\hat{G}\epsilon \quad (11.28)$$

A $\hat{G}$ se lo llama *generador de transformaciones infinitesimales*. Si se trata de generar una transformación finita con un parámetro θ , se puede definir $\epsilon = \theta/N$, con N suficientemente grande como para que ϵ sea infinitesimal. Entonces, se puede escribir a la transformación finita $U(\theta)$

como el producto de N transformaciones infinitesimales con N suficientemente grande:

$$U(\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} U(\theta/N)^N = \lim_{N \rightarrow \infty} (1 - \frac{i}{\hbar} \hat{G} \frac{\theta}{N})^N = \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{G} \theta) \quad (11.29)$$

donde hemos usado la fórmula de Euler para definir un exponencial. También podemos expresar el cambio de los operadores utilizando los generadores:

$$\begin{aligned} \hat{q}' &= U(\epsilon) \hat{q} U^{-1}(\epsilon) = (1 - \frac{i}{\hbar} \hat{G} \epsilon) \hat{q} (1 + \frac{i}{\hbar} \hat{G} \epsilon) \\ &= \hat{q} - \frac{i}{\hbar} [\hat{G}, \hat{q}] \epsilon + O(\epsilon^2) \end{aligned} \quad (11.30)$$

de manera que

$$\delta \hat{q} = \hat{q}' - \hat{q} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{G}, \hat{q}] \epsilon \quad (11.31)$$

Las relaciones que hemos obtenido son muy importantes: ante un cambio entre dos sistemas de medida con operador asociado $U(\theta)$

- los autoestados $|q\rangle$ cambian según $|q'\rangle = \exp((i/\hbar)G(\theta))|q\rangle$
- los operadores cambian según $\hat{q}' = \hat{q} - \frac{i}{\hbar} [\hat{G}, \hat{q}] \epsilon + O(\epsilon^2)$

Vemos que en el caso de una traslación (a lo largo del eje x), como $\hat{G} = \hat{p} = (\hbar/i)(d/dx)$

$$\delta \hat{q} = \hat{q}' - \hat{q} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{p}, \hat{q}] \epsilon = -\epsilon I \quad (11.32)$$

de manera que para los autovalores tendremos

$$q' = q - \epsilon \quad (11.33)$$

que es la fórmula adecuada para relacionar la medida de la posición en un sistema y en otro corrido respecto del primero en la cantidad ϵ .

Terminamos esta discusión recopilando las dos fórmulas que dan el cambio infinitesimal de autoestados y operadores:

$$\delta |q\rangle = -\frac{i\epsilon}{\hbar} \hat{G} |q\rangle, \quad \delta \hat{q} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{G}, \hat{q}] \epsilon \quad (11.34)$$

Noción de esquema

Sea $|\psi\rangle_1$ un estado dado y $\hat{A}_1$ un operador asociado a cierto observable. Sea $|\psi\rangle_2$ otro estado posible del sistema, “conectado” a $|\psi\rangle_1$ por una transformación lineal $\hat{U}_{21}$ que mantiene la norma:

$$|\psi\rangle_2 = \hat{U}_{21}|\psi\rangle_1 \quad (11.35)$$

De la condición

$${}_1\langle\psi|\psi\rangle_1 = {}_2\langle\psi|\psi\rangle_2 \quad (11.36)$$

Resulta que $\hat{U}_{21}$ es unitario,

$$\hat{U}_{21}^\dagger \hat{U}_{21} = I \quad (11.37)$$

El hecho de que la noción de resultado de una medida en mecánica cuántica este ligada a productos escalares (valores medios, que son objetos “globales” (en el sentido de que son números reales que son autovalores de un operador), hace natural plantear la siguiente pregunta:

¿Existirá algún operador $\hat{A}_2$ que actuando sobre $|\psi\rangle_2$ me de el mismo resultado que cuando $\hat{A}_1$ actúa sobre $|\psi\rangle_1$?

Cuando hablamos del “mismo resultado” queremos decir que

$${}_1\langle\psi|\hat{A}_1|\psi\rangle_1 = {}_2\langle\psi|\hat{A}_2|\psi\rangle_2 \quad (11.38)$$

o, usando (11.35),

$${}_1\langle\psi|\hat{A}_1|\psi\rangle_1 = {}_1\langle\psi|\hat{U}_{21}^\dagger \hat{A}_2 \hat{U}_{21}|\psi\rangle_1 \quad (11.39)$$

Es decir que para que $\hat{A}_2$ de la misma medida que $\hat{A}_1$ para todo estado debe ser

$$\hat{A}_2 = \hat{U}_{21} \hat{A}_1 \hat{U}_{21}^\dagger \quad (11.40)$$

Habíamos visto ya que en la mecánica cuántica había cierta ambigüedad con las funciones de onda: dos que diferían en una fase constante daban resultados idénticos para la medida de observables. Ahora vemos que hay una ambigüedad más amplia: el valor medio del operador $\hat{A}_1$ en el estado $|\psi\rangle_1$ puede dar el mismo resultado que el de $\hat{A}_2$ en el estado $|\psi\rangle_2$.

Hablaremos en relación a lo anterior de **esquemas**⁵²: el análisis de un sistema se puede hacer en el esquema 1 o en el esquema 2. En realidad, hay infinitos esquemas posibles, tantos como operadores lineales unitarios U queramos considerar.

Evolución temporal

Postulado 7: El espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de los estados de un sistema cuántico en un instante t arbitrario es idéntico al de los estados del sistema en un instante “inicial” t_0 .

Introduzcamos un esquema S y un esquema H de la siguiente manera:

- En el esquema S los estados evolucionan en el tiempo, $|\psi\rangle_S = |\psi(t)\rangle_S$, y los operadores son independientes del tiempo, $\hat{A}_S(t) = \hat{A}_S(t_0)$.
- En el esquema H los estados no evolucionan en el tiempo, $|\psi(t)\rangle_H = |\psi(t_0)\rangle_H$ pero los operadores sí: $\hat{A}_H(t) \neq \hat{A}_H(t_0)$.

Los esquemas S y H son conocidos como esquema de Schrödinger y esquema de Heisenberg por razones que quedarán claras pronto. Busquemos ahora el operador $\hat{U}(t)$ que ligue estados y operadores, en particular

$$\hat{q}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t) \hat{q}_S \hat{U}(t) \quad (11.41)$$

Llamemos $\hat{H}$ al generador infinitesimal de traslaciones en el tiempo. Entonces podremos escribir para la traslación de operadores

$$\hat{U}(t - t_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t - t_0)\hat{H}\right) \quad (11.42)$$

de manera que para un operador hermítico genérico $\hat{A}$ tendremos, según aprendimos,

$$\hat{A}_H(t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}(t - t_0)\hat{H}\right) \hat{A}_H(t_0) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t - t_0)\hat{H}\right) \quad (11.43)$$

⁵²En inglés se habla de diferentes “**pictures**”.

Dada la definición (11.42), está implícito que el generador $\hat{H}$ es independiente de t . En efecto, supongamos que no fuera así. Entonces en el instante t_0 deberíamos escribir $\hat{H} = \hat{H}(t_0)$ y apliquemos la relación (11.43). Resulta

$$\hat{H}_H(t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}(t - t_0)\hat{H}(t_0)\right) \hat{H}(t_0) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t - t_0)\hat{H}(t_0)\right) \quad (11.44)$$

Dado que un exponencial que contiene como único operador a $\hat{H}(t_0)$ debe conmutar con $\hat{H}(t_0)$ tendremos que para todo tiempo t

$$\hat{H}_H(t) = \hat{H}(t_0) = \hat{H} \quad (11.45)$$

por lo que el generador $\hat{H}$ es el mismo en los esquemas de Schrödinger y Heisenberg.

Postulado 8 (en el esquema de Heisenberg): Sea un intervalo durante el cual **no** se hacen medidas (ni el sistema interactúa con el medio en que se encuentra, esta “aislado”).

- (i) El estado $|\psi\rangle_H$ del sistema es el mismo en todo el intervalo.
- (ii) Como el sistema esta aislado, hay invarianza frente a traslaciones en el tiempo y el observable $\mathcal{A}$ tiene un operador asociado $\hat{A}_H(t)$ que evoluciona en el tiempo según la fórmula

$$\hat{A}_H(t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}(t - t_0)\hat{H}\right) \hat{A}_H(t_0) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t - t_0)\hat{H}\right) \quad (11.46)$$

Al operador $\hat{H}$, generador de las traslaciones infinitesimales en el tiempo se lo llama *hamiltoniano* del sistema y al observable asociado a este operador lo llama *energía*.

Es natural haber identificado al generador $\hat{H}$ con el hamiltoniano conectado con el observable energía si recordamos que en mecánica clásica la energía es la constante de movimiento asociada con la invarianza de un sistema físico ante traslaciones en el tiempo.

De la ec.(11.46) es fácil ver, teniendo cuidado en respetar el orden en que aparecen los operadores al derivar, que

$$\frac{d\hat{A}_H(t)}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{A}_H(t)] \quad (11.47)$$

Recordemos que en mecánica clásica existe una fórmula similar para las funciones $F(p, q)$ salvo que un corchete de Poisson reemplaza al conmutador en (11.47)

$$\frac{dF(p, q)}{dt} = \{H(p, q), F(p, q)\} \quad (11.48)$$

donde H es el Hamiltoniano clásico y el corchete de Poisson, para el caso de un espacio de dimension $d = 3$, se define como

$$\{H, F\} = \sum_k \left(\frac{\partial H}{\partial p_k} \frac{\partial F}{\partial q_k} - \frac{\partial H}{\partial q_k} \frac{\partial F}{\partial p_k} \right), \quad k = 1, 2, 3 \quad (11.49)$$

En (11.48) hemos supuesto que F no depende explícitamente de t . Caso contrario, la ecuación (11.48) debe reemplazarse por

$$\frac{dF(p, q; t)}{dt} = \frac{\partial F(p, q; t)}{\partial t} + \{H(p, q), F(p, q; t)\} \quad (11.50)$$

De la misma manera, para el caso en que el operador $\hat{A}$ dependa explícitamente del tiempo, deberemos también agregar en el lado derecho de (11.47) la derivada parcial de $\hat{A}$ respecto de t ,

$$\frac{d\hat{A}_H(t)}{dt} = \frac{\partial \hat{A}_H(t)}{\partial t} + \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{A}_H(t)] \quad (11.51)$$

En física clásica llamábamos constantes de movimiento a aquellas funciones de las variables dinámicas p, q que permanecían constantes durante el movimiento. La condición para que $F(p, q)$ fuera una tal constante (o integral) de movimiento era entonces que

$$\frac{\partial F(p, q; t)}{\partial t} + \{H(p, q), F(p, q; t)\} = 0 \quad (11.52)$$

En el caso en que la integral de movimiento no dependiera explícitamente del tiempo se tenía que la condición se reducía a que su corchete de Poisson con el Hamiltoniano se anulara

$$\{H(p, q), F(p, q)\} = 0 \quad (11.53)$$

Análogamente se tendrá que si $\mathcal{A}$ es un observable con un operador $\hat{A}_H(t)$ que no depende explícitamente del tiempo, será una constante de movimiento si se cumple que

$$[\hat{H}, \hat{A}_H(t)] = 0 \quad (11.54)$$

Cuando $\hat{A}_H$ conmuta con el Hamiltoniano para todo t se tiene que $\hat{A}(t) = \hat{A}(t_0)$. Supongamos que $|\psi\rangle_H$ es un autoestado de $\hat{A}(t_0)$. Si $\mathcal{A}$ es constante de movimiento entonces $|\psi\rangle_H$ es autoestado de $\hat{A}_H$ en todo instante.

Clase 12

Evolución temporal

Para comprobar que dado un observable A lo que hemos llamado $\hat{A}_H$ y $\hat{A}_S$ son el operador asociado $\hat{A}$ en dos esquemas diferentes, es decir, que se satisface la igualdad

$${}_H\langle\psi|\hat{A}_H|\psi\rangle_H = {}_S\langle\psi|\hat{A}_S|\psi\rangle_S \quad (12.1)$$

solo resta convencernos que existe un operador unitario $\hat{U}(t)$ que cumple

$$\hat{A}_S(t) = \hat{U}(t)\hat{A}_H(t)\hat{U}^\dagger(t) \quad (12.2)$$

tal que $\hat{A}_S(t) = \hat{A}_S(t_0)$.

Establecimos en la clase pasada (ver eq.(11.46) la relación

$$\hat{A}_H(t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}(t_0)\right)\hat{A}_H(t_0)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}(t_0)\right) \quad (12.3)$$

de la que es fácil ver que el operador adecuado es

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) \quad (12.4)$$

En efecto, tenemos

$$\begin{aligned} \hat{A}_S(t) &= \hat{U}(t)\exp\left(\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}\right)\hat{A}_H(t_0)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}\right)\hat{U}^\dagger(t) \\ &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)\exp\left(\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}\right)\hat{A}_H(t_0) \times \\ &\quad \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}\right)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) \\ &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t_0\right)\hat{A}_H(t_0)\exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t_0\right) \\ &= \hat{A}_S(t_0) \end{aligned} \quad (12.5)$$

Es decir

$$\hat{A}_S(t) = \hat{A}_S(t_0) \quad (12.6)$$

como debe ser en el esquema de Schrödinger en el que los operadores son independientes del tiempo.

En resumen, para cambiar de esquema a los operadores tenemos

$$\hat{A}_S = \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}t) \hat{A}_H \exp(\frac{i}{\hbar} \hat{H}t) \quad (12.7)$$

y para cambiar de esquema a los estados,

$$|\psi(t)\rangle_S = \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}t) |\psi\rangle_H \quad (12.8)$$

Por simple derivación respecto del tiempo se obtiene de la fórmula anterior $|\psi(t)\rangle_S$ obedece la siguiente ecuación de evolución temporal:

$$\frac{d|\psi(t)\rangle_S}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle_S \quad (12.9)$$

que podemos escribir de manera sugestiva como

$$\hat{H} |\psi(t)\rangle_S = \hbar i \frac{d|\psi(t)\rangle_S}{dt} \quad (12.10)$$

Proyectaremos ahora esta ecuación sobre la base $|q\rangle_S$ del operador $\hat{q}$ en el esquema de Schrödinger. Notemos que como el operador $\hat{q}$ está en el esquema de Schrödinger es independiente del tiempo por lo que sus autofunciones también lo son. Entonces

$${}_S\langle q | \hat{H} | \psi(t) \rangle_S = \hbar i {}_S\langle q | \frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle_S = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} {}_S\langle q | \psi(t) \rangle_S \quad (12.11)$$

Utilizando la notación $\langle q | \psi(t) \rangle_S = \psi(q, t)$ tendremos finalmente

$$\hat{H} \psi(q, t) = \hbar i \frac{\partial \psi(q, t)}{\partial t} \quad (12.12)$$

que no es otra que la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. En el marco de los postulados de la mecánica cuántica que estamos discutiendo esta ecuación ha surgido del estudio de la evolución temporal de los estados.

Una propiedad importante de los distintos esquemas se refiere a los autovalores. Consideremos un autoestado de un operador $\hat{A}_H(t)$ en el esquema de Heisenberg:

$$\hat{A}_H(t)|a\rangle_H = a|a\rangle_H \quad (12.13)$$

Multiplicando por $\exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)$ a izquierda insertando a la derecha del lado izquierdo se tiene

$$\exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)\hat{A}_H \exp(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t) \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)|a\rangle_H = a \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)|a\rangle_H \quad (12.14)$$

y usando que

$$|a\rangle_S = \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)|a\rangle_H, \quad (12.15)$$

tenemos

$$\hat{A}_S|a\rangle_S = a|a\rangle_S \quad (12.16)$$

Vemos que $\hat{A}_H$ y $\hat{A}_S$ tienen los mismos autovalores. Este es un resultado muy importante:

Los autovalores del observable son independientes del esquema.

Es decir que el resultado de las medidas será, como era de esperar si la noción de esquema tiene algún sentido, independiente de cuál esquema utilizemos.

Teorema de Ehrenfest⁵³

Por definición de esquema tenemos que

$${}_S\langle\psi(t)|\hat{A}_S|\psi(t)\rangle_S = {}_H\langle\psi|\hat{A}_H(t)|\psi\rangle_H \quad (12.17)$$

que para simplificar la notación escribiremos así:

$$\langle\hat{A}_S\rangle = \langle\hat{A}_H\rangle \quad (12.18)$$

⁵³Paul Ehrenfest, “Bemerkung über die angenäherte Gültigkeit der klassischen Mechanik innerhalb der Quantenmechanik”. (*Observaciones sobre la validez aproximada de la mecánica clásica dentro de la mecánica cuántica*), Zeitschrift für Physik 45 (1927) 455.

Ya que los estados en el esquema de Heisenberg no dependen del tiempo podemos deducir de la ecuación (12.18) que

$$\hbar i \frac{d\langle \hat{A}_S \rangle}{dt} = \hbar i \frac{d\langle \hat{A}_H(t) \rangle}{dt} = \langle \hbar i \frac{d\hat{A}_H}{dt} \rangle = -\langle [\hat{H}, \hat{A}_H] \rangle \quad (12.19)$$

Si insertamos en el conmutador la identidad escrita así:

$$I = \exp\left(\frac{i}{\hbar} \hat{H} t\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t\right) \quad (12.20)$$

es fácil ver que los estados en el esquema de Heisenberg se pueden escribir en términos de los de Schrödinger usando esos exponenciales con lo que se obtiene

$$\hbar i \frac{d\langle \hat{A}_S \rangle}{dt} = -\langle [\hat{H}, \hat{A}_S] \rangle \quad (12.21)$$

que nos da la evolución temporal de los valores medios en el esquema de Schrödinger en una fórmula hallada por Ehrenfest, que establece que la evolución temporal de los valores medios es formalmente idéntica a la que dan las ecuaciones de Hamilton de la mecánica clásica. Por ejemplo si elegimos $\hat{A}_S = \hat{p}$ y aceptamos que $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + V$, tenemos

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{dV}{dq} \right\rangle \equiv \langle F \rangle \quad (12.22)$$

Si en cambio elegimos $\hat{A}_S = \hat{q}$,

$$\frac{d\langle \hat{q} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\hat{p}}{m} \right\rangle \quad (12.23)$$

de donde podemos concluir que vale la ecuación de Newton para los valores medios.

$$\langle \mathcal{F} \rangle = m \frac{d^2 \langle \hat{q} \rangle}{dt^2} \quad (12.24)$$

donde $\mathcal{F}$ es el observable “fuerza”.

Cuantificación canónica

Postulado 9: Sea un sistema con análogo clásico en el esquema de Heisenberg.

- Los operadores “básicos” son $\hat{p}_i$ y $\hat{q}_i$ ($i = 1, 2, 3$) que corresponden a los observables *impulsos* “p” y *coordenadas* “q” del sistema y satisfacen

$$\begin{aligned} [\hat{p}_i, \hat{q}_j] &= -\hbar i \delta_{ij} \\ [\hat{p}_i, \hat{p}_j] &= [\hat{q}_i, \hat{q}_j] = 0 \end{aligned}$$

- Todo observable $\mathcal{A}$ que en mecánica clásica tome la forma $\mathcal{A}(p, q)$ se describe cuánticamente vía el operador $\hat{A} = \mathcal{A}(\hat{p}, \hat{q})$.

Ejemplo: La energía cinética clásica $T = p^2/2m$ deviene, por el postulado 9

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (12.25)$$

Vimos que en la representación de coordenadas se tiene que $\hat{p} = (\hbar/i)\nabla$ de manera que en tal representación

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \quad (12.26)$$

Nota: Hay en este postulado una ambigüedad. A la cantidad clásica $\mathcal{A} = pq$ le podemos hacer corresponder $\hat{A} = \hat{p}\hat{q}$ o $\hat{A} = \hat{q}\hat{p}$ y no son equivalentes puesto que $\hat{p}$ y $\hat{q}$ en general no conmutan. Una manera de salvar este problema es escribir $\mathcal{A} = (pq + qp)/2$ y entonces definir

$$\hat{A} = \frac{1}{2}(\hat{p}\hat{q} + \hat{q}\hat{p}) \quad (12.27)$$

que es lo que se llama *orden normal* de operadores.

Un ejemplo de cuantificación canónica

Sea una partícula de masa m y carga eléctrica e en un campo electromagnético $(\vec{E}, \vec{B})$,

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (12.28)$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (12.29)$$

con En cuanto a la q carga y corriente $\vec{j}$ asociada a un electrón en movimiento, toman la forma

$$q = -e, \quad \vec{j} = \frac{e}{c} \dot{\vec{x}} \quad (12.30)$$

El Lagrangiano clásico para un electrón será entonces

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - e\phi + \frac{e}{c} \dot{\vec{x}} \cdot \vec{A} \quad (12.31)$$

Usando

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}} = m \dot{\vec{x}} + \frac{e}{c} \vec{A} \quad (12.32)$$

el hamiltoniano clásico asociado a L toma la forma

$$H = \vec{p} \cdot \dot{\vec{x}} - L = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{x}, t) \right)^2 + e\phi(\vec{x}, t) \quad (12.33)$$

De acuerdo con el postulado de cuantificación canónica, el hamiltoniano *cuántico* del sistema es entonces

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\vec{p}} - \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{x}, t) \right)^2 + e\phi(\vec{x}, t) \quad (12.34)$$

Tomemos el caso de un campo electrostático en que $\vec{B} = 0$ y $\phi = \phi(\vec{x})$,

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{\vec{p}})^2 + e\phi(\vec{x}) \quad (12.35)$$

Para el caso de $\phi = 0$ y un campo magnético constante $\vec{B} = (0, 0, B)$ tenemos que el campo de gauge asociado es $(0, \vec{A})$ con

$$\vec{A} = \frac{1}{2} \vec{B} \wedge \vec{x}$$

Después de un poco de álgebra se llega a

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e}{2m} \vec{B} \cdot (\hat{x} \wedge \hat{p}) + \frac{e^2}{2mc} B(x^2 + y^2) \quad (12.36)$$

Es fácil ver que en el caso de una partícula cargada sometida a un campo electromagnético no se conserva $\hat{\vec{p}}$ sino $\hat{\vec{p}} - e/c \vec{A}(\vec{x}, t)$,

$$[\hat{H}, \hat{\vec{p}} - \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{x}, t)] = 0 \quad (12.37)$$

Simetrías y conmutadores

Vimos que si un observable $\mathcal{A}$ es conservado el operador asociado $\hat{A}$ conmuta con el hamiltoniano

$$[\hat{A}, \hat{H}] = 0$$

Ahora veremos cómo esta esto ligado con una invarianza del sistema. Consideremos un estado del sistema en el esquema de Schrödinger

$$|\psi(t)\rangle_S = \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)|\psi(0)\rangle_S \quad (12.38)$$

de manera que en la representación de coordenadas $\{|q\rangle\}$

$$\psi(q, t) = \langle q|\psi(t)\rangle_S = \langle q|\exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)|\psi(0)\rangle_S \quad (12.39)$$

Sea $\hat{G}$ el generador de transformaciones infinitesimales de cierta transformación que puede ser una traslación en el espacio que sabemos está asociada al impulso ($\hat{G} = \hat{p}$) una rotación, etc. Sabemos que el estado transformado $|q\rangle^\theta$ se puede escribir

$$|q\rangle^\theta = \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{G}\theta)|q\rangle \quad (12.40)$$

con θ el parámetro de la transformación. En el sistema transformado tendremos

$$\psi(q, t)^\theta = {}^\theta\langle q|\psi(t)\rangle_S^\theta = \langle q|\exp(\frac{i}{\hbar}\hat{G}\theta)\exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)|\psi(0)\rangle_S^\theta \quad (12.41)$$

Pero tenemos que

$$|\psi(0)\rangle_S^\theta = \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{G}\theta)|\psi(0)\rangle_S \quad (12.42)$$

con lo que

$$\psi(q, t)^\theta = \langle q|\exp(\frac{i}{\hbar}\hat{G}\theta)\exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t)\exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{G}\theta)|\psi(0)\rangle_S \quad (12.43)$$

o, usando la ecuación (10.37), para reemplazar el ket en $t = 0$ en el lado derecho por un ket a tiempo t ,

$$\psi(q, t)^\theta = \langle q | \exp(\frac{i}{\hbar} \hat{G} \theta) \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t) \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{G} \theta) \exp(\frac{i}{\hbar} \hat{H} t) | \psi(t) \rangle_S \quad (12.44)$$

Reescribamos (12.44) de la manera compacta

$$\psi(q, t)^\theta = \langle q | \hat{F} | \psi(t) \rangle_S \quad (12.45)$$

con

$$\hat{F} = \exp(\frac{i}{\hbar} \hat{G} \theta) \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t) \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{G} \theta) \exp(\frac{i}{\hbar} \hat{H} t)$$

Vemos que si fuera cierta la identidad $\hat{F} = I$ (12.45) devendría

$$\psi(q, t)^\theta = \langle q | \psi(t) \rangle_S = \psi(q, t) \quad (12.46)$$

Es decir que la función de onda en el sistema transformado sería idéntica a aquella en el sistema sin transformar. En otras palabras, el estado del sistema “no se enteraría de la transformación”. Y esto sería cierto para cualquier estado del sistema. Concluimos entonces que si $\hat{F} = I$ el sistema sería invariante ante tal transformación. Pero para que $\hat{F} = I$ es necesario que se cumpla que

$$\exp(\frac{i}{\hbar} \hat{G} \theta) \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t) = \exp(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \theta) \exp(\frac{i}{\hbar} \hat{G} t)$$

Y esta igualdad tiene como condición necesaria y suficiente que $\hat{G}$ y $\hat{H}$ conmuten. Podemos concluir entonces que

La condición necesaria y suficiente para que un sistema con hamiltoniano $\hat{H}$ sea invariante frente a una transformación cuyo generador infinitesimal es $\hat{G}$ es que

$$[\hat{G}, \hat{H}] = 0 \quad (12.47)$$

Clase 13

El momento angular

En la mecánica clásica, la invarianza de un sistema físico ante rotaciones (del sistema de coordenadas o de observador, según el punto de vista que se adopte) lleva de manera natural, vía el teorema de Noether, a la definición del vector momento angular como cantidad física que se conserva,

$$\vec{L} = \vec{x} \wedge \vec{p} \quad (13.1)$$

o, en componentes

$$L_i = \varepsilon_{ijk} x_j p_k, \quad i = 1, 2, 3 \quad (13.2)$$

Según las reglas de cuantificación canónica, el operador cuántico asociado es

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{x}} \wedge \hat{\vec{p}} \quad (13.3)$$

o en componentes

$$\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk} \hat{x}_j \hat{p}_k \quad (13.4)$$

No hay problemas de ambigüedad que requiera un ordenamiento pues la no conmutación entre coordenada e impulso da una contribución simétrica que se anula al ser multiplicada por ε_{ijk} .

Es fácil comprobar que $\hat{L}_i$ es un operador hermítico. En efecto,

$$\hat{L}_i^\dagger = \varepsilon_{ijk} \hat{p}_k^\dagger \hat{x}_j^\dagger = \varepsilon_{ijk} \hat{p}_k \hat{x}_j \quad (13.5)$$

y usando

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = \hbar i \delta_{ij} \quad (13.6)$$

tenemos

$$\hat{L}_i^\dagger = \varepsilon_{ijk}(-\hbar i\delta_{kj} + \hat{x}_j\hat{p}_k) = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_j\hat{p}_k = \hat{L}_i \quad (13.7)$$

También es fácil ver usando (13.6) que las componentes $\hat{L}_i$ no conmutan entre sí, sino que satisfacen reglas de conmutación de la forma

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = \hbar i\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k \quad (13.8)$$

De esto deducimos que

no se pueden medir al mismo tiempo con precisión absoluta las tres componentes del momento angular.

Es decir que las componentes del operador vectorial momento angular no son operadores compatibles. Esto pareciera dificultar el conocimiento de la magnitud del momento angular con precisión (ya que en su módulo intervienen las tres componentes). Sin embargo, dado

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_i\hat{L}_i \quad (13.9)$$

se puede comprobar fácilmente que

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_k] = 0 \quad (13.10)$$

De manera que

$\hat{L}^2$ y una de las tres componentes $\hat{L}_k$ sí pueden ser medidas a la par con precisión absoluta

Por convención suele llamarse $\hat{L}_z$ a la componente que se elige junto a $\hat{L}^2$ para integrar el CCOC.

Dijimos que en mecánica clásica $\vec{L}$ surgía de analizar la invarianza de un sistema físico ante rotaciones. Pero, ¿qué tiene que ver el operador $\hat{L}_i$ con las rotaciones? Consideremos a rotación infinitesimal la rotación de un vector $\vec{x}$ alrededor del eje 3 $\equiv z$. El vector se transformará según la matriz de rotaciones $R_z(\epsilon)$

$$\vec{x}' = R_z(\epsilon)\vec{x} \quad (13.11)$$

$$R_z(\epsilon) = \begin{pmatrix} \cos \epsilon & \sin \epsilon & 0 \\ -\sin \epsilon & \cos \epsilon & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & \epsilon & 0 \\ -\epsilon & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + O(\epsilon^2) \quad (13.12)$$

que podemos escribir

$$R_z(\epsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + O(\epsilon^2) \quad (13.13)$$

de manera que

$$\delta \vec{x} = \vec{x}' - \vec{x} = \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} \quad (13.14)$$

En mecánica cuántica sabemos que para rotar un operador $\hat{A}$ debemos conocer el generador de rotaciones, en este caso alrededor del eje z , $\hat{G}_z$, y escribir, en lugar de la expresión de una rotación del vector posición en física clásica dada por (13.14),

$$\hat{A}' = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{G}_z\epsilon\right) \hat{A} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{G}_z\epsilon\right) \quad (13.15)$$

de manera que para el caso de una rotación infinitesimal

$$\delta \hat{A} = -\frac{i}{\hbar}\epsilon[\hat{G}_z, \hat{A}] \quad (13.16)$$

En particular, si $\hat{A} = \vec{x}$

$$\delta \vec{x} = -\frac{i}{\hbar}\epsilon[\hat{G}_z, \vec{x}] \quad (13.17)$$

Se puede comprobar que la componente $\hat{L}_3 = \hat{L}_z$ cumple precisamente con la condición necesaria para ser el generador de rotaciones $\hat{G}_z$,

$$\hat{G}_z = \hat{L}_z \quad (13.18)$$

Es decir que, en general, el operador momento angular $\hat{L}_i$ es el generador infinitesimal de rotaciones alrededor del eje i . Para convencernos escribamos explícitamente

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x \quad (13.19)$$

o, en representación de coordenadas,

$$\hat{L}_z = \frac{\hbar}{i}(x\partial_y - y\partial_x) \quad (13.20)$$

donde

$$\partial_x = \frac{\partial}{\partial x} \quad (13.21)$$

Pero entonces

$$-\frac{i}{\hbar}\epsilon[\hat{L}_z, \vec{x}]f(\vec{x}) = -\epsilon[(x\partial_y - y\partial_x)\vec{x} - \vec{x}(x\partial_y - y\partial_x)]f(\vec{x}) \quad (13.22)$$

Luego de hacer actuar las derivadas se obtiene

$$-\frac{i}{\hbar}\epsilon[\hat{L}_z, \vec{x}]f(\vec{x}) = \epsilon \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} f(\vec{x}) \quad (13.23)$$

que es lo que habíamos obtenido en la ec.(13.14) para $\delta\vec{x}$ cuando relacionamos la medida de la posición en un sistema con la obtenida en otro rotado respecto del primero en un ángulo ϵ . Con esto confirmamos entonces que $\hat{L}_z$ es el generador infinitesimal de rotaciones alrededor del eje z y análogamente sucede con $\hat{L}_x$ y $\hat{L}_y$.

Tenemos entonces que, sobre operadores $\hat{A}$ una rotación con ángulo finito θ alrededor del eje z se escribe

$$\hat{A}^\theta = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{L}_z\theta\right)\hat{A}\exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{L}_z\theta\right) \quad (13.24)$$

Como $\hat{L}_z$ es un generador de una transformación de simetría, dado un sistema con hamiltoniano $\hat{H}$, tal sistema será invariante frente a rotaciones si y solo si $[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$.

Si se tratara de una rotación alrededor de los tres ejes, con ángulos $\vec{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ se tendría

$$\hat{A}^{\vec{\theta}} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{L}_i\theta_i\right)\hat{A}\exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{L}_i\theta_i\right) \quad (13.25)$$

Una estructura de generadores que satisfacen un álgebra como la que obedecen los $\hat{L}_i$, definida por las reglas de conmutación (13.8)

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k \quad (13.26)$$

se conoce como *algebra de Lie del grupo ortogonal* $O(3)$ que es el grupo de rotaciones en el espacio de 3 dimensiones. A los números $\hbar\varepsilon_{ijk}$ se los llama *constantes de estructura del álgebra*.

Autofunciones

Como vimos que $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0$, los operadores $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$ tienen que tener una base común de autofunciones que trataremos de encontrar. Llamemos $|\alpha\beta\gamma\rangle$ a los kets que corresponden a tales autofunciones:

$$\hat{L}^2|\alpha\beta\gamma\rangle = \hbar^2\alpha|\alpha\beta\gamma\rangle \quad (13.27)$$

$$\hat{L}_z|\alpha\beta\gamma\rangle = \hbar\beta|\alpha\beta\gamma\rangle \quad (13.28)$$

Con el índice γ estamos indicando una eventual degeneración.

Va a ser conveniente introducir dos operadores, $\hat{L}_+$ y $\hat{L}_-$ definidos así ⁵⁴:

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y \quad (13.29)$$

$$\hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y \quad (13.30)$$

de manera que se tiene

$$\hat{L}_+\hat{L}_- = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hbar\hat{L}_z \quad (13.31)$$

y

$$\hat{L}_-\hat{L}_+ = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 - \hbar\hat{L}_z \quad (13.32)$$

con lo que

$$\hat{L}_+\hat{L}_- + \hat{L}_-\hat{L}_+ = 2(\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2) = 2(\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2) \quad (13.33)$$

y

$$\hat{L}_+\hat{L}_- - \hat{L}_-\hat{L}_+ = [\hat{L}_+, \hat{L}_-] = 2\hbar\hat{L}_z \quad (13.34)$$

⁵⁴En el contexto de la física muchas fuentes atribuyen a Dirac la invención de estos “operadores escalera” que aparecen en su libro de 1930 *Principles of Quantum Mechanics* 1930 para resolver el problema de osciladores armónicos. Por el lado de la matemática, en el contexto de Grupos de Lie, aparecen en la llamada base de Cartan-Weyl.

Análogamente se puede ver que

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_\pm] = \pm \hbar \hat{L}_\pm \quad (13.35)$$

O sea que el álgebra definida en (13.26) en términos de $\{\hat{L}_i\}$ se puede escribir en una base diferente, usando $\{\hat{L}_\pm, \hat{L}_z\}$. Esta base se llama *de Cartan* y en ella las reglas de conmutación básicas son entonces

$$[\hat{L}_+, \hat{L}_-] = 2\hbar \hat{L}_z \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_\pm] = \pm \hbar \hat{L}_\pm \quad (13.36)$$

En su trabajo de tesis de 1894 Ellie Cartan utilizó esta base para clasificar todas las álgebras de Lie⁵⁵.

Notemos que como $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0$, se tiene inmediatamente que

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_\pm] = 0 \quad (13.37)$$

Ahora estamos en condiciones de analizar el ket $\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle$. Calculemos

$$\hat{L}^2(\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle) = \hat{L}_\pm\hat{L}^2|\alpha\beta\gamma\rangle = \hbar^2\alpha(\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle) \quad (13.38)$$

En cuanto a la acción de $\hat{L}_z$, después de usar (13.36) se llega a

$$\hat{L}_z(\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle) = \hbar(\beta \pm 1)(\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle) \quad (13.39)$$

De (13.38) vemos que $\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle$ es autofunción de $\hat{L}^2$ con el mismo autovalor α que $|\alpha\beta\gamma\rangle$. De (13.39) en cambio vemos que si bien $\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle$ es autofunción de $\hat{L}_z$, el autovalor correspondiente es $\beta \pm 1$. Concluimos entonces que

$$\hat{L}_\pm|\alpha\beta\gamma\rangle = C|\alpha(\beta \pm 1)\gamma\rangle \quad (13.40)$$

O sea que podemos inferir que los autovalores de $\hat{L}_z$ saltan de 1 en 1 salvo en el caso en que la constante C fuera nula. Por otra parte, dado que

$$||\hat{L}_x|\alpha\beta\gamma\rangle||^2 = \langle\alpha\beta\gamma|\hat{L}_x^2|\alpha\beta\gamma\rangle \geq 0 \quad (13.41)$$

y

$$||\hat{L}_y|\alpha\beta\gamma\rangle||^2 = \langle\alpha\beta\gamma|\hat{L}_y^2|\alpha\beta\gamma\rangle \geq 0 \quad (13.42)$$

⁵⁵Desde el punto de vista matemático, un álgebra de Lie es un espacio vectorial dotado de un corchete de Lie bilineal, antisimétrico y que verifica la identidad de Lie de Jacobi. Un corchete de Lie es una ley de composición interna $[\ , \]$ como por ejemplo $[a, b] = ab - ba$.

resulta

$$\langle \alpha\beta\gamma | \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 | \alpha\beta\gamma \rangle = \hbar^2(\alpha - \beta^2) \geq 0 \quad (13.43)$$

donde hemos usado

$$\langle \alpha\beta\gamma | \alpha\beta\gamma \rangle = 1 \quad (13.44)$$

Tenemos entonces que

$$\alpha \geq \beta^2 \quad (13.45)$$

Los autovalores de $\hat{L}^2$ son semidefinidos positivos. Dado un valor posible que llamaremos α_0 , los valores de β serán

$$\beta_0, \beta_0 + 1, \beta_0 + 2, \dots, \beta_{max} \leq \sqrt{\alpha_0}$$

de manera que debe ocurrir que

$$\hat{L}_+ |\alpha\beta_{max}\gamma\rangle = 0 \quad (13.46)$$

de donde

$$\begin{aligned} 0 &= \hat{L}_- \hat{L}_+ |\alpha\beta_{max}\gamma\rangle \\ &= (\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar \hat{L}_z) |\alpha\beta_{max}\gamma\rangle \\ &= (\alpha - \beta_{max}(\beta_{max} + 1)) |\alpha\beta_{max}\gamma\rangle \end{aligned} \quad (13.47)$$

con lo que

$$\alpha = \beta_{max}(\beta_{max} + 1) \quad (13.48)$$

Se puede hacer un análisis similar a partir de β_0 actuando con L_- . Se llega a que

$$\hat{L}_- |\alpha\beta_{min}\gamma\rangle = 0 \quad (13.49)$$

y en lugar de (13.48) a

$$\alpha = \beta_{min}(\beta_{min} - 1) \quad (13.50)$$

Luego, de las ecuaciones (13.48) y (13.50) resulta que

$$\beta_{max}(\beta_{max} + 1) = \beta_{min}(\beta_{min} - 1) \quad (13.51)$$

Hay dos soluciones posibles para esta relación cuadrática:

$$\beta_{min} = \beta_{max} + 1 \quad (13.52)$$

$$\beta_{min} = -\beta_{max} \equiv -l, \quad l \geq 0 \quad (13.53)$$

con $\beta_{max} > 0$. La solución (13.52) es absurda por lo que tenemos entonces

$$\beta = -l, -l+1, -l+2, \dots, l-1, l \quad (13.54)$$

$$\alpha = l(l+1) \quad (13.55)$$

Hay entonces $2l+1$ valores de β que van de $-l$ a l . Para ir de un entero negativo al mismo entero positivo β solo puede ser entero o semientero y escribiremos

$$|\alpha\beta\gamma\rangle = |lm\gamma\rangle \quad (13.56)$$

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 |lm\gamma\rangle &= \hbar^2 l(l+1) |lm\gamma\rangle \\ \hat{L}_z |lm\gamma\rangle &= \hbar m |lm\gamma\rangle \end{aligned} \quad (13.57)$$

$$-l \leq m \leq l \quad (13.58)$$

Para poder avanzar más en el conocimiento de los autovalores, consideremos a las autofunciones en la representación de coordenadas y escribamos a los operadores en coordenadas esféricas. Para comenzar, tenemos que

$$\hat{L}^2 = (\vec{r} \wedge \vec{p}) \cdot (\vec{r} \wedge \vec{p}) = r^2 (\vec{p})^2 - \vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{p}) \vec{p} + 2i\hbar \vec{r} \cdot \vec{p} \quad (13.59)$$

Ahora bien, la componente del gradiente en la dirección de r es $\partial/\partial r$ con lo que

$$\vec{r} \cdot \vec{p} = \frac{\hbar}{i} r \frac{\partial}{\partial r} \quad (13.60)$$

y (13.59) se puede escribir

$$\hat{L}^2 = r^2 \vec{p}^2 + \hbar^2 r^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2} + 2\hbar^2 r \frac{\partial}{\partial r} \quad (13.61)$$

o

$$\hat{L}^2 = r^2 \vec{p}^2 + \hbar^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \quad (13.62)$$

Ahora bien, tenemos que

$$\vec{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2 = -\hbar^2 \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \quad (13.63)$$

Usando (13.62) se tiene entonces

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \quad (13.64)$$

Vemos entonces que el Laplaciano en coordenadas esféricas se puede escribir en la forma

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

En cuanto a $\hat{L}_z = (\hbar/i)(x\partial/\partial y - y\partial/\partial x)$, en coordenadas esféricas resulta

$$\hat{L}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (13.65)$$

Las ecuaciones (13.64) y (13.65) nos dan entonces a $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$ en coordenadas esféricas. Es evidente ahora que en representación de coordenadas las autofunciones $|lm\gamma\rangle$ solo dependerán de (θ, φ) por lo que basta considerar

$$\langle \theta\varphi | lm\gamma \rangle \equiv \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi)$$

Entonces, la ecuación de autovalores de $\hat{L}_z$

$$\hat{L}_z \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) = \hbar m \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) \quad (13.66)$$

toma la forma

$$\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi} \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) = m \hbar \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) \quad (13.67)$$

que se integra trivialmente

$$\Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) = \exp(im\varphi) \Theta(\theta) \quad (13.68)$$

La dependencia en el ángulo azimutal dada por (13.68) implica que m debe ser entero pues de ser semientero $\Psi_{lm\gamma}(\theta, 0) = -\Psi_{lm\gamma}(\theta, 2\pi)$ y en

principio debemos descartar “autofunciones multivaluadas”. Tenemos entonces hasta ahora para los autovalores y autofunciones

$$\hat{L}^2 \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1) \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) \quad (13.69)$$

$$\hat{L}_z \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) = \hbar m \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) \quad (13.70)$$

con l un entero positivo o nulo y m entero tal que

$$l = 0, 1, 2, \dots \quad -l \leq m \leq l \quad (13.71)$$

Si escribimos $\hat{L}_+$ explícitamente en la representación de coordenadas es fácil ver que toma la forma

$$\hat{L}_+ = \hbar \exp(i\varphi) \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad (13.72)$$

de manera que

$$0 = \hat{L}_+ \Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) = \hbar \exp(i\varphi) \left((l+1) \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} - l \cot \theta \Theta \right) \quad (13.73)$$

de donde resulta que

$$\Theta(\theta) = A \sin^l(\theta) \quad (13.74)$$

con lo que

$$\Psi_{lm\gamma}(\theta, \varphi) = A \exp(il\varphi) \sin^l(\theta) \quad (13.75)$$

Vemos entonces que no hay degeneración alguna y que, eligiendo a A adecuadamente $\Psi_{lm} = Y_{lm}$ con $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ los armónicos esféricos. Aplicando $\hat{L}_-$ escrito explícitamente en coordenadas (θ, φ) se pueden obtener todos los armónicos esféricos a partir de Y_{lm} de manera que podemos escribir para las autofunciones de $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$

$$\langle \theta \varphi | lm \rangle = A_{lm} Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (13.76)$$

con A_{lm} una normalización adecuada. Puede mostrarse fácilmente que

$$\hat{L}_\pm |lm\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) \mp m(m+1)} |l, m \pm 1\rangle \quad (13.77)$$

con lo que cualquier autofunción puede construirse a partir de $|ll\rangle$:

$$|lm\rangle = \sqrt{\frac{(l+1)!}{(2l)!(l-m)!}} \frac{1}{\hbar^{l-m}} \hat{L}_-^{l-m} |ll\rangle \quad (13.78)$$

Clase 14

Potenciales centrales

Hemos comprobado en la clase pasada que el operador momento angular $\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{x}} \wedge \hat{\vec{p}}$ es el generador de rotaciones infinitesimales. Sabemos que si $[\hat{H}, \hat{\vec{L}}] = 0$ se cumple que $(d\hat{\vec{L}})/dt = 0$ lo que quiere decir que el momento angular es conservado.

Consideremos el hamiltoniano de una partícula de masa m sometida a un potencial $V(\vec{x})$,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{x}) \quad (14.1)$$

Como vale que

$$[\hat{L}_i, \hat{p}^2] = 0 \quad (14.2)$$

el hamiltoniano conmutará con el operador $\hat{L}_i$ si se cumple que

$$[\hat{L}_i, V(\vec{x})] = 0 \quad (14.3)$$

Puede verse trivialmente que la condición necesaria y suficiente para que valga (14.3) es que

$$V = V(|\vec{x}|) = V(r) \quad (14.4)$$

Una manera simple de comprobarlo consiste en utilizar las formulas en términos de variables angulares para L_φ y $L_\pm$ (eqs.(13.65), (13.72) y su conjugada) que permiten inferir que para conmutar con V éste no puede depender de ni de φ ni de θ .

Es decir que, al igual que en mecánica clásica, el sistema será invariante ante rotaciones y el momento angular se conservará si el potencial

es “central”⁵⁶. En tal caso, podremos trabajar con $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ como operadores compatibles y, según sea la forma del potencial central, buscar en cada caso sus autofunciones comunes. Es evidente que convendrá escribir al hamiltoniano en coordenadas esféricas en las que el laplaciano toma la forma

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \quad (14.5)$$

Vimos que cuando $\hat{L}^2$ es expresado en coordenadas esféricas toma la forma (ver ec. (13.64))

$$\hat{L}^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\hbar^2}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

que coincide con la parte angular del Laplaciano a menos del factor $1/r^2$. Si definimos como “momento radial” al cuadrado a $\hat{p}_r^2$ según la expresión

$$\hat{p}_r^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} \quad (14.6)$$

podemos escribir

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} = \frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} \quad (14.7)$$

El problema (independiente del tiempo) de autofunciones y autovalores a resolver

$$\hat{H}|Elm\rangle = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r)\right)|Elm\rangle = E|Elm\rangle \quad (14.8)$$

puede entonces escribirse en la representación de coordenadas en la forma ms simple

$$\left(\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} + V(r)\right) \Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) = E \Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) \quad (14.9)$$

con $\Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi)$ definida como

$$\Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) = \langle r\theta\varphi | Elm \rangle \quad (14.10)$$

⁵⁶I.e., depende solo de la distancia al centro

Pero como conocemos cómo actúa el operador $\hat{L}^2$ sobre la parte angular de autofunciones $\Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi)$ podemos escribir al problema de autovalores en la forma

$$\left(\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{2mr^2}l(l+1) + V(r) \right) \Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) = E\Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) \quad (14.11)$$

Como m , que es el autovalor de $\hat{L}_z$, no aparece en la ecuación, concluimos que las autofunciones solo dependerán de E y l . Luego, en un potencial central los autovalores de energía y de $\hat{L}^2$ tienen una degeneración de $2l+1$.

En este punto podemos escribir entonces explícitamente a la parte angular que como sabemos corresponde a los armónicos esféricos $Y_{lm}(\theta, \varphi)$

$$\Psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r} \Upsilon_{El}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (14.12)$$


con lo que ecuación de Schrödinger para los estados estacionarios en un potencial central se reduce entonces a una ecuación ordinaria de segundo grado para la coordenada radial,

$$\Upsilon''_{El} + \left(\frac{2m}{\hbar^2}(E - V(r)) - \frac{1}{r^2}l(l+1) \right) \Upsilon_{El} = 0 \quad (14.13)$$

donde $\Upsilon''_{El} = (d^2/dr^2)\Upsilon_{El}$. El problema de una partícula de masa m en un potencial central se ha reducido a un problema en una dimensión en el dominio $(0, \infty)$ y con un “potencial efectivo” $V_{ef}(r)$ dado por

$$V_{ef}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2}{2mr^2}l(l+1) \quad (14.14)$$

En la figura siguiente consideramos el caso en que $V(r)$ es del tipo coulombiano atractivo, $V(r) = -\alpha/r$



Al segundo término de la ec. (14.14) se lo llama *barrera centrífuga*. Notemos que ya a nivel clásico, cuando se trata de potenciales “centrales”, aparece la barrera centrífuga, tal como se ve en la figura. El único cambio en el caso cuántico es que la cantidad $(\vec{L})^2$ de la figura debe ser reemplazada por el autovalor del operador $(\hat{L})^2$ que es $\hbar^2 l(l+1)$. En el caso clásico la derivada del potencial asociado a la barrera científica lleva al habitual resultado la fuerza centrífuga (teniendo en cuenta que $\vec{L}^2$ es una constante de movimiento, $(\vec{L})^2 = m^2 v^2 r^2$

$$-\frac{d}{dr} \frac{1}{2mr^2} L^2 = \frac{1}{r^3} L^2 = \frac{mv^2}{r} \quad (14.15)$$

Dados los signos, esta fórmula corresponde a la fuerza centrífuga, que aparece cuando el cuerpo es considerado en un sistema de referencia rotante. Es una fuerza “ficticia” en el sentido de que resulta de la elección de sistema de referencia es no inercial.

A nivel cuántico no queda traza de L_z y sus autovalores en la ecuación (14.13) por lo que al determinar la energía habrá como ya señalamos una degeneración de $2l+1$, los valores que el número cuántico m puede tomar para un dado l .

En un problema como este en una dimensión no hay ninguna otra degeneración adicional, siempre que el potencial vaya a cero en el infinito y $r^2 V_{eff}(r)$ esté acotado en el origen de manera que sea válido un análisis del tipo del que hicimos para problemas en una dimensión.

Notemos que si el potencial está como dijimos acotado en el origen, allí domina la barrera centrífuga y la ecuación (14.13) deviene

$$\Upsilon''_{El} - \frac{1}{r^2} l(l+1) \Upsilon_{El} = 0, \quad r \sim 0 \quad (14.16)$$

con lo que la solución regular en el origen tiene la forma

$$\Upsilon_{El} \sim Ar^{l+1} \quad r \sim 0 \quad (14.17)$$

y la densidad de probabilidad dP

$$dP = |\Psi|^2 r^2 dr d\Omega \sim r^{2l+2} dr d\Omega \quad (14.18)$$

con $d\Omega$ el diferencial de ángulo sólido. Vemos que cuanto más grande es l , mayor es la probabilidad de encontrar a la partícula lejos del origen.

Un análisis como el que hicimos al estudiar las propiedades generales del movimiento en una dimensión permite ver que si $E < 0$ el espectro es discreto y si $E > 0$, continuo. El estado fundamental tiene que corresponder, necesariamente, a $l = 0$ ya que la parte angular de la función de onda (los armónicos esféricos) tiene, cuando $l \neq 0$ nodos y sabemos que el estado fundamental no los tiene.

El átomo de Hidrógeno

Vamos a aplicar lo que aprendimos de movimiento en un potencial central al estudio del átomo de Hidrógeno. Pero primero analizaremos cómo este átomo formado por dos partículas, un electrón de masa m_e y carga q_e y un protón de masa m_p y carga q_p , puede escribirse como un problema de una partícula (cuya masa es la masa reducida del sistema protón-electrón) en un potencial central. Empecemos por tabular los valores de masas y cargas:

$$\begin{aligned} m_p &= 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg} & q_p &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ Coul} \\ m_e &= 0.91 \times 10^{-30} \text{ kg} & q_e &= -1.6 \times 10^{-19} \text{ Coul} \end{aligned} \quad (14.19)$$

Existen dos fuerzas atractivas entre el protón y el electrón: la gravitatoria y la eléctrica. Pero la primera es 10^{36} veces más débil que la segunda por lo que el potencial que consideraremos será solo el coulombiano

$$V(r) = \frac{q_p q_e}{4\pi\epsilon_0 r} \equiv -\frac{e^2}{r} \quad (14.20)$$

con r la distancia entre ambas partículas (que consideraremos puntuales)

$$r = |\vec{r}_p - \vec{r}_e| \quad (14.21)$$

El hamiltoniano del sistema tiene la forma

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} + \frac{\hat{p}_p^2}{2m_p} - \frac{e^2}{r} \quad (14.22)$$

donde

$$\hat{\vec{p}}_e = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}_e}, \quad \hat{\vec{p}}_p = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}_p} \quad (14.23)$$

Al igual que en la mecánica clásica, conviene comenzar por separar el movimiento del centro de masa; para ello definimos

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_e \vec{r}_e + m_p \vec{r}_p}{m_e + m_p} \quad (14.24)$$

$$\vec{P}_{CM} = \hat{\vec{p}}_e + \hat{\vec{p}}_p \quad (14.25)$$

de manera que $\hat{H}$ tome la forma

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_{CM}^2}{2M_T} + \frac{\hat{p}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} \quad (14.26)$$

donde $M_T = m_e + m_p$, la masa reducida μ esta definida como

$$\mu = \frac{m_p m_e}{m_e + m_p} \quad (14.27)$$

y el momento relativo $\hat{\vec{p}}$ como

$$\hat{\vec{p}} = \frac{m_p \hat{\vec{p}}_e - m_e \hat{\vec{p}}_p}{m_e + m_p} \quad (14.28)$$

Como $m_e = 0.0018 \times m_p$ podemos aproximar

$$\mu \simeq m_e, \quad \hat{\vec{p}} \simeq \hat{\vec{p}}_e \quad (14.29)$$

Es claro de la ecuación (14.26) que el hamiltoniano queda separado en una parte correspondiente al centro de masa y otra al movimiento relativo:

$$\hat{H} = \hat{H}_{CM} + \hat{H}_{rel} \quad (14.30)$$

$$\hat{H}_{CM} = -\frac{\hbar^2}{2M_T} \nabla_{CM}^2 \quad (14.31)$$

$$\hat{H}_{rel} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 + V(r) \quad (14.32)$$

$$[\hat{H}_{CM}, \hat{H}_{rel}] = 0 \quad (14.33)$$

por lo que al problema estacionario

$$\hat{H}\psi(\vec{r}_p, \vec{r}_e) = E_T\psi(\vec{r}_p, \vec{r}_e) \quad (14.34)$$

lo podemos resolver separando variables

$$\psi(\vec{r}_p, \vec{r}_e) = \chi_{CM}(\vec{R}_{CM})\psi(\vec{r}) \quad (14.35)$$

$$\hat{H}_{CM}\chi_{CM} = E_{CM}\chi_{CM} \quad (14.36)$$

$$\hat{H}_{rel}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \quad (14.37)$$

$$E_T = E_{CM} + E \quad (14.38)$$

La solución de (14.36) es una onda plana,

$$\chi_{CM} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\vec{P}_{CM} \cdot \vec{R}_{CM}\right) \quad (14.39)$$

con

$$E_{CM} = \frac{\vec{P}_{CM}^2}{2M_T} \quad (14.40)$$

Queda entonces por resolver la parte del movimiento relativo. Podemos reemplazar como vimos la masa reducida por la del electrón y el impulso relativo por el del electrón:

$$\left(\frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} + V(r)\right)\psi(\vec{x}) = E\psi(\vec{x}) \quad (14.41)$$

Sabemos que en un problema de potencial central como este, el conjunto de operadores compatibles está dado por $\{\hat{H}_r, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$. Para resolverlo conviene nuevamente separar variables proponiendo una forma que para la parte angular corresponda a los armónicos esféricos (que son las autofunciones angulares adecuadas para un problema de potencial central)

$$\psi(\vec{x}) = \frac{1}{r}U_{El}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (14.42)$$

Con esto, la ecuación radial que resta resolver es

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m_e r^2}l(l+1) - \frac{e^2}{r}\right)U_{El}(r) = EU_{El}(r) \quad (14.43)$$

Como buscamos soluciones regulares debe ser $U_{El}(r=0) = 0$. En estas condiciones el problema unidimensional que enfrentamos tiene un espectro discreto para $E < 0$ y continuo para $E > 0$. Nos interesa estudiar el espectro discreto pues en tal caso el electrón se encuentra en algún estado ligado al núcleo formando el átomo de hidrógeno.

Conviene definir las siguientes cantidades y variables:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\hbar^2}{\mu e^2}, & E_I &= \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \\ \rho &= \frac{r}{a_0} & \lambda &= +\sqrt{\frac{-E}{E_I}} \end{aligned} \quad (14.44)$$

Con esto, la ec.(14.43) deviene

$$\left(\frac{d^2}{d\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} + \frac{2}{\rho}\right)U_{El}(\rho) = \lambda^2 U_{El}(\rho) \quad (14.45)$$

A grandes distancias esta ecuación se reduce a

$$U_{El}'' \sim \lambda^2 U_{El}, \quad \rho \rightarrow \infty \quad (14.46)$$

de manera que el comportamiento asintótico de la solución es, para el caso de los estados ligados ($E < 0$, λ real positivo)

$$U_{El} \sim \exp(-\lambda\rho), \quad \rho \rightarrow \infty \quad (14.47)$$

Entonces conviene escribir

$$U_{El}(\rho) = \exp(-\lambda\rho)y(\rho) \quad (14.48)$$

y resolver para $y(\rho)$,

$$y'' - 2\lambda y' + \left(\frac{2}{\rho} - \frac{1}{\rho^2}l(l+1)\right)y = 0 \quad (14.49)$$

La solución debe satisfacer $y(0) = 0$. Proponemos un desarrollo en serie de la forma

$$y(\rho) = \rho^s \sum_{q=0}^{\infty} c_q \rho^q \quad (14.50)$$

con s positivo de manera de asegurar que $y(r)$ se anule en el origen.

Insertando el desarrollo (14.50) en la ecuación (14.49) resulta, de comparar potencias,

$$-l(l+1) + s(s-1) = 0 \quad (14.51)$$

cuya única solución consistente es $s = l + 1$. Además, se obtiene la relación de recurrencia:

$$c_q = 2 \frac{(q+l)\lambda - 1}{q(q+2l+1)} c_{q-1} \quad (14.52)$$

De aquí se tiene que para $q \gg 1$

$$\frac{c_q}{c_{q-1}} \sim 2 \frac{\lambda}{q}, \quad q \gg 1 \quad (14.53)$$

Pero el lado derecho de (14.53) coincide con la relación de los coeficientes del desarrollo de $\exp(2\lambda\rho)$, que hace diverger a la función de onda para $\rho \rightarrow \infty$ a pesar del factor exponencial que contiene U_{El} según la ec.(14.48). Luego, como en el caso del oscilador, la serie debe cortarse y ello solo puede suceder, a l fijo, si para algún entero positivo $q = k$ se cumple que

$$(k+l)\lambda = 1, \quad k \geq 1 \quad (14.54)$$

Con esto, los autovalores de la energía resultan

$$E = E_{kl} = -E_I \frac{1}{(k+l)^2} \quad (14.55)$$

con E_I , definida en (14.44), con un valor que para el átomo de Hidrógeno es de

$$E_I = 13.6 \text{ eV} \ll m_e c^2 \quad (14.56)$$

Esta fórmula muestra que tiene sentido haber trabajado en una aproximación no relativista.

En cuanto a la ec. (14.55), que da la energía de los estados ligados, vemos que a medida que crecen los enteros k y l , la energía se aproxima a cero por los negativos de manera que en este límite la ligadura desaparece y por eso E_I se llama energía de ionización. Es fácil ver que los coeficientes del desarrollo (14.50) (que es un polinomio) tienen la forma

$$c_q = (-1)^q \frac{k-1}{(k-q-1)!} \frac{(2l+1)!}{q!(q+2l+1)!} c_0 \quad (14.57)$$

Podemos escribir entonces para la solución completa

$$\psi_{klm}(\vec{x}) = \rho^l \exp(-\lambda_{kl}\rho) \sum_{q=0}^{k-1} c_q \rho^q Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (14.58)$$

Para l fijo se tienen infinitos posibles valores para la energía poniendo $k = 1, 2, 3, \dots$. Dado que m no aparece en estas fórmulas, cada valor de la energía tiene una degeneración ligada a los $2l+1$ valores posibles de m a l fijo. Pero además hay una “degeneración accidental” debido a que puede suceder que

$$k+l = k' + l', \quad k \neq k' \quad l \neq l' \quad (14.59)$$

Conviene entonces definir $n = k+l$ y escribir

$$E_n = -E_I \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (14.60)$$

con

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (14.61)$$

En términos de n y l la degeneración $\mathcal{D}[E_n]$ del nivel E_n se calcula así:

$$\mathcal{D}[E_n] = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (14.62)$$

Las primeras funciones de onda radiales tienen la forma

$$U_{n=1, l=0, m=0}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \quad (14.63)$$

$$U_{n=2, l=0, m=0}(r) = \frac{1}{\sqrt{8\pi a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) \quad (14.64)$$

En general la función de onda completa se escribe

$$\psi_{lmn} = r^l \exp\left(-\frac{r}{na_0}\right) L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right) P_l^m(\cos\theta) \exp(im\varphi) \quad (14.65)$$



donde $L_p^q(r)$ son los polinomios de Laguerre y $P_l^m(\cos\theta)$ los de Legendre.

La función de onda del átomo de hidrógeno tiene superficies nodales (i.e. en las que $\psi = 0$). Suele estudiarse por separado la parte real y la imaginaria. Para comenzar, hay $l - m$ valores de θ para los que $P_l^m(\cos\theta) = 0$. Por otra parte, la parte real y la parte imaginaria de $\exp(im\varphi)$ se anulan para m valores del azimut. $L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right)$ se anula en $n-l-1$ valores de r . Para $l \neq 0$, r^l tiene un nodo en $r = 0$. Sumando todos estos casos, se tiene que salvo en el estado S ($l = 0$), el número total de superficies nodales es n (contando a $r = 0$ como una superficie nodal).


Solo si $l = 0$ la función de onda será apreciablemente no nula cerca del origen, lo que implica que el electrón tiene una probabilidad finita de estar sobre el núcleo y por ello quedar atrapado en lo que se conoce como una *captura electrónica*.

Como vimos, hay un número infinito de niveles de energía del discreto, (un infinito numerable). Para $E \geq 0$ se tiene un espectro continuo. En $E = 0$ hay un punto de acumulación ($E_n = 0$ para $n \rightarrow \infty$).


En las páginas siguientes se representan, usando la misma escala, las dos primeras funciones de onda radiales y luego la parte angular (en módulo cuadrado) de algunas de las funciones de onda del átomo de Hidrógeno.




En las figuras siguientes pueden verse representaciones paramétricas de la parte angular de funciones de onda del átomo e Hidrógeno para los casos $l = 0, 1, 2$ y $m = 0, 1, 0$ respectivamente.



Representación paramétrica de $||Y_{00}(\theta, \varphi)||^2$, la parte angular de la función de onda $\psi_{n,l=0,m=0}(r, \theta, \varphi)$



Representación paramétrica de $||Y_{11}(\theta, \varphi)||^2$, la parte angular de la función de onda $\psi_{n,l=1,m=1}(r, \theta, \varphi)$



Representación paramétrica de $||Y_{20}(\theta, \varphi)||^2$, la parte angular de la función de onda $\psi_{n,l=2,m=0}(r, \theta, \varphi)$

Una simetría dinámica $O(4)$

Es sabido que en un problema clásico en que el potencial es del tipo $1/r$ (problema de Kepler), además de H y $\vec{L}$, existe otra constante de movimiento que permite entender porqué las órbitas son cerradas. Este vector se llama vector de Lenz o de Runge-Lenz⁵⁷. Clásicamente se lo

⁵⁷Fue Pauli, al resolver en 1926 el problema cuántico del átomo de Hidrógeno sin usar la ecuación de Schrödinger, quien así lo bautizó. En realidad, por estar asociado a una conservación menos intuitiva que la del impulso o la del momento angular, fue redescubierto frecuente e independientemente varias veces en los últimos 3 siglos. El primero en construirlo fue Jakob Hermann (1710). Su trabajo fue generalizado a la forma moderna por Johann Bernoulli para ser redescubierto por Pierre-Simon de Laplace (1799). William Rowan Hamilton construyó un vector equivalente que llamó de excentricidad en 1847 y Gibbs usó análisis vectorial para obtenerlo. Esta última derivación fue tomada en un libro de texto de Carle Runge sobre vectores (1919), muy popular en Alemania. Por su lado Wilhem Lenz lo utilizó en un trabajo en

define como

$$\vec{M} = \frac{\vec{p} \wedge \vec{L}}{m} - \frac{\kappa}{r} \vec{r} \quad (14.66)$$

donde $\kappa = e^2$ para el caso del potencial coulombiano. Para que el operador cuántico asociado con esta cantidad sea hermítico, se da una definición simétrica de la forma

$$\hat{\vec{M}} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\vec{p}} \wedge \hat{\vec{L}} - \hat{\vec{L}} \wedge \hat{\vec{p}} \right) - \frac{\kappa}{r} \vec{r} \quad (14.67)$$

Puede mostrarse que

$$[\hat{\vec{M}}, H] = 0, \quad \hat{\vec{M}} \cdot \hat{\vec{L}} = \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{M}} = 0 \quad (14.68)$$

Ademas, existe la relación siguiente:

$$\hat{\vec{M}}^2 = \frac{2H}{m} (\hat{\vec{L}}^2 + \hbar^2) + \kappa^2 \quad (14.69)$$

Pauli tomo a las 3 componentes de $\hat{\vec{M}}$ como generadores adicionales a los de rotación identificados con $\hat{\vec{L}}$. P El álgebra que obedecen los 6 generadores es

$$[L_i, L_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k, \quad (14.70)$$

$$[L_i, M_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} M_k, \quad (14.71)$$

$$[M_i, M_j] = -i \left(\frac{2H}{m} \right) \hbar \varepsilon_{ijk} L_k, \quad (14.72)$$

Siempre que se consideren estados de energía negativa (ligados) se puede redefinir

$$M'_i = \left(\frac{-m}{2\hat{H}} \right)^{1/2} M_i \quad (14.73)$$

con $\hat{H}^{-1}$ definido a través de la relación

$$\hat{H}^{-1} |\psi\rangle = E^{-1} |\psi\rangle \quad (14.74)$$

que lo utilizó en 1924 para estudiar, usando la “vieja mecánica cuántica”, el átomo de Hidrógeno. Estas dos últimas referencias hicieron que Pauli llamara vector de Runge-Lenz.

(Eventualmente deberá restringirse el espacio de Hilbert a aquellos vectores en lo que valga esta identidad). Con tal cambio las relaciones de conmutación devienen

$$[L_i, L_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k, \quad (14.75)$$

$$[L_i, M'_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} M'_k, \quad (14.76)$$

$$[M'_i, M'_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k, \quad (14.77)$$

que no es otra cosa que el álgebra del grupo $O(4)$. Todavía podemos ir más allá: definiendo

$$\begin{aligned} I_i &= \frac{1}{2}(L_i + M'_i) \\ K_i &= \frac{1}{2}(L_i - M'_i) \end{aligned} \quad (14.78)$$

puede verse que las relaciones de conmutación (14.77) devienen

$$\begin{aligned} [I_i, I_j] &= i\hbar \varepsilon_{ijk} I_k, \\ [K_i, K_j] &= i\hbar \varepsilon_{ijk} K_k, \\ [I_i, K_j] &= 0 \end{aligned} \quad (14.79)$$

que hace evidente el isomorfismo entre el álgebra de $O(4)$ y el álgebra de $O(3) \times O(3)$. Estas dos álgebras son independientes y puede verse entonces que $\vec{I}^2$ y $\vec{K}^2$ conmutan con todos los generadores. Podemos entonces buscar una base común a $\vec{I}^2, \vec{K}^2, I_z, L_z$ tal como hicimos cuando estudiamos el caso del momento angular $\vec{L}$.

Dado que vimos que $L_i M_i = 0$ resulta que también vale que $L_i M'_i = 0$ de donde resulta que

$$\vec{I}^2 = \vec{K}^2 \quad (14.80)$$

Por otra parte, de la relación (14.69) se establece que

$$-\frac{1}{2}m\kappa^2 \hat{H}^{-1} = 2(\vec{I}^2 + \vec{K}^2) + \hbar^2 \quad (14.81)$$

lo que indica que la base común de I_j, K_i también es base de $\hat{H}$. Determinando como hicimos con $\hat{\vec{L}}$. A nivel de autovalores, siendo los de $\vec{I}^2$ y $\vec{K}^2$ iguales, la fórmula anterior deviene

$$-\frac{1}{2}m\kappa^2 E_k^{-1} = 4(k(k+1)\hbar^2 + \hbar^2) = (2k+1)^2 \hbar^2 \quad (14.82)$$

de donde tenemos

$$E_k = -E_I \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad k = 0, 1/2, 1, \dots \quad (14.83)$$

que coincide con la previamente obtenida (14.60) si se identifica $n = 2k+1$. Solo que de esta manera la degeneración adicional está ausente.

Las autofunciones correspondientes no son autoestados de $\vec{L}^2$. El conjunto completo de operadores que conmutan asociados a observables son H, I_z, K_z mientras que en la versión anterior que dimos eran $H_0, \vec{L}^2, L_z$. Notemos además que mientras que $\vec{L}$ es un vector axial, $\vec{M}$ es un verdadero vector de manera que $\vec{I}$ y $\vec{K}$ no tienen paridad definida por lo que los autoestados no pueden tener paridad definida.

Terminemos este análisis señalando que, en mecánica clásica, puede demostrarse la existencia de un vector que no cambia en el tiempo, análogo al de Runge-Lenz, para el caso de cualquier potencial central, siempre que se trate de describir el movimiento de órbitas cerradas. En contraste, en el caso cuántico, solo puede hallarse para los casos de un potencial constante, del coulombiano $V \propto 1/r$ y del oscilador armónico esférico $V \propto r^2$.

Clase 15

El spin

El concepto de spin de una partícula fue introducido para explicar una experiencia de los alemanes Otto Stern y Wahltter Gerlach que en 1922 reportaron resultados sobre el momento dipolar magnético de átomos de plata⁵⁸ que no concordaban con lo que predecía la teoría cuántica de Bohr. La palabra *spin* tiene en inglés un sentido de *giro* y así fue usada por Compton en 1921 cuando escribió, al concluir un trabajo sobre rayos X:

*“The electron itself, spinning like a tiny gyroscope, is probably the ultimate magnetic particle”.*⁵⁹

Pero esta interpretación es errada: hoy sabemos que el spin del electrón es $\hbar/2$.

Para determinar las posibilidades del electrón de girar de manera de obtener el momento angular de las medidas de Stern y Gerlach, su velocidad angular debería violar la relatividad restringida. Para mostrar esto Pauli calculó, en el marco del electromagnetismo clásico, el momento magnético $\vec{m}$ de una esfera de radio R uniformemente cargada

⁵⁸W. Gerlach and W. Stern “Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld” (*La demostración experimental de la cuantificación espacial en un campo magnético*), Zeitschrift für Physik **9** (1922) 349; “Das magnetische Moment des Silberatoms” (*El momento magnético del átomo de plata*) Zeitschrift für Physik **9** (1922) 353.

⁵⁹*El electrón mismo, girando como un pequeño giróscopo, es probablemente la “suprema” (extrema) partícula magnética.*

(con carga q) que gira con velocidad angular ω alrededor del eje z . Para ello, se parte de la fórmula para el momento dipolar magnético para anillos infinitesimales,

$$d\vec{m} = \frac{1}{2} \vec{r} \wedge \vec{J} dV \quad (15.1)$$

donde $\vec{J}$ es la corriente que circula por el anillo, $J = q/T$ con T el período de la órbita y dV el diferencial de volumen que conviene escribir en coordenadas esféricas. La integral sobre φ da como resultado 2π para luego integrar sobre θ de manera de cubrir la esfera.

El resultado del cálculo es

$$\vec{m} = \frac{1}{5} q \omega R^2 \hat{z} \quad (15.2)$$

Por supuesto la velocidad de giro ω no puede violar la relatividad general. Con ese dato, para que esta fórmula lleve a que el valor del momento angular sea $\hbar/2$, hace que el radio de la “esfera” tendría que ser mayor que $|\hbar/(2m_e c)| = 2 \times 10^{-13}$ m! siendo que los datos experimentales y cálculos teóricos indican hoy que tiene un radio menor que algún valor entre 10^{-18} y 10^{-22} metros!

Como conclusión, el spin del electrón nada tiene que ver con la rotación del electrón alrededor de algún eje.

La experiencia que idearon de Stern y Gerlach utilizaba un haz de átomos de plata, cuyas propiedades paramagnéticas⁶⁰ eran bien conocidas. Al momento de realizarse el experimento se entendía que estas propiedades estaban relacionada con las corrientes eléctricas que los electrones atómicos generan al moverse en sus “órbitas”. El átomo de plata tiene 47 electrones, lo que corresponde a 46 formando 4 capas cerradas (de 2, 8, 18, 18 electrones) y una quinta capa con un único electrón que, en la época se pensaba (erradamente) tenía momento angular $\hat{L}^2$ con número cuántico $l = 1$. Este electrón desapareado era el responsable de las propiedades magnéticas del átomo.

⁶⁰El paramagnetismo es un magnetismo de ciertos materiales que no tienen imantación espontánea pero que, bajo los efectos de un campo magnético externo adquieren una imantación en la misma dirección y sentido de ese campo externo. Al desaparecer el campo externo no conservan su imantación como en cambio sucede con los materiales ferromagnéticos. En los diamagnéticos la imantación, tiene sentido contrario

Según las ecuaciones de Maxwell que constituyen la base del electromagnetismo clásico, es el campo eléctrico producido por el electrón desapareado quien, como toda carga en movimiento, en este caso en su órbita, genera un campo magnético⁶¹. Ese campo magnético estaba en el origen de lo que se pensaba era un momento magnético elemental asignado a cada electrón atómico.

Los átomos de plata eran evaporados en un horno y llevados a formar un fino haz utilizando un colimador con un diafragma. Ese haz atravesaba un campo magnético muy inhomogéneo que lo desviaba según fuera el momento magnético de cada átomo del haz. Los átomos así deflectados al chocar contra una placa metálica dejaban una marca visible.

Al momento de hacerse el experimento de Stern y Gerlach (1920-1922) el valor de $l = 1$ asignado al electrón desapareado resultaba de aplicar la regla de cuantificación del momento angular propuesta por Bohr, $l = n\hbar$ con $n = 1, 2, \dots$ que llevaba, a través de argumentos clásicos, a niveles de energía para el átomo de Hidrógeno cuantificada según la fórmula $E_n = -E_I/n^2$. El valor más pequeño posible para l era, para el modelo de Bohr, $l = 1$. En cuanto a la proyección sobre el eje z , podía tomar cualquier valor entre -1 y 1 por ello en la pantalla donde incidían los electrones debían aparecer un segmento de recta continuo entre los puntos ± 1 , ya que no había ninguna restricción como la que dedujimos a nivel cuántico.

Recién con la mecánica cuántica de Schrödinger-Heisenberg, desarrollada en 1925 pudo saberse que los valores posibles de l incluían $l = 0$ y que este era el valor de l para el electrón desapareado del átomo de plata por lo que, finalmente, el experimento no serviría para confirmar

⁶¹Las corrientes eléctricas generan entonces campos magnéticos microscópicos por lo que los átomos eran vistos como imanes microscópicos a los que se asociaba un “momento magnético” Cuando actúa un campo magnético externo sobre estos imanes microscópicos, tiende a ordenarlos como el imán del costurero de la dama lo hace con las alfileres. En una primera aproximación los materiales magnéticos se clasifican como diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. En los diamagnéticos los campos microscópicos tienden a “oponerse” al campo externo resultando esto en un campo neto más débil. En los paramagnéticos tienden a aumentarlo. Al ferromagnetismo puede pensárselo como un paramagnetismo exagerado. Se utiliza un parámetro μ , llamado permeabilidad magnética, para caracterizar a estas diferentes posibilidades. En los materiales diamagnéticos $\mu < 1$. En los paramagnéticos $\mu > 1$. En los ferromagnéticos $\mu \gg 1$.

la cuantificación de $\hat{L}^2$ propuesta por Bohr.

En la página siguiente vemos un esquema simplificado del aparato usado por Stern y Gerlach. El campo magnético utilizado tiene una intensidad de aproximadamente 10^4 gauss. Si llamamos z a la dirección perpendicular al movimiento, el magneto es tal que el gradiente de campo es muy grande en esa dirección, $|dB_z/dz| \sim 10^5$ gauss/cm. Esto indica que el número de líneas por unidad de área aumenta mucho de sur a norte. Por supuesto, como $\nabla \vec{B} = 0$, esta variación debe ser compensada por la de otra componente (en este caso dB_x/dx).

Anotaremos como $\vec{m}$ al momento magnético de los átomos de plata. La energía potencial que adquieren en presencia de un campo magnético $\vec{B} = B(x, y)\check{k}$ será:


$$V = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad (15.3)$$

por lo que la fuerza a que están sometidos y que los desvía es

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z} (\vec{m} \cdot \vec{B}) \quad (15.4)$$

con lo que

$$\vec{F} = m_z \frac{dB_z}{dz} \check{k} \quad (15.5)$$



Para comprender el origen del momento magnético de los átomos de Ag conviene recordar que los electrones de este átomo están todos salvo uno en capa cerrada. El electrón de valencia (i.e., el único que no está en capa cerrada) tendrá un cierto momento angular y por ello, a partir de un razonamiento clásico, tendrá un momento magnético. En efecto, una partícula cargada al moverse genera una corriente eléctrica que induce un campo magnético y un momento magnético que resulta proporcional al momento angular de la partícula

$$\vec{m} \sim \vec{L} \quad (15.6)$$

Al ser sometido a un campo magnético externo, cada átomo sentirá un momento $\vec{\tau}$ dado por

$$\vec{\tau} = \vec{m} \wedge \vec{B} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (15.7)$$

o sea que

$$\frac{d\vec{L}}{dt} \perp \vec{L} \quad (15.8)$$


y tendremos, como en un giróscopo, la precesión de $\vec{L}$ alrededor de un eje. En la figura siguiente representamos esta precesión tomando al campo magnético en la dirección z (que corresponde al desvío del haz en el esquema anterior del experimento de Stern y Gerlach).

Como $\vec{L}$ y por ello $\vec{m}$ precesionan alrededor de z el promedio temporal alrededor de los otros ejes es nulo,

$$\langle m_x \rangle_{temp} = \langle m_y \rangle_{temp} = 0 \quad (15.9)$$

por lo que la fuerza promedio $\vec{F}$ será

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\langle m_z \rangle_{temp} B_z) = -\langle m_z \rangle_{temp} \left| \frac{dB_z}{dz} \right| \check{k} \quad (15.10)$$



La presencia del signo negativo se origina en la disminución del flujo magnético al crecer z). O sea que la fuerza es proporcional a la componente z del momento magnético promediado o, lo que es lo mismo, a la componente z del momento angular,

$$F_z \sim L_z \quad (15.11)$$

Vemos entonces que el dispositivo de Stern y Gerlach nos permite, a partir del análisis del desvío del haz y del cálculo de la fuerza que lo produjo, medir el momento angular del electrón de valencia.

Como los momentos magnéticos de los distintos átomos que forman el haz están orientados al azar, no hay una dirección preferencial para los $\vec{m}$. Entonces, m_z puede entonces tomar cualquier valor, desde un máximo $m_z = +|\vec{m}|$ a un mínimo, $m_z = -|\vec{m}|$. Según este análisis clásico, en la pantalla se vería una traza continua producida por los átomos al llegar desviados de manera continua, entre un punto de desvío máximo “a” hasta un punto de desvío mínimo “b”. En la figura siguiente mostramos cuál sería la imagen en la pantalla si este análisis clásico fuera correcto




Imagen clásica

Si en lugar de este análisis clásico procediéramos a uno cuántico basado en lo que establece la cuantificación canónica, deberíamos comenzar por construir el hamiltoniano del electrón de valencia en un campo magnético como el de la experiencia,

$$\hat{H}_e = \frac{1}{2m_e} \left(\hat{\vec{p}}_e - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 \quad (15.12)$$

El potencial vector de un campo magnético $\vec{B} = (0, 0, B)$ como el de la experiencia puede escribirse en términos de un potencial vector así:

$$\vec{A} = B(-y, x, 0) \quad (15.13)$$

(notar que este campo de gauge está en el gauge de Coulomb, $\partial_i A_i = 0$).

Para este campo de gauge el hamiltoniano (15.12) toma la forma:

$$\hat{H}_e = \frac{\hat{\vec{p}}_e^2}{2m_e} - \frac{e}{2m_e c} (\vec{B} \wedge \vec{r}) \cdot \hat{\vec{p}} + \frac{e^2}{2m_e c^2} (x^2 + y^2) B(z)^2$$

$$= \frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} - \frac{e}{2m_e c} \vec{B} \cdot \hat{\vec{L}} + \frac{e^2}{2m_e c^2} (x^2 + y^2) B(z)^2 \quad (15.14)$$

Hemos usado que para un campo como el dado por (15.13), $[\hat{\vec{p}}, \vec{A}] = 0$. Podemos ahora despreciar el llamado término diamagnético, de la forma

$$\frac{e^2}{2m_e c^2} (x^2 + y^2) B(z)^2 \quad (15.15)$$

ya que es muy pequeño, dado que $(x^2 + y^2)$ es del orden del radio atómico y aparece dividido por c^2 .

Dado el campo magnético en cuestión, el producto de $B_z L_z$ que aparece en la ecuación (15.15) puede ser identificado con $\vec{B} \cdot \vec{L}$ para un campo en cualquier dirección. Entonces, si llamamos

$$\vec{m} = \frac{e}{2m_e c} \vec{L} \quad (15.16)$$

el hamiltoniano del electrón de valencia puede ser escrito como

$$\hat{H}_e = \frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} - \vec{m} \cdot \vec{B} \quad (15.17)$$

Es fácil probar que, como el campo magnético en el experimento de Stern-Gerlach está dirigido en la dirección z en el segundo término solo aparece $m_z \propto L_z$ por lo que

$$[\hat{H}_e, \hat{L}^2] = [\hat{H}_e, \hat{L}_z] = 0 \quad (15.18)$$

por lo que el CCOC adecuado para trabajar es $\{H_e, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$. Los autovalores de $\hat{L}_z$ pueden tomar un número impar de valores $\hbar m$, $-l \leq m \leq l$ por lo que m_z puede tener $2l + 1$ valores,

$$m_z = \frac{e\hbar}{2m_e c} m \equiv \beta m \quad (15.19)$$

lo que nos permite escribir en general

$$\vec{m} = \beta \frac{\hat{\vec{L}}}{\hbar} \quad (15.20)$$

La imagen que debería verse en la experiencia de Stern-Gerlach debería tener un número impar de trazas de impacto.




Imagen de la cuantificación canónica

En realidad el momento angular del electrón de valencia del átomo de Ag es nulo, así que la imagen debería ser la de un único punto en el centro de la pantalla. Pero la imagen que se obtiene en la experiencia es la que mostramos abajo:




Imagen experimental

Que en la experiencia el haz se divida en dos implica que el momento angular del electrón de valencia del átomo de Ag cumplir que $2l_e + 1 = 2$ o, lo que implica aceptar que el electrón tiene un momento angular l_e

$$l_e = 1/2 \quad (15.21)$$

con una proyección sobre el eje z con número cuántico $m_e = \pm 1/2$. (Recordemos que los valores semienteros del momento angular habían sido descartados por unicidad de la función de onda).

El paso que fue necesario dar fue el que dieron en 1925 Samuel Goudsmit and George Uhlenbeck al postular que el electrón tiene un momento magnético intrínseco $\vec{m}_s$ que no proviene del movimiento⁶². A este momento magnético lo podemos pensar como producido por un momento angular intrínseco, que anotaremos como $\hat{s}$ y llamaremos spin⁶³,

$$\vec{m}_s = g\beta\frac{\hat{s}}{\hbar} \quad (15.22)$$

Hemos utilizado el mismo factor de proporcionalidad β (llamado magnetón de Bohr) que aparecía según la cuantificación canónica en la fórmula del momento magnético orbital, (15.20). Pero en este caso la proporcionalidad no tiene porqué ser la misma que dedujimos cuando pensábamos en un momento angular orbital. Por eso hemos introducido un factor de corrección que llamamos g . Como necesitamos justificar la imagen doble en la pantalla, tenemos que el autovalor de $\hat{s}_z$ debe ser $\pm\hbar/2$. Con esto, puede determinarse experimentalmente el valor numérico de g que al día de hoy está establecido en

$$g_{ex} = 2 \times (1.001\,159\,652\,193 \pm .000\,000\,000\,004)$$

Conviene aclarar que hemos elegido definir el factor giromagnético como un número positivo lo que implica que la carga del electrón que aparece en el magnetón de Bohr debe tomarse con signo negativo⁶⁴.

En el marco de la Mecánica cuántica en que estamos trabajando no puede predecirse el valor de g . Recién cuando se hace un análisis

⁶²S. Goudsmit and G. Uhlenbeck, *Naturwissenschaften* **13**(1925)953

⁶³El sustantivo “spin” se traduce al castellano como “giro”

⁶⁴Hay dos maneras de definir el momento magnético de las distintas partículas cargadas que tienen que ver con el signo de la carga eléctrica cuando la tienen. Una de las maneras es asignar a g un valor positivo y tener en cuenta el signo de la carga de la partícula en cuestión en el magnetón de Bohr $\beta = (e\hbar/(2mc))$ que será negativo para el electrón y positivo para el protón (cuyo factor giromagnético toma el valor $g_p = 5.585694702$). Esta suele ser la convención que se adoptaba en física atómica en el siglo pasado. La otra posibilidad es definir al magnetón de Bohr en valor absoluto y tener en cuenta el signo según sea el de la carga que aparece en el magnetón de Bohr. Esta última es la más moderna, utilizada en la física de partículas y que es consistente para el caso de partículas neutras como es el caso del neutrón cuyo momento magnético aparece con el mismo signo que el del electrón.

relativista se obtiene un valor teórico muy próximo al experimental, $g = 2$. Es en el contexto de la Teoría cuántica de campos cuando se logra un valor teórico sorprendentemente próximo al experimental. En efecto, en lo que es considerado uno de los triunfos más espectaculares de la Electrodinámica cuántica (llamada habitualmente *QED* según sus iniciales en inglés) la teoría predice

$$g_{teor} = 2 \times (1.001\,159\,652\,459 \pm .000\,000\,000\,123)$$

Una vez que introducimos un momento angular de spin podemos, recordando que los autovalores del momento angular podían en principio ser enteros o semienteros, copiar lo que aprendimos para el momento angular orbital, i.e.

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{L}_j] &= \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k \\ \hat{L}^2 |lm\rangle &= \hbar^2 l(l+1) |lm\rangle \\ \hat{L}_z |lm\rangle &= \hbar m |lm\rangle \end{aligned}$$

y escribir para $\hat{\vec{s}}$,

$$[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{s}_k \quad (15.23)$$

En cuanto a las autofunciones,

$$\hat{s}^2 |sm_s\rangle = \hbar^2 s(s+1) |sm_s\rangle \quad (15.24)$$

$$\hat{s}_z |sm_s\rangle = \hbar m_s |sm_s\rangle \quad (15.25)$$

que en este caso, en que necesariamente $|s_z| = 1/2$ y $s = 1/2$, se reducen a

$$\hat{s}^2 \left| \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{3\hbar^2}{4} \left| \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle \quad (15.26)$$

$$\hat{s}_z \left| \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle = \pm \frac{\hbar}{2} \left| \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle \quad (15.27)$$

Con la introducción del spin resolvemos un problema (el ligado al desvío en dos haces del haz de electrones en un campo magnético) pero creamos otro. En efecto, si hay un momento magnético propio al

electrón, éste deberá acoplarse al momento angular “orbital” $\vec{L}$ producido por el movimiento del electrón en su órbita. Es decir, tendremos un hamiltoniano de interacción de la forma

$$\hat{H}_{int} \propto \vec{m}_s \cdot \vec{L} \propto \vec{s} \cdot \vec{L} \quad (15.28)$$

con lo que

$$[\hat{H}_{int}, \hat{\vec{L}}] \neq 0 \quad (15.29)$$

El sistema pareciera haber perdido la invarianza bajo rotaciones espaciales. Solo si pensamos que el spin se asocia con el momento angular $\hat{\vec{L}}$ para formar un operador de momento angular total $\hat{\vec{J}}$ podremos esperar recuperar la imagen que relacionaba el momento angular con rotaciones e invarianzas. A los autovalores de este $\hat{\vec{J}}$ deben contribuir los enteros que son autovalores de $\hat{L}^2$ y los semienteros ($1/2$) de $\hat{s}^2$.

Comencemos por establecer el álgebra del momento angular total. Como en los casos del momento angular orbital y el de spin, escribiremos

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k \quad (15.30)$$

$$\hat{J}^2 |jm_j\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm_j\rangle \quad (15.31)$$

$$\hat{J}_z |jm_j\rangle = \hbar m_j |jm_j\rangle \quad (15.32)$$

Los autovalores j pueden tomar valores enteros o semienteros, positivos,

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \quad (15.33)$$

En cuanto a m_j , puede tomar $2j+1$ valores,

$$-j \leq m_j \leq j \quad (15.34)$$

Con un j fijo, tendré entonces $2j+1$ autofunciones independientes que generan un subespacio que llamaremos de *espinores de rango $2j$* .

Para dar una definición precisa de un espinor, recordemos cómo se define un vector ordinario en el espacio de tres dimensiones: se dice que tres cantidades v_i ($i = 1, 2, 3$) son las componentes de un vector $\vec{v}$ si transforman bajo rotaciones según la ley

$$v'_i = R_{ij} v_j, \quad R \in O(3) \quad (15.35)$$

Diremos que $2j + 1$ cantidades e_i ($i = 1, 2, \dots, 2j + 1$) son las componentes de un espinor de rango $2j$ si transforman frente a la rotación $R \in O(3)$ definida en (15.35) según

$$e'_i = D_{ik}^j(R) e_k, \quad (15.36)$$

La matriz de $(2j + 1) \times (2j + 1)$ componentes $D^j(R)$ representa una rotación sobre objetos de un espacio vectorial de dimensión $2j + 1$, los espinores.

Ahora bien, cuando estudiamos transformaciones de los estados de un sistema cuántico vimos que para que estuvieran asociadas a invariaciones de ese sistema debía tratarse de operadores hermíticos, es decir que, si los llamamos U debía cumplirse que

$$U^\dagger = U^{-1} \quad (15.37)$$

Si llamamos M_n a los generadores de esas transformaciones vimos que la transformación U podía escribirse como

$$U = \exp(M_n \alpha_n) \quad (15.38)$$

donde α_n , $n = 1, 2, \dots$ son los parámetros asociados a las transformaciones, por ejemplo los ángulos de una rotación. Pero entonces debe ser que para que se cumpla (15.38) debe valer que

$$\exp(M_n^\dagger \alpha_n) = \exp(-M_n \alpha_n) \quad (15.39)$$

o sea que M_n debe ser anti-hermítica

$$M^\dagger = -M_n$$

Como queremos generadores hermíticos para asociarlos a observables vimos que convenía escribir

$$M_n = iK_n \quad (15.40)$$

con lo cual se cumple que

$$K_n^\dagger = K_n$$

En particular, para el caso de rotaciones escribiremos entonces para las matrices asociadas a una rotación R

$$D(R) = \exp(iJ_i \alpha_i) \quad (15.41)$$

Algunos ejemplos

Espinores de rango 0: Como el rango $2j = 0$, debe ser $j = 0$. La dimensión del subespacio es $\dim = 1$. Las matrices $D^0(R)$ son entonces números y la unitariedad hace que tengamos

$$D^0(R) = 1$$

Un espinor de rango cero no cambia entonces frente a rotaciones: es un escalar:

Espinor de rango 2: Como $2j = 2$ debe ser $j = 1$. El espinor debe tener 3 componentes y lo podremos escribir así:

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \quad (15.42)$$

Las matrices de rotación $D^1(R)$ son matrices de 3×3 que rotan a estos espinores según fórmula

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} = D^1(R) \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \quad (15.43)$$

Los espinores de rango 2 transforman entonces como las componentes de un vector.

Espinor de rango 1: Como $2j = 1$ debe ser $j = 1/2$. El espinor debe tener 2 componentes y lo podremos escribir así:

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \quad (15.44)$$

Frente a rotaciones se transformarán así:

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = D^{\frac{1}{2}}(R) \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \quad (15.45)$$

con $D^{\frac{1}{2}}(R)$ matrices de 2×2 que representan rotaciones.

En general se puede definir un producto escalar de espinores:

$$(e, f) = e_1^* f_1 + e_2^* f_2 + \dots + e_{2j+1}^* f_{2j+1} = e_i^* f_i \quad (15.46)$$

Este producto es ciertamente un escalar pues ante rotaciones

$$(e', f') = e_i'^* f_i' = e_p^* f_q (D_{ip}^j)^\dagger(R) D_{iq}^j(R) \quad (15.47)$$

Basta entonces con que $D^j(R)$ sea unitaria para tener

$$(e', f') = (e, f) \quad (15.48)$$

Clase 16

Más sobre las representaciones del Algebra de Lie de $O(3)$

Vamos ahora a tratar de hallar las matrices $D^j(R)$ en algunas de las representaciones de $O(3)$. Empecemos por la que corresponde a $j = 1$ que rota espinores de rango $2j = 2$, es decir vectores de 3 componentes. Estará dada por 3 matrices de 3×3 que de hecho ya conocemos, pues coinciden (a menos de algun posible cambio de base) con las matrices que generan las rotaciones de los vectores “geométricos” o “vectores espaciales” como el vector posición.

Empecemos por definir, a partir de los operadores $\hat{J}_i$, operadores $J_{\pm}$ como hicimos ya con los momentos angulares orbitales $\hat{L}_i$:

$$J_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (J_x \pm iJ_y) \quad (16.1)$$

A la manera de Cartan, el álgebra el álgebra puede definirse entre estos dos generadores y J_z

$$\begin{aligned} [J_z, J_{\pm}] &= \pm \hbar J_{\pm} \\ [J_+, J_-] &= \hbar J_z \end{aligned} \quad (16.2)$$

La ruta que hay que seguir para calcular una representación matricial finita, de orden $(2j+1) \times (2j+1)$ para estos generadores es la siguiente.

Se comienza por elegir a J_z como una matriz diagonal. Esto no implica ninguna pérdida de generalidad ya que toda matriz hermítica es diagonalizable por una transformación unitaria. Pero si J_z es diagonal y no es la identidad, los otros dos generadores, $J_{\pm}$ ya que no conmutan con J_z no pueden ser diagonales.

Elegimos una base engendrada por las autofunciones de J^2 y J_z que sí conmutan,

$$J_z|jm\rangle = m|jm\rangle \quad (16.3)$$

donde hemos puesto $\hbar = 1$ por economía notacional. Al final del cálculo, por análisis dimensional, recuperaremos a la constante de Planck. También vamos a obviar la indicación del autovalor de J^2 dejando solamente el de J_z ,

$$|jm\rangle \equiv |m\rangle$$

ya que j estará fijo para cada representación.

Sabemos que

$$J_+|j-i\rangle = \nu_i|j-i+1\rangle, \quad J_-|j-i\rangle = \mu_i|j-i-1\rangle \quad (16.4)$$

donde μ_i, ν_i son factores de proporcionalidad a determinar.

Siendo que la representación es finita, debe ser

$$\begin{aligned} J_+|j\rangle &= 0 \\ J_-|-j\rangle &= 0 \end{aligned} \quad (16.5)$$

Vamos ahora a determinar los factores de proporcionalidad μ, ν en (16.4). Calculando de manera directa la acción de $J_{\pm}$ tendremos

$$J_+J_-|j-i\rangle = \mu_i J_+|j-i-1\rangle = \mu_i \nu_{i+1}|j-i\rangle \quad (16.6)$$

Por otro lado, usando el álgebra (16.2) se tiene

$$\begin{aligned} J_+J_-|j-i\rangle &= J_-J_+|j-i\rangle + [J_+, J_-]|j-i\rangle \\ &= (\mu_{i-1}\nu_i + (j-i))|j-i\rangle \end{aligned} \quad (16.7)$$

Aquí hemos usado para el primer término de la segunda línea que $J_+|j-i\rangle = |j-i+1\rangle = |j-(i-1)\rangle$ y para el segundo término que el conmutador está dado por $[J_+, J_-] = \hbar J_z$. Con esto se tiene, igualando los lados derechos de (16.6)-(16.7)

$$\mu_i \nu_{i+1} = \mu_{i-1} \nu_i + (j-i) \quad (16.8)$$

Pero además vale que como $J_+ = J_-^\dagger$

$$\mu_i = \nu_{i+1}^*$$

ya que, para estados normalizados

$$\langle i - j - 1 | (J_- | i - 1 \rangle) = \mu_i \quad (16.9)$$

Pero esta misma relación se puede calcular como

$$\left(\langle i - j - 1 | J_+ \right) | i - 1 \rangle = \nu_{i+1}^* \quad (16.10)$$

con lo que (16.8) puede escribirse como

$$|\mu_i|^2 = |\mu_{i-1}|^2 + (j - i) \quad (16.11)$$

Pero como una posible fase no es relevante para los autoestados base, elegiremos coeficientes reales de manera de tener

$$\mu_i^2 = \mu_{i-1}^2 + (j - i) \quad (16.12)$$

que da una relación de recurrencia para los μ_i . Dado que $\mu_{2j} = 0$ (ya que $J_- | j - (i = 2j) \rangle = J_- | -j \rangle = 0$)

$$\mu_{2j-1}^2 = j$$

y repitiendo este proceso $i + 1$ veces se llega a

$$\mu_i^2 = j(i + 1) - i \frac{(i + 1)}{2} \quad (16.13)$$

Si ahora pasamos a un índice $m = j - i$, que va desde $-j$ hasta j tendremos

$$\mu_m = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(j - m + 1)(j + m)} = \nu_{m+1} \quad (16.14)$$

El caso $j = 1$

Con $j = 1$ sabemos que $m_j = -1, 0, 1$ por lo que las autofunciones de $\hat{J}^2$ y J_z serán

$$|1 - 1\rangle, \quad |10\rangle, \quad |11\rangle \quad (16.15)$$

La acción de J_+ sobre estas autofunciones será:

$$\begin{aligned}\hat{J}_+|1\ 1\rangle &= 0 \\ \hat{J}_+|1\ 0\rangle &= \hbar|11\rangle \\ \hat{J}_+|1\ -1\rangle &= \hbar|10\rangle\end{aligned}\tag{16.16}$$

Con esto podemos construir los 9 elementos de matriz:

$$\begin{aligned}\langle 1\ -1|\hat{J}_+|1\ -1\rangle &= 0 & \langle 1\ 0|\hat{J}_+|1\ -1\rangle &= \hbar & \langle 1\ 1|\hat{J}_+|1\ -1\rangle &= 0 \\ \langle 1\ -1|\hat{J}_+|1\ 0\rangle &= 0 & \langle 1\ 0|\hat{J}_+|1\ 0\rangle &= 0 & \langle 1\ 1|\hat{J}_+|1\ 0\rangle &= \hbar \\ \langle 1\ -1|\hat{J}_+|1\ 1\rangle &= 0 & \langle 1\ 0|\hat{J}_+|1\ 1\rangle &= 0 & \langle 1\ 1|\hat{J}_+|1\ 1\rangle &= 0\end{aligned}$$

O sea que podemos escribir matricialmente (recuperando el factor $\hbar$ que habíamos puesto a 1)

$$J_+ = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\tag{16.17}$$

donde hemos recuperado la constante $\hbar$ que habamos puesto igual a 1 por economía notacional.

Análogamente tendremos para J_- :

$$J_- = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\tag{16.18}$$

A partir de la relación (16.1) podemos determinar $J_x = (1/2)(J_+ + J_-)$ obteniendo:

$$J_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\tag{16.19}$$

y también $J_y = (-i/2)(J_+ - J_-)$

$$J_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}i} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\tag{16.20}$$

En cuanto a J_z , tenemos que

$$\begin{aligned}\langle 1-1|\hat{J}_z|1-1\rangle &= -\frac{\hbar}{\sqrt{2}} & \langle 1\ 0|\hat{J}_z|1-1\rangle &= 0 & \langle 1\ 1|\hat{J}_z|1-1\rangle &= 0 \\ \langle 1-1|\hat{J}_z|1\ 0\rangle &= 0 & \langle 1\ 0|\hat{J}_z|1\ 0\rangle &= 0 & \langle 1\ 1|\hat{J}_z|1\ 0\rangle &= 0 \\ \langle 1-1|\hat{J}_z|1\ 1\rangle &= 0 & \langle 1\ 0|\hat{J}_z|1\ 1\rangle &= 0 & \langle 1\ 1|\hat{J}_z|1\ 1\rangle &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

o

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (16.21)$$

Estas matrices corresponden a los generadores del grupo de rotaciones en la representación en que éstos actúan sobre vectores de 3 componentes. Sin embargo, las matrices que obtuvimos al estudiar rotaciones y el momento angular orbital y sus generadores no tienen la forma que acabamos de obtener. En particular, recordemos que el generador de rotaciones alrededor del eje z (que llamamos G_z y coincidía con L_z) estaba representado por una matriz de 3×3 de la forma:

$$G_z = \hbar \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.22)$$

Es fácil ver, sin embargo, que existe una matriz O que por una transformación de similitud identifica a J_z con G_z :

$$J_z = O^{-1}G_zO \quad (16.23)$$

Esta transformación corresponde a pasar de G_z a una matriz diagonal como es J_z . Es decir que O es una matriz diagonalizante. Dado que se trata de matrices hermíticas, O debe ser unitaria. Vemos que O es simplemente la matriz que produce un cambio de base en el espacio de los vectores de 3 componentes. Explícitamente se encuentra que:

$$O = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-i}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.24)$$

En realidad, observando la forma de J_z y G_z es fácil ver que al cambiar de base lo que se hace es intercambiar adecuadamente el papel de filas y columnas. También se puede comprobar que con la misma matriz O se produce el correcto cambio de base para los generadores J_x y J_y .

El caso $j = 1/2$

Esta representación rota espinores de rango 1, es decir de 2 componentes. Estará dada por 3 matrices de 2×2 que calcularemos de manera análoga a como hicimos para los espinores de rango 2.

Con $j = 1/2$ sabemos que $m_j = -1/2, 1/2$ por lo que las autofunciones de $\hat{J}^2$ y J_z serán

$$\left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle, \quad \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \quad (16.25)$$

Conviene definir a $J_{\pm}$ con una normalización adecuada

$$J_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(J_x \pm iJ_y) \quad (16.26)$$

Con esta normalización, la acción de J_+ sobre las autofunciones será:

$$\begin{aligned} \hat{J}_+ \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle &= 0 \\ \hat{J}_+ \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \end{aligned} \quad (16.27)$$

Con esto podemos construir los 4 elementos de matriz:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right| \hat{J}_+ \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle &= 0 & \left\langle \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right| \hat{J}_+ \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ \left\langle \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| \hat{J}_+ \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle &= 0 & \left\langle \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| \hat{J}_+ \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle &= 0 \end{aligned}$$

O sea que podemos escribir matricialmente

$$J_+ = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.28)$$

Análogamente tendremos para J_- :

$$J_- = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.29)$$

A partir de la relación (16.26) obtenemos

$$J_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \frac{\hbar}{2} \sigma_1 \quad (16.30)$$

y

$$J_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \equiv \frac{\hbar}{2} \sigma_2 \quad (16.31)$$

En cuanto a J_z , tenemos que

$$\begin{aligned} \langle \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} | \hat{J}_z | \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \rangle &= \frac{\hbar}{2} & \langle \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} | \hat{J}_z | \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \rangle &= 0 \\ \langle \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} | \hat{J}_z | \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \rangle &= 0 & \langle \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} | \hat{J}_z | \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \rangle &= -\frac{\hbar}{2} \end{aligned}$$

Por lo que podemos escribir

$$J_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \equiv \frac{\hbar}{2} \sigma_3 \quad (16.32)$$

A las matrices σ_i ($i = 1, 2, 3$) se las conoce como matrices de Pauli,

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (16.33)$$

En términos de estas matrices, una rotación R de parámetros θ_i , actuando sobre espinores de dos componentes que son independientes de las coordenadas se escribe así:

$$D^{1/2}(R) = \exp(-\frac{i}{\hbar} J_i \theta_i) = \exp(-\frac{i}{2} \sigma_i \theta_i) \quad (16.34)$$

Si por simplicidad consideramos una rotación con ángulo θ alrededor del eje 3,

$$D_3^{1/2}(R) = \exp(-\frac{i}{2} \sigma_3 \theta) \quad (16.35)$$

y desarrollamos en serie el exponencial, tendremos:

$$D_3^{1/2}(R) = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n \frac{(\sigma_3)^n}{n!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^n \quad (16.36)$$

Es fácil ver que

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = I \quad (16.37)$$

por lo que (16.36) se puede escribir

$$D_3^{1/2}(R) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k)!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^{2k} - i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \sigma_3 \frac{1}{(2k+1)!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^{2k+1} \quad (16.38)$$

o

$$D_3^{1/2}(R) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - i\sigma_3 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (16.39)$$

Utilizando la forma explícita de σ_3 dada en (16.32) tendremos

$$D_3^{1/2}(R) = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) - i \sin(\frac{\theta}{2}) & 0 \\ 0 & \cos(\frac{\theta}{2}) + i \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix}$$

o

$$D_3^{1/2}(R) = \begin{pmatrix} \exp(-i\frac{\theta}{2}) & 0 \\ 0 & \exp(i\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \quad (16.40)$$

Es interesante comparar esta expresión, que da la expresión de la matriz de rotación de un ángulo θ alrededor del eje z para un espinor de 2 componentes con la correspondiente a igual eje y ángulo pero para un espinor de 3 componentes (un vector):

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (16.41)$$

Si en lugar de haber considerado una rotación alrededor del eje z hubiéramos considerado una general, dependiente de tres parámetros $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$, después de desarrollar en serie habríamos obtenido, en lugar de (16.39)

$$D^{1/2}(R(\theta_i)) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \frac{\sigma_i \theta_i}{|\theta|} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (16.42)$$

con

$$\theta^2 = \theta_i \theta_i$$

Más sobre álgebras de Lie y el grupo de rotaciones

Hemos estado discutiendo álgebras de Lie en relación a la introducción de momentos angulares en mecánica cuántica. A partir de la relación entre momento angular y las rotaciones establecimos una conexión entre el álgebra de Lie definida por las relaciones de conmutación

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \hbar i \epsilon_{ijk} \hat{J}_k \quad (16.43)$$

y los generadores del grupo de rotaciones $O(3)$ (o $SO(3)$ si pedimos $\det g = 1$ para todo $g \in SO(3)$).

Pero el álgebra anterior también coincide con la de los generadores del grupo $SU(2)$ (matrices unitarias de determinante 1 cuya representación más pequeña está dada por matrices de 2×2 , las matrices de Pauli). Eso último puede verse si escribimos el álgebra que obedecen las matrices de Pauli:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$$

Nótese que en la constante de estructura de esta expresión aparece con un factor diferente que la de la fórmula (16.43). Bastara escribir $\sigma_i = (2/\hbar)s_i$ para tener la misma. álgebra

Que las dos álgebras coincidan indican que existe una relación entre los grupos $SU(2)$ y $SO(3)$.

Nota: Consideremos el caso de rotaciones de $SO(3)$. Las podemos representar por una esfera sólida de radio π en el espacio R^3 . Todos los puntos de la esfera (incluidos los de su interior) están a una distancia $d \leq \pi$ del origen O . Podemos asociar a cada punto P de la esfera con una rotación que tiene una dirección y un sentido dados y una longitud que es la de la recta que va de O a P .

La identidad del grupo corresponde al punto O , el origen de la esfera.

En el caso de rotaciones de ángulo π y $-\pi$ tenemos puntos antipodales sobre la superficie de la esfera y sabemos que se trata de rotaciones $SO(3)$ idénticas. Luego, debemos identificar como uno solo a cada par de puntos en las antípodas de la superficie de la esfera. Al hacerlo establecemos un homomorfismo entre el grupo de rotaciones $SO(3)$ y la esfera sólida en R^3 .

Por lo anterior se dice que $SO(3)$ no es un grupo simplemente conexo **simplemente conexo**⁶⁵.

Notemos también que en el caso de $SU(2)$ vimos que las rotaciones con ángulo 0 y 2π no pueden identificarse. Por ello se dice que $SU(2)$ es el grupo de *recubrimiento* de $SO(3)$. Y también se dice que las matrices de $SO(3)$ dan una representación que no es fiel de $SU(2)$ porque como

⁶⁵En topología, un espacio topológico es llamado simplemente conexo si todo camino que une dos puntos puede deformarse de manera continua en cualquier otro camino entre esos puntos.

vimos identifica como un solo elemento a los puntos diametralmente opuestos.

Para los espinores que acabamos de estudiar, se puede ver que existe el isomorfismo siguiente

$$SU(2)/Z_2 \approx SO(3)$$

Aquí “ $SU(2)/Z_2$ ” representa el “coset” o “grupo cociente” de $SU(2)$ con el grupo de los enteros módulo 2. Esto quiere decir que $Z_2 = \pm I$.

Construir el coset “ $SU(2)/Z_2$ ” corresponde a identificar a los elementos g y $-g$ de $SU(2)$ con un único elemento de $SO(3)$. O sea que los elementos de $SU(2)/Z_2$ son las matrices de $SU(2)$ a menos de un signo y estos elementos coinciden con los de $SO(3)$.

Se llama “centro” del grupo $SU(N)$, (el caso discutido arriba corresponde a $SU(2)$) al subconjunto de elementos que conmutan con todos los elementos del grupo. Se puede ver (usando el lema de Schur) que los elementos del centro deben ser múltiplos de la identidad lo que lleva a que el centro de $SU(N)$ sea Z_N .

Representaciones de grupos

A los grupos “abstractos” de transformaciones que estudiamos en mecánica cuántica se les asocia vía un isomorfismo un grupo de operadores lineales (que pueden ser matrices de orden finito u operadores diferenciales como los que definen a $\hat{L}_i$, etc) que actúan sobre vectores de un **espacio vectorial de la representación**. La dimensión de la representación es la dimensión de los elementos de dicho espacio.

Llamemos g al elemento de un dado grupo y $D(g)$ a una representación particular, digamos de matrices de $n \times n$. Al espacio de representación (de dimensión n) lo llamaremos V

$$D(g)v = v' \in V \quad (16.44)$$

Sea V_1 un subespacio de V . Diremos que V_1 es un **subespacio invariante** para nuestra representación si para todo $v_1 \in V_1$ se tiene que

$$D(g)v_1 = v'_1 \in V_1 \quad (16.45)$$

O sea que ningún elemento de V_1 “se sale” de V_1 .

Representemos gráficamente lo que sucede con las transformaciones de los elementos de un subespacio invariantes. Llamemos $\vec{v}_1$ a las primeras n_1 componentes de un vector de la representación y $\vec{v}_1^\perp$ a las restantes $n-n_1$. Si las matrices de la representación tienen la forma que mostramos abajo

$$D(g)_{n \times n} \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n_1 \times n_1}(g) & B(g)_{(n-n_1) \times (n-n_1)} \\ 0_{n_1 \times n_1} & C(g)_{(n-n_1) \times (n-n_1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}_1^g \\ 0 \end{pmatrix} \quad (16.46)$$

el subespacio $V_1 = \{v_1\}$ es un subespacio invariante independiente de cuánto valgan B y C .

Una representación es **irreducible** si no existe ningún subespacio (aparte de los subespacios trivial vacío y el que coincide con todo el espacio) que quede invariante ante las operaciones del grupo. Si el espacio V admite al menos un subespacio invariante no trivial (o sea, distinto del vacío y del espacio completo), se dice que la representación es **reducible**.

Si V_1 es un subespacio invariante de V , su “complemento” V_2 (esto es, el resto de las componentes de cada vector de V) también es un subespacio invariante. En efecto, tomemos dos vectores, $f \in V_1$ y $h \in V_2$, se tiene que el producto escalar $(f, h) = 0$. Supongamos que la representación es unitaria. Entonces

$$0 = (f, h) = (D^\dagger(g)D(g)f, h) = (D(g)f, D(g)h) \quad (16.47)$$

Por lo tanto siendo que $D(g)f \in V_1$ y su producto con $D(g)h$ se anula, resulta que debe ser que $D(g)h \in V_2$ y eso para todo g . Luego V_2 es un subespacio invariante. En la notación de la ec.(16.46) esto significa que la matriz (bloque) B es idénticamente nula.

La matriz $D(g)$ resulta entonces ser “diagonal por bloques” y puede escribirse como suma directa de dos matrices

$$D(g) = \begin{pmatrix} A(g) & 0 \\ 0 & C(g) \end{pmatrix} = A(g) \oplus C(g) \quad (16.48)$$

Este proceso puede continuarse con cada bloque hasta que no encontremos más subespacios invariantes. Llegamos así a un resultado muy

importante de la teoría de grupos en lo que respecta a las representaciones unitarias: con el producto escalar que definimos para los espinores, si $D^j(R)$ es unitaria, puede siempre escribirse como suma directa de representaciones unitarias irreducibles. O sea, que podrá escribirse así:

$$\begin{pmatrix} D^j(R) & 0_{(2j+1) \times (2j'+1)} & 0_{(2j+1) \times (2j''+1)} & \cdots \\ 0_{(2j'+1) \times (2j+1)} & D^{j'}(R) & 0_{(2j'+1) \times (2j''+1)} & \cdots \\ 0_{(2j''+1) \times (2j+1)} & 0_{(2j''+1) \times (2j'+1)} & D^{j''}(R) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad (16.49)$$

La submatriz $D^j(R)$ (de $(2j+1) \times (2j+1)$) actúa en el subespacio $|j'm'\rangle$ con $m' = -j', -j' + 1, \dots, +j'$.

Los valores de j que aparecen en la descomposición (y cuántas veces aparecen) dependen del problema que uno trate. Pero lo que se puede probar en general es que

los valores resultan o bien todos enteros o bien todos semienteros.

A esta afirmación se la suele catalogar de “regla de superselección”. La prueba de ella está basada en el hecho de que cuando j es entero, $D_3^j(2\pi) = I$ mientras que si es semientero $D_3^j(2\pi) = -I$. En efecto, si un vector de una dada representación pudiera tener componentes en subespacios de j entero y semientero al mismo tiempo, entonces podría escribirse así

$$|\psi\rangle = \alpha|\psi_e\rangle + \beta|\psi_s\rangle$$

con $|\psi_e\rangle$ en el subespacio de j entero y $|\psi_s\rangle$ en el de j semientero. Pero entonces al hacer una rotación de 2π alrededor del eje 3 la matriz actuaría como la identidad I en $|\psi_e\rangle$ y como $-I$ en $|\psi_s\rangle$. Así que el espinor rotado $|\psi\rangle^R$ tendría la forma

$$|\psi\rangle^R = \alpha|\psi_e\rangle - \beta|\psi_s\rangle$$

Pero como se trata de una rotación de 2π , $|\psi\rangle$ no puede diferir de $|\psi\rangle^R$ más que en un signo. O sea que $\alpha = 0$ ó $\beta = 0$. O sea que el espinor no puede tener simultáneamente componentes con j entero y j semientero. Por lo tanto para generar una base en el espacio de Hilbert se usan solo los valores enteros o semienteros de j , según los casos.

Para un dado valor de j , entero o semientero, los $2j + 1$ vectores correspondientes a $m = -j, -j + 1, \dots, j$ generan un subespacio en el que puede actuar una representación de $O(3)$ que será irreducible. Pero también sabemos que el momento angular de un sistema físico no está a priori fijo (como lo está por ejemplo la masa en los problemas cuánticos que tratamos en este curso) sino que puede tomar muchos valores posibles según sea la dinámica del sistema. Por lo tanto un solo j no es suficiente para contar con una base completa del espacio de Hilbert de los estados de un sistema cuántico. Esto además está relacionado con el hecho de que si un solo valor de j fuera suficiente el espacio de Hilbert sería de dimensión finita! Pero sabemos que este espacio tiene en general una dimensión infinita.

Para obtener una base completa debemos tener entonces en cuenta en general infinitos valores de j y entonces la representación de la rotación será **reducible** y en principio de dimensión infinita.

Grupos de simetría en Mecánica cuántica

Podemos a esta altura establecer el siguiente resultado:

- El espacio de Hilbert de los estados del sistema debe corresponder a un espacio de representación del grupo de simetrías que tiene el sistema. O sea, debe ser un espacio vectorial donde actúa una representación del grupo de simetría del sistema. Dicha representación es unitaria.

Sabemos que dado dos estados $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ de un sistema con una simetría R ,

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &\xrightarrow{R} |\psi'\rangle \\ |\phi\rangle &\xrightarrow{R} |\phi'\rangle \end{aligned} \quad (16.50)$$

Ahora bien, en mecánica cuántica los observables están asociados a productos escalares del tipo $\langle\phi|\psi\rangle$. Luego si R es una simetría del sistema, los observables no deben cambiar si calculo esos productos con los vectores originales o los transformados

$$|\langle\phi'|\psi'\rangle|^2 = |\langle\phi|\psi\rangle|^2 \quad (16.51)$$

lo cual implica que la transformación es generada por un operador unitario $U(R)$,

$$\begin{aligned} |\psi'\rangle &= U(R)|\psi\rangle \\ |\phi'\rangle &= U(R)|\phi\rangle \end{aligned} \quad (16.52)$$

Entonces

- A cada operación de simetría le corresponde un operador Unitario que actúa en el espacio de Hilbert y que transforma a los vectores de estado.

Estrictamente la ecuación (16.51) implica que se cumpla que $\langle\phi'|\psi'\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$ o que $\langle\phi'|\psi'\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^*$. En el segundo caso debería hablarse de transformaciones anti-unitarias. La inversión temporal es uno de los casos en que la transformación es anti-unitaria.

Clase 17

El momento angular total

Vimos a partir del experimento de Stern-Gerlach que era necesario asignar al electrón un momento angular intrínseco, que llamamos spin cuya proyección $\hat{s}_z$ tiene autovalores $\pm 1/2$ en unidades de $\hbar$. Quiere decir que la función de onda que describe al electrón tiene que tener información sobre el spin y su proyección.

Cuando no habíamos incorporado el número cuántico ligado al spin vimos que en la representación de coordenadas, dado el ket $|\psi\rangle$ que representa un estado de un sistema (el electrón, por ejemplo), la función de onda estaba dada por la proyección de ese ket sobre $|\vec{x}\rangle$, las autofunciones del operador posición,

$$\psi(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \psi \rangle \quad (17.1)$$

Pero ahora es evidente que además de proyectar sobre $|\vec{x}\rangle$, que tiene que ver con las coordenadas espaciales (variables espaciales) del sistema, tendremos que proyectar sobre un bra que incluya además de las variables coordenadas las de spin. Construyamos entonces el siguiente producto tensorial de kets (usando el habitual signo $\otimes$ para representarlo:

$$|\vec{x} \ s \ m_s\rangle = |\vec{x}\rangle \otimes |s \ m_s\rangle \quad (17.2)$$

Dado que para el electrón $s = 1/2$ y m_s solo tiene dos posibles valores que distinguen las dos posibles proyecciones de spin sobre el eje z , ($m_s = \pm 1/2$), por economía notacional escribiremos

$$|\vec{x} \ m_s\rangle$$

El ket resultante es entonces autofunción de $\hat{x}$, $\hat{s}^2$ y $\hat{s}_z$,

$$\begin{aligned}\hat{x}|\vec{x} \pm \frac{1}{2}\rangle &= \vec{x}|\vec{x} \pm \frac{1}{2}\rangle \\ \hat{s}^2|\vec{x} \pm \frac{1}{2}\rangle &= \hbar^2 \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1)|\vec{x} \pm \frac{1}{2}\rangle \\ \hat{s}_z|\vec{x} \pm \frac{1}{2}\rangle &= \pm \frac{\hbar}{2}|\vec{x} \pm \frac{1}{2}\rangle\end{aligned}\quad (17.3)$$

La ortonormalidad y relación de clausura para esta base se escribirán así:

$$\begin{aligned}\langle \vec{x} m_s | \vec{x}' m_{s'} \rangle &= \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{x}') \delta_{m_s, m_{s'}} \\ \sum_{m_s = \pm \frac{1}{2}} \int d^3x |\vec{x} m_s \rangle \langle \vec{x} m_s| &= I\end{aligned}\quad (17.4)$$

con lo que

$$|\psi \rangle = \sum_{m_s = \pm \frac{1}{2}} \int d^3x \langle \vec{x} m_s | \psi \rangle |\vec{x} m_s \rangle \quad (17.5)$$

o, llamando

$$\psi_{m_s}(\vec{x}) = \langle \vec{x} m_s | \psi \rangle \quad (17.6)$$

$$|\psi \rangle = \sum_{m_s = \pm \frac{1}{2}} \int d^3x \psi_{m_s}(\vec{x}) |\vec{x} m_s \rangle \quad (17.7)$$

Este resultado nos muestra que

En la teoría de Pauli para el spin la función de onda tiene dos componentes,

$$\psi_{+\frac{1}{2}}(\vec{x}) \quad \psi_{-\frac{1}{2}}(\vec{x}) \quad (17.8)$$

que podemos acomodar en un espinor representado por

$$\psi(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \psi_{+\frac{1}{2}}(\vec{x}) \\ \psi_{-\frac{1}{2}}(\vec{x}) \end{pmatrix} = \psi_{+\frac{1}{2}}(\vec{x}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \psi_{-\frac{1}{2}}(\vec{x}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (17.9)$$

donde

$$\begin{aligned}\hat{s}_z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= +\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hat{s}_z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (17.10)$$

con $\hat{s}_z$ dado por

$$\hat{s}_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_3 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (17.11)$$

En resumen, la experiencia de Stern-Gerlach nos ha enseñado que además de las coordenadas, la descripción del movimiento de una partícula cuántica requiere, en casos como el del electrón, de una nueva variable específica que puede tomar solo valores discretos, relacionados con su momento angular propio, que nada tiene que ver con el momento angular orbital. Además de las variables x, y, z , la función de onda depende entonces de una variable de spin que indica el valor de la proyección del spin en la dirección de algún eje en el espacio. Se trata de una variable discreta por lo que varias notaciones son posibles:

$$\psi(x, y, z; m_s) \quad \psi_{m_s}(x, y, z) \quad \begin{pmatrix} \psi_{+\frac{1}{2}}(x, y, z) \\ \psi_{-\frac{1}{2}}(x, y, z) \end{pmatrix} \quad (17.12)$$

Se trata de un espinor de rango $2j = 1$ que se transforma frente a rotaciones tal como aprendimos. Por ejemplo, para una rotación de un ángulo infinitesimal $\delta\varphi$ alrededor del eje z tenemos

$$\psi^{\delta\varphi}(\vec{x}'; m_s) = \left(1 - \frac{i}{\hbar} s_z \delta\varphi\right) \psi(\vec{x}; m_s) \quad (17.13)$$

y para una rotación finita de un ángulo φ

$$\psi^\varphi(\vec{x}'; m_s) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} s_z \varphi\right) \psi^0(\vec{x}; m_s) \quad (17.14)$$

que explícitamente toma la forma

$$\begin{aligned} \psi^\varphi(\vec{x}'; m_s) &= \left(\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) I_{2 \times 2} - i \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sigma_3 \right) \psi^0(\vec{x}; m_s) \\ &= \begin{pmatrix} \exp\left(-\frac{i\varphi}{2}\right) & 0 \\ 0 & \exp\left(\frac{i\varphi}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_{+1/2}^0(\vec{x}; m_s) \\ \psi_{-1/2}^0(\vec{x}; m_s) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vemos que para $\varphi = 2\pi$ se tiene

$$\psi^{2\pi}(\vec{x}'; m_s) = -\psi^0(\vec{x}; m_s) \quad (17.15)$$

Para esta rotación se tiene que $\vec{x}' = \vec{x}$ por lo que

$$\psi^{2\pi}(\vec{x}; m_s) = -\psi^0(\vec{x}; m_s) \quad (17.16)$$

Y vemos entonces que el espinor cambia de signo al dar una vuelta completa al sistema de coordenadas. Vamos ahora a calcular el valor medio de $\hat{s}_z$ en el estado $\psi(\vec{x}'; m_s)$

$$\begin{aligned} \langle \hat{s}_z \rangle &= \langle \psi | \hat{s}_z | \psi \rangle = \sum_{m_s = \pm \frac{1}{2}} \int d^3x \langle \psi | \hat{s}_z | \vec{x} m_s \rangle \langle \vec{x} m_s | \psi \rangle \\ & \quad (17.17) \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} \langle \hat{s}_z \rangle &= \sum_{m_s = \pm \frac{1}{2}} \int d^3x \langle \psi | \hat{s}_z | \vec{x} m_s \rangle \psi_{m_s}(\vec{x}) \\ &= \hbar \sum_{m_s = \pm \frac{1}{2}} m_s \int d^3x \psi_{m_s}^*(\vec{x}) \psi_{m_s}(\vec{x}) \\ &= \frac{\hbar}{2} \int d^3x |\psi_{+\frac{1}{2}}|^2 - \frac{\hbar}{2} \int d^3x |\psi_{-\frac{1}{2}}|^2 \quad (17.18) \end{aligned}$$

que podemos escribir en forma compacta como

$$\langle \hat{s}_z \rangle = \frac{\hbar}{2} \int d^3x P_+(\vec{x}) - \frac{\hbar}{2} \int d^3x P_-(\vec{x}) \quad (17.19)$$

donde

$$P_{\pm}(\vec{x}) = |\psi_{\pm \frac{1}{2}}|^2 \quad (17.20)$$

de manera que $P_+(\vec{x})$ representa la densidad de probabilidad de encontrar al electrón en el punto $\vec{x}$ con la proyección de su spin con un valor $+1/2$ y $P_-(\vec{x})$ la densidad de probabilidad de encontrar al electrón en el punto $\vec{x}$ con la proyección de su spin con un valor $-1/2$.

Estudiemos con más detalle la rotación de estos espinores. Para eso, consideremos un dado punto P_0 en el espacio:

$$\psi(P_0) = \begin{pmatrix} \psi_+(P_0) \\ \psi_-(P_0) \end{pmatrix} \quad (17.21)$$

Al espinor transformado por una rotación R lo anotaremos:

$$\psi'(P_0) = \begin{pmatrix} \psi'_+(P_0) \\ \psi'_-(P_0) \end{pmatrix} \quad (17.22)$$

Consideremos el sistema de coordenadas utilizado para ubicar al punto P_0 . Sean las coordenadas antes de realizar la rotación $\vec{x}_0$ y en el sistema rotado, $\vec{x}'_0$. Estas coordenadas estan ligadas por la rotación así:

$$\vec{x}'_0 = R\vec{x}_0 \quad (17.23)$$

Para el espinor rotado tendremos entonces:

$$\psi'(\vec{x}'_0) \quad (17.24)$$

y para el espinor sin rotar,

$$\psi(\vec{x}_0) \quad (17.25)$$

Estos espinores están ligados por la rotación R en la representación adecuada, $D^{1/2}(R)$,

$$\psi'(\vec{x}'_0) = D^{1/2}(R)\psi(\vec{x}_0) \quad (17.26)$$

o

$$\psi'(R\vec{x}_0) = D^{1/2}(R)\psi(\vec{x}_0) \quad (17.27)$$

Si ahora hacemos un adecuado cambio de nombre llamando $\vec{x}$ a

$$\vec{x} = R\vec{x}_0 \quad \vec{x}_0 = R^{-1}\vec{x}$$

tendremos

$$\psi'(\vec{x}) = D^{1/2}(R)\psi(R^{-1}\vec{x}) \quad (17.28)$$

Vemos que hemos logrado relacionar el espinor sin rotar con el rotado de manera que en ambos lados de la igualdad aparezcan las mismas coordenadas $\vec{x}$. Esto apunta a obtener una fórmula final en la que, como veremos, las coordenadas del punto no aparezcan explícitamente modificadas por la rotación.

Consideremos para simplificar una rotación infinitesimal de ángulo ϵ alrededor del eje z . Tenemos

$$D^{1/2}(R) \approx I - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{s}_z \quad (17.29)$$

En cuanto a $\vec{x}$, dado que R tiene la forma

$$R \approx I - \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (17.30)$$

con lo que

$$R^{-1} \approx I + \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (17.31)$$

podemos escribir

$$R^{-1}\vec{x} \approx \vec{x} + \epsilon \begin{pmatrix} y \\ -x \\ o \end{pmatrix} = \vec{x} + \vec{\epsilon} \quad (17.32)$$

donde $\vec{\epsilon}$ está definido como

$$\vec{\epsilon} \equiv \epsilon \begin{pmatrix} y \\ -x \\ o \end{pmatrix} \quad (17.33)$$

Reemplazando todo esto en (9.31) tendremos,

$$\psi'(\vec{x}; m_s) = (I - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{s}_z)\psi(\vec{x} + \vec{\epsilon}; m_s) \quad (17.34)$$

Desarrollando $\psi(\vec{x} + \vec{\epsilon})$ en potencias de $\vec{\epsilon}$ tendremos, a primer orden

$$\psi(\vec{x} + \vec{\epsilon}; m_s) = \psi(\vec{x}) + \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \epsilon_i + \dots \quad (17.35)$$

de manera que $\psi'(\vec{x}; m_s)$ resulta

$$\begin{aligned} \psi'(\vec{x}; m_s) &= (I - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{s}_z) \left(\psi + \epsilon y \frac{\partial \psi}{\partial x} - \epsilon x \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \\ &= (I - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{s}_z) \left(\psi - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{L}_z \psi \right) \\ &= (I - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{s}_z - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{L}_z) \psi \\ &= (I - i\frac{\epsilon}{\hbar}\hat{J}_z) \psi(\vec{x}) \end{aligned} \quad (17.36)$$

donde hemos escrito

$$\hat{J}_z = \hat{L}_z + \hat{s}_z \quad (17.37)$$

Podemos interpretar entonces a $\hat{J}_z$ como el generador infinitesimal de rotaciones alrededor del eje z . Cuando actúa sobre el espinor ψ , $\hat{L}_z$ “ataca” la parte de coordenadas y $\hat{s}_z$ la de spin. Lo mismo podíamos haber hecho con rotaciones alrededor de cualquier eje, por lo que tiene sentido definir el momento angular total $\hat{\vec{J}}$ como

$$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \hat{\vec{s}} \quad (17.38)$$

Una rotación finita general con ángulos $\vec{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ transforma entonces al espinor $\psi(\vec{x})$ según la fórmula

$$\psi'(\vec{x}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{\theta} \cdot \hat{\vec{J}}\right) \psi(\vec{x}) \quad (17.39)$$

Como adelantamos, en esta fórmula las coordenadas del punto en que consideramos al espinor original y al rotado son las mismas.

Dadas las álgebras que obedecen $\hat{\vec{L}}$ y $\hat{\vec{s}}$ es fácil comprobar que $\hat{\vec{J}}$ satisface:

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \hbar i \epsilon_{ijk} \hat{J}_k \quad (17.40)$$

Un electrón en un campo magnético constante

Dado un hamiltoniano $\hat{H}$, escribiremos la ecuación de Schrödinger para una partícula de spin 1/2 en la forma

$$\hat{H} \begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}, t) \\ \psi_-(\vec{x}, t) \end{pmatrix} = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}, t) \\ \psi_-(\vec{x}, t) \end{pmatrix} \quad (17.41)$$

Supongamos que se trata de un electrón, sometido a un campo magnético constante que por comodidad escribiremos así:

$$\vec{B} = (0, 0, B) \quad (17.42)$$

En lo que respecta a la parte de energía cinética $\hat{H}_0$, el hamiltoniano tendrá la forma de una matriz diagonal de 2×2 :

$$\hat{H}_0 = \begin{pmatrix} \frac{\hat{p}^2}{2m} & 0 \\ 0 & \frac{\hat{p}^2}{2m} \end{pmatrix} \quad (17.43)$$

pues la energía cinética es la misma para ambas componentes del espinor que representa la función de onda del electrón de masa m . En cuanto a la energía potencial $\hat{V}$, corresponde a una energía potencial magnética debido a la interacción entre el campo externo y el momento magnético $\hat{\vec{m}}_s$ del electrón,

$$\hat{V} = -\hat{\vec{m}}_s \cdot \vec{B} \quad (17.44)$$

Como vimos, $\hat{\vec{m}}_s$ está dado por

$$\hat{\vec{m}}_s = -g\beta \frac{\vec{s}}{\hbar} \quad (17.45)$$

con $\beta = e\hbar/(2mc)$ y $g \approx 2$. Escribiremos entonces

$$\hat{V} = V_e \hat{s} \cdot \vec{B} = V_e B \hat{s}_z \quad (17.46)$$

con

$$V_e \approx \frac{e\hbar}{mc} \quad (17.47)$$

Hemos puesto $g \approx 2$ que se ha simplificado con el factor $1/2$ de β .

Con esto,

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} = \begin{pmatrix} \frac{\hat{p}^2}{2m} & 0 \\ 0 & \frac{\hat{p}^2}{2m} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{g\beta B}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{g\beta B}{2} \end{pmatrix} \quad (17.48)$$

o

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{g\beta B}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{g\beta B}{2} \end{pmatrix} \quad (17.49)$$

Proponiendo

$$\begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}, t) \\ \psi_-(\vec{x}, t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}) \\ \psi_-(\vec{x}) \end{pmatrix} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} Et\right) \quad (17.50)$$

pasamos a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$\begin{pmatrix} \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{g\beta B}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{g\beta B}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}) \\ \psi_-(\vec{x}) \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}) \\ \psi_-(\vec{x}) \end{pmatrix} \quad (17.51)$$

Si el campo magnético fuera nulo, el problema se reduciría a

$$\begin{pmatrix} \frac{\hat{p}^2}{2m} & 0 \\ 0 & \frac{\hat{p}^2}{2m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_+(\vec{x}) \\ \phi_-(\vec{x}) \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} \phi_+(\vec{x}) \\ \phi_-(\vec{x}) \end{pmatrix} \quad (17.52)$$

Tendríamos en el caso de campo nulo dos soluciones linealmente independientes,

$$\begin{pmatrix} \phi(\vec{x}) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \phi(x) \end{pmatrix} \quad (17.53)$$

con ϕ la solución de partícula libre que conocemos,

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} \phi(\vec{x}) = E_0 \phi(x) \quad (17.54)$$

Es decir que al considerar al spin, la energía E_0 de un electrón libre resulta ser degenerada: existen entonces dos soluciones linealmente para una partícula libre con spin $1/2$, una con spin “para arriba”, la otra con spin “para abajo”.

Si ahora volvemos al caso con campo magnético no nulo, las ecuaciones para ψ_+ y ψ_- se desacoplan trivialmente:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{g\beta B}{2} \right) \psi_+(\vec{x}) &= E \psi_+(\vec{x}) \\ \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{g\beta B}{2} \right) \psi_-(\vec{x}) &= E \psi_-(\vec{x}) \end{aligned} \quad (17.55)$$

o

$$\begin{aligned} \frac{\hat{p}^2}{2m} \psi_+(\vec{x}) &= \left(E - \frac{g\beta B}{2} \right) \psi_+(\vec{x}) \\ \frac{\hat{p}^2}{2m} \psi_-(\vec{x}) &= \left(E + \frac{g\beta B}{2} \right) \psi_-(\vec{x}) \end{aligned} \quad (17.56)$$

Cada una de estas ecuaciones es idéntica a la de partícula libre pero con la energía corrida de distinta manera. Es evidente que tenemos nuevamente dos soluciones linealmente independientes que podemos escribir en términos de la solución de partícula libre ϕ

$$\begin{aligned}
\frac{\hat{p}^2}{2m}\psi_+(\vec{x}) &= \overbrace{\left(E - \frac{g\beta B}{2}\right)}^{E_0} \psi_+(\vec{x}) \\
\frac{\hat{p}^2}{2m}\psi_-(\vec{x}) &= \underbrace{\left(E + \frac{g\beta B}{2}\right)}_{E_0} \psi_-(\vec{x})
\end{aligned} \tag{17.57}$$

Entonces tenemos

$$\begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}) \\ \psi_-(\vec{x}) \end{pmatrix} = \phi(\vec{x}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{con energía} \quad E_+ = E_0 + \beta B \tag{17.58}$$

y

$$\begin{pmatrix} \psi_+(\vec{x}) \\ \psi_-(\vec{x}) \end{pmatrix} = \phi(\vec{x}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{con energía} \quad E_- = E_0 - \beta B \tag{17.59}$$

Esto que venimos de hacer tomando a $\hat{H}_0$ como el hamiltoniano libre vale también para el caso en que H_0 contiene un potencial como por ejemplo el coulombiano. En este caso, E_0 representará la energía del sistema cuando está ausente el campo magnético. Por ejemplo, para el caso del átomo de Hidrógeno, E_0 podría ser la energía de los distintos estados ligados que encontramos. Entonces, en presencia del campo magnético el nivel de energía del estado fundamental, que era degenerado a campo nulo (la misma energía para las dos proyecciones de spin), se desdobla en dos niveles con energías

$$E_{\pm} = E_0 \pm \beta B \tag{17.60}$$


El estado con spin hacia abajo ($m_s = -1/2$) tiene entonces menor energía, lo que es razonable ya que el momento magnético tiende a alinearse en forma paralela al campo para minimizar la energía. O sea que el spin se alinea de manera antiparalela en el estado de menor energía. A este desdoblamiento de los niveles de energía se lo llama “efecto Zeeman (anómalo)”.

Pieter Zeeman era un físico holandés que en 1896, a los 31 años, se había doctorado en la Universidad de Leiden bajo la supervisión de Hendrik Lorentz. Desobedeciendo a las autoridades del laboratorio,

usó el equipo disponible para estudiar el efecto de un campo magnético fuerte sobre los niveles de energía.

Zeeman logró así medir el desdoblamiento de la llamada línea D del sodio. Por esa desobediencia fue echado de la Universidad pero 6 años más tarde recibió el premio Nobel (junto a Lorentz que dio la primera explicación sobre el fenómeno de desdoblamiento debido al acoplamiento del momento angular, sea orbital o de spin con el campo magnético) al descubrir la separación de niveles en un número par de líneas.

Al efecto se lo llamo efecto Zeeman anómalo porque aún no se conocía el spin del electron y no había manera, ni con argumentos clásicos ni semiclásicos de obtener tal resultado. Cuando se trataba de electrones con momento angular orbital, con el consiguiente desdoblamiento en un número impar de líneas, el efecto era explicable con argumentos semiclásicos y se lo llamaba efecto Zeeman normal.




En la figura se representa el spin $\vec{s}$ del electrón formando un cierto ángulo con la dirección del campo magnético. También se representa el momento magnético del electrón, $\vec{m}_s$, que tiene el signo opuesto al spin.

Clase 18

Comenzaremos aquí a estudiar la evolución temporal del problema (agregando luego un campo magnético dependiente del tiempo) siguiendo otro camino que el que describimos antes.

Supongamos que hacemos pasar un electrón por un primer campo magnético $\vec{B}_0$ constante que está en una cierta dirección y que por ello el electrón queda polarizado con spin apuntando en la dirección de $\vec{B}_0$. Luego lo hacemos pasar por otro campo magnético $\vec{B}$ como en la figura siguiente



Si el spin fuera paralelo al eje z sabemos que la parte de spin de la función de onda sería simplemente proporcional a

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pero en este caso, como hemos elegido el eje z , no es así. Pero podemos pensar en un sistema O' en que el eje z' sí coincide con la dirección $\vec{s}_e$ del spin del electrón. En tal sistema tendremos para que la función de

onda del espinor tendrá la forma

$$\psi' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (18.1)$$

Para escribir la función de onda del electrón en el sistema de partida en que el eje z es paralelo a $\vec{B}$, podemos hacer una rotación de un ángulo $-\theta$ alrededor del eje y para lograr $z' \rightarrow z$:

$$\psi = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{s}_y(-\theta)\right) \psi' = \exp\left(\frac{i\theta}{2} \sigma_2\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (18.2)$$

o

$$\psi = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + i\sigma_2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (18.3)$$

Usando el valor de σ_2 ,

$$\psi = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -\sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ -\sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \quad (18.4)$$

Para estudiar la evolución temporal de este sistema consideramos la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo repitiendo algunos pasos que ya describimos en la clase anterior. Vimos que el hamiltoniano de un electrón en un campo magnético $\vec{B}$ se escribía como:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 I - \hat{\vec{m}} \cdot \vec{B} \quad (18.5)$$

con $\hat{\vec{m}}$ es el momento magnético propio del electrón, que debimos introducir para explicar la experiencia de Stern-Gerlach:

$$\hat{\vec{m}} = -g\beta \frac{1}{\hbar} \hat{\vec{s}} \approx -\beta \vec{\sigma} \quad (18.6)$$

Hemos usado para el factor giromagnético del electrón el valor aproximado $g = 2$. Tomamos $\hat{H}_0 = \hat{p}^2/2m$ y escribiremos explícitamente una matriz identidad multiplicando a $\hat{H}_0$ para explicitar que este operador actúa sobre un espinor de 2 componentes. Entonces, para el caso del campo magnético constante en cuestión la ecuación de Schrödinger que da la evolución temporal del sistema vimos que tiene la forma

$$(\hat{H}_0 I + \beta B \sigma_3) \psi = \hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (18.7)$$

o, explicitando el carácter matricial

$$\begin{pmatrix} \hat{p}^2/2m + \beta B & 0 \\ 0 & \hat{p}^2/2m - \beta B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \quad (18.8)$$

Llegamos así al sistema desacoplado:

$$\begin{aligned} \hbar i \frac{\partial \psi_+}{\partial t} &= (\hat{p}^2/2m + \beta B) \psi_+ \\ \hbar i \frac{\partial \psi_-}{\partial t} &= (\hat{p}^2/2m - \beta B) \psi_- \end{aligned} \quad (18.9)$$

Como antes llamamos E_0 a la energía de la parte libre,

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} \varphi(\vec{x}) = E_0 \varphi(\vec{x}) \quad (18.10)$$

con lo que se tiene

$$\begin{aligned} \psi_+ &= \psi_+^0 \varphi(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(E_0 + \beta B)t\right) \\ \psi_- &= \psi_-^0 \varphi(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(E_0 - \beta B)t\right) \end{aligned} \quad (18.11)$$

donde $\psi_{\pm}^0$ son las dos constantes arbitrarias asociadas a la soluciones $\psi_{\pm}$. Tenenmos además que

$$\int d^3x |\varphi(x)|^2 = 1 \quad (18.12)$$

Tomaremos como condición inicial $\psi_{\pm}^0$ una función de onda como la dada por la ecuación (18.4)

$$\psi_+^0 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \psi_-^0 = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (18.13)$$

Podemos entonces escribir a la solución completa en la forma

$$\begin{aligned} \psi(\vec{x}, t) &= \varphi(\vec{x}) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(E_0 + \beta B)t\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\quad - \varphi(\vec{x}) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(E_0 - \beta B)t\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (18.14)$$

De aquí vemos que la densidad de probabilidad de encontrar al instante t al electrón con su spin para arriba es

$$P_+ = |\psi_+|^2 = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (18.15)$$

y para abajo

$$P_- = |\psi_-|^2 = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (18.16)$$

Si calculamos el valor medio de $\hat{s}_z$,

$$\langle \hat{s}_z \rangle = \langle \psi | \hat{s}_z | \psi \rangle = \frac{\hbar}{2} \int d^3x |\varphi(\vec{x})|^2 \left(\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \quad (18.17)$$

$$\langle \hat{s}_z \rangle = \hbar \cos \theta \int d^3x |\varphi(\vec{x})|^2 = \hbar \cos \theta \quad (18.18)$$

Es decir que $\langle \hat{s}_z \rangle$ es independiente del tiempo; es una constante de movimiento.

En cambio, si se calcula $\langle \hat{s}_x \rangle$ o $\langle \hat{s}_y \rangle$ se puede ver que sí dependen del tiempo:

$$\langle \hat{s}_x \rangle = \langle \psi | \frac{\hbar}{2} \sigma_1 | \psi \rangle = \hbar \sin \theta \cos(\omega_L t) \quad (18.19)$$

$$\langle \hat{s}_y \rangle = \langle \psi | \frac{\hbar}{2} \sigma_2 | \psi \rangle = \hbar \sin \theta \sin(\omega_L t) \quad (18.20)$$

donde ω_L , la *frecuencia de Larmour*, está definida como

$$\omega_L = \frac{2\beta B}{\hbar} \text{equiv} \frac{\Delta E}{\hbar} \quad (18.21)$$

con ΔE la diferencia de energía entre los dos niveles. Es decir que en presencia de un campo externo B , s_z es una constante de movimiento pero s_x y s_y no lo son. El electrón se comporta como un trompo, con su momento angular intrínseco precesionando alrededor del campo magnético con una frecuencia de Larmour ω_L dada por (18.21).

Qué sucede si además del campo constante en la dirección del eje z , se tiene un campo cruzado (i.e, en el plano (x, y)) variable en el tiempo de forma que el campo externo total sea:

$$\vec{B} = (h_0 \cos(\omega t), h_0 \sin(\omega t), B) \quad (18.22)$$

El “hamiltoniano de spin” será en este caso:

$$H_{spin} = \frac{g\beta}{2} (h_0 \hat{s}_x \cos(\omega t) + h_0 \hat{s}_y \sin(\omega t) + B \hat{s}_z) \quad (18.23)$$

hemos vuelto a introducir el factor giromagnético g pues contemplamos aplicar este ejemplo a otros casos además del de un electrón.

Trabajando con la forma explícita de $\hat{s}$ en términos de las matrices de Pauli se obtiene, luego de un poco de álgebra,

$$H_{spin} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_L & \Omega \exp(-i\omega t) \\ \Omega \exp(i\omega t) & \omega_L \end{pmatrix} \quad (18.24)$$

donde

$$\Omega = \frac{g\beta}{\hbar} h_0$$

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo toma entonces para la parte de spin la forma siguiente

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_L & \Omega \exp(-i\omega t) \\ \Omega \exp(i\omega t) & \omega_L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \quad (18.25)$$

Si probamos con una solución de la forma

$$\psi_{\pm} = \exp(\mp i \frac{\omega_L}{2} t) c_{\pm}(t) \quad (18.26)$$

es fácil ver que las ecuaciones para $c_{\pm}(t)$ resultan

$$i\dot{c}_{\pm}(t) = \frac{\Omega}{2} \exp(\mp i(\omega - \omega_L)t) c_{\mp}(t) \quad (18.27)$$

Derivando respecto del tiempo la ecuación para $\dot{c}_+$ y usando la de $\dot{c}_-$ obtenemos una ecuación de segundo orden desacoplada

$$i\ddot{c}_{\pm}(t) + i(\omega - \omega_L)\Omega\dot{c}_{\pm}(t) + \frac{\Omega^2}{4}c_{\pm}(t) = 0 \quad (18.28)$$

cuya solución es

$$c_+(t) = A \exp\left(-\frac{i}{2}((\omega - \omega_L) + \Delta)t\right) + B \exp\left(-\frac{i}{2}((\omega - \omega_L) - \Delta)t\right) \quad (18.29)$$

con

$$\Delta = \sqrt{\Omega^2 + (\omega - \omega_L)^2} \quad (18.30)$$

En cuanto a $c_-(t)$, obtenemos

$$c_-(t) = \frac{2i}{\Omega} \exp((\omega - \omega_L)t) \dot{c}_+(t) \quad (18.31)$$

Para determinar las constantes debemos dar alguna condición inicial. Supongamos que en $t = 0$ el sistema se hallaba con la proyección del spin hacia abajo,

$$c_+(0) = 0 \quad c_-(0) = 1 \quad (18.32)$$

De la condición para $c_+(0)$ resulta que

$$A = -B \quad (18.33)$$

y de la de $c_-(0)$, usando la relación (18.31) entre c_+ y $\dot{c}_-$

$$c_-(0) = 1 = \frac{2i}{\Omega} \dot{c}_+(0) \quad (18.34)$$

resulta

$$A = -\frac{\Omega}{2\Delta} \quad (18.35)$$

Con esto, la solución será

$$c_+(t) = -i \frac{\Omega}{\Delta} \sin\left(\frac{\Delta}{2}t\right) \exp((\omega - \omega_L)t) \quad (18.36)$$

La densidad de probabilidad P_+ al tiempo t de encontrar al sistema con el spin hacia arriba será

$$P_+(t) = |c_+(t)|^2 = \frac{\Omega^2}{\Delta^2} \sin^2\left(\frac{\Delta}{2}t\right) \quad (18.37)$$

Habiendo tomado como condición inicial que el spin apuntaba hacia abajo, podemos interpretar a P_+ como una probabilidad de transición del estado en que el spin apunta hacia abajo al estado en que el spin apunta hacia arriba. En términos de las cantidades originales, tenemos:

$$P_{\downarrow \rightarrow \uparrow}(t) = P_+(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega - \omega_L}{\Omega}\right)^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega - \omega_L}{\Omega}\right)^2}\right) \quad (18.38)$$

Los máximos de esta función se producen para instantes t_n tales que el argumento del seno se hace $(2n+1)\pi/2$. En particular t_0 toma el valor:

$$t_0 = \frac{\pi}{\Omega} \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega - \omega_L}{\Omega})^2}} \quad (18.39)$$

y

$$t_n = (2n+1)t_0 \quad (18.40)$$

En tal instante t_n se tendrá

$$P_{\downarrow \rightarrow \uparrow}(t) = \frac{1}{1 + (\frac{\omega - \omega_L}{\Omega})^2} \quad (18.41)$$

de manera que si $\omega - \omega_L \approx 0$

$$P_{\downarrow \rightarrow \uparrow}(t) \approx 1 \quad (18.42)$$

El sistema oscila entre dos niveles. El efecto es más pronunciado cuanto mas cercana es la frecuencia externa del campo cruzado variable a la frecuencia de Larmour. En este caso se habla de *resonancia paramagnética*.

Gracias al campo cruzado variable (en el plano (x, y)) $\vec{h}_0$, además de la precesión producida por el campo constante $B\vec{k}$ el spin “cabecea” en un movimiento de nutación, máximo cuando $\omega \approx \omega_L$. No solo $\langle \hat{s}_x \rangle$ y $\langle \hat{s}_y \rangle$ varían en el tiempo como cuando solo había un campo constante $B\vec{k}$. También cambia $\langle \hat{s}_z \rangle$ y por ello hay transición. Si además hubiera habido un momento angular, en lugar de dos estados hubiera tenido $2j+1$ y las transiciones serían entre esos estados.

Las transiciones implican una absorción de energía igual a la diferencia de energía que hay entre los dos niveles. La absorción de energía por unidad de tiempo es

$$\frac{dE}{dt} = N_+ P_{\uparrow \rightarrow \downarrow} + N_- P_{\downarrow \rightarrow \uparrow} \quad (18.43)$$

con $N_{\pm}$ la población de los niveles. Cuando en medicina se habla de *resonancia paramagnética nuclear*, se está hablando de lo siguiente. Las moléculas de agua tienen un momento magnético de los electrones que la forman que suma a cero. Pero el protón del núcleo del Hidrógeno tiene un spin y entonces, cuando se aplica un campo externo como el

estudiado, hace una transición entre dos estados y absorbe energía. El efecto es chico pero amplificado se lo ve. El agua del cuerpo entonces es utilizada para ir obteniendo una imagen a partir de los lugares en que se produce absorción de energía. Valen en este caso las fórmulas que escribimos arriba pero utilizando el factor giromagnético del protón,

$$g_p = 5.585694702 \quad (18.44)$$


con una incerteza de 0.000000017. Nótese que el momento magnético del protón es positivo el signo en contraste con el negativo del momento magnético del electrón (dada su carga opuesta). El valor de g_p se obtiene a partir de modelos fenomenológicos ya que un cálculo perturbativo como en el caso del electrón no puede ser efectuado ya que la teoría que lo permitiría tiene una constante de acoplamiento que no es pequeña.

Experiencias de Stern-Gerlach en cadena

Vimos que cuando hacemos pasar un haz de electrones por un campo magnético como el de la experiencia de Stern-Gerlach, el haz se divide en dos, uno de electrones con spin hacia arriba ($m_s = +1/2$) y otro con electrones con spin para abajo ($m_s = -1/2$). Esto lo inferimos del hecho de que en la pantalla a la que llegan los electrones aparecen aparecen dos regiones oscuras que indican que el spin de los electrones tienen proyecciones opuestas pues por esa razón son desviados en el eje del campo magnético unos hacia arriba, otros hacia abajo.

Cuando en un haz se conoce con certeza la orientación del spin se dice que el haz está polarizado (esto es totalmente análogo a lo que sucede con la luz polarizada; en ese caso, son los estados de spin del fotón -que puede pensarse como un spinor de rango 2, con spin 1-). Ahora tomamos uno de los dos haces polarizados (digamos el que tiene $m_s = +1/2$) y lo hacemos pasar por otro campo magnético pero que está en una dirección que forma un ángulo θ con el primero (o sea, un ángulo θ con la dirección de polarización). Queremos responder las siguientes preguntas: ¿cuántos haces habrá a la salida? ¿cuáles son sus intensidades?

Graficamos la situación en la siguiente figura:



Hemos representado con línea punteada el sistema de ejes asociado al primer aparato. Suponemos que el spin del electrón, antes de pasar por el segundo aparato, es paralelo al eje z del sistema punteado. Al segundo campo magnético lo llamamos B que define eje z' del segundo sistema de referencia con coordenadas primadas. Podemos pasar del eje z al z' por una rotación con ángulo θ alrededor del eje y .

La función de onda del electrón cuando pasó por el primer campo magnético tiene una forma simple en el sistema sin primar:

$$\psi(\vec{x}) = \varphi(\vec{x}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (18.45)$$

Si hacemos una rotación de $-\theta$ alrededor del eje y , podemos expresar esta función de onda en el sistema primado:

$$\begin{aligned} \psi'(\vec{x}') &= \varphi(\vec{x}') D_y^{1/2}(-\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varphi(\vec{x}') \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \varphi(\vec{x}') \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (18.46)$$

A esta función de onda la podemos escribir ahora así:

$$\psi' = \varphi \cos(\frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \varphi \sin(\frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (18.47)$$

No insistimos en escribir explícitamente $\vec{x}'$ pues en realidad representa el mismo punto que $\vec{x}$ pero en otro sistema de referencia. Lo que interesa

es que la probabilidad de encontrar al electrón en la dirección z' con proyección hacia arriba será:

$$P(\uparrow) = \int d^3x |\varphi(x)|^2 \cos^2(\frac{\theta}{2}) = \cos^2(\frac{\theta}{2}) \quad (18.48)$$

y para abajo,

$$P(\downarrow) = \int d^3x |\varphi(x)|^2 \sin^2(\frac{\theta}{2}) = \sin^2(\frac{\theta}{2}) \quad (18.49)$$

Si se tuvieran muchos electrones, lo que es probabilidad para uno es “estadística” para muchos. El cociente de (18.48) y (18.49) me daría el cociente de intensidades de ambos haces:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{P(\uparrow)}{P(\downarrow)} = \frac{\cos^2(\frac{\theta}{2})}{\sin^2(\frac{\theta}{2})} \quad (18.50)$$

Este es el cociente de intensidades de los dos haces pues aquellos electrones que tienen spin hacia arriba son los desviados hacia arriba en un campo con polo N hacia arriba y los que tienen spin hacia abajo son desviados hacia abajo. La experiencia concuerda absolutamente y da resultados muy diferentes del caso clásico: si el ángulo fuera $\theta = \pi/2$, el spin del electrón incidente sobre el segundo campo sería ortogonal al gradiente de campo y no habría fuerza actuante sobre el electrón, que no se desviaría. Sin embargo cuánticamente tendríamos:

$$P(\uparrow) = P(\downarrow) = \frac{1}{2}$$

El cociente de intensidades daría 1 y esto está en contradicción con la intuición clásica. En efecto, en el marco clásico, si el ángulo entre los campos magnéticos fuera $\theta = \pi/2$ el producto escalar entre el momento magnético del electrón y el campo sería nulo y el electrón no volvería a desviarse.

Desde el punto de vista matemático, el resultado cuántico se origina en la ley de transformación eq.(18.46). En efecto, como la función de onda corresponde a un electrón de spin $1/2$, la definimos como un espinor de Pauli de 2 componentes y transforma frente a rotaciones según la matriz $D_y^{1/2}(-\theta)$ en la que senos y cosenos tiene por argumento $\theta/2$.

La contradicción clásica/cuántica puede entenderse desde el punto de vista físico recordando que en la mecánica cuántica los resultados se obtienen en valor medio. Calculemos entonces el valor medio de $\hat{s}_z$ entre estados como los de la ec.(18.46)

$$\begin{aligned}
 \langle s_z \rangle &= \langle \psi' | \hat{s}_z | \psi' \rangle = \int d^3x |\varphi(x)|^2 \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & \sin(\theta/2) \end{pmatrix} \hat{s}_z \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & \sin(\theta/2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{2} (\cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2)) = \frac{\hbar}{2} \cos \theta
 \end{aligned} \tag{18.51}$$

que se anula si $\theta = \pi/2$.

Clase 19

Acoplamiento spin-órbita

Supongamos que un electrón, con un momento magnético $\vec{m}_s$ se mueve con impulso $\vec{p}$ en un campo eléctrico $\vec{E}$. Por tener carga e , sabemos que genera un campo magnético

$$\vec{B} = -\frac{1}{c} \frac{\vec{p}}{m} \wedge \vec{E} \quad (19.1)$$

Habría entonces una energía de interacción entre ese campo magnético y $\vec{m}_s$:

$$V_{int} = -\vec{m}_s \cdot \vec{B} = \frac{1}{c} \vec{m}_s \cdot \frac{\vec{p}}{m} \wedge \vec{E} \quad (19.2)$$

Usando la expresión explícita de $\vec{m}_s$ en términos del spin,

$$\vec{m}_s = -g \frac{\beta}{\hbar} \vec{s}$$

con $\beta = e\hbar/(2mc)$, tenemos

$$V_{int} = -\frac{g\beta}{\hbar mc} \vec{s} \cdot \vec{p} \wedge \vec{E} \quad (19.3)$$

Consideremos el caso de un potencial central,

$$\vec{E} = -e \frac{\vec{r}}{r} \frac{d\phi}{dr}$$

con ϕ el potencial escalar. En este caso, V_{int} toma la forma

$$V_{int} = \frac{ge\beta}{\hbar mc} \frac{d\phi}{r dr} \vec{s} \cdot \vec{p} \wedge \vec{r} \quad (19.4)$$

En términos del momento angular $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$, tenemos finalmente

$$V_{int} = \frac{4}{\hbar} w(r) \vec{L} \cdot \vec{s} \quad (19.5)$$

con

$$w(r) = -\frac{e^2 \hbar}{4m^2 c^2} \frac{d\phi}{r dr} \quad (19.6)$$

donde hemos utilizado el valor $g = 2$ para el factor giromagnético del electrón. Cuando se tienen en cuenta las leyes de transformación relativista de los campos, se encuentra que, por puro efecto cinemático, aparece una contribución adicional a la energía que tiene la misma forma que la dada por (19.5) pero multiplicada por un factor $-1/2$. Cuando se incluye esta contribución, llamada término de Thomas, se obtiene para la interacción spin-órbita el resultado completo

$$V_{int} = \frac{2}{\hbar} w(r) \vec{L} \cdot \vec{s} \quad (19.7)$$

El hamiltoniano del electrón tiene entonces la forma

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{p}^2/2m + e\phi(r) & 0 \\ 0 & \hat{p}^2/2m + e\phi(r) \end{pmatrix} + w(r) \vec{\sigma} \cdot \vec{L} \quad (19.8)$$

Es fácil ver que $[\hat{H}, \hat{L}_z] \neq 0$ por lo que $\hat{L}_z$ no es un buen operador para formar el CCOC. Pero en cambio puede verse que $\hat{J}^2$ y $\hat{J}_z$ sí conmutan con el hamiltoniano y junto con $\hat{s}^2$ y $\hat{L}^2$ formarán el CCOC adecuado.

Teoría de Perturbaciones (independientes del tiempo)

Consideremos un hamiltoniano independiente del tiempo de la forma

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V} \quad (19.9)$$

en el que $\hat{H}_0$ representa un hamiltoniano que incluye una interacción tal que permita resolver exactamente el problema de autofunciones y autovalores asociado:

$$\hat{H}_0 |\psi_m^{(0)}\rangle = E_m^{(0)} |\psi_m^{(0)}\rangle \quad (19.10)$$

A H_0 lo llamaremos “hamiltoniano sin perturbar”. El término $\hat{V}$ será considerado una perturbación, un potencial adicional que complica el problema de manera que, cuando esté presente, sea imposible hallar una solución exacta. En cuanto a λ , es un parámetro sin dimensiones que en algunos casos estará ligado a la intensidad de la perturbación y en otros nos dará simplemente una manera conveniente de controlar el orden de la aproximación que realicemos. Ahora bien, para que el método sea consistenmte debiera ser suficientemente “pequeño” en el sentido que especificaremos en lo que sigue.

Consideremos para comenzar el caso en que el problema sin perturbar tiene un

Espectro discreto no degenerado

Ya que no podemos calcular exactamente los autovalores y autofunciones del problema perturbado,

$$\hat{H} |\psi_m\rangle = E_m |\psi_m\rangle \quad (19.11)$$

haremos un desarrollo en serie de potencias de λ de la forma

$$E_m = E_m^{(0)} + \lambda E_m^{(1)} + \lambda^2 E_m^{(2)} + \dots \quad (19.12)$$

$$|\psi_m\rangle = \sum_n c_{mn} |\psi_n^{(0)}\rangle \quad (19.13)$$

en el que los coeficientes c_{mn} también serán desarrollados en serie de potencias de λ . El número n corresponde al "orden" en el que tratamos a la perturbación.

$$c_{mn} = c_{mn}^{(0)} + \lambda c_{mn}^{(1)} + \lambda^2 c_{mn}^{(2)} + \dots \quad (19.14)$$

Insertando las expansiones (19.12)-(19.14) en la ec.(19.11) y comparando potencias de λ se tiene, al orden más bajo (λ^0),

$$\hat{H}_0 \sum_n c_{mn}^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle = E_m^{(0)} \sum_n c_{mn}^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle \quad (19.15)$$

o

$$\sum_n E_n^{(0)} c_{mn}^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle = E_m^{(0)} \sum_n c_{mn}^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle \quad (19.16)$$

que tiene como solución única:

$$c_{mn}^{(0)} = \delta_{mn} \quad (19.17)$$

O sea que el orden cero en potencias de λ del desarrollo perturbativo corresponde a la energía sin perturbar.

Vayamos ahora al orden 1 en λ :

$$\sum_n E_n^{(0)} c_{mn}^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle + \hat{V} |\psi_m^{(0)}\rangle = E_m^{(0)} \sum_n c_{mn}^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle + E_m^{(1)} |\psi_m^{(0)}\rangle \quad (19.18)$$

Multiplicando por $\langle \psi_m^{(0)} |$ se obtiene

$$c_{mm}^{(1)} E_m^{(0)} + \langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_m^{(0)} \rangle = c_{mm}^{(1)} E_m^{(0)} + E_m^{(1)} \quad (19.19)$$

de donde obtenemos para la primera corrección a la energía sin perturbar,

$$E_m^{(1)} = \langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_m^{(0)} \rangle \equiv V_{mm} = \int d^3x \psi_m^{(0)*}(x) \hat{V}(x) \psi_m^{(0)}(x) \quad (19.20)$$

Si volvemos a la ecuación (19.18) y la multiplicamos por $\langle \psi_k^{(0)} |$ con $k \neq m$, obtenemos

$$E_k^{(0)} c_{mk}^{(1)} + V_{km} = E_m^{(0)} c_{mk}^{(1)} \quad (19.21)$$

de donde obtenemos:

$$c_{mk}^{(1)} = \frac{V_{km}}{E_m^{(0)} - E_k^{(0)}} \quad k \neq m \quad (19.22)$$

Solo nos queda a orden λ por determinar $c_{mm}^{(1)}$. Pero como $|\psi_m\rangle$ debe estar normalizada orden a orden, puede hallarse este coeficiente en términos de todos los demás.

Para determinar cuán buena es esta aproximación, notemos que para que la energía sin perturbar no se vea corregida al calcular la primera corrección por un término que sea del orden o mayor a ella debe cumplirse que

$$|V_{mm}| \ll E_m^{(0)} \quad (19.23)$$

En cuanto a las funciones de onda, se ve que para que la aproximación sea buena debe cumplirse que

$$|V_{mn}| \ll |E_m^{(0)} - E_n^{(0)}| \quad (19.24)$$

Se puede continuar calculando los órdenes siguientes de manera análoga. Por ejemplo, a orden λ^2 se obtiene:

$$E_m^{(2)} = \sum_{n \neq m} \frac{|V_{mn}|^2}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}} \quad (19.25)$$

Vemos que si estudiamos cuánto cambia el estado fundamental ($m = 0$), como $E_n^{(0)} > E_0^{(0)}$ esta corrección de segundo orden será siempre negativa.

Si además de espectro discreto hubiera continuo, las fórmulas anteriores se generalizan trivialmente a fórmulas en las que integrales reemplazan a las sumas sobre índices discretos.

Un primer ejemplo

Consideremos el caso en el que un potencial de oscilador armónico es perturbado por términos cúbicos y cuárticos:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + g_3 x^3 + g_4 x^4 \quad (19.26)$$

con

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (19.27)$$

En este caso el papel de $\lambda\hat{V}$ lo juegan los términos anarmónicos,

$$\lambda\hat{V} = g_3x^3 + g_4x^4 \quad (19.28)$$

La energía del problema sin perturbar es la que calculamos para el oscilador armónico

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + \dots = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) + E_n^{(1)} + \dots \quad (19.29)$$

En cuanto a $E_n^{(1)}$ tenemos

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | (g_3x^3 + g_4x^4) | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (19.30)$$

o

$$E_n^{(1)} = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_n^{(0)}|^2 (g_3x^3 + g_4x^4) \quad (19.31)$$

Vimos que las autofunciones del oscilador tienen paridad definida. Al cambiar $x \rightarrow -x$ la función de onda sin perturbar se mantiene invariante o cambia de signo pero su módulo cuadrado es en cualquier caso invariante. Como $dx \rightarrow -dx$ y los límites de la integral se invierten, es fácil ver que el término cúbico no contribuye por lo que tenemos

$$E_n^{(1)} = g_4 \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_n^{(0)}|^2 x^4 \quad (19.32)$$

Reemplazando explícitamente las autofunciones del oscilador se obtiene, luego de la integración:

$$E_n^{(1)} = \frac{3}{4}g_4 \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^2 (2n^2 + 2n + 1) \quad (19.33)$$

vemos que si $g_4 > 0$, $E_n^{(1)} > 0$ y el valor de la energía se hace mayor a causa de la perturbación. En cuanto a g_3 , recién contribuirá a segundo orden.

Efecto Stark⁶⁶

Supongamos que sometemos al electrón del átomo de Hidrógeno a un campo externo eléctrico $\vec{E}$ constante. Ignoraremos por ahora el acoplamiento de $\vec{E}$ con el momento magnético intrínseco del electrón. La energía potencial del electrón en tal campo será entonces:

$$V = -e\vec{E} \cdot \vec{r} \quad (19.34)$$

Tenemos entonces

$$\hat{H} = \hat{H}_{hid} - e\vec{E} \cdot \vec{r} \quad (19.35)$$

donde $\hat{H}_{hid}$ es el hamiltoniano del átomo de hidrógeno sin perturbar, cuyos autovalores y autofunciones conocemos. La primera corrección $E_n^{(1)}$ a la energía $E_n^{(0)}$ del nivel n (no degenerado, para que valgan nuestras fórmulas obtenidas para casos no-degenerados), provocada por el campo eléctrico será:

$$E_n^{(1)} = -\langle \psi_n^{(0)} | e\vec{E} \cdot \vec{r} | \psi_n^{(0)} \rangle = -e\vec{E} \cdot \langle \psi_n^{(0)} | \vec{r} | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (19.36)$$

Para que esta aproximación sea buena, el campo eléctrico externo tiene que ser menor que el producido por el núcleo del átomo que, calculado a una distancia equivalente al radio de Bohr, es aproximadamente

$$\frac{1}{ea} E_{coul} \sim 10^{10} \text{ volts/m}$$

Definamos

$$\vec{r}_{nk} = \langle \psi_n^{(0)} | \vec{r} | \psi_k^{(0)} \rangle = \int d^3x \psi_n^{(0)*}(\vec{x}) \psi_k^{(0)}(\vec{x}) \vec{r} \quad (19.37)$$

Sabemos que las autofunciones del átomo de hidrógeno tienen paridad definida por lo que

$$\vec{r}_{nn} = \int d^3x |\psi_n^{(0)}(\vec{x})|^2 \vec{r} = 0 \quad (19.38)$$

⁶⁶J. Stark, Beobachtungen ber den Effekt des elektrischen Feldes auf Spektrallinien I. Quereffekt (Observaciones del efecto de un campo eléctrico of en las líneas espectrales I. Transverse effect), Annalen der Physik, vol. 43 (1914) 965. Publicado previamente (1913) en Sitzungsberichten der Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss.

y por eso la primer corrección provocada por el campo externo será de segundo orden y se habla de *efecto Stark cuadrático*.

Tenemos entonces:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(2)} + \dots \quad (19.39)$$

con $E_n^{(2)}$ dada por la fórmula (19.25)

$$E_n^{(2)} = e^2 \sum_{k \neq n} \frac{\vec{E} \cdot \vec{r}_{nk}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \frac{\vec{E} \cdot \vec{r}_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \quad (19.40)$$

Estudiemos el caso del nivel fundamental (que es no degenerado) y consideremos el caso en que $\vec{E} = (0, 0, E)$. Tenemos

$$E_1^{(2)} = e^2 E^2 \sum_{k \neq 1} \frac{\vec{z}_{1k} \cdot \vec{z}_{k1}}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} = e^2 E^2 \sum_{k \neq 1} \frac{|\vec{z}_{k1}|^2}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} \quad (19.41)$$

Hay una manera ingeniosa de calcular la suma (19.41) descubierta por Heisenberg y que utilizaremos ahora para calcular la suma en (19.41). Supongamos conocer una cierta función $F(\vec{r})$ tal que

$$z|\psi_1^{(0)}\rangle = [F(\vec{r}), \hat{H}_{hid}]|\psi_1^{(0)}\rangle \quad (19.42)$$

Tendremos entonces

$$z_{k1} = \langle \psi_k^{(0)} | [F(\vec{r}), \hat{H}_{hid}] | \psi_1^{(0)} \rangle = (E_1^{(0)} - E_k^{(0)}) \langle \psi_k^{(0)} | F(\vec{r}) | \psi_k^{(0)} \rangle \quad (19.43)$$

De esta manera, reemplazando en (19.41) tendremos

$$E_1^{(2)} = e^2 E^2 \sum_{k \neq 1} z_{1k} F_{k1} = e^2 E^2 \sum_k z_{1k} F_{k1} - z_{11} F_{11} \quad (19.44)$$

Pero por paridad $z_{11} = 0$. En cuanto a la suma, por completitud tenemos

$$\begin{aligned} E_1^{(2)} &= e^2 E^2 \sum_k z_{1k} F_{k1} = e^2 E^2 \sum_k \langle \psi_1^{(0)} | z | \psi_k^{(0)} \rangle \langle \psi_k^{(0)} | F | \psi_1^{(0)} \rangle \\ &= e^2 E^2 \langle \psi_1^{(0)} | z F | \psi_1^{(0)} \rangle \end{aligned} \quad (19.45)$$

Es fácil hallar la función $F(\vec{r})$. Basta notar que

$$[F(\vec{r}), \hat{H}_{hid}] = [F(\vec{r}), \frac{\hat{p}^2}{2m}] \quad (19.46)$$

con lo que la ecuación a resolver será:

$$z\psi_1^{(0)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(F(\vec{r})\nabla^2\psi_1^{(0)} - \nabla^2(F(\vec{r})\psi_1^{(0)}) \right) \quad (19.47)$$

Usando la forma explícita de $\psi_1^{(0)}$,

$$\psi_1^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} \exp(-r/a)$$

con $a = \hbar^2/(me^2)$ el radio de Bohr, se llega a una ecuación de segundo orden para F cuya solución es:

$$F(\vec{r}) = -\frac{ma}{\hbar^2} \left(\frac{r}{2} + a \right) z \quad (19.48)$$

con lo que finalmente volviendo a la ecuación (19.45) nos resta calcular

$$E_1^{(2)} = e^2 E^2 \langle \psi_1^{(0)} | z F | \psi_1^{(0)} \rangle = -\frac{e^2 E^2 ma}{\hbar^2} \langle \psi_1^{(0)} | z^2 \left(\frac{r}{2} + a \right) | \psi_1^{(0)} \rangle \quad (19.49)$$

Dada la simetría de la función de onda del estado fundamental del átomo de hidrógeno, podemos reemplazar z^2 por $r^2/3$ y enfrentar una integral radial que se calcula muy simplemente. El resultado final es:

$$E_1^{(2)} = -\frac{9}{4} a^3 E^2 \quad (19.50)$$

Vemos que la primera corrección a la energía del estado fundamental es negativa por lo que el valor de la energía del fundamental es, en presencia de un campo eléctrico, más negativa que en un átomo sin perturbar. Si recuperamos las unidades habituales (lo que incluye reintroducir la constante dieléctrica ϵ_0) tendremos entonces

$$E_1 = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a} - 9\pi\epsilon_0 a^3 E^2 \quad (19.51)$$

Como sealamos arriba, hasta aquí hemos considerado el caso de niveles no degenerados para los cuales vale la teoría de perturbaciones. Veremos luego, al extender el método de perturbaciones al caso de niveles degenerados, que el *efecto Stark lineal* tiene también lugar en el átomo de hidrógeno.

Clase 20

Teoría de perturbaciones

Espectro degenerado

En el caso no degenerado, al desarrollar la función de onda del sistema perturbado con hamiltoniano $\hat{H}$ en términos del problema sin perturbar, con hamiltoniano $\hat{H}_0$,

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V} \quad (20.1)$$

$$\hat{H}|\psi_m\rangle = E_m|\psi_m\rangle \quad (20.2)$$

$$\hat{H}_0|\psi_m^{(0)}\rangle = E_m^{(0)}|\psi_m^{(0)}\rangle \quad (20.3)$$

$$|\psi_m\rangle = \sum_n c_{mn}|\psi_n^{(0)}\rangle \quad (20.4)$$

y proponer una expansión en potencias de un “parámetro de conteo”

$$c_{mn} = c_{mn}^0 + \lambda c_{mn}^{(1)} + \dots \quad (20.5)$$

$$E_m = E_m^{(0)} + \lambda E_m^{(1)} + \dots \quad (20.6)$$

obtuvimos como resultado

$$c_{mn}^{(0)} = \delta_{mn} \quad (20.7)$$

$$E_m^{(1)} = V_{mm} = \langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_m^{(0)} \rangle \quad (20.8)$$

El resultado obtenido para $c_{mn}^{(0)}$ (ec. (20.7)) resultó de suponer que el vector de estado con energía $E_m^{(0)}$ era único. Cuando el nivel de energía

$E_m^{(0)}$ tiene una degeneración D en energía (es decir, hay D autofunciones con el mismo autovalor de energía), es evidente que en lugar de tener una única función de onda para elegir a orden cero se tendrán D posibilidades de manera que en lugar de (20.7) se tendrá:

$$c_{mm_r}^{(0)} = c_r \delta_{mm_r} \quad r = 1, 2, \dots, D \quad (20.9)$$

Repitiendo lo hecho en el caso sin degeneración insertamos los desarrollos (20.5)-(20.6) en (20.2)

$$\begin{aligned} (\hat{H}_0 + \lambda \hat{V}) \left(\sum_{r=1}^D c_r |\psi_{m_r}^{(0)}\rangle + \lambda \sum_n c_{mn}^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle + \dots \right) = \\ (E_m^{(0)} + \lambda E_m^{(1)} + \dots) \left(\sum_{r=1}^D c_r |\psi_{m_r}^{(0)}\rangle + \lambda \sum_n c_{mn}^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle + \dots \right) \end{aligned} \quad (20.10)$$

A orden cero la igualdad se satisface automáticamente. A orden λ tenemos:

$$\begin{aligned} \hat{V} \sum_{r=1}^D c_r |\psi_{m_r}^{(0)}\rangle + \sum_n c_{mn}^{(1)} E_n^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle = \\ E_m^{(0)} \sum_n c_{mn}^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle + E_n^{(1)} \sum_{r=1}^D c_r |\psi_{m_r}^{(0)}\rangle \end{aligned} \quad (20.11)$$

o

$$(\hat{V} - E_m^{(1)}) \sum_{r=1}^D c_r |\psi_{m_r}^{(0)}\rangle = \sum_n (E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) c_{mn}^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle \quad (20.12)$$

Multiplicando por $\langle \psi_{m_r'} |$ el lado derecho se anula pues la ortonormalidad o porque el factor $(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})$ se anula. Se tiene entonces

$$\sum_{r=1}^D c_r \left(\langle \psi_{m_r'} | \hat{V} | \psi_{m_r}^{(0)} \rangle - E_m^{(1)} \delta_{m_r' m_r} \right) = 0 \quad (20.13)$$

o, de manera compacta

$$\sum_{r=1}^D c_r \left(V_{m_r' m_r} - E_m^{(1)} \delta_{m_r' m_r} \right) = 0 \quad (20.14)$$

Para que este sistema de ecuaciones homogéneas tenga solución no trivial es necesario que el determinante del sistema se anule,

$$\det(V_{m_r, m_r} - E_m^{(1)} \delta_{m_r, m_r}) = 0 \quad (20.15)$$

En general esta ecuación secular admite D soluciones reales. Una vez hallados los autovalores $E_n^{(1)}$, se sustituyen en las ecuaciones y se obtienen los c_r .

Tomemos el caso mas simple, de una degeneración doble. En este caso $m_r = 1, 2$ y la ecuación secular resulta

$$\begin{vmatrix} V_{11} - E_m^{(1)} & V_{12} \\ V_{21} & V_{22} - E_m^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (20.16)$$

Las dos soluciones que resultan de la ecuación de segundo grado que se deriva de (20.16) son:

$$E_m^{(1)} = \frac{1}{2}(V_{11} + V_{22}) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(V_{11} + V_{22})^2 + 4(|V_{12}|^2 - V_{11}V_{22})} \quad (20.17)$$

Donde antes había un nivel doblemente degenerado, ahora hay dos niveles cuya diferencia de energías es

$$\Delta E_m = \sqrt{(V_{11} + V_{22})^2 + 4(|V_{12}|^2 - V_{11}V_{22})} \quad (20.18)$$

En este caso hablamos de “desdoblamiento de niveles”.

Efecto Stark lineal

Ahora sí estamos en condiciones de estudiar el efecto Stark para el caso de un nivel degenerado del átomo de hidrógeno en el que las contribuciones de primer orden en principio no se anulan necesariamente como sucedía con el nivel fundamental que es no-degenerado dada la paridad del integrando que determina $E_1^{(1)}$.

Consideremos el primer estado excitado del átomo de hidrógeno que tiene un número cuántico $n = 2$ por lo que su degeneración es $n^2 = 4$. Los cuatro estados, uno con $l = 0, m = 0$ y los otros tres con $l = 1, m = 0, \pm 1$, tienen todos la misma energía. Si sometemos al átomo a la acción de un campo eléctrico $\vec{E} = (0, 0, E)$, la perturbación tomará

la forma $V = -eEz$ por lo que los elementos de matriz que jugarán un papel en nuestro análisis serán

$$V_{m_r, m_r} = -eE \int d^3x \psi_{2l'm'}^*(\vec{x}) z \psi_{2lm}(\vec{x}) \quad (20.19)$$

Las funciones de onda del primer estado excitado pueden ser escritas como

$$\psi_{2lm}(\vec{x}) = f_{2l}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (20.20)$$

Las funciones radiales $f_{2l}(r)$ se expresan en términos de los polinomios de Laguerre mientras que la parte angular corresponde a armónicos esféricos que determinan la paridad de los estados,

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\pi - \theta, \varphi + \pi) \quad (20.21)$$

donde hemos usado que el cambio $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$ corresponde, en coordenadas esféricas a

$$\theta \rightarrow \pi - \theta, \phi \rightarrow \varphi + \pi \quad (20.22)$$

Entonces, la paridad $\mathcal{P}$ del producto de funciones de onda para la perturbación proporcional a z será:

$$\mathcal{P}(\psi_{2l'm'}^*(\vec{x}) z \psi_{2lm}(\vec{x})) = (-1)^{l+l'+1} \quad (20.23)$$

Como este producto debe ser par para que no se anulen las integrales que dan las correcciones de primer orden debiera cumplirse que

$$l + l' + 1 = 2k \quad (20.24)$$

o sea que no pueden ser al mismo tiempo l y l' iguales. Unos pocos elementos de matriz del potencial serán entonces no nulos:

$$V_{l'm', lm} = \begin{pmatrix} 0 & V_{00,10} & V_{00,11} & V_{00,1-1} \\ V_{10,00} & 0 & 0 & 0 \\ V_{11,00} & 0 & 0 & 0 \\ V_{1-1,00} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (20.25)$$

Es fácil ver que de los 6 elementos que nos resta calcular, hay cuatro que se anulan. En efecto, consideremos los elementos de matriz

$$\begin{aligned} \langle l'm' | \hat{L}_z z | lm \rangle &= \hbar m' \langle l'm' | z | lm \rangle \\ \langle l'm' | z \hat{L}_z | lm \rangle &= \hbar m \langle l'm' | z | lm \rangle \end{aligned}$$

Si restamos ambas igualdades tendremos

$$\langle l'm' | [\hat{L}_z, z] | lm \rangle = \hbar(m' - m) \langle l'm' | z | lm \rangle \quad (20.26)$$

Pero como $[\hat{L}_z, z] = 0$ el lado derecho de (20.26) debe anularse lo que implica que

$$\langle l'm' | z | lm \rangle = 0 \quad \text{si } m \neq m' \quad (20.27)$$

Entonces, solo nos queda por calcular

$$V_{l'm',lm} = \begin{pmatrix} 0 & V_{00,10} & 0 & 0 \\ V_{10,00} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (20.28)$$

Las funciones de onda de los estados implicados son

$$\begin{aligned} \psi_{200}^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left(\frac{1}{2a} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a} \right) \exp \left(-\frac{r}{2a} \right) \\ \psi_{210}^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left(\frac{1}{2a} \right)^{3/2} \frac{r}{a} \exp \left(-\frac{r}{2a} \right) \cos \theta \end{aligned} \quad (20.29)$$

Con lo que, usando $z = r \cos \theta$ se tiene

$$\begin{aligned} V_{00,10} = V_{10,00} &= -\frac{eE}{32\pi a^4} \int r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi r^2 \left(2 - \frac{r}{a} \right) \exp \left(-\frac{r}{a} \right) \cos^2 \theta \\ &= -3eEa \end{aligned} \quad (20.30)$$

Tenemos entonces

$$V_{l'm',lm} = \begin{pmatrix} 0 & -3eEa & 0 & 0 \\ -3eEa & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (20.31)$$


Vemos que hay dos autovalores nulos (que no corregirán la energía obtenida del primer nivel excitado que resulta cuando no hay campo externo). Nos queda un bloque superior no trivial del que estudiaremos la ecuación secular:

$$\begin{vmatrix} -E_2^{(1)} & -3eEa \\ -3eEa & -E_2^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (20.32)$$

La solución de esta ecuación nos da los dos valores no nulos de corrección de la energía del primer nivel excitado del átomo de Hidrógeno en presencia de un campo eléctrico constante:

$$E_2^{(1)} = \pm 3eEa \quad (20.33)$$

Los estados que tenían $m = 0$ ahora no son más degenerados. Los otros dos estados, con $m = 1$ y con $m = -1$ siguen degenerados y con el mismo valor que cuando no había campo eléctrico. Sin perturbación, este nivel era degenerado 4 veces. Es decir que ahora dos de los niveles se han desdoblado y solo queda una degeneración doble, según vemos en el esquema siguiente



Una vez conocidos los autovalores, podemos obtener las autofunciones fácilmente. La ecuación homogénea tiene la forma

$$c_r(V_{l'm',lm} - E_2^{(1)}) = 0 \quad r = 1, 2 \quad (20.34)$$

Para el autovalor $E_2^{(+)}$ se obtiene

$$(c_r^+) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (20.35)$$

y para el autovalor $E_2^{(-)}$

$$(c_r^-) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (20.36)$$

En los vectores columna, la fila de arriba corresponde a $l = 0, m = 0$ y la de abajo a $l = 1, m = 0$.

Conocidos los c_r , podemos ahora escribir las funciones de onda asociadas con cada nivel:

$$\psi^{(+)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200}^{(0)} - \psi_{210}^{(0)}) \quad (20.37)$$

$$\psi^{(-)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200}^{(0)} + \psi_{210}^{(0)}) \quad (20.38)$$

$$\psi^{(D)} = \psi_{211}^{(0)}, \quad \psi_{21-1}^{(0)} \quad (20.39)$$

Acoplamiento spin-órbita

Vimos que cuando una partícula cargada y con spin como el electrón se mueve en un campo eléctrico central como en el caso del átomo de hidrógeno, existe una interacción entre su momento magnético y el campo. Por argumentos de cuantificación canónica logramos escribir esa interacción para un electrón en un potencial eléctrico ϕ en la forma:

$$\hat{V}_{int} = \frac{2}{\hbar} w(r) \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}} \quad (20.40)$$

con

$$w(r) = -\frac{e\hbar}{4m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{d\phi}{dr} \quad (20.41)$$

El hamiltoniano $\hat{H}$ que describe entonces al electrón en un átomo de hidrógeno tendrá entonces la forma:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{int} \quad (20.42)$$

con $\hat{H}_0$ dado por

$$\hat{H}_0 = \begin{pmatrix} \hat{p}^2/2m + \phi & 0 \\ 0 & \hat{p}^2/2m + \phi \end{pmatrix} \quad (20.43)$$

con $\phi = \phi(r)$ el potencial Coulombiano producido por el núcleo del átomo.

Las autofunciones del problema sin perturbar son, como vimos:

$$R_{nl}Y_{lm}(\theta, \varphi) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad R_{nl}Y_{lm}(\theta, \varphi) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (20.44)$$

Son autofunciones del CCOC del hamiltoniano sin perturbar, $\{\hat{H}_0, \hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{s}^2, \hat{s}_z\}$, que denotaremos como $|n l m_l 1/2 m_s\rangle$. Para n fijo, tenemos una degeneración de $2(2l+1)$, el factor 2 originado en las dos posibles proyecciones del spin y el factor $2l+1$ en las posibles proyecciones del momento angular orbital.

Pero como ya señalamos antes, al agregar el término spin-órbita los operadores $\hat{L}_z$ y $\hat{s}_z$ dejan de conmutar con $\hat{H}$ por lo que utilizar la base anterior en el análisis perturbativo resultaría engorroso. Para evitar esta complicación, notemos que el acoplamiento spin-órbita se puede escribir así:

$$\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}} = \frac{1}{2}(\hat{\vec{L}} + \hat{\vec{s}})^2 - \frac{1}{2}\hat{L}^2 - \frac{1}{2}\hat{s}^2 = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{s}^2) \quad (20.45)$$

Esto nos hace ver que $\hat{J}^2$ y $\hat{J}_z$ conmutan con $\hat{H}$ (además de conmutar naturalmente con $\hat{L}^2$ y $\hat{s}^2$). Quiere decir que la base natural para el problema perturbado es la provista por el CCOC $\{\hat{H}, \hat{J}^2, \hat{L}^2, \hat{s}^2, \hat{J}_z\}$.

Tratemos entonces de escribir las autofunciones del problema sin perturbar en términos de esta base para luego usarlas fácilmente para calcular los elementos de matriz de la perturbación. La idea es entonces hacer un cambio de base como el siguiente:

$$|nl \frac{1}{2} m_l m_s\rangle = \sum_{j m_j} C_{j m_j} |nl \frac{1}{2} j m_j\rangle \quad (20.46)$$

Podemos escribir a los kets de la ecuación anterior así:

$$\begin{aligned} |nl \frac{1}{2} m_l m_s\rangle &= |nl \frac{1}{2}\rangle \otimes |m_l m_s\rangle \\ |nl \frac{1}{2} j m_j\rangle &= |nl \frac{1}{2}\rangle \otimes |j m_j\rangle \end{aligned} \quad (20.47)$$

vemos entonces que la parte de las autofunciones correspondiente a $\hat{L}^2$ y $\hat{s}^2$ es común a ambas,

$$|nl \frac{1}{2}\rangle = R_{nl} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad |nl \frac{1}{2}\rangle = R_{nl} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (20.48)$$

El cambio de base se refiere entonces a

$$|m_l m_s\rangle = \sum_{j, m_j} C_{j, m_j} |j m_j\rangle \quad (20.49)$$

Podemos asociar a los kets $|m_l m_s\rangle$ en esta ecuación con armónicos esféricos y autofunciones de $\hat{s}_z$:

$$\left| m_l \frac{1}{2} \right\rangle = Y_{lm_l} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \left| m_l - \frac{1}{2} \right\rangle = Y_{lm_l} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (20.50)$$

y a los kets $|j m_j\rangle$ con

$$|j m_j\rangle = Y_{jm_j} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad o \quad |j m_j\rangle = Y_{jm_j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (20.51)$$

Es fácil obtener, haciendo actuar por ejemplo $\hat{J}_z$ sobre las autofunciones de la vieja base la relación que hay entre m_j , m_l y m_s . Por ejemplo:

$$\hat{J}_z Y_{lm_l} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (\hat{L}_z + \hat{s}_z) Y_{lm_l} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \hbar(m_l + \frac{1}{2}) Y_{lm_l} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (20.52)$$

De ésta y de la relación análoga para la otra autofunción se desprende que

$$m_j = m_l + m_s$$

De esta manera podemos poner

$$|j m_j\rangle = A Y_{lm_j - \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + B Y_{lm_j + \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (20.53)$$

Esta combinación da el valor correcto de m_j :

$$\begin{aligned} \hat{J}_z |j m_j\rangle &= \hbar A (m_j - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}) Y_{lm_j - \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \\ &\quad \hbar B (m_j + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) Y_{lm_j + \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \hbar m_j |j m_j\rangle \end{aligned} \quad (20.54)$$

Falta determinar los coeficientes A y B . Es fácil ver que se pueden ajustar recordando que

$$\hat{J}^2 |j m_j\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j m_j\rangle \quad (20.55)$$

Ahora debemos imponer esto a la combinación lineal (20.53). Para ello, debemos escribir $\hat{J}^2$ en términos de $\hat{\vec{L}}$ y $\hat{\vec{S}}$ para poder hacerlos actuar sobre los armónicos esféricos $Y_{lm_j \mp \frac{1}{2}}$ y sobre las autofunciones de spin. Para ello escribimos

$$\hat{J}^2 = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}} = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\hat{L}_z \hat{S}_z + 2\hat{L}_+ \hat{S}_- + 2\hat{L}_- \hat{S}_+ \quad (20.56)$$

y, dado que conocemos la acción de cada uno de los términos, podemos calcular la acción de $\hat{J}^2$ sobre la combinación (20.53). Al igualar esto a (20.55) se obtiene un sistema homogéneo de dos ecuaciones para A y B . De la condición de que el determinante se anule para que haya solución no trivial resulta una condición para j

$$j = (l \pm \frac{1}{2}) \quad (20.57)$$

Utilizando cada uno de estos dos valores, se determinan A y B y finalmente se tiene

$$|j = l + \frac{1}{2} m_j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \left(\sqrt{l + m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j - \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sqrt{l - m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j + \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad (20.58)$$

$$|j = l - \frac{1}{2} m_j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \left(-\sqrt{l - m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j - \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sqrt{l + m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j + \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad (20.59)$$

En resumen, hemos aprendido que

$$j = l \pm 1/2, \quad m_j = m_l + m_s \quad (20.60)$$

Con esto podemos calcular fácilmente los elementos de matriz de la perturbación en términos de las autofunciones sin perturbar pero escritas en la base conveniente (aquella en que la perturbación es diagonal). Obtenemos:

$$\begin{aligned} \Delta E &= V_{int}^{jm_j, j'm'_j} = \left\langle nl \frac{1}{2} j m_j \left| \frac{2}{\hbar} w(r) \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}} \right| nl \frac{1}{2} j' m'_j \right\rangle \\ &= \hbar \int r^2 dr |R_{nl}|^2 w(r) \delta_{jj'} \delta_{m_j m'_j} \times \left(j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right) \\ &= \langle W \rangle \delta_{jj'} \delta_{m_j m'_j} \left(j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right) \end{aligned} \quad (20.61)$$

donde hemos definido $\langle W \rangle$ según la fórmula

$$\langle W \rangle = \hbar \int r^2 dr |R_{nl}|^2 w(r) \quad (20.62)$$


Notemos que si $l = 0$ entonces $j = 1/2$ (el otro caso daría como resultado $j = -1/2$ lo que es inconsistente). Entonces $j(j+1) = 3/4$ y evidentemente no hay efecto spin-órbita puesto que el factor dependiente de los momentos angulares se anula. Para el caso en que $l \neq 0$ y tenemos un solo electrón, $j = l \pm 1/2$. Si $j = l + 1/2$

$$\Delta E = \hbar l \langle W \rangle \quad (20.63)$$

mientras que si $j = l - 1/2$

$$\Delta E = -\hbar l(l+1) \langle W \rangle \quad (20.64)$$

Tenemos entonces el siguiente esquema de niveles:



Estructura Fina

Vemos que de la degeneración que teníamos, se rompió la ligada a m_s .

Para analizar la validez de la aproximación que hemos realizado recordemos que la condición que hacía adecuado el desarrollo perturbativo era:

$$\left| \frac{\Delta E}{E_n^{(0)}} \right| \ll 1 \Rightarrow \frac{\hbar \langle w \rangle}{E_n^{(0)}} \ll 1 \quad (20.65)$$

Por definición tenemos

$$w = -\frac{e\hbar}{4m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{d\phi}{dr} = \frac{e^2\hbar}{4m^2c^2} \frac{1}{r^3} \quad (20.66)$$

de manera que para un tomo hidrogenoide con radio na y Z protones en el núcleo,

$$\langle w \rangle = \frac{e^2\hbar}{4m^2c^2} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{e^2\hbar}{4m^2c^2} \frac{1}{a^3} \quad (20.67)$$

con a el radio de Bohr. Reemplazando los valores numéricos, la condición (20.65) toma la forma

$$\frac{\hbar \langle w \rangle}{E_n^{(0)}} \approx \frac{(Z\alpha)^2}{n} \ll 1 \quad (20.68)$$

donde α es la llamada constante de estructura fina,

$$\alpha = \frac{e^2}{(4\pi\epsilon_0)\hbar c} \quad (20.69)$$

Si trabajamos en un sistema de unidades en el que el “factor de permittividad” $4\pi\epsilon_0 = 1$ la expresión se reduce a

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137.035999074(44)} \approx \frac{1}{137} \quad (20.70)$$

o

$$\alpha = 7.2973525698(24)10^{-3} \quad (20.71)$$

Es decir que la aproximación que hicimos es buena si no tenemos en cuenta los efectos relativistas que resultan ser más importantes en el hidrógeno (pero no en átomos multielectrónicos).

Nota bene

Siendo que la constante de estructura fina es adimensional y no parece ligada de manera directa a ninguna constante matemática (como π , e , ...) atrajo la atención de muchos físicos. Richard Feynman se refería a ella en estos términos[14]:

There is a most profound and beautiful question associated with the observed coupling constant, e - the amplitude for a real electron to emit or absorb a real photon. It is a simple number that has been experimentally determined to be close to 0.08542455. (My physicist friends won't recognize this number, because they like to remember it as the inverse of its square: about 137.03597 with about an uncertainty of about 2 in the last decimal place. It has been a mystery ever since it was discovered more than fifty years ago, and all good theoretical physicists put this number up on their wall and worry about it.) Immediately you would like to know where this number for a coupling comes from: is it related to π or perhaps to the base of natural logarithms? Nobody knows. It's one of the greatest damn mysteries of physics: a magic number that comes to us with no understanding by man. You might say the "hand of God" wrote that number, and "we don't know how He pushed his pencil." We know what kind of a dance to do experimentally to measure this number very accurately, but we don't know what kind of dance to do on the computer to make this number come out, without putting it in secretly!

Arthur Eddington, Astronomer Royal en el Royal Greenwich Observatory llegó a argumentar que ese valor se podía "obtener por deducción pura" y lo relacionó con el "número de Eddington" que el suponía haber calculado para evaluar el número total de protones del universo. Según Eddington el número de protones era

$$N_{Edd} = 136 \times 2^{256} \quad (20.72)$$

y cuando planteó su explicación (a fines de 1930) ese era el resultado experimental que se tenía para $1/\alpha$. Al mejorar las medidas experimentales, desmejoró el acuerdo con el número de Eddington a quien la famosa revista satírica inglesa Punch paso a llamar "Edington Adding one".

Hoy la única explicación es antrópica: la materia estable y luego la vida de seres inteligentes, no podría existir si el valor fuera diferente. Por ejemplo, si cambiara apenas un 4% la fusión estelar no hubiera podido crear carbono, átomo fundamental para la vida. si $\alpha > 0.1$ no habría en el Universo lugar a una temperatura tal que la vida pudiera existir.

Clase 21

Efecto Zeeman

Supongamos que sometemos a un átomo como el de hidrógeno a la acción de un campo magnético $\vec{B}$, constante, en la dirección del eje z , $\vec{B} = (0, 0, B)$. Además de la interacción de un campo magnético con el momento magnético asociado al spin, que ya estudiamos en la clase 17, tendremos ahora una interacción entre $\vec{B}$ y los momentos angulares orbital y de spin debido a la existencia del término de spin-órbita ($\propto \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}}$), de manera que el hamiltoniano del sistema será:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{w(r)}{\hbar}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{s}^2) + \frac{eB}{2mc}(\hat{L}_z + 2\hat{s}_z) \quad (21.1)$$

Hemos escrito como antes al término $\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}}$ en términos del momento angular total $\hat{J}^2$. En cuanto al factor 2 frente al operador de spin del electrón en relación al factor 1 frente al momento angular orbital, se origina en que, como vimos, el factor giromagnético del electrón es (aproximadamente) 2.

Sabemos que el efecto spin-órbita es el resultado del acoplamiento entre el spin del electrón y el campo magnético generado por la existencia del campo eléctrico del núcleo. Este campo magnético es del orden de 10^4 gauss. Luego, si el campo externo B cumple que

$$B \ll 10^4 \text{ gauss}$$

podemos tomar al nuevo término como una perturbación al hamiltoniano que solo contiene acoplamiento $\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}}$. Se habla en este caso de Efecto Zeeman.

Si el campo externo es tal que

$$B \gg 10^4 \text{ gauss}$$

es el término spin-órbita el que deberá ser tratado como perturbación luego de haber tenido en cuenta la que produce el campo externo sobre el átomo de hidrógeno. Se habla en este caso de efecto Paschen-Bach.

Veremos en esta clase el efecto Zeeman y dejaremos para la práctica el efecto Paschen-Bach. Luego, dado el sistema que estudiamos antes y que diagonalizamos para calcular el efecto del término spin-órbita sobre los niveles del átomo de hidrógeno, tomaremos como nueva perturbación al término

$$\hat{V}_Z = \beta_0 B (\hat{L}_z + 2\hat{s}_z) = \beta_0 B (\hat{J}_z + \hat{s}_z) \quad (21.2)$$

Estudiaremos separadamente los casos $j = l + 1/2$ y $j = l - 1/2$ que corresponden a los dos posibles valores de j . Enfrentamos el inconveniente de que las autofunciones que usamos en la clase anterior, $|nlsm_j\rangle$, adecuadas para tratar el término de spin-órbita una vez escrito como en (21.1), no son autofunciones del operador $\hat{s}_z$ que aparece en la nueva interacción sumado a $\hat{J}_z$. Si insistimos en usarlas, deberemos ser capaces de calcular

$$\hat{s}_z |nlm_j, j = l + \frac{1}{2}, m_j\rangle \quad (21.3)$$

(En lo que sigue no escribiremos explícitamente en los kets los números cuánticos n, l y s .)

En la ecuación (20.58) escribimos la relación entre esta autofunción y las de la base vieja en la representación de coordenadas:

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | \hat{s}_z | l + \frac{1}{2}, m_j \rangle &= \hat{s}_z \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \left(\sqrt{l + m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j - \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \right. \\ &\quad \left. \sqrt{l - m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j + \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \left(\sqrt{l + m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j - \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \right. \end{aligned}$$

$$\sqrt{l - m_j + \frac{1}{2}} Y_{lm_j + \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (21.4)$$


De manera que, usando ortogonalidad, podemos concluir que

$$\langle l + \frac{1}{2}, m'_j | \hat{s}_z | l + \frac{1}{2}, m_j \rangle = \delta_{m_j m'_j} \frac{\hbar m_j}{2l + 1} \quad (21.5)$$

Vemos entonces que toda la perturbación es en realidad diagonal y tendremos

$$\langle l \pm \frac{1}{2}, m'_j | \hat{V}_Z | l \pm \frac{1}{2}, m_j \rangle = \delta_{m_j m'_j} \hbar m_j (1 \pm \frac{1}{2l + 1}) \beta_0 B \quad (21.6)$$

Aquí hemos incorporado con el doble signo el resultado para el caso $j = l - 1/2$ que se trata de manera idéntica. El esquema de niveles resultante será entonces (representamos el caso $l = 1$):



Estructura Fina Zeeman

Estructura hiperfina

El acoplamiento spin-órbita que hemos discutido no produce ningún efecto en el nivel fundamental del átomo de hidrógeno pues el electrón tiene en ese estado momento angular orbital nulo y el desdoblamiento encontrado es proporcional a l (ver fórmulas (20.63)-(20.68)).

Pero existe otro efecto notable que hace que el momento magnético intrínseco del electrón interactúe con otro momento angular y que sí afectara a la energía del nivel fundamental del átomo. En efecto, el protón que constituye el núcleo del hidrógeno tiene un momento magnético proporcional a su spin que es $1/2$ como en el caso del electrón.

Es decir que debe incluirse en el hamiltoniano del electrón una energía de interacción de la forma

$$\hat{V}_H = -\vec{m}_e \cdot \vec{m}_p \quad (21.7)$$

donde $\vec{m}_e$ es el momento magnético del electrón, (con $g \approx 2$) y $\vec{m}_p$ el del protón, asociado a su spin $1/2$ (con $g_p = 5.586$)

$$\vec{m}_e = g_e \beta \frac{1}{\hbar} \hat{s}_e = g_e \frac{e}{2m_e c} \hat{s}_e, \quad \vec{m}_p = g_p \frac{\beta'}{\hbar} \hat{s}_p = g_p \frac{e_p}{2m_p c} \hat{s}_p \quad (21.8)$$

donde hemos usado $\beta = e\hbar/(2m_e c)$ y una fórmula análoga para el protón.

Se tiene entonces

$$\hat{V}_H = A \hat{s}_e \cdot \hat{s}_p \quad (21.9)$$

con

$$A = 2g_p \frac{e^2}{4c^2 m_e m_p} \quad (21.10)$$

El factor giromagnético del protón es determinado experimentalmente)

Dado el valor de su masa, el momento magnético del protón resulta ser aproximadamente 10^{-3} veces menor que el del electrón por lo que

el efecto que produce esta interacción será también 10^{-3} veces menor que la interacción spin-órbita del electrón. De ahí que la estructura de niveles resultante se llame *hiperfina*.

Es importante notar que $\hat{s}_e$ y $\hat{s}_p$ actúan sobre espacios diferentes por lo que

$$[\hat{s}_{ei}, \hat{s}_{pj}] = 0 \quad (21.11)$$

Sin tener en cuenta esta interacción, el nivel fundamental del átomo de hidrógeno tendría una degeneración 4, dada los 4 estados posibles con proyecciones $\pm 1/2$ de los spines del electrón y el protón. Las cuatro funciones de onda asociadas al mismo autovalor del fundamental serían (representamos solo la parte de spin):

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_e \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_p \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_e \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_p \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_e \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_p \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_e \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_p \quad (21.12)$$

A estos mismos estados los podemos anotar como kets $|s_{ez}s_{pz}\rangle$:

$$\left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \quad \left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle \quad \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \quad \left| -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle \quad (21.13)$$

Como en el caso de la interacción spin-órbita, convendrá en este caso también estudiar el cambio de base a la del spin total

$$\hat{s} = \hat{s}_e + \hat{s}_p \quad (21.14)$$

de manera que escribiendo el producto escalar entre los spines como

$$\hat{s}_e \cdot \hat{s}_p = \frac{1}{2}(\hat{s}^2 - \hat{s}_e^2 - \hat{s}_p^2) \quad (21.15)$$

podamos obtener elementos de matriz de la perturbación que sean diagonales. Se trata entonces de encontrar el cambio de base

$$|ss_z\rangle = \sum_{s_{ez}, s_{pz}=\pm\frac{1}{2}} \langle s_{ez}s_{pz}|ss_z\rangle |s_{ez}s_{pz}\rangle \quad (21.16)$$

Llamaremos c_i ($i = 1, \dots, 4$) a los coeficientes de este desarrollo ordenados según

$$|ss_z\rangle = c_1 \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + c_2 \left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle + c_3 \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + c_4 \left| -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle \quad (21.17)$$

Para determinar los coeficientes c_i se utilizan las ecuaciones

$$\begin{aligned}\hat{s}^2|ss_z\rangle &= \hbar^2 s(s+1)|ss_z\rangle \\ \hat{s}_z|ss_z\rangle &= \hbar s_z|ss_z\rangle\end{aligned}\quad (21.18)$$

Como siempre, conviene escribir

$$\hat{s}^2 = \hat{s}_e^2 + \hat{s}_p^2 + 2\hat{s}_{ez}\hat{s}_{pz} + \hat{s}_{e+}\hat{s}_{p-} + \hat{s}_{e-}\hat{s}_{p+} \quad (21.19)$$

con

$$\begin{aligned}\hat{s}_+ &= \hat{s}_x + i\hat{s}_y = \frac{\hbar}{2}(\sigma_1 + i\sigma_2) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \hat{s}_- &= \hat{s}_x - i\hat{s}_y = \frac{\hbar}{2}(\sigma_1 - i\sigma_2) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (21.20)$$

Tenemos entonces por ejemplo, al aplicar $\hat{s}^2$,

$$\begin{aligned}& s(s+1) \left(c_1 \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + c_2 \left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle + c_3 \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + c_4 \left| -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle \right) \\ &= \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \right) c_1 \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) c_2 \left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle + \\ & \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) c_3 \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \right) c_4 \left| -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle \\ & + c_3 \left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle + c_2 \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle\end{aligned}\quad (21.21)$$

Podemos ahora igualar los coeficientes de cada uno de los cuatro vectores independientes. Se obtiene entonces

$$s(s+1)c_1 = 2c_1 \quad (21.22)$$

lo que implica

$$\begin{aligned}c_1 &= 0 \\ \text{o} \\ s^2 + s - 2 &= 0\end{aligned}\quad (21.23)$$

La ecuación de segundo grado en (21.23) tiene una raíz negativa que debe ser descartada por lo que queda

$$\begin{aligned}c_1 &= 0 \\ \text{o} \\ s &= 1\end{aligned}\quad (21.24)$$

Un resultado análogo se obtiene igualando los coeficientes de c_4 ,

$$\begin{aligned} c_4 &= 0 \\ \text{o} \\ s &= 1 \end{aligned} \quad (21.25)$$

En cuanto a los de c_2 y c_3 se obtienen las ecuaciones

$$c_2 = c_3, \quad s = 1 \quad (21.26)$$

$$\begin{aligned} \text{o} \\ c_2 = -c_3, \quad s = 0 \end{aligned} \quad (21.27)$$

Tomemos la solución $s = 0$ de la ecuación anterior. Como c_1 y c_4 están indeterminados, los elijo nulos, $c_1 = c_4 = 0$. Se tiene entonces

$$|0s_z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\rangle - |-\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle) \quad (21.28)$$

pero aplicando $\hat{s}_z$ a esta igualdad y utilizando $\hat{s}_z = \hat{s}_{ez} + \hat{s}_{pz}$ se tiene

$$\hat{s}_z|0s_z\rangle = 0 \quad (21.29)$$

de donde se concluye que $s_z = 0$ y que el estado resulta ser:

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\rangle - |-\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle \right) \quad (21.30)$$

En el caso en que $s = 1$ vemos de la ecuación (21.28) que podemos escribir

$$|1s_z\rangle = c_1|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle + c_2 \left(|\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\rangle + |-\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle \right) + c_4|-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\rangle \quad (21.31)$$

y al hacer actuar $\hat{s}_z$ tenemos

$$\hat{s}_z|1s_z\rangle = \hbar \left(c_1|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle - c_4|-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\rangle \right) \quad (21.32)$$

Entonces, para que $|1s_z\rangle$ sea autofunción de $\hat{s}_z$ deben ser o bien $c_1 = 0$ o bien $c_4 = 0$. Si elegimos $c_4 = 0$ tendremos, según (21.27),

$$|1s_z\rangle = |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle \quad (21.33)$$

de donde se desprende que $s_z = 1$ y tenemos

$$|11\rangle = \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \quad (21.34)$$

Si en cambio elegimos $c_1 = 0$ tendremos, según (21.26) y por un análisis similar,

$$|1-1\rangle = \left| -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle \quad (21.35)$$

Finalmente la última opción es elegir $c_2 = c_3$ con $s = 1$ y esto nos lleva a

$$|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle + \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \right) \quad (21.36)$$

Podemos entonces resumir lo hallado en la tabla siguiente:

$$\begin{array}{lcl} \text{singulete} & \left\{ \begin{array}{l} |00\rangle \\ |1-1\rangle \end{array} \right. & = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle - \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \right) \\ \text{triplete} & \left\{ \begin{array}{l} |1-1\rangle \\ |10\rangle \\ |11\rangle \end{array} \right. & = \begin{array}{l} \left| -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle + \left| -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \right) \\ \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \end{array} \end{array} \quad (21.37)$$


Ahora estamos en condiciones de calcular los elementos de matriz de la perturbación $\hat{V}_H$ causada por la interacción entre los spines del protón y del electrón:

$$\langle V_H \rangle = \langle s's'_z | \frac{A}{2} (\hat{s}^2 - \hat{s}_e^2 - \hat{s}_p^2) | ss_z \rangle = \frac{A\hbar^2}{2} \left(s(s+1) - \frac{3}{2} \right) \quad (21.38)$$

De esta manera, tenemos

$$\begin{aligned} \langle V_H \rangle &= \frac{A\hbar^2}{4}, & s &= 1 \\ \langle V_H \rangle &= -\frac{3A\hbar^2}{4}, & s &= 0 \end{aligned} \quad (21.39)$$

El esquema de niveles es entonces el siguiente:



Una transición del triplete al singlete va acompañada de la emisión de un fotón de energía E_f ,

$$E_f = \hbar\nu = \frac{A\hbar^2}{4} - \left(-\frac{3A\hbar^2}{4}\right) \quad (21.40)$$

o

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = A\hbar \quad (21.41)$$

Utilizando el valor de A que se calcula de (21.10), se tiene

$$\nu = 1420 \times 10^6 \text{ ciclos/seg} \quad (21.42)$$

Esta frecuencia corresponde a una longitud de onda de $\lambda \approx 21\text{cm}$. Esta es la famosa línea de 21 cm del hidrógeno usada en radioastronomía para detectar hidrógeno en sistemas extragalácticos.

Quedan muchas otras correcciones a hacer para describir la estructura de niveles del átomo de hidrógeno. Hemos aproximado la masa reducida del sistema de dos cuerpos por la masa del electrón, como si el núcleo fuera infinitamente masivo. Si se tiene en cuenta la masa del núcleo, se encuentra una corrección que si bien es pequeña, es detectable comparando el espectro del hidrógeno y del deuterio. Son necesarias también correcciones relativistas que solo se pueden hacer en el marco de la teoría de Dirac y no en el de la de Schrödinger. Finalmente, existe el llamado efecto Lamb, producido por la interacción del electrón con las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético. Este efecto solo puede ser descrito en el marco de la electrodinámica cuántica

y permite ver cómo la degeneración predicha por la teoría de Dirac para los estados $2S_{1/2}$ y $2P_{1/2}$ se rompe tal como lo mostraban desde 1947 las medidas de Lamb y Rutherford. El resultado experimental daba una frecuencia asociada con la diferencia de energías de los niveles de aproximadamente 1000MHz . Los cálculos de la electrodinámica cuántica llevan el valor a

$$1057.864 \pm 0.014\text{MHz}$$

Las medidas experimentales recientes dan un valor de

$$1057.862 \pm 0.020\text{MHz}$$

mostrando un perfecto acuerdo.

Acoplamiento de momentos angulares

Al estudiar la estructura hiperfina aprendimos a *acoplar* dos spines. Es decir, a saber cómo hacer el cambio de base para pasar de la base de los spines individuales del protón y el electrón a aquella en que están sumados. Planteando ecuaciones de autovalores y autofunciones calculamos los coeficientes del desarrollo que relaciona una base con otra. Esto puede hacerse en general para dos momentos angulares cualquiera. A los coeficientes del desarrollo que liga a las bases se los llama coeficientes de Clebsh-Gordan.

Supongamos tener dos momentos angulares $\hat{\vec{J}}_1$ y $\hat{\vec{J}}_2$. Cada uno obedece el álgebra de momento angular que conocemos:

$$[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{1j}] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{J}_{1k} \quad (21.43)$$

$$[\hat{J}_{2i}, \hat{J}_{2j}] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{J}_{2k} \quad (21.44)$$

En cuanto a la suma, que anotamos, para simplificar la notación,

$$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{J}}_1 + \hat{\vec{J}}_2 \quad (21.45)$$

recordemos que en realidad tiene la expresión

$$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{J}}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{\vec{J}}_2 \quad (21.46)$$

Los coeficientes de Clebsh-Gordan relacionan la “vieja base”

$$|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle = |j_1 j_2 m_1 m_2\rangle \quad (21.47)$$

con la “nueva” base

$$|j_1 j_2 j m\rangle \quad (21.48)$$

Además de los coeficientes de Clebsh-Gordan, se trata de hallar los valores posibles del momento angular total y de su proyección, conocidos los correspondientes a $\hat{J}_1$ y $\hat{J}_2$.

El cambio de base está dado por la fórmula:

$$|j_1 j_2 j m\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle j_1 j_2 m_1 m_2 | j_1 j_2 j m \rangle |j_1 j_2 m_1 m_2\rangle \quad (21.49)$$

Como j_1 y j_2 están presentes en los kets de ambos lados de la igualdad, los obviaremos y escribiremos de manera compacta

$$|j m\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle m_1 m_2 | j m \rangle |m_1 m_2\rangle \quad (21.50)$$

Se trata entonces de calcular los coeficientes de Clebsh-Gordan

$$\langle m_1 m_2 | j m \rangle \quad (21.51)$$

Si aplicamos a la ec.(21.49) el operador $\hat{J}_z = \hat{J}_{1z} + \hat{J}_{2z}$ tendremos

$$\begin{aligned} \hat{J}_z |j m\rangle &= m |j m\rangle = (\hat{J}_{1z} + \hat{J}_{2z}) |j m\rangle \\ &= \sum_{m_1, m_2} (m_1 + m_2) \langle m_1 m_2 | j m \rangle |m_1 m_2\rangle \end{aligned} \quad (21.52)$$

Pero reescribiendo el lado izquierdo nuevamente en términos de la vieja base se llega a la relación entre números cuánticos “magnéticos”:

$$m = m_1 + m_2 \quad (21.53)$$

Consideremos ahora los operadores $\hat{J}_+$ y $\hat{J}_-$ definidos como

$$\begin{aligned} \hat{J}_+ &= \hat{J}_{1+} + \hat{J}_{2+} \\ \hat{J}_- &= \hat{J}_{1-} + \hat{J}_{2-} \end{aligned} \quad (21.54)$$

Aplicando $\hat{J}_{\pm}$ al desarrollo (21.49) se obtienen relaciones de recursión que permiten calcular los coeficientes del cambio de base:

$$\begin{aligned} \sqrt{(j \pm m)(j \mp m + 1)} \langle m_1 m_2 | j, m \mp 1 \rangle = \\ \sqrt{(j_1 \mp m_1)(j_1 \pm m_1 + 1)} \langle m_1 \pm 1, m_2 | jm \rangle + \\ \sqrt{(j_2 \mp m_2)(j_2 \pm m_2 + 1)} \langle m_1, m_2 \pm 1 | jm \rangle \end{aligned} \quad (21.55)$$

para comprender cómo se utilizan estas fórmulas consideremos el caso en que m_1 toma su valor máximo posible, $m_1 = j_1$ y lo mismo para m , $m = j$. Luego m_2 tiene un único valor posible, $m_2 = m - m_1 = j - j_1$. Se obtiene en este caso usando los signos de la línea superior

$$\begin{aligned} \sqrt{2j} \langle j_1, j - j_1 - 1 | j, j - 1 \rangle = \\ \sqrt{(j_2 - j + j_1 + 1)(j_2 + j - j_1)} \langle j_1, j - j_1 | jj \rangle \end{aligned} \quad (21.56)$$

Ahora usemos la línea de signos inferior pero para $m_1 = j_1$, $m_2 = j - j_1$ y consecuentemente $m = j - 1$. Tendremos

$$\begin{aligned} \sqrt{2j} \langle j_1, j - j_1 | j, j \rangle = \sqrt{2j_1} \langle j_1 - 1, j - j_1 | j, j - 1 \rangle + \\ \sqrt{(j_2 + j - j_1 + 1)(j_2 - j + j_1 + 1)} \langle j_1, j - j_1 - 1 | j, j - 1 \rangle \end{aligned} \quad (21.57)$$

A partir de (21.56) podemos calcular $\langle j_1, j - j_1 - 1 | j, j - 1 \rangle$ a partir de $\langle j_1, j - j_1 | jj \rangle$. Luego, puede calcularse a partir de (21.57) $\langle j_1 - 1, j - j_1 | j, j - 1 \rangle$. Siguiendo la recurrencia se calculan todos los coeficientes de Clebsh-Gordan en términos de un único coeficiente:

$$\langle j_1, j - j_1 | jj \rangle \quad (21.58)$$

El valor absoluto de este coeficiente se calcula por normalización. Sabemos que el coeficiente será no nulo en el rango de valores posibles de m_2 ,

$$-j_2 \leq m_2 = j - j_1 \leq j_2 \quad (21.59)$$

pero también podíamos haber expresado a todos los coeficientes en término de otro,

$$\langle j - j_2, j_2 | jj \rangle \quad (21.60)$$

Y en este caso la condición para que fuera no nulo sería

$$j_2 - j_1 \leq j \leq j_1 + j_2 \quad (21.61)$$

De estos dos rangos deducimos la llamada *condición triangular*

$$|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2 \quad (21.62)$$

O sea que los números j, j_1, j_2 deben ser tales que puedan constituir los 3 lados de un triángulo. Tenemos entonces para j

$$j - j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots, |j_1 - j_2| \quad (21.63)$$

Vemos que o bien los 3 números j, j_1, j_2 son enteros o bien dos de ellos son semienteros y el tercero entero. Notemos finalmente que puede verse que los coeficientes de Clebsh-Gordan pueden pensarse como los elementos de una matriz unitaria que, con una elección adecuada de fase del calculado por normalización, resulta ser real.

Clase 22

El efecto Aharonov-Bohm

Introducción

En el año 1959 Yakir Aharonov y David Bohm publicaron un artículo que cambió profundamente nuestra manera de pensar acerca del electromagnetismo en el contexto de la mecánica cuántica⁶⁷. La parte invariante de gauge del campo de gauge $A_\mu = (\phi, \vec{A})$ fue promovida a partir de ese trabajo al status de una cantidad física real, no de un cuadrivector conveniente para resumir cierta información del campo eléctrico y magnético. En palabras de Chen Ning Yang

“El tensor de campo electromagnético $F_{\mu\nu}$,

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (22.64)$$

*da una información incompleta del electromagnetismo, como lo demuestra el efecto Bohm-Aharonov...”*⁶⁸.

Yang se refiere a que el campo de gauge A_μ pasa a jugar, a nivel cuántico, un papel protagónico.

A fines del siglo 19 James Clerk Maxwell había cambiado la manera de pensar *la acción a distancia* identificando las componentes de $F_{\mu\nu}$,

⁶⁷Y. Aharonov and D. Bohm, Significance of electromagnetic potentials in quantum theory. Physical Review 115 (1959) 485.

⁶⁸C.N. Yang en Proceedings of the International Symposium on Foundation of Quantum Mechanics in the Light of New Technology, Tokyo, 1983 eds. S. Kamefuchi et al, Physical Society of Japan (1984), p 5.

que son lo que llamamos *campos de Maxwell* y anotamos como $\vec{E}$ y $\vec{B}$, como las entidades físicas fundamentales a partir de las cuales se derivan energía y momento y las leyes microscópicas de conservación. En la teoría de Maxwell los campos electromagnéticos no son apenas funciones matemáticas que solo resumen información, por ejemplo sobre el movimiento de cargas. Son las cantidades físicas básicas para describir cualquier fenómeno de la electrodinámica.

Hacia 1920, con las bases de la mecánica cuántica ya establecidas, Dirac dio el impulso para cuantificar los campos de la electrodinámica, teoría que tuvo una formulación acabada en la década de 1940. Lo que encontraron Aharonov y Bohm en 1959 es que en mecánica cuántica, cuando los campos de Maxwell actúan en regiones que son múltiplemente conexas⁶⁹, no contienen toda la información física necesaria para describir, por ejemplo, el movimiento de cargas.

En el marco de la mecánica cuántica es necesario que el potencial vector A_μ adquiera entidad física a través de lo que T.T. Wu y C.N. Yang llamaron en la década de 1970 *factor de fase* de una teoría de gauge⁷⁰,

$$W[C] = \exp \left(\frac{ie}{\hbar} \oint_C A_\mu dx^\mu \right) \quad (22.65)$$



donde C es una dada curva cerrada. Este factor de fase ya había jugado un papel central en la introducción de monopolos magnéticos en el electromagnetismo, en un famoso trabajo de Dirac de 1931⁷¹. La generalización al caso de teorías de gauge no-abelianas fue introducida por K. Wilson para estudiar el confinamiento de quarks⁷²

⁶⁹En topología, un espacio topológico se dice simplemente conexo si dos puntos cualesquiera puede ser conectados por caminos que pertenecen a ese espacio y todo camino cerrado puede ser deformado a un punto. Un ejemplo de ello es la superficie de una esfera (S^2). Espacios que son conectados por caminos que pertenecen a él pero que no son simplemente conexos se llaman múltiplemente conexos. Una esfera con una manija es múltiplemente conexa.

⁷⁰T.T. WU and C.N. Yang, Phys. Rev. D14 (1976) 437.

⁷¹P. A. M. Dirac, "Quantised Singularities in the Electromagnetic Field", Proceedings of the Royal Society (London) A133 (1931) 60.

⁷²K. Wilson, "Confinement of quarks". Physical Review D10 (1974) 2445.



En la figura de arriba cualquier camino cerrado puede deformarse a otro y también puede deformarse a un punto mientras que en la de abajo los dos caminos cerrados que se muestran no pueden deformarse uno en el otro y el rojo tampoco puede deformarse a un punto.

Existió una polémica sobre la atribución del nombre *Aharonov-Bohm* al efecto. Estuvo basada en el hecho de que previamente, Werner Eherenberg y Raymond Siday habían anticipado el efecto en 1949⁷³. Sin embargo, en su trabajo lo presentaban casi como una curiosidad sin ver el punto central del asunto ni hacer el cálculo completo que llevó a Aharonov y Bohm a predecir un fenómeno de interferencia entre electrones, interferencia que fue confirmada por los experimentos. Esta polémica puede ser dada por concluida si se recuerda un desafortunado fenómeno identificado por el matemático inglés Alfred North Whitehead en una presentación que hizo en 1916 a la famosa Asociación Británica por el Avance de la Ciencia:

“Todo aquello de importancia fue dicho antes por alguien que no lo descubrió”

El fenómeno

El efecto Aharonov-Bohm (AB) se refiere a un fenómeno que involucra partículas cargadas que pueden ser afectadas por campos electro-

⁷³W. Eherenberg and R. W. Siday, The Refractive Index in Electron Optics and the Principles of Dynamics, Proceedings of the Royal Society (London) B62 (1949) 8.

magnéticos que está presente en una región en la que las partículas están rigurosamente excluidas (es decir, no pueden pasar por ella).

La influencia de los campos electromagnéticos se manifiesta como un desfase de la función de onda que describe a las partículas cargadas que pasan en dos regiones distintas para impactar en un dado blanco. Los desfases son detectados en un experimento de interferencia entre haces de electrones, por ejemplo. Como vemos, se trata de un fenómeno de raíces puramente cuánticas cuya interpretación, a pesar de las dudas que originalmente despertó, quedó totalmente confirmada en experimentos realizados con anillos superconductores y con junturas Josephson⁷⁴.

A pesar del trabajo referido arriba, las discusiones que por muchos años hubo sobre el efecto AB y su eventual comprobación experimental fueron originadas por las dificultades para construir un dispositivo experimental con precisión suficiente en escala demasiado pequeña para la tecnología de las décadas de 1950-1970. Fue recién en 1986 que hubo unanimidad en la confirmación del fenómeno, a partir de una experiencia realizada por Akira Tonomura y su grupo (ver su trabajo de “review”⁷⁵ y las referencias en él).

Vamos a considerar aquí un dispositivo experimental utilizado por Tonomura y su grupo para el caso de partículas cargadas en presencia de un campo magnético (El fenómeno puede tener también lugar cuando las partículas están sometidas a un campo eléctrico). Mostramos el dispositivo en la figura 1.

El aparato consiste en una fuente de electrones, que produce un haz que se hace chocar contra una hoja de metal que por tener dos orificios que llamaremos B y C lo divide en dos trayectorias. Una de las trayectorias de los electrones está en la región la izquierda (ABD) en la figura y la otra en la derecha (ACD) de un solenoide que produce un campo magnético perpendicular al plano representado, pero evitándolo. Finalmente los haces se vuelven a encontrar en D , para incidir sobre la pantalla.

⁷⁴La primera confirmación fue hecha por R.G. Chambers, “Shift of an electron interference pattern by enclosed magnetic flux, Phys. Rev. Lett. 5, 3, (1960)”.

⁷⁵A. Tonomura, “Applications of electron holography, Review of Modern Physics 59 (1987) 639.




Figura 1: los dos haces de electrones que pasan a ambos lados del solenoide para reencontrarse en una pantalla.

Se trata de un experimento muy fácil de entender: separar un haz en dos partes de manera que puedan volver a encontrarse luego de recorrer sus caminos que encierran sin tocarlo, un campo magnético. Si el solenoide es de radio muy pequeño y las espiras por donde circula una corriente están muy apretadas, podemos pensar que el campo magnético producido por la corriente está confinado al interior del solenoide. Pero en estas condiciones **los caminos de los electrones corresponden a regiones donde el campo magnético es nulo.**

Debe notarse que si bien el campo magnético en los caminos de los dos haces es nulo, ello no quiere decir que el potencial $\vec{A}$ vector sea nulo. En efecto, un potencial vector de la forma

$$\vec{A} = \vec{\nabla} \Lambda(\vec{x}) \quad (22.66)$$

con $\Lambda(\vec{x})$ una función escalar, tiene un rotor nulo por lo que se tiene para el campo magnético

$$\vec{H} = \vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} \Lambda(\vec{x})) = 0 \quad (22.67)$$

Un campo vectorial como este se designa como “*gauge puro*”: no produce campo electromagnético alguno y puede ser eliminado por una

transformación de gauge $\Omega(\vec{x})$,

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}^\Omega = \vec{A} + \vec{\nabla}\Omega \quad (22.68)$$

basta elegir $\Omega = -\Lambda$ para que el transformado de gauge se anule.

Sin embargo, debemos recordar que el hamiltoniano de una partícula de carga q y masa m en un potencial vector $\vec{A}$ debe escribirse como

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 \quad (22.69)$$

Para el caso de un campo como el dado en (22.66) se tiene entonces

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{\nabla}\Lambda \right)^2 \quad (22.70)$$

Es fácil ver que la ecuación de Schrödinger

$$\hat{H}\psi = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (22.71)$$

tiene como solución

$$\Psi_\Lambda = \Psi_0 \exp \left(\frac{iq}{\hbar c} \Lambda(\vec{x}) \right) \quad (22.72)$$

con Ψ_0 una solución de partícula libre con $\vec{A} = 0$. Nótese que dada la forma de $\vec{A}$, podemos escribir en lugar de (22.72)

$$\Psi_\Lambda = \Psi_0 \exp \left(\frac{iq}{\hbar c} \int_{C_{x_0}^x} \vec{\nabla}\Lambda(\vec{x}') \cdot d\vec{x}' \right) = \Psi_0 \exp \left(\frac{iq}{\hbar c} \int_{C_{x_0}^x} \vec{A}(\vec{x}') \cdot d\vec{x}' \right) \quad (22.73)$$

con $C_{x_0}^x$ una curva que va de un punto arbitrariamente elegido $\vec{x}_0$ al punto $\vec{x}$.

Es fácil extender el resultado (22.73) al caso en que hay un campo magnético no trivial. Basta escribir

$$\Psi(x) = \Psi_0 \exp \left(\frac{i}{\hbar} S(x) \right) \quad (22.74)$$

donde la fase S en presencia del campo magnético $\vec{H}$ no trivial será simplemente

$$S(x) = \frac{q}{c} \int_{C_{x_0}^x} \vec{A} \cdot d\vec{x} \quad (22.75)$$

Sin embargo, en esta experiencia tenemos una región que no es simplemente conexa y por eso el cálculo del flujo magnético debe hacerse con cuidado. Que no lo sea se ve claramente en la figura 2




Figura 2

Tanto el camino azul C_{azul} como el rojo C_{rojo} empiezan y terminan en el mismo punto x_0 . Pero el rojo encierra la región con campo magnético y no puede deformarse hasta tomar la forma del camino azul de manera continua porque el campo magnético B actúa como una “estaca” clavada en el plano que impide ser atravesada sin “cortar el hilo” que correspondería a la curva. De hecho los flujos magnéticos Φ encerrados por cada curva son distintos:

$$\Phi[C_{rojo}] = \int_{SC_{rojo}} B dS = \Phi_0 \neq 0, \quad \Phi[C_{azul}] = 0 \quad (22.76)$$

Esto quiere decir que si utilizamos la fórmula (22.75) para calcular la función de onda en el punto x_0 nos dará un resultado trivial para el camino azul,

$$\Psi(x_0) = \Psi_0 \quad (22.77)$$

mientras que para el rojo resultará

$$\Psi(x_0) = \Psi_0 \exp\left(\frac{iq}{\hbar c} \Phi_0\right) \quad (22.78)$$

Solo si

$$\frac{q}{\hbar c} \Phi_0 = 2\pi n \quad (22.79)$$

las funciones de onda evaluadas en x_0 , obtenidas por cada uno de los caminos elegidos, coincidirán. Es decir que el flujo debe estar cuantificado en unidades de n ,

$$\Phi_0 = \frac{\hbar c}{q} 2\pi n \quad (22.80)$$

Notemos que este resultado es válido solo si el solenoide es infinitamente largo de manera que no pueda haber líneas de flujo en ningún camino como el azul. Con un solenoide de longitud finita irremediablemente las líneas de flujo de un extremo deben cerrarse en las del otro extremo (pues $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$) por lo que cualquier camino encerraría siempre el flujo de tales líneas.

Para comprender lo que pasa con un experimento como el de la figura 1 podemos pensar en una función de onda de la forma

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 \quad (22.81)$$

superposición de Ψ_1 , que representa el haz en un lado (digamos el de la izquierda de la figura) que recorre el camino que llamaremos $C1 \equiv ABD$ del solenoide y Ψ_2 el haz en el otro lado (el de la derecha) por el camino $C2 \equiv ACD$. Cada una de estas funciones está en una región simplemente conexa. Por lo tanto podemos escribir:

$$\Psi = \Psi_0^1(x, t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} S^1\right) + \Psi_0^2(x, t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} S^2\right) \quad (22.82)$$

La interferencia dependerá de la diferencia de fase según la fórmula

$$\begin{aligned} \Delta\delta &= \frac{(S^1 - S^2)}{\hbar} = \frac{q}{\hbar c} \int_{C1_{x_0}} \vec{A} \cdot d\vec{x} - \frac{q}{\hbar c} \int_{C2_{x_0}} \vec{A} \cdot d\vec{x} = -\frac{q}{\hbar c} \oint \vec{A} \cdot d\vec{x} \\ &= -\frac{q}{\hbar c} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \equiv -\Phi_0 \end{aligned} \quad (22.83)$$

La integral a la derecha en la primera línea se evalúa sobre una curva cerrada formada por la unión de $C1$ y $C2$ (tomando en este caso a $C2$ en sentido contrario al de $C1$). En la segunda línea se ha usado el teorema de Gauss-Stokes para escribir tal integral de línea como una integral de superficie que es proporcional al flujo de campo magnético que atraviesa la superficie encerrada por $C1 \cup C2$.

Este efecto se produce entonces a pesar de que no haya fuerzas magnéticas actuando sobre las regiones por donde pasan los electrones, es decir, regiones donde $\vec{H} = 0$. Como resultado, se observa que aún en estas condiciones, se produce una diferencia de fase entre los haces, que queda determinada sólo por el flujo magnético, que no es una cantidad local y como tal recoge contribuciones de regiones por donde los electrones no pasaron.

El resultado es sorprendente desde el punto de vista clásico del electromagnetismo de Maxwell ya que según él, los haces no interferirían. El fenómeno solo puede comprenderse en el marco de la mecánica cuántica donde las funciones de onda que describen a los electrones pueden desfasarse de manera medible. Como ya dijimos, la predicción de Aharonov-Bhom fue confirmada por Tonomura y colaboradores en 1986 [12].

El fenómeno de interferencia

El desfase entre los dos haces de electrones, que resulta por la existencia de un campo magnético en el interior de los caminos recorridos por cada uno, sin que esos caminos estén afectados por fuerza alguna tiene como manifestación experimental la aparición de una figura de interferencia sobre la pantalla, como sucedía en el caso de la experiencia de la doble rendija. En este último caso la diferencia de fase se producía porque existía una diferencia en la longitud de los caminos recorridos. En el caso del efecto Aharonov-Bohm ambos caminos tienen la misma longitud pero a la diferencia de fase $e\Phi_0/\hbar$ la produce el flujo del campo magnético Φ_0 .

En física clásica solo las fuerzas que actúan sobre los electrones podrían producir un efecto medible. Que hubiera un flujo o no en el espacio comprendido entre los caminos no cambiaría el resultado. Pero vimos que en el caso de la mecánica cuántica no es el concepto de fuerzas el que permite inferir si habrá un efecto físico o no.

Por lo anterior, solo los campos eléctricos y magnéticos locales podían afectar a los electrones. En este caso se trata de una cantidad que si bien tiene que ver con el campo magnético, es una cantidad no-local que afecta a los electrones por encerrar ese flujo entre sus dos caminos, no por ser afectados puntualmente por un campo magnético.

El análisis cuantitativo del fenómeno de interferencia fue hecho en el artículo original de Aharonov-Bohm [8]. Se basa en un análisis de dispersión de electrones por un campo magnético con un radio infinitesimal pero con un flujo magnético finito. Se parte de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en el plano, escrita en términos de coordenadas polares (r, φ) ,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial \varphi} - i \frac{e}{c} A_\varphi \right)^2 \right) \psi = E\psi \quad (22.84)$$

Como se trata de electrones, hemos puesto $q = e$.

Teniendo en cuenta que la circulación de $\vec{A}$ obedece la fórmula (22.83) podemos tomarlo en la forma

$$A_r = 0, \quad A_\varphi = \frac{e\Phi_0}{2\pi\hbar c} \equiv \alpha \quad (22.85)$$

Si suponemos que el solenoide tiene un radio $r \approx 0$, la solución de esta ecuación debe satisfacer la condición

$$\psi(0, \varphi) = 0 \quad (22.86)$$

Debemos resolver entonces un problema de dispersión como el de las barreras de potencial que hemos estudiado. Debemos obtener la expresión para la sección eficaz de dispersión σ en un problema típico de dispersión que se discutirá en el curso de mecánica cuántica 2. Pondremos aquí simplemente el resultado final

$$\sigma = \frac{\sin^2(\pi\alpha)}{2\pi} \frac{1}{\cos^2 \varphi/2} \quad (22.87)$$

Cuando $\alpha = n$ con n entero, σ se anula mientras que los máximos se producen cuando $\alpha = n + 1/2$. El resultado coincide perfectamente con los obtenidos en los experimentos.

El experimento definitivo

En 1986, Tonomura y sus colegas [12] fabricaron un ferromagneto toroidal de $6\mu\text{m}$ de diámetro (Figs. 3(a) y 3 (b)), y lo cubrieron con un material niobio superconductor tipo II para confinar totalmente el campo magnético dentro del toro (recordar que el campo magnético no puede penetrar al cuerpo del superconductor). Con el magneto mantenido a una temperatura de 5 K, midieron la diferencia de fase a partir de las líneas de interferencia producidos por el desfase entre un electrón que pasa a través del agujero del toro y otro que pasa por el exterior.


Debajo de una cierta temperatura crítica T_c los campos magnéticos no pueden atravesar un superconductor tipo II debido a un efecto conocido como “efecto Meissner”. Luego el campo del ferromagneto toroidal queda confinado al interior de la capa superconductora. El modelo BCS (acrónimo que hace referencia a sus promotores, Bardeen, Cooper y Schrieffer) establece que por debajo de T_c en un superconductor los electrones se acoplan de a pares (llamados pares de Cooper) y es la dinámica de esos pares la que produce un efecto sorprendente: el campo en el interior del superconductor solo puede tener la forma de filamentos

(vórtices) cuyo flujo está cuantificado según la fórmula

$$\oint A_\mu dx^\mu = (\hbar c) \frac{2\pi}{q} n = -(\hbar c) \frac{\pi}{e} n, \quad n \in Z \quad (22.88)$$

donde en la última igualdad hemos usado que los pares de Cooper tienen una carga eléctrica que es el doble de la del electrón, $q = -2e$.

En el experimento de Tonomura y colaboradores hay dos flujos magnéticos: el del ferromagneto colocado en el interior de la capa superconductora y el generado por la supercorriente producida por los pares de Cooper, que circula sobre la pared interna del superconductor que recubre el agujero del toro. En la figura siguiente se indica al flujo total en el agujero interno como ϕ_0 .



La figura anterior representa un corte transversal del toro (una “tajada da la rosquilla”). La onda representada representa a la función de onda de los pares de Cooper que forman una corriente superconductora que va moviéndose enrollando al toro. Por una consistencia a la de Broglie, para que la función de onda de los pares de Cooper sea monovaluada, la onda debe acomodarse como en la figura. La supercorriente produce un flujo magnético en la misma dirección que el del ferromagnético. El flujo magnético de la supercorriente deberá ajustarse de manera que el desfase de la onda dibujada, al dar la vuelta, sea $2n\pi$. Cuando esto sucede, en el caso de un par de Cooper que tiene carga $-2e$ el flujo magnético total, que llamamos ϕ_0 en la figura, debe ser $\phi_0 = -(\hbar c/2e)2n\pi = -(\hbar c/e)n\pi$.

Cuando un electrón pasa por fuera del toro y otro por dentro del agujero, las curvas que recorren encierran, sumarlas adecuadamente para formar un bucle, el flujo magnético ϕ_0 calculado arriba, $\phi_0 = -(\hbar c/e)n\pi$. Como los electrones tienen la mitad de carga que los pares de Cooper, el desfase para ellos será $n\pi$.

El resultado de la medida es el que se muestra en la figura 3a y corresponde al desfase producido en el caso en que $n = 1$. Las líneas de interferencia están desplazadas justo en un ancho $1/2$ dentro y fuera del toro indicando la existencia de un efecto AB




Figura 3: En el cuadro (a), se ve el anillo negro del magneto recubierto por el superconductor. En el orificio interior se ve como la línea de interferencia está desplazada respecto de las exteriores en una fracción de $1/2$. En los cuadros (b) y (c) se muestran detalles de la construcción del anillo.

El efecto en el caso eléctrico

Así como vimos que la fase de la función de onda depende del potencial vector en el caso del flujo magnético, también dependerá del potencia escalar $A_0 = \phi/c$ en el caso en que éste sea no nulo.

Para considerar un efecto Aharonov-Bohm en este último caso es necesario construir un aparato en que A_0 difiera por dos caminos posibles de partículas cargadas atravesando regiones en las que el campo eléctrico es nulo. Esta última condición descarta cualquier efecto medible a nivel clásico pero nuevamente el tratamiento cuántico dará resultados medibles.

Desde el punto de vista de la ecuación de Schrödinger la fase del electrón será calculable a partir de la ecuación

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \right)^2 + \frac{e}{c} A_o \quad (22.89)$$

y la ecuación (22.71) es resuelta entonces por

$$\Psi_\Lambda = \Psi_0 \exp \left(-\frac{i}{\hbar} Et \right) \exp \left(\frac{ie}{\hbar} \int^t A_0 dt' \right) \quad (22.90)$$

En el caso sencillo en que se trate de un potencial constante $A_0 = V/c$, su contribución se agrega a la de la energía E y se produce un desfase no trivial

$$\Delta\delta = -\frac{eVt}{\hbar} \quad (22.91)$$

La propuesta teórica inicial para medir este efecto fue la de un experimento en el que partículas cargadas pasaran a través de cilindros conductores siguiendo dos caminos. Los cilindros apantallarían el efecto de cualquier campo eléctrico externo pero producirían en la región de los caminos un potencial eléctrico no nulo producido por cargas puestas en la superficie. Este experimento resultó muy complicado y hubo entonces otra propuesta con geometría de anillo circular interrumpida por barreras en las que se produce efecto tunel de manera de que hubiera una diferencia de potencial en las dos mitades del anillo. Esta situación sí produjo un desfase Aharonov–Bohm medible que fue observado experimentalmente en 1998 [13].

Bibliography

- [1] M. Planck, Planck, “Über eine Verbesserung der Wienschen Spektralgleichung”. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2 (1900)202. (“On an Improvement of Wien’s Equation for the Spectrum”. The Old Quantum Theory)
- [2] P.A.M. Dirac, *The principles of Quantum Mechanics*, Oxford, 1930.
- [3] P.A.M. Dirac, Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion, **3** (1933) 64.
- [4] R.P. Feynman, Rev. Mod. Phys. **20** (1948) 367.
- [5] Claus Jönsson, “Interferencia de electrones por múltiples rendijas”, Zeitschrift für Physik **161** (1961) 454.
- [6] Akira Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki and H. Ezawa “ Demonstration of single-electron build-up of an interference pattern”, American Journal of Physics **57** (1989) 117
- [7] E. Nother, *Invariante Variationsprobleme*. Nachr. D. Knig. Gesellsch. D. Wiss. Zu Göttingen, Math-phys. Klasse **3** (1918) 235.
- [8] Y. Aharonov and D. Bohm, *Significance of electromagnetic potentials in quantum theory*. Physical Review 115 (1959) 485.
- [9] C.N.Yang en *Proceedings of the International Symposium on Foundation of Quantum Mechanics in the Light of New Technology, Tokyo, 1983* eds. S. Kamefuchi et al, Physical Society of Japan (1984), p 5.

- [10] P. A. M. Dirac, *Quantised Singularities in the Electromagnetic Field*. Proceedings of the Royal Society (London) **A133** (1931) 60.
- [11] W. Eherenberg and R. W. Siday, *The Refractive Index in Electron Optics and the Principles of Dynamics*, Proceedings of the Royal Society (London) **B62** (1949) 8.
- [12] A. Tonomura, *Applications of electron holography*, Review of Modern Physics **59** (1987) 639.
- [13] A. van Oudenaarden, M. Devoret, Yu. V. Nazarov and J. E. Mooij *Magneto-electric Aharonov-Bohm effect in metal rings*, Nature 391 (1998) 768.
- [14] Richard P. Feynman QED: The Strange Theory of Light and Matter. Princeton University Press. p. 129. 1985.