

Proyecto Final - Síndrome de Burnout

Mayrim Figueroa - Comisión 79905 · Agosto 2025

Índice

1. Introducción

La base de datos seleccionada contiene variables sociodemográficas y de hábitos (edad, género, horas de sueño, estado civil, cantidad de hijos, nivel educativo, entre otras) que permiten analizar diferencias en la prevalencia del síndrome de burnout. El interés central es evaluar si existen diferencias por género en la predisposición al burnout, considerando además efectos de edad y contexto.

2. Primera Pre-Entrega

- Selección del dataset de burnout y revisión exploratoria de sus campos.
- Definición del objetivo: comparar niveles por género y variables sociodemográficas.
- Alcance inicial y supuestos de calidad de datos.

3. Segunda Pre-Entrega

- Segmentación temporal 2019–2025 y por departamentos.
- Destinatarios: estratégico (Dirección), táctico (RRHH), operativo (mandos medios).
- Preguntas clave: evolución temporal, diferencias por género/edad, áreas críticas, relación con rotación.

4. Modelo de Datos

4.1 Tablas Power BI

Tabla: DimEmpleado (Power BI)

ID_Empleado (PK)	Nombre	Edad	Género	Estado_Civil	Hijos	Nivel_Educativo	Horas_Sueño
47	Empleado_047	50	Masculino	Casada/o	0	Universitario	6
50	Empleado_050	58	Masculino	Soltera/o	2	Postgrado	8
23	Empleado_023	56	Femenino	Soltera/o	2	Universitario	4
59	Empleado_059	41	Masculino	Soltera/o	1	Universitario	4
42	Empleado_042	32	Femenino	Casada/o	1	Universitario	5
99	Empleado_099	29	Femenino	Soltera/o	0	Técnico	4

Tabla 1. DimEmpleado (Power BI)

Tabla: DimDepartamento (Power BI)

ID_Departamento (PK)	Nombre_Departamento	Ubicacion
1	Ventas	Sede Norte
2	Marketing	Sede Centro
3	TI	Sede Centro
4	Operaciones	Sede Sur
5	RRHH	Sede Norte

Tabla 2. DimDepartamento (Power BI)

Tabla: Burnout_Laboral (Hechos)

ID_Burnout (PK)	ID_Empleado (FK)	ID_Puesto (FK)	ID_Departamento (FK)	Año	Nivel_Burnout	Días_Licencia	Rotación
502.0	2.0	4.0	1.0	2024.0	75.4	3.0	0.0
479.0	79.0	2.0	2.0	2023.0	60.4	4.0	0.0
373.0	73.0	4.0	1.0	2022.0	65.0	3.0	0.0
375.0	75.0	2.0	4.0	2022.0	67.2	2.0	0.0
337.0	37.0	4.0	3.0	2022.0	59.2	1.0	1.0
112.0	12.0	1.0	1.0	2020.0	50.7	5.0	0.0
455.0	55.0	3.0	3.0	2023.0	64.0	3.0	0.0
642.0	42.0	1.0	1.0	2025.0	54.5	3.0	0.0

Tabla 3. Burnout_Laboral (Hechos)

Tabla: Medidas (DAX)

Medida	Fórmula DAX
Prom_Burnout	AVERAGE('Burnout_Laboral'[Nivel_Burnout])
Tasa_Rotacion	DIVIDE(CALCULATE(DISTINCTCOUNT('Burnout_Laboral'[ID_Empleado]), 'Burnout_Laboral'[Rotación]=1), DISTINCTCOUNT('Burnout_Laboral'[ID_Empleado]))
Burnout_Año	CALCULATE([Prom_Burnout], VALUES('DimTiempo'[Año]))

Tabla 4. Medidas (DAX)

4.2 Diagrama Estrella




Figura 1. Diagrama del modelo estrella

5. Visualizaciones




Figura 2. Evolución temporal del burnout (2019-2025)




Figura 3. Burnout promedio por departamento




Figura 4. Burnout promedio por género




Figura 5. Burnout promedio por grupo etario




Figura 6. Burnout vs. Rotación

6. Proceso en Power BI / Power Query

- Limpieza y tipificación de datos en Power Query; eliminación de duplicados y tratamiento de nulos.
- Normalización: dimensiones (Empleado, Departamento, Tiempo) y tabla de hechos (Burnout_Laboral).
- Tabla Calendario 2019–2025 y relaciones 1:* desde dimensiones a hechos.
- Medidas DAX: Prom_Burnout, Tasa_Rotación, cortes por Año/Departamento.

7. Conclusiones

Se observan variaciones del burnout a lo largo del tiempo y entre áreas funcionales, con diferencias ligeras por género y grupos etarios. El modelo estrella facilita el análisis y la comunicación mediante visualizaciones consistentes, habilitando la toma de decisiones basada en datos.

8. Recomendaciones

- Monitoreo trimestral y alertas tempranas por área.
- Programas de bienestar y liderazgo saludable en áreas críticas.
- Educación en higiene del sueño y manejo del estrés.
- Evaluaciones periódicas de clima y carga de trabajo.

9. Limitaciones y futuras líneas de trabajo

El conjunto de datos utilizado es sintético y no cubre la totalidad de factores contextuales posibles (carga laboral, modalidad, tipo de contrato). Se propone ampliar variables, integrar fuentes cualitativas y construir series con mayor granularidad temporal.

10. Referencias Bibliográficas (APA)

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behaviour*.

World Health Organization. (2019). Burn-out an occupational phenomenon: International Classification of Diseases (ICD-11).

Microsoft. (s. f.). Power BI documentation. <https://learn.microsoft.com/power-bi/>

11. Anexo – Guía para replicar el tablero en Power BI Desktop

- 1) Importar tablas DimEmpleado, DimDepartamento, DimTiempo y Burnout_Laboral.
- 2) Crear relaciones 1:* desde claves primarias a foráneas (dirección de filtro simple).
- 3) Medidas DAX sugeridas:
 - Prom_Burnout = AVERAGE('Burnout_Laboral'[Nivel_Burnout])
 - Tasa_Rotación = DIVIDE(CALCULATE(DISTINCTCOUNT('Burnout_Laboral'[ID_Empleado]), 'Burnout_Laboral'[Rotación]=1), DISTINCTCOUNT('Burnout_Laboral'[ID_Empleado]))
- 4) Visuales: línea de tiempo (Año vs Prom_Burnout), barras por Departamento, barras por Género/Edad, comparativo Rotación.