

Diario degli Esperimenti TIDES

Filippo Di Ludovico

January 9, 2026

Contents

1	Introduzione	2
2	Experiment A: Baseline (Riferimento)	2
2.1	Configurazione	2
2.2	Risultati	2
2.2.1	1. Evoluzione Spaziale	3
2.2.2	2. Analisi della Varianza (Punto Anfidromico)	3
2.2.3	3. Diagramma di Hovmöller	4
3	Experiment B: Amplitude Sensitivity (Linearity Check)	5
3.1	Configurazione	5
3.2	Analisi dei Risultati	5
3.2.1	1. Verifica della Linearità	5
3.3	Conclusioni	7
4	Experiment C: Bathymetry Sensitivity (Pendenza Adriatica)	8
4.1	Configurazione	8
4.2	Analisi dei Risultati	8
4.2.1	1. Velocità di Fase	8
4.2.2	2. Diagramma di Hovmöller	9
4.2.3	3. Evoluzione Spaziale (Confronto A vs C)	10
5	Experiment D: Resolution Sensitivity	12
5.1	Configurazione	12
5.2	Analisi dei Risultati	12
5.2.1	1. Confronto Serie Temporali	12
5.2.2	2. Diagramma di Hovmöller	13
6	Esperimento E: Validazione Fisica ($f = 0$)	14
6.1	Obiettivo	14
6.2	Risultati	14

1 Introduzione

Questo documento raccoglie i risultati delle prove di sensibilità effettuate sul modello NEMO per il caso TIDES (propagazione Onda di Kelvin in Adriatico idealizzato). L'obiettivo è analizzare la risposta del modello variando parametri come l'ampiezza della perturbazione iniziale.

2 Experiment A: Baseline (Riferimento)

Obiettivo: Stabilire una simulazione stabile.

2.1 Configurazione

- **Dominio:** Bacino idealizzato rettangolare per approssimare l'Adriatico.
 - Estensione: Lon [17.75°E, 19.64°E], Lat [40°N, 49°N].
 - Dimensioni Griglia: 22×102 punti (x, y) .
 - Batimetria: Piatta costante $H = 100$ m.
 - Risoluzione Orizzontale: $\Delta x = 10$ km (`nn_GYRE = 1`).
 - Risoluzione Verticale: 31 livelli.
- **Perturbazione Iniziale:**
 - Tipo: Anomalia Gaussiana di SSH.
 - Ampiezza: $A_0 = 0.1$ m.
 - Posizione: Centrata a 19.0°E, 40.5°N (Angolo Sud-Est, analogo al Canale d'Otranto).
 - Dimensione: Raggio $\sigma = 20$ km.
- **Setup Numerico:**
 - Timestep: $\Delta t = 60$ s.
 - Durata: 24 ore.

2.2 Risultati

Simulazione stabile con timestep 60s.

2.2.1 1. Evoluzione Spaziale

La propagazione dell'onda di Kelvin è mostrata in Figura 1. L'onda viaggia in senso antiorario lungo i bordi del bacino.




Figure 1: Snapshots SSH per Experiment A (Baseline).

2.2.2 2. Analisi della Varianza (Punto Anfidromico)

La mappa della varianza (Figura 2) mostra dove l'oscillazione è massima (antinodi, agli angoli e ai bordi) e dove è minima (al centro). La regione centrale indica il potenziale punto anfidromico.




Figure 2: Mappa della Varianza SSH (Exp A). Il blu scuro al centro indica il nodo dell'onda stazionario.

2.2.3 3. Diagramma di Hovmöller

Il percorso di estrazione per il diagramma di Hovmöller scorre lungo la costa orientale, come mostrato in Figura 3 (sinistra). Il diagramma lungo la costa Est (Figura 3, destra) mostra una propagazione lineare senza distorsioni.




Figure 3: Sinistra: Percorso di estrazione (linea rossa). Destra: Diagramma di Hovmöller.

3 Experiment B: Amplitude Sensitivity (Linearity Check)

Obiettivo: Verificare la linearità della risposta del modello (SSH Input vs Output) e la dipendenza della velocità di fase dall'ampiezza.

3.1 Configurazione

Sono state eseguite tre run con perturbazione Gaussiana ($R = 20$ km) centrata a 19.0°E , 40.5°N :

- **AMP0.1:** $A_0 = 0.1$ m
- **AMP0.5:** $A_0 = 0.5$ m
- **AMP1.0:** $A_0 = 1.0$ m

3.2 Analisi dei Risultati

3.2.1 1. Verifica della Linearità

La Figura 4 mostra il confronto delle serie temporali di SSH registrate all'Estremità Nord del bacino, normalizzate per l'ampiezza iniziale A_0 . Si osserva che le curve normalizzate sono perfettamente sovrapposte. Questo indica che il modello risponde in modo lineare:

$$\frac{\text{SSH}(t)}{A_0} \approx \text{costante}$$

Non si osservano sfasamenti temporali, la velocità di fase $c = \sqrt{gh}$ non è influenzata dall'ampiezza in questo regime di profondità (100m).




Figure 4: Sinistra: Punto di estrazione (rossa). Destra: Confronto serie temporali normalizzate.

Per quantificare eventuali effetti non lineari e identificare il punto anfidromico, si mostrano le analisi spaziali nelle Figure 5 e 6.

La mappa di non-linearità (sinistra) mostra la varianza della differenza tra i campi normalizzati:

$$\text{Var} \left(\frac{\text{SSH}_{1.0}}{1.0} - \frac{\text{SSH}_{0.1}}{0.1} \right)$$

In un regime perfettamente lineare, questa differenza sarebbe zero ovunque. I valori osservati sono estremamente bassi (ordine 10^{-7} m^2), confermando che per ampiezze fino a 1m la dinamica è dominata dalla fisica lineare. Eventuali residui sono localizzati vicino alle coste.

La mappa a destra (Figura 6) mostra la varianza totale della SSH nel tempo.




Figure 5: Mappa Non-linearità (Residui)




Figure 6: Punto Anfidromico (Varianza SSH)

3.3 Conclusioni

Il sistema si comporta in modo **lineare** per perturbazioni fino a 1.0 m su fondale di 100 m. La velocità di propagazione è costante e indipendente dall'ampiezza in questo range.

4 Experiment C: Bathymetry Sensitivity (Pendenza Adriatica)

Obiettivo: Analizzare la propagazione dell'onda di Kelvin su un fondale inclinato, simile a quello reale dell'Adriatico (da 1000m a Sud a 30m a Nord).

4.1 Configurazione

- **Batimetria:** Pendenza lineare $H(y)$ lungo l'asse Nord-Sud.

$$H(y) = 1000 \text{m (Sud)} \rightarrow 100 \text{m (Nord)}$$

La visualizzazione del dominio è in Figura 7.

- **Perturbazione:** $A_0 = 0.1 \text{ m}$ centrata a Sud-Est.
- **Parametri Numerici:** A causa della maggiore profondità ($H = 1000 \text{m} \Rightarrow c \approx 100 \text{ m/s}$), il timestep è stato ridotto a $\Delta t = 20 \text{ s}$ (invece di 60 s) per soddisfare la condizione CFL. Durata totale mantenuta a 24h ($N_{steps} = 4320$).




Figure 7: Batimetria Esperimento C: Pendenza lineare lungo y .

4.2 Analisi dei Risultati

4.2.1 1. Velocità di Fase

L'effetto della profondità variabile è evidente nella **Velocità di Fase**, come visibile nel confronto delle serie temporali al punto Nord (Figura 8).




Figure 8: Confronto SSH a Nord. Esperimento C (Rosso) vs Baseline (Nero).

L’onda dell’Esperimento C (che ha viaggiato su fondali profondi fino a 1000m) arriva a destinazione molto prima (≈ 4 ore) rispetto alla Baseline (9 ore), confermando che la relazione $c = \sqrt{gH}$ è correttamente rappresentata dal modello.

4.2.2 2. Diagramma di Hovmöller

Nel diagramma spazio-tempo (Figura 9) viene sovrapposta la curva teorica del tempo di arrivo $t(y)$, calcolata integrando la velocità di fase locale (dipendente dalla profondità $H(y)$):

$$t(y) = \int_0^y \frac{dy'}{\sqrt{gH(y')}}$$

La pendenza della traccia numerica segue la curva teorica (linea tratteggiata), confermando che l’onda viaggia alla velocità corretta data dalla batimetria. La leggera curvatura indica la decelerazione progressiva mentre l’onda risale verso acque meno profonde.




Figure 9: Confronto Hovmöller: Exp A (Sinistra) vs Exp C (Destra).

4.2.3 3. Evoluzione Spaziale (Confronto A vs C)

Gli snapshots in Figura 10 (Exp C), confrontati con quelli della Baseline (Exp A), evidenziano differenze dinamiche fondamentali:

- **Velocità:** In Exp C l'onda viaggia molto più velocemente.
- **Confinamento Costiero:** In Exp A (100m) l'onda è confinata alla costa (Raggio di Rossby $R = \sqrt{gH}/f \approx 300 \text{ km}$). In Exp C, nelle zone profonde (1000m), R aumenta ($\approx 1000 \text{ km}$), superando la larghezza del bacino. Di conseguenza, l'onda perde il carattere di Kelvin "intrappolata" e assume un comportamento più dispersivo o di oscillazione dell'intero bacino.




Figure 10: Snapshots Esperimento C.

5 Experiment D: Resolution Sensitivity

Obiettivo: Verificare l'impatto della risoluzione spaziale sulla simulazione.

5.1 Configurazione

- **Risoluzione:** GYRE = 2 ($\Delta x \approx 5$ km). Risoluzione raddoppiata rispetto alla Baseline (10 km).
- **Timestep:** $\Delta t = 20$ s (ridotto per CFL).
- **Batimetria:** Piatta 100m (come Exp A).

5.2 Analisi dei Risultati

5.2.1 1. Confronto Serie Temporali

La Figura 11 mostra il confronto diretto dell'SSH all'Estremità Nord tra Exp A (10km) e Exp D (5km).

- L'ampiezza del picco è leggermente diversa, indicando che la risoluzione influenza la conservazione dell'energia.
- La fase è coerente, confermando che la velocità fisica dell'onda è ben risolta in entrambi i casi.




Figure 11: Confronto SSH all'Estremità Nord: Baseline (Nero, 10km) vs Alta Risoluzione (Rosso, 5km).

5.2.2 2. Diagramma di Hovmöller

Il diagramma spazio-tempo per il caso ad alta risoluzione (Figura 12) mostra dettagli più fini nella struttura dell'onda.




Figure 12: Diagramma di Hovmöller per Exp D (5km).

6 Esperimento E: Validazione Fisica ($f = 0$)

6.1 Obiettivo

Per confermare che l'onda osservata nell'Esperimento A sia effettivamente un'onda di Kelvin costiera, ho rimosso la rotazione terrestre imponendo il parametro di Coriolis $f = 0$. Senza la forza di Coriolis, il meccanismo di intrappolamento costiero viene meno.

6.2 Risultati

La Figura 13 mostra l'evoluzione dell'SSH. A differenza dell'Exp A, dove l'onda restava incollata alla costa destra, qui si osserva:

- **Propagazione Radiale:** La perturbazione si espande in tutte le direzioni come un'onda di gravità.
- **Decadimento:** L'energia si disperde nel bacino invece di canalizzarsi lungo la costa.

Questo conferma che il confinamento costiero osservato nella Baseline è dovuto esclusivamente alla rotazione terrestre (Onda di Kelvin).




Figure 13: Snapshots Exp E ($f = 0$).