

Лекция 07.02.22

Note 1

662fbc59ca984f5b820ad1041f1eb840

Пусть $f(x) : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$. Многочлен $p(x)$ степени n такой, что

$$\begin{aligned} f(x) &= p(x) + o((x-a)^n), \\ f(a) &= p(a), \end{aligned}$$

называется многочленом Тейлора функции f порядка n в точке a .

Note 2

738279ec323b45e29a170a4e41b4bce0

Если многочлен Тейлора функции f порядка n в точке a существует, то он единственен.

Note 3

8f605243b193465799ba06e1576d171e

В чём ключевая идея доказательства единственности многочлена Тейлора?

Пусть коэффициент r_m при $(x-a)^m$ — первый ненулевой коэффициент в многочлене $p - q$. Тогда

$$\frac{p - q}{(x - a)^m} \xrightarrow{x \rightarrow a} r_m,$$

но при этом

$$\frac{p - q}{(x - a)^m} = o((x - a)^{n-m}) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \implies r_m = 0.$$

Note 4

f4110a9b63c640be96d810d835d0d1fd

Многочлен Тейлора функции f порядка n в точке a обозначается $T_{a,n}f$.

Note 5

97c12315facb454e987cb94fae99be75

$$f(x)|_{x=a} \stackrel{\text{def}}{=} f(a).$$

Note 6

cf7e5ab30b564c139557fd0a940f8204

$$\left. \left((x-a)^k \right)^{(n)} \right|_{x=a} =_{\{\{c1::\}} \begin{cases} 0, & n \neq k, \\ n!, & n = k. \end{cases} \}}{}$$

Note 7

7597b782ce5f4e92998cc6445ce6f40e

« $\{\{c3::$ Свойство n раз дифференцируемой функции $\}\}$ »

Пусть $\{\{c2:: f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, n \in \mathbb{N} \text{ и}$

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0.$$

$\}\}$ Тогда $\{\{c1:: f(x) = o((x-a)^n), x \rightarrow a.\}$

Note 8

22aa07051d4c4e0ebb08ce0114be5429

«Определение o -малого в терминах ε, δ .»

$$f(x) = o(g(x)) \stackrel{\text{def}}{\iff} \{\{c1:: \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \cap \dot{V}_\delta \quad |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|.\}\}$$

Note 9

957fd9747bd84545bd6b1cca723d72ba

Пусть $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, n \in \mathbb{N}, \{\{c2:: f(a) = 0,$

$$f'(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a.$$

$\}\}$ Тогда $f(x) =_{\{\{c1:: o((x-a)^{n+1}), \quad x \rightarrow a.\}\}}$

Note 10

a6bfd750e8e142afadb6fb1ebdb5040d

Пусть $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, n \in \mathbb{N}, f(a) = 0,$

$$f'(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a.$$

Каков первый шаг в доказательстве того, что

$$f(x) = o((x-a)^{n+1}), \quad x \rightarrow a?$$

Расписать равенство $f'(x) = o((x-a)^n)$ по определению в терминах ε, δ . При этом δ выбирается так, что $\dot{V}_\delta \subset D$.

Note 11

cb1eee862a1a4d34821bc2a7808afa0e

Пусть $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, n \in \mathbb{N}, f(a) = 0$,

$$f'(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a.$$

В чем первая ключевая идея доказательства того, что

$$f(x) = o((x-a)^{n+1}), \quad x \rightarrow a?$$

По формуле конечных приращений

$$f(x) = f'(a + \theta(x-a)) \cdot (x-a), \quad \theta \in (0, 1).$$

Note 12

fe72b791cd844bf7909cbe33e50fd55d

Пусть $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, n \in \mathbb{N}, f(a) = 0$,

$$f'(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a.$$

В чем вторая ключевая идея доказательства того, что

$$f(x) = o((x-a)^{n+1}), \quad x \rightarrow a?$$

$$a + \theta(x-a) \in \dot{V}_\delta(a) \implies f'(a + \theta(x-a)) < \varepsilon |x-a|^n.$$

Note 13

b7ddf1bbcdf84c769dd7b409e5be494d

Какой метод используется в доказательстве свойства n -раз дифференцируемой функции?

Доказательство по индукции.

Note 14

f04179797fd64614827341d425616341

Какова основная идея в доказательстве свойства n -раз дифференцируемой функции (базовый случай)?

Из определения дифференцируемости следует, что

$$f(x) = o(x - a).$$

Note 15

f04179797fd64614827341d425616341

Какова основная идея в доказательстве свойства n -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

Из индукционного предположения $f'(x) = o((x - a)^n)$, но тогда $f(x) = o((x - a)^{n+1})$

Note 16

99a8f041e1a34dba923a682c6500c46b

«Формула Тейлора-Пеано»

Пусть $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$, $n \in \mathbb{N}$ и f n раз дифференцируема в точке a . Тогда

$$T_{a,n}f = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

}}