Эквивалентность и порядок

Note 1

f30a93a82ch7436dhf01a4f27h739d36

Каким одним требованием можно заменить симметричность и транзитивность в определении отношения эквивалентности?

Евклидовость.

Note 2

d8936dde76084fbfaa621700f57c7cd4

Пусть $R\subseteq A\times A$ — отношение эквивалентности. (кез:Множество классов эквивалентности R_0) называется (кез:фактормножеством множества A по отношению R_0)

Note 3

212c805b47c40c48f35bdbd5130db2l

Бинарное отношение $R\subseteq \{\{c3:A\times A\}\}$ называется $\{\{c2:Ha3:baeercs othoшeнием частичного порядка,}\}$ если $\{\{c1:ohopeфлексивно, антисимметрично и транзитивно.}\}$

Note 4

2a3a6e89d50d41068b22bfd1c595b39a

Отношение ((с2. частичного порядка) обычно обозначается символом ((с1. €.))

Note 5

90faa1ffef764c7d808d6757d97dfa4b

Множество A с (са: заданным на нём отношением частичного порядка) называется (са: частично упорядоченным множеством.)

Note 6

4157aa1725c244a58f3e32a92a0937bb

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество, $x,y\in A$. Говорят, что $\{(c):x\in Y \text{ и } y \text{ сравнимы}, (g) \text{ если } \{(c):x\leqslant y \text{ или } y\leqslant x.\}\}$

Note 7

e75ca87d267f4673a53c15a0e7adcccl

Бинарное отношение $R\subseteq \{\{e3:A\times A\}\}$ называется $\{e2:$ отношением линейного порядка, $\{e3:A\times A\}\}$ если $\{e3:A\times A\}$ отношение частичного порядка и любые $x,y\in A$ сравнимы.

Множество A с $\{c^2\}$ заданным на нём отношением линейного порядка $\{c^2\}$ называется $\{c^2\}$ линейно упорядоченным множеством.

Note 9

e914e0e523ee44139c021af45c63a712

Пусть (A, \leqslant) — частично упорядоченное множество, $x, y \in A$. Говорят, что $\{(can x < y, y) \in A\}$

Note 10

c264501d4458400e8b0073eac66b95fe

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество. Во избежание путаницы, отношение $\{(c): <\}\}$ называют отношением $\{(c): c$ трогого $\}$ порядка.

Note 11

ec44ba694d2541deaae260221aaafdc5

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество. Во избежание путаницы, отношение (a) называют отношением (a) нестрого(a) порядка.

Note 12

962a3744a3cc4153bd9317aab2cb46cb

Пусть (A, \leqslant) — частично упорядоченное множество. Мы читаем знак < как (A, \leqslant) — «меньше».

Note 13

850b05ff29334d869b6a9c7e96eef9a9

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество. Мы читаем знак \leqslant как $\{(c)\}$ «меньше или равно». $\{(c)\}$

Note 14

0e5d3d3ef97541309f99f132d7d20073

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество, $x,y\in A$. Тогда $\{(c^2,x\leqslant y)\}$ $\{(c^3,x)\in y\}$ $\{(c^3,x)\in y\}$ $\{(c^3,x)\in y\}$ или $\{(c^4,x)\in y\}$

Пусть (A, \leq) — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < рефлексивным?

Нет.

Note 16

fcc7c32a4ca7455dbcd3260a478ecd97

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < антирефлексивным?

Да.

Note 17

2d5bf110950f42b4bc343f143b82dfc8

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < транзитивным?

Да.

Note 18

378780d3b9d74367a71bdf0fb3f67e9f

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < асимметричным?

Да.

Note 19

f4e2e2fe9c8140a6b8fcda896dd5da35

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество, $x,y\in A$. Тогда если (казах $\leqslant y\leqslant x$,)) то (казах $\leqslant y$.)

Note 20

1ca369e310d2477782f82089ab512891

Пусть (A, \leqslant) — частично упорядоченное множество, $x, y \in A$. Тогда если $x \leqslant y \leqslant x$, то x = y. В чём ключевая идея доказательства?

Антисимметричность.

Note 21

0af7ee8e9a5c4ad88db6ea371bee9527

Пусть (A, \leqslant) — частично упорядоченное множество, $x, y \in A$. Почему не стоит читать $x \leqslant y$ как «x не больше y»?

 $\overline{x \geqslant y} \implies x \leqslant y$, если порядок не линеен.

Note 22

414d948920404634hec1fec01hd9h0h2

Бинарное отношение $R\subseteq \{\{c3:A\times A\}\}$ называется $\{\{c2:$ называется отношением предпорядка, $\{\}\}$ если $\{\{c1:$ оно рефлексивно и транзитивно. $\{\}\}$

Note 23

5a0d3dae2151442795c045fdb2e1ba7f

Пусть \leqslant — $\{\!\{\!\}\!\}$ предпорядок $\}\!\}$ на множестве A. Тогда \leqslant задаёт естественное $\{\!\{\!\}\!\}$ отношение частичного порядка $\}\!\}$ $\{\!\{\!\}\!\}$ на фактор множестве A по отношению

 $x \leqslant y$ u $y \leqslant x$.

}}

Note 24

ac3052b941bd4ae981f8d3559789c7e0

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество, (са: $B\subseteq A$.)) ((са: Частичный порядок $(\leqslant)\cap B^2$)) называется (са: частичным порядком на B, индуцированным из A.))

Note 25

01c0ah122f3d4940ah98f766e6h357c2

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество, $B\subseteq A$. «Са: Частичный порядок на B, индуцированный из A,» обозначается (СТ: \leqslant_B .)

Note 26

2a1949206b6843f8859d96feb5f3d640

Пусть (A,\leqslant) — частично упорядоченное множество, $B\subseteq A$. Если (селе линеен,)) то (селе \leqslant линеен.))

Пусть X и Y — два множества. Что есть множество X + Y?

Объединение непересекающихся копий X и Y.

Note 28

18350dfc5244bddb59d2f27a28a33ac

Пусть X и Y — два множества. Если X и Y пересекаются, то как они разделяются в X+Y?

 \blacksquare Элементы из Y записываются с чертой (как вариант).

Note 29

b9a67a4ebd2542d6b6cf86b0d4505d81

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. Как задаётся порядок на X+Y?

Внутри X и Y порядок обычный и $x \leqslant \overline{y}$.

Note 30

caa 0e 9e 0bd 594f 80aff 6ab 6d 1711059e

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. При каком условии порядок на X+Y будет линейным?

 \blacksquare Только если порядки на X и Y линейны.

Note 31

2f6406e74c4443c191caa1532527294f

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. Как определятся покоординатное сравнение на $X \times Y$?

 \blacksquare Первая координаты \leqslant_X и вторые \leqslant_Y .

Note 32

fec1ac2eb92d496e9677d8011742333e

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. В чём недостаток покоординатного сравнения на $X \times Y$?

Он не линеен.

Note 33

f80cf291316d430489b6ed3f5ea1f116

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. Как определятся порядок на $X \times Y$?

Аналогично лексикографическому порядку.

Note 34

a3950be00a93447ba48cc93e24fc143

Сколько различных линейных порядков на множестве из n элементов?

n!

Note 35

5dc17edbd7424921a6801b645ec91847

Всякий ли частичный порядок на конечном множестве можно продолжить до линейного?

Да.

Note 36

8ee88fb845d94611a7bad34e78b447b0

Всякий ли частичный порядок на бесконечном множестве можно продолжить до линейного?

Да.

Note 37

d5d18db2bf744c3f95cc4c390a2b63fa

Всякий частичный порядок на конечном множестве можно продолжить до линейного. В чём ключевая идея доказательства?

По индукции выбирать минимальный элемент.

Какой элемент частично упорядоченного множества называется наибольшим?

Тот, что больше любого другого элемента.

Note 39

1fbc4c3d075344fb8889b64fc11d73c

Какой элемент частично упорядоченного множества называется максимальным?

Тот, для которого не существует большего элемента.

Note 40

ba81375ada8245dc86f019d40cfc73b2

При каком условии понятия наибольшего и максимального элемента совпадают?

Если порядок линеен.

Note 41

df72779f7c5049dd82bb27f993c2a177

Сколько наибольших элементов может существовать у произвольного частично упорядоченного множества?

Не более одного.

Note 42

dd861e24b4c246bc9769d4d9d8c1684a

Сколько максимальных элементов может существовать у произвольного частично упорядоченного множества?

Сколь угодно.

Note 43

fe2b7f694c644bfbbab346e18477d765

Какой элемент частично упорядоченного множества называется наименьшим?

Тот, что меньше любого другого элемента.

Note 44

f42b3c3570904de282e2a8bfe96a337a

Какой элемент частично упорядоченного множества называется минимальным?

Тот, для которого не существует меньшего элемента.

Note 45

0d235255b51b40e2970c6f0c00ee671e

Любые два различных максимальных элемента ((c): не сравнимы.)

Note 46

e6a3453de9ae404f80ca583e6ea036c

Пусть X — частично упорядоченное множество и $\{(c) \in X\}$ конечно. $\|$ Для любого $x \in X$ найдётся максимальный элемент $\{(c) \in X\}$

Изоморфизмы

Note 1

110d1d04fa2246daa69b785b7fd393fe

Пусть A,B — частично упорядоченные множества, $f:A\to B$. Отображение f называется прядок упорадизмом, если прядок упорадитивно и сохраняет порядок.

Note 2

13d514bd40fc4478a6ed3a4ab34ff195

Пусть A,B — частично упорядоченные множества. Множества A и B называют ([с2: изоморфными,]) если ([с1: существует изоморфизм $f:A\to B$.])

Note 3

007687446bf044fb8b2643fb03f6dcd9

Все частично упорядоченные множества разбиваются на классы изоморфных, называемые порядковыми типами.

Note 4

b680b5e72c204aad8c291c056457dc4d

 $\{(c)\}$ Конечные линейно $\|$ упорядоченные множества $\{(c)\}$ из одинакового числа элементов $\|$ $\{(c)\}$ изоморфны. $\|$

Note 5

5083f28c1c664d26a48aba53a9beae8c

Конечные линейно упорядоченные множества из одинакового числа элементов изоморфны. В чём ключевая идея доказательства?

Построить изоморфизм в $\{1, 2, ..., n\}$, начиная с наименьшего элемента.

Note 6

7/3cdca62182/07686015562c7/cf65d

Вещественная последовательность называется (сезфинитной,)) если ((сывсе её члены, кроме конечного числа, равны 0.))

Множестве всех финитных последовательностей в $\{\!\{c4:\mathbb{Z}_+\}\!\}$ с $\{\!\{c3:3$ аданным на нём покомпонентным порядком $\{\!\}$ изоморфно $\{\!\{c2:\mathbb{N}\}\!\}$ с отношением $\{\!\{c1:\infty\}\!\}$ с отношением $\{\!\{c1:\infty\}\!\}$

Note 8

f5d322f891eb4f7797645163e5f45493

Как изоморфизм частично упорядоченных множеств действует на наибольший элемент?

Переводит его в наибольший элемент.

Note 9

2793f2d5da5d4b4397c20d874b1fc14e

Пусть A — частично упорядоченное множество. (с2::Изоморфизм $A \to A$) называется (с1::автоморфизмом A.)

Note 10

5995cccf4e2848eebf953a18d27ff7cf

Любой автоморфизм частично упорядоченного множества \mathbb{N}_{\parallel} порядоченного множества использовать поражением.

Note 11

9a1b8384b96b4c1b80082eaa74d708ad

Любой автоморфизм частично упорядоченного множества $\mathbb N$ является тождественным отображением. В чём ключевая идея доказательства?

По индукции f(n) = n.

Note 12

9ec39c6ae7d94216b153421659205a07

Пусть A-k-элементное множество и $\mathcal{P}(A)$ упорядоченно по включению. Тогда

$$|\operatorname{Aut}\mathcal{P}(A)|=\{\{\operatorname{clim}k!.\}\}$$

Пусть A-k-элементное множество и $\mathcal{P}(A)$ упорядоченно по включению. Тогда $|\operatorname{Aut}\mathcal{P}(A)|=k!$. В чём ключевая идея доказательства?

Автоморфизм определяется его действием на одноэлементных множествах.

Note 14

0c815486f4924485acded03c5bcfcbdd

Пусть $\mathbb N$ упорядоченно отношением «быть делителем». Тогда

$$|\mathrm{Aut}\,\mathbb{N}|=\{\{\mathrm{cl}::\mathfrak{c.}\}\}$$

Note 15

e9541105db840b299859a32c0f7ceb9

Пусть $\mathbb N$ упорядоченно отношением «быть делителем». Тогда $|\operatorname{Aut}\mathbb N|=\mathfrak c$. В чём ключевая идея доказательства?

Можно "перемешать" простые числа.

Note 16

c0d051d05a0b4228902a6d0ea3506209

Изоморфен ли $([0,1], \leq)$ множеству (\mathbb{R}, \leq) ?

Нет.

Note 17

6e4e63c5d18f46dd9e164c78f193c40e

Почему $([0,1],\leqslant)$ не изоморфен (\mathbb{R},\leqslant) ?

 \mathbb{R} В \mathbb{R} нет наибольшего элемента.

Note 18

9a8f1a6138c949ba91eee96998f166b7

Изоморфно ли (\mathbb{Z},\leqslant) множеству (\mathbb{Q},\leqslant) ?

Нет.

Note 19

87d5dfed83174bec88c290c54882ec3a

Почему (\mathbb{Z}, \leqslant) не изоморфно (\mathbb{Q}, \leqslant)?

 \mathbb{Q} плотно в \mathbb{R} .

Note 20

2b69523f72144db68161c333b4e5ec82

Изоморфны ли (\mathbb{Z},\leqslant) и $(\mathbb{Z}+\mathbb{Z},\leqslant)$?

Нет.

Note 21

23d161737e134362b37a92013b77c5d8

Почему (\mathbb{Z},\leqslant) и $(\mathbb{Z}+\mathbb{Z},\leqslant)$ не изоморфны?

Между 0 и $\overline{0}$ бесконечно много элементов, что невозможно в \mathbb{Z} .

Note 22

360028f6f71143e99dc483ac687c9383

Изоморфны ли (\mathbb{N},\leqslant) и (\mathbb{Z},\leqslant) ?

Нет.

Note 23

7a70e9e2377c4257b8efb486b7967d89

Почему (\mathbb{N},\leqslant) и (\mathbb{Z},\leqslant) не изоморфны?

В № есть наименьший элемент.

Note 24

697e50108ea547c3a372fb441f7d1448

Как можно визуально представить $(\mathbb{Z} \times \mathbb{N}, \leqslant)$?

Последовательность непересекающихся "столбцов"

$$\mathbb{Z} \times \{i\}$$
.

Как представить ($\mathbb{Z} \times \mathbb{N}, \leqslant$) в виде суммы?

 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z} + \mathbb{Z} + \dots$

Note 26

a67db9b47ea40bf95ec1d08c9e9c69

Изоморфны ли $(\mathbb{Z} \times \mathbb{N}, \leqslant)$ и $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \leqslant)$?

Нет.

Note 27

19a444a43c154a90be9f954bb3b05480

Почему ($\mathbb{Z} \times \mathbb{N}, \leqslant$) и ($\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \leqslant$) не изоморфны?

От обратного и каждому "столбцу" в $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ соответствует "столбец" в $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Note 28

8a9b0bca924d47f4b16ce8a629424644

Допустим, что f — изоморфизм ($\mathbb{Z} \times \mathbb{N}, \leqslant$) и ($\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \leqslant$). Как показать, что f сопоставляет "столбцу" в $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ "столбец" в $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Между элементами одного столбца есть лишь конечное число других элементов.

Note 29

00d9aff0d0a4aafa0d2cf77b58ef9e3

Изоморфны ли $(\mathbb{N} \times \mathbb{Z}, \leqslant)$ и $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \leqslant)$?

Нет.

Note 30

422d3d1f24854d10abc217203fc5af30

Почему $(\mathbb{N} \times \mathbb{Z}, \leqslant)$ и $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \leqslant)$ не изоморфны?

От обратного и любому "столбцу" в $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ соответствует "столбец" в $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Изоморфны ли ($\mathbb{Q} \times \mathbb{N}, \leqslant$) и ($\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}, \leqslant$)?

Да.

Note 32

b81b5778d5b84d9692f1a7e9b2a7213e

Почему $(\mathbb{Q} \times \mathbb{N}, \leqslant)$ и $(\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}, \leqslant)$ изоморфны?

Можно разделить $\mathbb{Q} \times \{0\}$ на интервалы с иррациональными границами.

Note 33

88a9f34456fe49d897d1266a579abb34

Изоморфны ли упорядоченные множества рациональных точек интервалов (0,1) и $(0,\sqrt{2})$?

Да.

Note 34

349e19c69cbf4e538962f2b5647c9ec8

Упорядоченные множества рациональных точек интервалов (0,1) и $(0,\sqrt{2})$ изоморфны. В чём ключевая идея доказательства?

Выбрать строго возрастающие последовательности, сходящиеся к 1 и к $\sqrt{2}$, и построить кусочно-линейную функцию.

Note 35

9935ca5d5b984b1d8a3abdb6a136e45e

Для каких упорядоченных множеств вводят понятие соседних элементов?

Для линейно упорядоченных.

Note 36

6c9efbfcd1f248499b3684e875f90187

Какие два элемента линейно упорядоченного множества называются соседними?

x < y и не существует элемента между ними.

Note 37

257d91e2bd644a394471f45f956b381

 ${\it {(с2:}}$ Линейно ${\it {(}}$ упорядоченное множество называется ${\it {(}}$ с2: ${\it {(}}$ плотным, ${\it {(}}$ если ${\it {(}}$ с1: ${\it {(}}$ в нём нет соседних элементов. ${\it {(}}$

Note 38

fbb41cd3433e4f518aad0470091368f8

««Любые» два «са счётных плотных линейно» упорядоченных множества «са без наибольшего и наименьшего элементов» «са изоморфны.»

Note 39

897a90582ea34029857e54219cdaae9b

Любые два счётных плотных линейно упорядоченных множества без наибольшего и наименьшего элементов изоморфны. В чём ключевая идея доказательства?

Построить изоморфизм по шагам.

Note 40

05c3a6d6aaf14ee2ace8ac0a6f341ed

Любые два счётных плотных линейно упорядоченных множества без наибольшего и наименьшего элементов изоморфны. Что строится на n-м шаге доказательства?

Два изоморфных n-элементных подмножества.

Note 41

81d3607a53a44a02adc761c77683cfcd

Любые два счётных плотных линейно упорядоченных множества без наибольшего и наименьшего элементов изоморфны. Как строятся изоморфные подмножества на 0-м шаге?

Два пустых множества.

Любые два счётных плотных линейно упорядоченных множества без наибольшего и наименьшего элементов изоморфны. Как строятся изоморфные подмножества на каждом следующем ((n+1)-m) шаге?

Выбирается «неохваченный» элемент из X и для его позиции выбирается элемент из Y.

Note 43

c20edaf43894fa6aad8ff406ff45512

Любые два счётных плотных линейно упорядоченных множества без наибольшего и наименьшего элементов изоморфны. Как в доказательстве гарантировать, что все элементы обоих множеств будут охвачены?

Пронумеровать и поочерёдно выбирать «неохваченный» элемент с наименьшим индексом.

Note 44

9046bf3a560244b1be2ff15bfb8fc1c5

Сколько существует неизоморфных счётных плотных линейных множеств?

Четыре.

Note 45

00ea7e2d37ed47ebba2ca53baf9f132c

Существует только 4 неизоморфных счётных плотных линейных множеств. В чём ключевая идея доказательства?

Изоморфность зависит только от наличия наибольших и наименьших элементов.

Note 46

388cf7317e604c62adeadeb29423837

 $\{(c4)$ Всякое $\}$ $\{(c3)$ счётное линейно $\}$ упорядоченное множество $\{(c2)$ изоморфно $\}$ $\{(c1)$ некоторому подмножеству $\mathbb{Q}.\}$

Всякое счётное линейно упорядоченное множество изоморфно некоторому подмножеству \mathbb{Q} . В чём ключевая идея доказательства?

По шагам «охватывать» элементы изоморфизмом.

Note 48

5071d1ba54de4db0955aa3bc403cbc54

Всякое счётное линейно упорядоченное множество изоморфно некоторому подмножеству \mathbb{Q} . Почему именно \mathbb{Q} ?

Можно было взять любое счётное плотное линейно упорядоченное множество без наибольшего и наименьшего элементов.