

# Лекция 07.02.22

## Note 1

662fbc59ca984f5b820ad1041f1eb840

Пусть  $f(x) : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Многочлен  $p(x)$  степени  $n$  такой, что

$$\begin{aligned} f(x) &= p(x) + o((x - a)^n), \\ f(a) &= p(a), \end{aligned}$$

называется **многочленом Тейлора функции  $f$  порядка  $n$  в точке  $a$** .

## Note 2

738279ec323b45e29a170a4e41b4bce0

Если многочлен Тейлора функции  $f$  порядка  $n$  в точке  $a$  существует, то он **единственен**.

## Note 3

8f605243b193465799ba06e1576d171e

В чём ключевая идея доказательства единственности многочлена Тейлора?

Младший ненулевой коэффициент при  $(x - a)^m$  в  $p - q$  равен нулю  $\implies \perp$ . (Доказательство от противного.)

## Note 4

91af14a03bea4b9fadee06859cbab64d

Пусть  $p$  и  $q$  — два многочлена Тейлора функции  $f$ , коэффициент  $r_m$  перед  $(x - a)^m$  — младший ненулевой коэффициент в  $p - q$ . Как показать, что  $r_m = 0$ ?

Рассмотреть многочлен

$$\frac{p(x) - q(x)}{(x - a)^m}.$$

## Note 5

f4110a9b63c640be96d810d835d0d1fd

Многочлен Тейлора функции  $f$  порядка  $n$  в точке  $a$  обозначается  $T_{a,n}f$ .

## Note 6

1b7244a616994615a1d41bbc85768a3f

«**Формула Тейлора для многочленов**»

Пусть  $p$  — многочлен степени не более  $n$ . Тогда

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{p^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

}}

## Note 7

97c12315facb454e987cb94fae99be75

$$f(x)|_{x=a} \stackrel{\text{def}}{=} f(a).$$

## Note 8

cf7e5ab30b564c139557fd0a940f8204

$$\left. \left( (x-a)^k \right)^{(n)} \right|_{x=a} = \begin{cases} 0, & n \neq k, \\ n!, & n = k. \end{cases}$$

## Note 9

9b6c61f4867142bea860ca4d00c07174

В чем основная идея доказательства истинности формулы Тейлора для многочленов?

Записать  $p(x)$  с неопределенными коэффициентами и вычислить  $p^{(k)}(a)$  для  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ .

## Note 10

7597b782ce5f4e92998cc6445ce6f40e

«**Свойство  $n$  раз дифференцируемой функции**»

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$  и

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0.$$

Тогда  $f(x) = o((x-a)^n), x \rightarrow a$ .

## Note 11

22aa07051d4c4e0ebb08ce0114be5429

«Определение  $o$ -малого в терминах  $\varepsilon, \delta$ .»

Пусть  $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a$  — предельная точка  $D$ . Тогда

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow a \stackrel{\text{def}}{\iff} \{\{c1:: \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \cap \dot{V}_\delta(a) \quad |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|.\}\}$$

## Note 12

b7ddf1bbcdf84c769dd7b409e5be494d

Какой метод используется в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции?

■ Индукция по  $n$ .

## Note 13

f04179797fd64614827341d425616341

Какова основная идея в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (базовый случай)?

■ Подставить  $f(a) = f'(a) = 0$  в определение дифференцируемости.

## Note 14

7a10e93958724ee6b93bc1637a13773f

Каков первый шаг в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■ Заметить, что из индукционного предположения

$$f'(x) = o((x - a)^n)$$

■ и расписать это равенство в терминах  $\varepsilon, \delta$ .

## Note 15

b863b13c8a8b45c09c6444b48e5c0b75

Какие ограничения накладываются на  $\delta$  в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■  $V_\delta(a) \cap D$  есть невырожденный промежуток.

## Note 16

2506d5781f234e13a94358880699831a

Почему в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход) мы можем сказать, что  $\exists \delta > 0$  такой, что  $V_\delta(a) \cap D$  есть невырожденный отрезок?

■ По определению дифференцируемости функции.

## Note 17

73ed2cd8b8b444ce991d587d9ed279ed

В чем ключевая идея доказательства свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■ Выразить  $f(x) = f'(c) \cdot (x-a)$  по симметричной формуле конечных приращений и показать, что  $|f'(c)| < \varepsilon |x-a|^n$ .

## Note 18

a08796d96ad841bd91a8e7daaab1857d

Откуда следует, что  $|f'(c)| < \varepsilon |x-a|^n$  в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■  $|c-a| < \delta \implies |f'(c)| < \varepsilon |c-a|^n < \varepsilon |x-a|^n$

## Note 19

957fd9747bd84545bd6b1cca723d72ba

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, n \in \mathbb{N}, \{c3: f(a) = 0, \}$   $\{c2:$

$$f'(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a.$$

$\}$

Тогда  $f(x) = \{c1: o((x-a)^{n+1}), \quad x \rightarrow a. \}$

«Формула Тейлора-Пеано»

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  и  $f$   $n$  раз дифференцируема в точке  $a$ . Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

}}

# Лекция 11.02.22

## Note 1

3bf65c72c3374838aeca626de8a3a4d

Каков первый шаг в доказательстве истинности формулы Тейлора-Пеано?

Обозначить через  $p(x)$  многочлен в формуле:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}_{p(x)} + o((x-a)^n).$$

## Note 2

6f41684761ec41308bf9f95619ec1849

Чему для  $k \leq n$  равна  $p^{(k)}(a)$  в доказательстве истинности формулы Тейлора-Пеано?

$$p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a).$$

## Note 3

72455c0671414c80aca4c9ef2ba63d44

В чем основная идея доказательства истинности формулы Тейлора-Пеано?

По свойству  $n$  раз дифференцируемой функции  $f(x) - p(x) = o((x-a)^n)$ .

## Note 4

db6e4a55afed4c5d95a38869cf9d2e00

Что позволяет применить свойство  $n$  раз дифференцируемой функции в доказательстве формулы Тейлора-Пеано?

$$\forall k \leq n \quad (f(x) - p(x))^{(k)} \Big|_{x=a} = 0$$

## Note 5

8c823210f5c94ab99024c3e8c3d6778a

$$\{\{c2::\Delta_{a,b}\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::\left\{\begin{array}{ll} [a,b], & a \leq b, \\ [b,a], & a \geq b. \end{array}\right.\}\}$$

## Note 6

9755fb6343494fa9b0034b4542e518d3

$$\{\{c2::\tilde{\Delta}_{a,b}\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::\left\{\begin{array}{ll} (a,b), & a < b, \\ (b,a), & a > b. \end{array}\right.\}\}$$

## Note 7

ddb25fcd6e834aa2ae54ec6ddc0c6787

$$\{\{c2::R_{a,n}f\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::f - T_{a,n}f\}\}$$

## Note 8

0d92b12a18f34554a0251578aa811b7f

« $\{\{c3::\text{Формула Тейлора-Лагранжа}\}\}$ »

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a, x \in \mathbb{R}, a \neq x$ ,  $\{\{c2::f \in C^n(\Delta_{a,x})\}\}$ ,  
 $f^{(n)}$  дифференцируема на  $\tilde{\Delta}_{a,x}$ . Тогда  $\{\{c1::\text{найдется } c \in \tilde{\Delta}_{a,x},$   
 для которой

$$f(x) = T_{a,n}f(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

$\}\}$

## Note 9

f9314b4b0e184f52826c8f740c873e21

При  $n = 0$  формула Тейлора-Лагранжа эквивалентна  $\{\{c1::$   
 теореме Лагранжа $\}\}$ .

## Note 10

5fe508cfd3c445c4b15093e8d2c8c504

В чем основная идея доказательства истинности формулы  
 Тейлора-Лагранжа?

**|** Вычислить производную функции  $F(t) = R_{t,n}f(x)$  и  
 далее по теореме Коши.

### Note 11

e1a329fbc3ef4c5981773d8baad7d3b1

Для каких  $t$  определяется функция  $F(t)$  в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$t \in \Delta_{a,x}.$$

### Note 12

a4f7e43161cc4c9fb58ac7a250610c50

Для каких  $t$  вычисляется  $F'(t)$  в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$t \in \tilde{\Delta}_{a,x}.$$

### Note 13

73e4df5e1b074010a95ee5dbe0458338

К каким функциям применяется теорема Коши в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$F(t) \text{ и } \varphi(t) = (x - t)^{n+1}.$$

### Note 14

b1d63dae062e4a438ceb891f94a33e96

К каким точкам применяется теорема Коши в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$\text{К границам отрезка } \Delta_{a,x}.$$

### Note 15

b8f3f99b66794d59b6fa546eb06d7fb3

Какое неявное условие позволяет применить теорему Коши к функциям  $F(t)$  и  $\varphi(t)$  с точках  $a$  и  $x$  в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$F(x) = 0, \quad \varphi(x) = 0.$$



## Note 16

e425a1ef13124799b6b391e3884f86f1

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\llbracket e^x \rrbracket = \llbracket \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \rrbracket$$

## Note 17

70a13102af174271b95762b24e6b1169

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\llbracket \sin x \rrbracket = \llbracket \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \rrbracket$$

## Note 18

9c528f645b0741ef90f268989f7701eb

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\llbracket \cos x \rrbracket = \llbracket \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \rrbracket$$

## Note 19

90ff22c33f67493fac3fa800e93905f4

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\llbracket \ln(1+x) \rrbracket = \llbracket \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \rrbracket$$

## Note 20

aaf8ef38d3bb409baf7c7fcc1df14f48

$\llbracket \text{Обобщённый биномиальный коэффициент} \rrbracket$  задаётся формулой

$$C_{\alpha}^k = \llbracket \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!} \rrbracket, \quad \alpha \in \llbracket \mathbb{R} \rrbracket.$$

## Note 21

5ed01e7f4e8e4b22adf1929f60e4d4f5

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{ \{c2:: (1+x)^\alpha \} \} = \{ \{c1:: \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n) \} \}$$

## Note 22

eb36b5f5a2b04e44b4d5b13d2278ff40

Формулу Тейлора-Пеано для  $(1+x)^\alpha$  называют  $\{ \{c1:: \text{биноми-}$   
альным разложением} \}.

## Note 23

c766c427b7e44be8a2e40e872ec7dd2b

$$C_{-1}^k = \{ \{c1:: (-1)^k \} \}$$

## Note 24

82717b22134b4f66b014c17df3ba337c

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{ \{c2:: (1+x)^{-1} \} \} = \{ \{c1:: \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n) \} \}$$

## Note 25

7d3d35d9fcb344458f0d82ed7b2d940f

Пусть  $\{ \{c3:: \text{функция } f \text{ удовлетворяет условиям для разложе-}$   
ния по формуле Тейлора-Лагранжа} \} Тогда если  $\{ \{c2::$

$$\forall t \in \tilde{\Delta}_{a,x} \quad |f^{(n+1)}(t)| \leq M,$$

$\} \text{ то } \{ \{c1::$

$$|R_{a,n}f(x)| \leq \frac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

$\}$

# Семинар 17.02.22

## Note 1

05fb49aabf444b3daf73947c33bf8f10

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1).$$

## Note 2

3eae90c7fe9944e6a9d07784205f0d1d

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$$

## Note 3

af533d11b4c2421baaad26c4fca61b2a

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C.$$

## Note 4

8939b90686dc43ae81c37c01fa728294

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$$

## Note 5

edb57ab590834e5db5946311b9910393

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$$

## Note 6

709b5fa5f404426ea7b67b17dc16f830

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

## Лекция 18.02.22

### Note 1

b55d92bf361d4e31b5e60975656b3fb4

Пусть  $\{c4:: f \in C\langle A, B \rangle \text{ и дифференцируема на } (A, B).\}$  Тогда

- $\{c2:: f \nearrow \text{ на } \langle A, B \rangle\} \{c3:: \iff \} \{c1:: f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (A, B).\}$

### Note 2

eb69e8bd92104c0ab3b235de95941521

Каков основной шаг в доказательстве критерия возрастания функции на промежутке (необходимость)?

Показать, что произвольное разностное отношение неотрицательно.

### Note 3

7d9850f850c2465aa217f34c4dbd1a66

Каков основной шаг в доказательстве критерия возрастания функции на промежутке (достаточность)?

Выразить для  $a < b$  разность  $f(b) - f(a)$  через формулу конечных приращений.

### Note 4

63e919dff3ba4ea282cb06d25b445300

Пусть  $\{c4:: f \in C\langle A, B \rangle \text{ и дифференцируема на } (A, B).\}$  Тогда

- $\{c2:: f \nearrow \text{ на } \langle A, B \rangle\} \{c3:: \iff \} \{c1:: f'(x) > 0 \quad \forall x \in (A, B).\}$

### Note 5

0e1b8bb37eca4c29af2ca084fcedc196

Каков основной шаг в доказательстве достаточного условия строгого возрастания функции на промежутке?

Выразить для  $a < b$  разность  $f(b) - f(a)$  через формулу конечных приращений.

## Note 6

2e3edf0757ba4f72bbdbb5b66dca690d

Пусть  $f \in C\langle A, B \rangle$  и дифференцируема на  $(A, B)$ . Тогда

- $f$  постоянна на  $\langle A, B \rangle$   $\iff f'(x) = 0 \quad \forall x \in (A, B)$ .

## Note 7

b036d705ddbe49b6814f53a6ad2b93f9

Каков основной шаг в доказательстве критерия постоянства функции на промежутке (достаточность)?

Выразить для произвольных  $a$  и  $b$  разность  $f(b) - f(a)$  через формулу конечных приращений.

## Note 8

2dfd421d331745a0a8b2da63493d1b4f

Пусть  $f, g \in C[A, B]$  и дифференцируемы на  $(A, B)$ . Тогда Если  $f(A) = g(A)$  и

$$f'(x) > g'(x) \quad \forall x \in (A, B),$$

то

$$f(x) > g(x) \quad \forall x \in (A, B).$$

}

## Note 9

e2c4b9fb4f4147a3bf25e2ab97a3e24f

Пусть  $f, g \in C[A, B]$  и дифференцируемы на  $(A, B)$ . Тогда если  $f(B) = g(B)$  и

$$f'(x) < g'(x) \quad \forall x \in (A, B),$$

то

$$f(x) > g(x) \quad \forall x \in (A, B).$$

}

## Note 10

0f2a5e13f0a2495388e631ac0b4776aa

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется точкой максимума функции  $f$ , если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) \leq f(a).$$

}

### Note 11

a89063cdc4a34df7aa891ad50a98d0a8

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется точкой строгого максимума функции  $f$ , если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) < f(a).$$

}}

### Note 12

0c2db077ea274453a5c14d982fe1c571

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется точкой минимума функции  $f$ , если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) \geq f(a).$$

}}

### Note 13

3bc6223309d34118a582302414c9632e

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется точкой строгого минимума функции  $f$ , если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) > f(a).$$

}}

### Note 14

a1e964e24fc6456ca0a297c008405c34

Если точка  $a$  является точкой минимума или максимума функции  $f$ , то  $a$  называется точкой экстремума  $f$ .

### Note 15

98f3cebff02ca464ab3cf9e94355caaa2

«Необходимое условие экстремума»

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}, a \in (A, B)$ ,  $f$  дифференцируема в точке  $a$ . Тогда если  $a$  является точкой экстремума  $f$ , то  $f'(a) = 0$ .

### Note 16

acfe3357868e41809070b12ea6034081

Каков основной шаг в доказательстве необходимого условия экстремума?

Применить теорему Ферма к сужению  $f$  на отрезок, включённый в окрестность  $V_\delta(a)$  из определения экстремума.

### Note 17

96502706cad4449ab9ac44074765a384

Точка  $a$  называется стационарной точкой функции  $f$ , если

$$f'(a) = 0.$$

}}

### Note 18

99ca6c71ff484416941c4e10086ca6ea

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда точка  $a \in (A, B)$  называется критической точкой, если либо  $a$  стационарна для  $f$ , либо  $f$  не дифференцируема в точке  $a$ .

### Note 19

40f1ebf761e14f5ba885b2276d64dae7

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда все точки экстремума  $f$ , принадлежащие  $(A, B)$ , лежат в множестве её критических точек.

### Note 20

e8adcc7d8b474840907e72b38014fcde

Пусть  $f \in C[a, b]$ . Тогда

$$\max_{f([a, b])} = \max \{f(a), f(b), \max_{f(C)}\},$$

где  $C$  — множество критических точек  $f$ .

### Note 21

909932c22cec4a5fb5d8cfb506e7dbfb

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f$  непрерывна в точке  $a$  и дифференцируема на  $\dot{V}_\delta(a)$ ,  $\delta > 0$ . Если

$$\operatorname{sgn} f'(x) = \operatorname{sgn}(a - x) \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a),$$

то  $a$  — точка строго максимума  $f$ .

## Note 22

1b1674e5941040ee87e83073a1a0d57b

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f$  непрерывна в точке  $a$  и дифференцируема на  $\dot{V}_\delta(a)$ ,  $\delta > 0$ . Если  $\{\{c1::$

$$\operatorname{sgn} f'(x) = \operatorname{sgn}(x - a) \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a),$$

$\}\}$  то  $\{\{c2::a — точка строго минимума  $f$ .$



# Лекция 21.02.22

## Note 1

4d119e495cf043019ed8ee01f9a7957a

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f''$  определена в точке  $a$ ,  $f'(a) = 0$ . Тогда если  $f''(a) > 0$ , то  $a$  — точка строгого минимума  $f$ .

## Note 2

f8b71055f7eb427f8226b47df9ed1e05

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f''$  определена в точке  $a$ ,  $f'(a) = 0$ . Тогда если  $f''(a) < 0$ , то  $a$  — точка строгого максимума  $f$ .

## Note 3

5e0ea19ce2b043c693e2cbe7752fcfa1

Каков первый шаг в доказательстве достаточного условия экстремума в терминах  $f''$ ?

Выразить  $f(x) - f(a)$  по формуле Тейлора-Пиано с

$$o((x - a)^2).$$

## Note 4

3124302c512c44bfac961f48e231e1cc

В чем основная идея доказательства достаточного условия экстремума в терминах  $f''$ ?

Вынести в формуле Тейлора-Пиано  $\frac{f''(a)}{2}(x - a)^2$  за скобки, далее по теореме о стабилизации функции.

## Note 5

bb068aa42bfe43deb084eaa739cd08c6

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0, \\ f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Тогда если  $n$  нечётно, то  $f$  не имеет экстремума в точке  $a$ .

## Note 6

b8ec49e2117443588a98b2e5c8cc032

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0, \\ f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Тогда если  $\{\{c2: n \text{ чётно},\} \{\{c1: то достаточное условие аналогично достаточному условию в терминах } f''.\}\}$

## Note 7

d2426d6723fd4c20966bd4397dce3eb3

« $\{\{c3: \text{Теорема Дарбу}\}\}$ »

Пусть  $\{\{c2: f \text{ дифференцируема на } \langle A, B \rangle, a, b \in \langle A, B \rangle,$

$$f'(a) < 0, \quad f'(b) > 0.$$

$\}\}$  Тогда  $\{\{c1: \exists c \in (a, b) \quad f'(c) = 0.\}\}$

## Note 8

43152412fd6f41e984fc4a4e96521633

В чем основная идея доказательства теоремы Дарбу?

По теореме Вейерштрасса существует точка минимума  $c$ , далее по теореме Ферма.

## Note 9

b0b7d5c649bf4839bdc1e90102df6405

Что позволяет применить теорему Ферма в доказательстве теоремы Дарбу?

$c$  — внутренняя точка отрезка  $[a, b]$ .

## Note 10

d480b573cf054a67a6bf5596881b0afb

Как в доказательстве теорему Дарбу показать, что  $c$  не лежит на границе  $[a, b]$ ?

Расписать  $f'(a)$  через правосторонний предел и показать, что  $a$  — не локальный минимум. Аналогично для  $b$ .

## Note 11

bc1402d472ba422ea18b051e2a0615c4

Пусть  $f$  дифференцируема на  $\langle A, B \rangle$ . Если

$$f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \langle A, B \rangle,$$

то  $f$  строго монотонна на  $\langle A, B \rangle$ .

## Note 12

e29cdd0f22c346cab64fe288db3fbd8

В чем основная идея доказательства следствия о монотонности функции с ненулевой производной?

Доказать от противного, что  $f'$  не меняет знак на  $\langle A, B \rangle$ .  
Далее по достаточному условию строгой монотонности.

## Note 13

9fc77ac828a342f885c48ee472c09734

**«Следствие из теоремы Дарбу  
о сохранении промежутка.»**

Пусть  $f$  дифференцируема на  $\langle A, B \rangle$ . Тогда  $f'(\langle A, B \rangle)$  — промежуток.

## Note 14

56d20a83493a46d1ac834fec9f4ebdef

В чем основная идея доказательства следствия из теоремы Дарбу о сохранении промежутка?

Показать, что для любых  $a, b \in \langle A, B \rangle$

$$[f'(a), f'(b)] \subset f'(\langle A, B \rangle).$$

## Note 15

0cd99b9f1fae4d1aadfac35788f440c6

Какое упрощение принимается (для определённости) для точек  $a, b \in \langle A, B \rangle$  в доказательстве следствия из теоремы Дарбу о сохранении промежутка?

$$f'(a) \leq f'(b).$$

## Note 16

9ee92cbcb63b46e78fe63b31bbf7f924

Как в доказательстве следствия из теоремы Дарбу о сохранении промежутка показать, что

$$\forall y \in (f'(a), f'(b)) \quad y \in f(\langle A, B \rangle)?$$

Применить теорему Дарбу к функции

$$F(x) = f(x) - y \cdot x$$

в точках  $a$  и  $b$ .

## Note 17

3c1144d31e264164b099479d41f9abc3

«**Следствие из теоремы Дарбу  
о скачках производной.**»

Пусть  $f$  дифференцируема на  $\langle A, B \rangle$ . Тогда функция  $f'$  не имеет скачков на  $\langle A, B \rangle$ .

## Note 18

f94b4bdf90b14fa0a4256a492cf742a5

В чем основная идея доказательства следствия из теоремы Дарбу о скачках производной?

Допустить противное и показать, что  $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$  — не промежуток.

## Note 19

933fb7290ce844da8f84c48835915d5c

Какие допущения принимаются (для определённости) в доказательстве следствия из теоремы Дарбу о скачках производной?

$f$  имеет скачок справа в точке  $a \in \langle A, B \rangle$  и

$$L := \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) < f'(a).$$

## Note 20

4fc5c84bb2b14241a99633260e7f76fc

Как выбирается  $\delta$  в доказательстве следствия из теоремы Дарбу о скачках производной?

Так, что для некоторого  $y \in (L, f'(a))$

$$f'(x) < y \quad \forall x \in (a, a + \delta).$$

## Note 21

027449ca442a449786b58ca872e4aff2

Функция  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  называется выпуклой на  $\langle A, B \rangle$ , если

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \langle A, B \rangle, \lambda \in (0, 1) \\ f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b). \end{aligned}$$

}}

## Note 22

0073407c9c4f473cb4759784548208bd

Функция  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  называется строго выпуклой на  $\langle A, B \rangle$ , если

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \langle A, B \rangle, \lambda \in (0, 1) \\ f(\lambda a + (1 - \lambda)b) < \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b). \end{aligned}$$

}}

## Note 23

a0e64a51b1ac405c9e5806d135c272da

«Критерий строгой выпуклости  $f$  на  $\langle A, B \rangle$ »

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда равносильны следующие утверждения.

- $f$  строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$ .
- $\forall a, b, c \in \langle A, B \rangle, a < c < b$  справедливо неравенство

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

}}

(из леммы о трёх хордах)

## Note 24

8969555424f24b2c8347358586f381e8

### «Лемма о трёх хордах»

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда следующие утверждения.

- $f$  строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$ .
- $\forall a, b, c \in \langle A, B \rangle, a < c < b$  справедливы неравенства

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

}}

## Note 25

c8e0bc0478654a5bbabdf38890b5f942

Каким образом доказываются критерий строгой выпуклости и лемма о трёх хордах?

Строится цепочка импликаций

$$(1) \implies (2) \implies (3) \implies (1).$$

- (1) — строгая выпуклость  $f$ ,
- (2) — неравенство из леммы о трёх хордах.
- (3) — неравенство из критерия выпуклости,

## Note 26

11c8d7341f374a2e8d7d5c8df97eaba8

В чём основная идея доказательства критерия строгой выпуклости из леммы о трёх хордах (достаточность)?

Положить  $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$  и отсюда выразить  $c - a$  и  $b - c$ .

В чем основная идея доказательства леммы о трёх хордах (необходимость)?

Положить в определении выпуклости

$$\lambda = \frac{b - c}{b - a}.$$

## Лекция 25.02.22

### Note 1

0abcc31a29c74496883c555de61b5af7

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \langle A, B \rangle$ ,

$$F(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Тогда если  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ , то

$$F \nearrow \text{ на } \langle A, B \rangle \setminus \{a\}.$$

}}

### Note 2

6658c8d28bde461584886f85aacf4977

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \langle A, B \rangle$ ,

$$F(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Тогда если  $f$  строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$ , то

$$F \nearrow \nearrow \text{ на } \langle A, B \rangle \setminus \{a\}.$$

}}

### Note 3

d547aa237c104089813102cd73487563

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \langle A, B \rangle$ ,  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ . Откуда следует возрастание функции  $F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ ?

■ Из леммы о трёх хордах.

### Note 4

0bb5876454d448878db0853372d90fe7

Пусть  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ ,  $a \in \langle A, B \rangle$ . Тогда

$$\exists f'_+(a) \in [-\infty, +\infty).$$

}}

### Note 5

960c7add5b8c4ab4b798301f26f12648

Пусть  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ ,  $a \in \langle A, B \rangle$ . Тогда

$$\exists f'_-(a) \in (-\infty, +\infty].$$

}}



## Note 6

1ea150313caa4817b9f27c00d5c8e6d8

Откуда следует существование односторонних производных у выпуклой функции?

Из теоремы о пределе монотонной функции для

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

## Note 7

2e664465fdc5410ca8b72059cfe627bc

Пусть  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ . Тогда  $f'_+(a)$  и  $f'_-(a)$  конечны и  $f'_-(a) \leq f'_+(a)$ .

## Note 8

82fe965871ac446facad207a4f246b18

Пусть  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ ,  $a \in (A, B)$ . Откуда следует, что  $f'_-(a) \leq f'_+(a)$ ?

Из теоремы о пределе монотонной функции.

## Note 9

eb64f07db3d3434197d40b0980a78e66

Если функция  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ , то она непрерывна на  $(A, B)$ .

## Note 10

9390116052df401f8413ffb225259a9d

Пусть  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ . Откуда следует, что она непрерывна на  $(A, B)$ ?

Из существования конечных односторонних производных  $f$  в любой точке  $(A, B)$ .

## Note 11

9f16939e7619449e9fe1d75a7aac2e87

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \langle A, B \rangle$ . Прямая  $y = g(x)$  называется опорной для функции в точке  $a$ , если она проходит через точку  $(a, f(a))$  и

$$f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in \langle A, B \rangle.$$

}}

## Note 12

7b835ae738654ba5a0921df5133181e7

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \langle A, B \rangle$ . Прямая  $y = g(x)$  называется строго опорной для функции в точке  $a$ , если она проходит через точку  $(a, f(a))$  и

$$f(x) > g(x) \quad \forall x \in \langle A, B \rangle \setminus \{a\}.$$

}}

## Note 13

fedf029d618e48ddabe81280b131b72b

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ ,  $a \in (A, B)$ , прямая  $\ell$  задаётся уравнением

$$y = f(a) + k(x - a).$$

Тогда прямая  $\ell$  является опорной для функции  $f$  в точке  $a$ , тогда и только тогда, когда  $k \in [f'_-(a), f'_+(a)]$ .

## Note 14

8ceccffa4cbe4c8d8330451f4f53876c

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$ ,  $a \in (A, B)$ , прямая  $\ell$  задаётся уравнением

$$y = f(a) + k(x - a).$$

Тогда прямая  $\ell$  является строго опорной для функции  $f$  в точке  $a$ , тогда и только тогда, когда  $k \in [f'_-(a), f'_+(a)]$ .

}}

## Note 15

1da04fcb23dc406eba98567735e9e6dc

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ ,  $a \in (A, B)$ . Как показать, что если прямая  $y = f(a) + k(x - a)$  является опорной для  $f$ , то  $k \in [f'_-(a), f'_+(a)]$ ?

В определении опорной прямой выразить  $f(x)$  через односторонние производные по определению дифференцируемости.

## Note 16

9ab922ea4b1f422c855c9dc14925580a

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$ ,  $a \in (A, B)$ . Как показать, что прямая  $y = f(a) + k(x - a)$  является опорной для  $f$ , если  $k \in [f'_-(a), f'_+(a)]$ ?

По теореме о пределе монотонной функции сравнить

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

с односторонними производными в точке  $a$ .

## Note 17

f8f5608de51344b89b749bf6fb673e89

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Если  $\{\{c2\}$  в каждой точке  $(A, B)$  функция  $f$  имеет опорную прямую, $\}$  то  $\{\{c1\}$  она выпукла на  $\langle A, B \rangle$ .  
 $\}$

(в терминах опорных прямых)

## Note 18

0a5cbb4429524954af423e27fe0c32bc

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Если  $\{\{c2\}$  в каждой точке  $(A, B)$  функция  $f$  имеет строго опорную прямую, $\}$  то  $\{\{c1\}$  она строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$ . $\}$

(в терминах опорных прямых)

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Если в каждой точке  $a \in (A, B)$  функция  $f$  имеет опорную прямую, то она выпукла на  $\langle A, B \rangle$ . В чем основная идея доказательства?

Выбрать  $x < a < y$  и показать для них выполнение неравенства критерия выпуклости из леммы о трёх хордах.

## Лекция 04.03.22

### Note 1

acc9492d0b4f4c4a8e6b1688ee26ed5e

В чем геометрический смысл  $T_{a,1}f(x)$ ?

График  $T_{a,1}f(x)$  — это касательная к функции  $f$  в точке  $a$ .

### Note 2

570272578ee74dd988ea80f9e95cbc6f

«Связь выпуклости функции с её касательными»

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  дифференцируема на  $\langle A, B \rangle$ .  
Тогда функция  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$  тогда и только тогда, когда

$$\forall a \in (A, B), \quad x \in \langle A, B \rangle \\ f(x) \geq T_{a,1}f(x).$$

}}

### Note 3

32700c2a93204435b3f66db20ea03bf7

«Связь выпуклости функции с её касательными»

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  дифференцируема на  $\langle A, B \rangle$ .  
Тогда функция  $f$  строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$  тогда и только тогда, когда

$$\forall a \in (A, B), x \in \langle A, B \rangle \setminus \{a\} \\ f(x) > T_{a,1}f(x).$$

}}

### Note 4

76ff105d143e49dea8fe8db2b74ee9ff

В чем основная идея доказательства теоремы о связи выпуклости функции с её касательными (необходимость)?

$f$  дифференцируема в любой точке  $\langle A, B \rangle \implies$  касательная совпадает с опорной прямой.

## Note 5

a71b501cf8434876a0ff83fdc763c8d3

В чем основная идея доказательства теоремы о связи выпуклости функции с её касательными (достаточность)?

Из условия  $f$  имеет опорную прямую в каждой точке  $(A, B)$ .

## Note 6

3b6d6467bd5144febe2b52fd934c971a

Пусть  $f : (A, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  имеет при  $x \rightarrow +\infty$  асимптоту  $y = kx + b$ . Тогда если  $f$  выпукла на  $(A, +\infty)$ , то

$$f(x) \geq kx + b \quad \forall x \in (A, +\infty).$$

}}

## Note 7

e766cccf8cdf4765b58203bef6244390

Пусть  $f : (A, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  имеет при  $x \rightarrow +\infty$  асимптоту  $y = kx + b$ . Тогда если  $f$  строго выпукла на  $(A, +\infty)$ , то

$$f(x) > kx + b \quad \forall x \in (A, +\infty).$$

}}

## Note 8

7046fd62e87e44c7a6dc18f4e94f7bd8

Пусть  $f : (A, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  имеет при  $x \rightarrow +\infty$  асимптоту  $y = kx + b$ . Тогда если  $f$  строго выпукла на  $(A, +\infty)$ , то

$$f(x) > kx + b \quad \forall x \in (A, +\infty).$$

В чем основная идея доказательства?

Показать, что  $f(x) - kx \searrow$ . Далее по теореме о пределе монотонной функции.

## Note 9

f0e5b2b8f6a74445a42cf0b35e854f39

Пусть  $f : (A, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  имеет при  $x \rightarrow +\infty$  асимптоту  $y = kx + b$  и  $f$  строго выпукла на  $(A, +\infty)$ . Как показать, что  $f(x) - kx \searrow$ ?

По теореме о пределе монотонной функции для

$$t \mapsto \frac{f(t) - f(x)}{t - x}.$$

## Note 10

94e7cdb6145142c3bb7cc8115035e5ad

«Связь выпуклости функции с  $f'$ »

Пусть  $f \in C\langle A, B \rangle$ ,  $f$  дифференцируема на  $(A, B)$ . Тогда  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$  тогда и только тогда, когда

$$f' \nearrow \text{ на } (A, B).$$

}}

## Note 11

cfdb1a58f41247169b530e3bc3f5b061

«Связь выпуклости функции с  $f'$ »

Пусть  $f \in C\langle A, B \rangle$ ,  $f$  дифференцируема на  $(A, B)$ . Тогда  $f$  строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$  тогда и только тогда, когда

}}

$$f' \nearrow \nearrow \text{ на } (A, B).$$

}}

## Note 12

8b55ad03aaca4dfcb1ec7ce171dee0ce

В чем основная идея доказательства теоремы о связи выпуклости функции с  $f'$  (необходимость)?

Для  $x < y$  сравнить значения  $f'(x)$ ,  $f'(y)$  с  $\frac{f(y) - f(x)}{y - x}$ .

## Note 13

b1782e215a3d4a948b9fbddfbaed55d3

В чем основная идея доказательства теоремы о связи выпуклости функции с  $f'$  (достаточность)?

По теореме Лагранжа выполняется неравенство критерия выпуклости из леммы о трёх хордах.

## Note 14

1db6c044058c49e68328ad272c648da8

### «Связь выпуклости функции с $f''$ »

Пусть  $f \in C\langle A, B \rangle$ ,  $f$  дважды дифференцируема на  $(A, B)$ .

Тогда  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$  тогда и только тогда, когда

||

$$f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in (A, B).$$

||

## Note 15

d78c1dfaebde4a2e89fdccfb43309163

### «Связь выпуклости функции с $f''$ »

Пусть  $f \in C\langle A, B \rangle$ ,  $f$  дважды дифференцируема на  $(A, B)$ .

Тогда  $f$  строго выпукла на  $\langle A, B \rangle$ , если ||

$$f''(x) > 0 \quad \forall x \in (A, B).$$

||

## Note 16

d912e4ab9b6a4459b2f104fabfc198f8

В чем основная идея доказательства теоремы о связи выпуклости функции с  $f''$ ?

■ Применить критерий возрастания функции к  $f'$ .

## Note 17

399c82ffb7094f2e8e4a74da8023fc60

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ . Точка  $a$  называется точкой перегиба функции  $f$ , если ||

- $\exists \delta > 0$  такое, что  $V_\delta(a) \subset (A, B)$  и  $f$  имеет разный характер выпуклости на  $(a - \delta, a]$  и  $[a, a + \delta)$ ;
- $f$  непрерывна в точке  $a$ ;
- $\exists f'(a) \in \overline{\mathbb{R}}$ .

||



## Note 18

9aa5847a39ac46c8ad8dbec41e14a904

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f$  дважды дифференцируема на  $a$ . Если  $\{\{c2::a \text{ является точкой перегиба } f,\}\}$  то  $\{\{c1:: f''(a) = 0,\}\}$

## Note 19

aca76c8bcbef4c38ad13dd619d48d19d

Является ли нулевая вторая производная достаточным условием перегиба?

■ Нет, это только необходимое условие.

## Note 20

c3615f4ec8d84748bde8c518c9e98375

Пусть  $\{\{c3:: f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}, a \in (A, B), f \text{ непрерывна в точке } a \text{ и имеет в ней производную из } \overline{\mathbb{R}}.\}\}$  Тогда если  $\{\{c1:: \exists \delta > 0 \text{ такое, что } f \text{ дважды дифференцируема на } \dot{V}_\delta(a) \text{ и}$

- либо  $\text{sgn } f''(x) = \text{sgn}(a - x) \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a),$
  - либо  $\text{sgn } f''(x) = \text{sgn}(x - a) \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a),$
- $\}\}$  то  $\{\{c2:: a \text{ — точка перегиба } f.\}\}$

## Семинар 03.03.22

### Note 1

655ebf6da8c1489f84fdaeca82dcc793

$$\int_{\{c2::\ln x\}} dx = \{c1::x \ln x - x\} + C$$

### Note 2

310668af95114f9f8e87673be333fec8

$$\int_{\{c2::\frac{1}{\sin x}\}} dx = \{c1::\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|\} + C$$

### Note 3

898276fe3ef943c49921748d594000c8

$$\int_{\{c2::\frac{1}{\cos x}\}} dx = \{c1::\ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right|\} + C$$

### Note 4

ce3022e62a4f4a6ea2d13195a9f94d31

$$\int_{\{c2::\frac{1}{x^2 + a^2}\}} dx = \{c1::\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}\} + C \quad (\{c3::a \neq 0\})$$

### Note 5

8661888336db411a89fed337ad926a76

$$\int_{\{c2::\frac{A}{x+a}\}} dx = \{c1::A \ln |x+a|\} + C$$

### Note 6

2cd6c699811f4760be34715a24b0081f

$$\int_{\{c2::\frac{1}{nx+a}\}} dx = \{c1::\frac{1}{n} \ln \left| x + \frac{a}{n} \right|\} + C \quad (\{c3::n \neq 0\})$$

### Note 7

b7b778e748574ee8b52225ae5669cbe6

$$\int_{\{c2::\frac{A}{(x+a)^k}\}} dx = \{c1::\frac{A}{(1-k)(x+a)^{k-1}}\} + C \quad (\{c3::k \neq 1\})$$

## Note 8

72b0aaea0b254078bbfcc47745885653

$$\int \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} dx = \frac{M}{2} \ln |x^2 + px + q| + \frac{2N - pM}{2a} \arctan \frac{2x + p}{2a} + C,$$

$$\text{где } a^2 := \frac{4q - p^2}{4}, \quad p^2 - 4q < 0.$$

## Note 9

c7fcc3d1ab9443d2855e310bfb0beec8

$$\int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^k} dx = \int \frac{N - M\frac{p}{2}}{(t^2 + a^2)^k} dt + \int \frac{Mt}{(t^2 + a^2)^k} dt + C,$$

$$\text{где } t := x + \frac{p}{2}, \quad a^2 := \frac{4q - p^2}{4}, \quad p^2 - 4q < 0.$$

## Note 10

a3d0cc7201b74c4c9fab9590e7a6c0b2

$$I_k =: \int \frac{1}{(t^2 + a^2)^k} dt \quad (k > 1, a \neq 0)$$

$$I_k = \frac{1}{2(k-1)a^2} \cdot \left( (2k-3)I_{k-1} + \frac{t}{(t^2 + a^2)^{k-1}} \right)$$

## Note 11

972b3ecb92a94f62b12e46795945593d

$$\int \frac{Mt}{(t^2 + a^2)^k} dt = \frac{M}{2(1-k)(t^2 + a^2)^{k-1}} + C$$

## Лекция 07.03.22

### Note 1

8d4e84ad6e1a4cdc91020e2f61878f24

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Функция  $F : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  называется первообразной функции  $f$ , если  $F$  дифференцируема на  $\langle A, B \rangle$  и

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \langle A, B \rangle.$$

## Note 2

5436ab9b46cf488eb5fa6c2353bd3616

Множество всех первообразных функции  $f$  на промежутке  $\langle A, B \rangle$  обозначается  $\mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle)$ .

### Note 3

ec64c5e7734140f888511699374deaec

Пусть  $\{\{c_4:: f, F, G : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}, F \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle).\}$  Тогда

$$\llbracket c2::G \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle) \rrbracket \llbracket c3:: \iff \rrbracket \llbracket c1:: \exists c \in \mathbb{R} \quad G(x) = F(x) + c. \rrbracket$$

### Note 4

e9bbf7b29a8d40b48aad130674b03cc9

Пусть  $f, F, G : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle)$ . Тогда

$$G \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle) \implies \exists c \in \mathbb{R} \quad G(x) = F(x) + c.$$

В чем основная идея доказательства?

■  $(F - G)' \equiv 0 \implies F - G = \text{const.}$

### Note 5

64bcacf18cb94a4e9b96e551eff15e5b

Пусть  $f, F, G : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle)$ . Тогда

$$G \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle) \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad G(x) = F(x) + c.$$

В чем основная идея доказательства?

Тривиально следует из определения первообразной.

## Note 6

b196b146568446a2b31a62a77bcd445

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle)$ . Множество функций

$$\{F(x) + c \mid c \in \mathbb{R}\}$$

называется неопределённым интегралом  $f$  на  $\langle A, B \rangle$ .

## Note 7

98516b869bc740b9bacfcc5244a89cb0

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Неопределённый интеграл функции  $f$  на  $\langle A, B \rangle$  обозначается

$$\int f(x) dx.$$

}}

## Note 8

7581f732c1c44de4bc99cae39e01f4ea

Корректна ли запись

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad ?$$

Строго говоря нет, поскольку формально интеграл является множеством, а не функцией, но такая запись удобна на практике.

## Note 9

ad021cd0f9bd4d9ca316d3574a3b67a4

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  и  $f$  имеет первообразную на  $\langle A, B \rangle$ .

$$\left( \int f(x) dx \right)' \stackrel{\text{def}}{=} f(x).$$

## Note 10

a2f17fea47484277b1a9d9349fba7ff

Пусть  $f, g : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle)$ ,  $G \in \mathcal{P}_g(\langle A, B \rangle)$ .

$$\int f(x) dx + \int g(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ F(x) + G(x) + C \mid C \in \mathbb{R} \right\}.$$

## Note 11

7d5f8b97d72747df93959cee3fb0bae9

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  и  $f$  имеет первообразную на  $\langle A, B \rangle$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\lambda \int f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=}_{\{\{c1::\}} \left\{ \lambda F(x) + C \mid C \in \mathbb{R} \right\}.$$

## Note 12

3fb6e723afb54981be16c06cf2bfb210

Из  $\{\{c3::\}$  теоремы Дарбу  $\}$  следует, что если  $\{\{c2::\}$   $f$  имеет первообразную на промежутке  $\langle A, B \rangle$ ,  $\}$  то  $\{\{c1::\}$   $f$  не имеет скачков на  $\langle A, B \rangle$ .

## Note 13

3c586c7317d247a3be4f7b50373a0d46

Является ли непрерывность функции  $f$  на промежутке необходимым условием для существования у неё первообразной?

Нет, поскольку  $f$  может иметь точки разрыва второго рода.

## Note 14

ca1243ec222b4440903a1f5a22a53b16

### «Достаточное условие существования первообразной»

$\{\{c1::\}$  Если  $f$  непрерывна на  $\langle A, B \rangle$ , то  $f$  имеет первообразную на  $\langle A, B \rangle$ .  $\}$

# Лекция 11.03.22

## Note 1

8d01db3371424aba95e1092ffa2cd4dc

Пусть  $f : E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Функция  $F : E \rightarrow \mathbb{R}$  называется первообразной  $f$  на множестве  $E$ , если  $F$  дифференцируема на  $E$  и  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in E$ .

## Note 2

a36222511f224d049fc0a1fc0c465aa5

Интеграл  $\int f(x) dx$  называется берущимся, если функция  $f$  имеет элементарную первообразную.

## Note 3

937d08196fed4fea9d424dfd802f1c82

Пусть  $f, g : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  имеют на  $\langle A, B \rangle$  первообразную. Тогда для любых  $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

## Note 4

2f7dd89b9a244dacbf41650571c4f13c

Как доказать свойство линейности неопределённого интеграла?

■ По определению интеграла и первообразной.

## Note 5

26b34c9a101f488aaed5dde4ddd43d2

**Теорема о замене переменной  
в неопределённом интеграле»**

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F \in \mathcal{P}_f(\langle A, B \rangle)$ ,  $\varphi : \langle C, D \rangle \rightarrow \langle A, B \rangle$  и  $\varphi$  дифференцируема на  $\langle C, D \rangle$ . Тогда

$$\int f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C.$$

}}

## Note 6

2f7dd89b9a244dacbf41650571c4f13c

Как доказать теорему о замене переменной в неопределённом интеграле?

■ По определению интеграла и первообразной.

## Note 7

cf45cd81236549efb89f81fcce13349f

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi : \langle C, D \rangle \rightarrow \langle A, B \rangle$  и  $\varphi$  дифференцируема на  $\langle A, B \rangle$  и обратима. Тогда если  $G$  — первообразная функции  $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$  то

$$\int f(x) dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

## Note 8

f1d541a0c135409c8aef89920ad254e8

«Формула интегрирования по частям»

Пусть  $f, g \in C^1\langle A, B \rangle$ . Тогда

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx.$$

}}

## Note 9

e2df459e1699495f980cddacc633f6f

В чем основная идея доказательства формулы интегрирования по частям для неопределённого интеграла?

$$(uv)' = u'v + uv' \implies uv = \int vu' dx + \int uv' dx.$$



## Лекция 18.03.22

### Note 1

ae4062806eca4ddd9b9f4afa5197e8e5

Любая рациональная функция имеет  $\{\{c1::\text{элементарную первообразную.}\}\}$

### Note 2

e8574dd4be844dd3a30f41aa822525cb

$$\{\{c2::[a : b]\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::[a, b] \cap \mathbb{Z}.\}\}$$

### Note 3

c4e15a9924f5453cbaa5673cf84f62f5

Пусть  $\{\{c3::[a, b] - \text{невыврожденный отрезок.}\}\}$  Набор точек

$$\{x_k\}_{k=0}^n : a = x_0 < \dots < x_n = b.$$

$\}} \text{ называется } \{\{c2::\text{разбиением отрезка } [a, b].\}\}$

### Note 4

e301682aa933430591e748e6973a1843

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок.  $\{\{c1::\text{Множество всех разбиений отрезка } [a, b]\}\}$  обозначается  $\{\{c2::T[a, b].\}\}$

### Note 5

6f5e8266e0b44eeebba980ac5d8c6112

Пусть  $\{x_k\}_{k=0}^n$  — некоторое разбиение отрезка  $[a, b]$ . Тогда

$$\{\{c2::\Delta x_k\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::x_{k+1} - x_k.\}\}$$

### Note 6

22701dee44544e9092fe48e0e077273a

Пусть  $\tau = \{x_k\}_{k=0}^n$  — некоторое разбиение отрезка  $[a, b]$ .  $\{\{c1::\text{Величина}$

$$\max \{\Delta x_k\}$$

$\}} \text{ называется } \{\{c2::\text{рангом разбиения } \tau.\}\}$

### Note 7

7c1e8de0a92a44b897b789c2e84da964

Пусть  $\tau = \{x_k\}_{k=0}^n$  — некоторое разбиение отрезка  $[a, b]$ .  $\{\{c2::\text{Ранг разбиения } \tau\}\}$  обозначается  $\{\{c1::\lambda_\tau.\}\}$

## Note 8

47c24c1487804ce88e30a8dfb2519b37

Пусть  $\tau = \{x_k\}_{k=0}^n$  — некоторое разбиение отрезка  $[a, b]$ .  $\{c1::$   
 Набор точек  $\{\xi_k\}_{k=0}^{n-1}$  таких, что  $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$  называется  
 $\{c2::$ оснащением разбиения  $\tau$ . $\}$

## Note 9

5e83015672844d94a0a89355f7af372e

Пусть  $\{c3::\tau$  — некоторое разбиение отрезка  $[a, b]$ ,  $\xi$  — оснаще-  
 ние разбиения  $\tau$ . $\}$  Тогда  $\{c1::$ пара  $(\tau, \xi)$  $\}$  называется  $\{c2::$ осна-  
 щённым разбиением отрезка  $[a, b]$ . $\}$

## Note 10

974eeb7d70c24d318e71abd3d9a95f3f

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок.  $\{c1::$ Множество всех  
 оснащённых разбиений отрезка  $[a, b]$  $\}$  обозначается  $\{c2::T'[a, b]$ .  
 $\}$

## Note 11

ef2c57fbd464435c9896c8e8f24db8b5

Пусть  $\{c3::f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, (\tau, \xi) = (\{x_k\}, \{\xi_k\})$  — оснащённое  
 разбиение  $[a, b]$ . $\}$   $\{c1::$ Сумма

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k$$

$\}$  называется  $\{c2::$ интегральной суммой функции  $f$ , отвечаю-  
 щей оснащённому разбиению  $(\tau, \xi)$ . $\}$

## Note 12

f4adab8132d7489fb5594271853a86c7

Интегральные суммы так же называют  $\{c1::$ суммами Римана.  
 $\}$

## Note 13

c14685fee7ff492d9e5452c059f94fb6

$\{c2::$ Интегральная сумма функции  $f$ , отвечающая оснащён-  
 ному разбиению  $(\tau, \xi)$ , $\}$  обозначается как  $\{c1::$

$$\sigma_{\tau}(f, \xi).$$

$\}$

## Note 14

f356a2fc28ae4487aae50ba5b3064cee

Пусть  $\{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$ . Число  $I \in \mathbb{R}$  называют пределом интегральных сумм функции  $f$  при ранге разбиения, стремящемся к нулю, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (\tau, \xi) : \lambda_\tau < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon,$$

где  $(\tau, \xi)$  — оснащённое разбиение отрезка  $[a, b]$ .

(определение в терминах  $(\varepsilon, \delta)$ )

## Note 15

ed766ec774814eba83502c9dd75a2e49

Предел интегральных сумм функции  $f$  при ранге разбиения, стремящемся к нулю, обозначается

$$\lim_{\lambda_\tau \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi) \quad \text{или} \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma.$$

}}

## Note 16

46f5a6ad385a4386813c6f707bd08927

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I \in \mathbb{R}$ . Число  $I$  называют пределом интегральных сумм функции  $f$  при ранге разбиения, стремящемся к нулю, если для любой последовательности оснащённых разбиений  $\{(\tau_j, \xi_j)\}_{j=1}^\infty$  такой, что  $\lambda_{\tau_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0$ ,

$$\sigma_{\tau_j}(f, \xi_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} I.$$

}}

(определение в терминах последовательностей)

# Семинар 17.03.22

## Note 1

e25a48aad5c048c3b2d3b7e2d9af0b98

Алгоритм взятия интеграла вида

$$\int \frac{Mx + N}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx.$$

Выделить полный квадрат под радикалом и почленно поделить числитель на знаменатель.

## Note 2

79c04c292b2a4aeb8fb583ccc7916c2a

Алгоритм взятия интеграла вида

$$\int (Mx + N)\sqrt{ax^2 + bx + c} dx.$$

Выделить полный квадрат под радикалом и раскрыть скобки.

## Note 3

30fa84062ed64fdabc405fa09e0c6148

Алгоритм взятия интеграла вида

$$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx, \quad \text{где } P_n \in \mathbb{R}[x]_n.$$

Представить ответ в виде

$$Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2 + bx + c} + \lambda \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx,$$

продифференцировать левую и правую часть равенства и найти неизвестные коэффициенты в  $Q_{n-1}(x)$  и  $\lambda$  из полученного соотношения.

## Note 4

15f51247a7d04b4fb445ea745f418ca4

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + px + q}} dx = \ln \left| x + \frac{p}{2} + \sqrt{x^2 + px + q} \right| + C.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{-x^2 + px + q}} \, dx = \arcsin \frac{2x - p}{2a} + C,$$

где  $a := \sqrt{\frac{4q+p^2}{4}}$ .

## Лекция 21.03.22

### Note 1

679c0a0615d44749bc685cda9a47b233

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  называется интегрируемой по Риману на  $[a, b]$ , если существует  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi)$ .

### Note 2

d6b62c8f08a842b2829447ab45a27e8c

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  интегрируема по Риману на  $[a, b]$ . Тогда

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi)$$

называется определённым интегралом Римана от функции  $f$  по отрезку  $[a, b]$ .

### Note 3

7dc12d32c0ce407f87be1d7c51d0b1b3

Интеграл Римана от функции  $f$  по отрезку  $[a, b]$  обозначается

$$\int_a^b f \quad \text{или} \quad \int_a^b f(x) dx.$$

}}

### Note 4

e5e082ef6db649858cc60a662cb312b1

В выражении

$$\int_a^b f$$

числа  $a, b$  называют пределами интегрирования.

### Note 5

44bd096f622b475f908006fcf8e88426

В выражении

$$\int_a^b f$$

функцию  $f$  называют подынтегральной функцией.

## Note 6

4e8ab8723a9e485abea045a4aa0c79f0

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок. Множество всех функций интегрируемых по Риману на  $[a, b]$  обозначается  $\mathcal{R}[a, b]$ .

## Note 7

1294b085870d432eae003c1159bbc60

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tau = \{x_k\}_{k=0}^n$  — разбиение отрезка  $[a, b]$ . Тогда сумма

$$\sum_{k=0}^{n-1} M_k \Delta x_k, \quad \text{где } M_k := \sup f([x_k, x_{k+1}]),$$

называется верхней интегральной суммой Дарбу, отвечающей разбиению  $\tau$ .

## Note 8

8807ccc652554a53aa9f97a7ee09ad99

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tau \in T[a, b]$ . Верхняя интегральная сумма Дарбу функции  $f$ , отвечающая разбиению  $\tau$ , обозначается

$$S_\tau(f).$$

}}

## Note 9

220907a5d6e248b78f987af0d058e64c

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tau = \{x_k\}_{k=0}^n$  — разбиение отрезка  $[a, b]$ . Тогда сумма

$$\sum_{k=0}^{n-1} m_k \Delta x_k, \quad \text{где } m_k := \inf f([x_k, x_{k+1}]),$$

называется нижней интегральной суммой Дарбу, отвечающей разбиению  $\tau$ .

## Note 10

2bbefff21b2c4c8fba866cd8eea6b02c

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \tau \in T[a, b]$ . Нижняя интегральная сумма Дарбу функции  $f$ , отвечающая разбиению  $\tau$ , обозначается

$$s_{\tau}(f).$$

}}

## Note 11

189f37e44f0a45048e5cb16973582e14

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \tau$  — разбиение  $[a, b]$ . Тогда  $f$  ограничена сверху, тогда и только тогда, когда сумма  $S_{\tau}(f)$  конечна.

## Note 12

083512018d304036a80002a9df45af7e

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \tau$  — разбиение  $[a, b]$ . Тогда  $f$  ограничена снизу, тогда и только тогда, когда сумма  $s_{\tau}(f)$  конечна.

## Note 13

1c8af1c02f864877bdd4971a256a30e

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \tau$  — разбиение  $[a, b]$ . Как  $S_{\tau}(f)$  выражается через суммы Римана?

|

$$S_{\tau}(f) = \sup \{ \sigma_{\tau}(f, \xi) \mid \forall \xi \}$$

## Note 14

7958d85410954f6280755a33f7bfff6b

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \tau$  — разбиение  $[a, b]$ . Как  $s_{\tau}(f)$  выражается через суммы Римана?

|

$$s_{\tau}(f) = \inf \{ \sigma_{\tau}(f, \xi) \mid \forall \xi \}$$

## Note 15

53ffcba153934fda879e5241f8e85387

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \tau$  — разбиение  $[a, b]$ . Как, в общих чертах, доказать, что  $S_{\tau}(f) = \sup \{ \sigma_{\tau}(f, \xi) \mid \forall \xi \}$ ?



Представить  $\{\sigma_\tau(f, \xi) \mid \forall \xi\}$  как сумму множеств

$$\Delta x_k \cdot f([x_k, x_{k+1}]).$$

## Note 16

453749996f00487b9b845f66318e9f7c

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tau, \tilde{\tau}$  — два разбиения  $[a, b]$ ,  $\tau \subset \tilde{\tau}$ .

Тогда

$$S_{\tilde{\tau}}(f) \leq S_{\tau}(f),$$

$$s_{\tilde{\tau}}(f) \geq s_{\tau}(f).$$

}}

## Лекция 25.03.22

### Note 1

a23a2495841f4894a31b489127b41054

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Как связаны  $s_{\tau_1}(f)$  и  $S_{\tau_2}(f)$  для произвольных разбиений  $\tau_1, \tau_2$  отрезка  $[a, b]$ ?

$$s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f)$$

### Note 2

84c295b304a64dd3a80a791f82958c91

Верно ли, что каждая нижняя сумма Дарбу функции  $f$  не превосходит каждой верхней суммы Дарбу этой же функции даже для разных разбиений отрезка?

Да.  $s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f)$  для любых  $\tau_1, \tau_2$

### Note 3

b7fac4e6a3324160adefc29c06d73479

Каждая нижняя сумма Дарбу не превосходит каждой верхней суммы Дарбу. В чем основная идея доказательства?

Для  $\tau_1 = \tau_2$  утверждение тривиально. В ином случае рассмотреть суммы Дарбу для разбиения  $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ .

### Note 4

be394bd9e8e2456284b7c108e7e973f8

Существует ли ограниченная на отрезке функция, неинтегрируемая на нём?

Да. Например, функция Дирихле.

### Note 5

3b28a2ca07d44ea38f8d2df0ce9f396f

Существует ли интегрируемая на отрезке функция, неограниченная на нём?

Нет. Любая интегрируемая на отрезке функция ограничена на нём.

## Note 6

c6120328fd3e40a48f6d7e69fce29c9d

Как показать, что любая интегрируемая на отрезке функция ограничена на нём?

Если допустить, что  $f$  не ограничена, то  $\forall \tau$  имеем  $S_\tau(f) = \sup \{\sigma_\tau(f, \xi)\} = +\infty$ , а значит

$$\nexists \lim_{\lambda_\tau \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi).$$

## Note 7

e5921a1f2caa4ed583198b136ce6b34c

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Величина

$$\inf \{S_\tau(f) \mid \forall \tau\}$$

называется верхним интегралом Дарбу функции  $f$ .

## Note 8

fcfb0f775cac40c9a18563576c086827

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Верхний интеграл Дарбу функции  $f$  обычно обозначается

## Note 9

304c0f4c87fe44cb922eeaf557997d02

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Величина

$$\sup \{s_\tau(f) \mid \forall \tau\}$$

называется нижним интегралом Дарбу функции  $f$ .

## Note 10

bd7f75d9e429454599a993144985b2dc

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Нижний интеграл Дарбу функции  $f$  обычно обозначается

## Note 11

83287fd934bc4878a99a742db1668220

«**Критерий интегрируемости функции**»

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  тогда и только тогда, когда

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \xrightarrow{\lambda_\tau \rightarrow 0} 0.$$

}}

## Note 12

68b782b8c09040dfa994ede932b748bc

$$\begin{aligned}
\{c2:: S_\tau(f) - s_\tau(f) \xrightarrow{\lambda_\tau \rightarrow 0} 0\} &\stackrel{\text{def}}{\iff} \\
&\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \tau : \lambda_\tau < \delta \\
&\{c1:: S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon. \}
\end{aligned}$$

(в терминах  $\varepsilon, \delta$ )

## Note 13

6a94745f7ac74cf7a5be1b0a6128e303

В чем ключевая идея доказательства критерия интегрируемости функции (необходимость)?

По определению  $\sup$  и  $\inf$

$$I - \varepsilon \leq s_\tau(f), \quad S_\tau(f) \leq I + \varepsilon.$$

## Note 14

53f49c34063149d892ad1eb1015abebd

В чем ключевая идея доказательства критерия интегрируемости функции (достаточность)?

$$\begin{aligned}
s_\tau(f) &\leq I_* \leq I^* \leq S_\tau(f), \\
s_\tau(f) &\leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f).
\end{aligned}$$

для любого оснащённого разбиения  $(\tau, \xi)$  отрезка  $[a, b]$ .

## Note 15

f200bb84909d45898f1313f053135d3a

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Как соотносятся  $I^*$ ,  $I_*$  и  $\int_a^b f$ ?

$$I_* = I^* = \int_a^b f.$$

## Note 16

1e7ec80a8e8f4caf87b70493394d837a

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Как для произвольного разбиения  $\tau$  соотносятся  $s_\tau(f)$ ,  $S_\tau(f)$  и  $\int_a^b f$ ?

$$s_\tau(f) \leq \int_a^b f \leq S_\tau(f).$$

## Note 17

c1ca9a97a9a948e685e22801cc7e1ee5

Если  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , то

$$\lim_{\lambda_\tau \rightarrow 0} S_\tau(f) = \left( \int_a^b f \right).$$

## Note 18

6a890ec9b5384ed2944133d968407712

Как показать, что

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \implies \lim_{\lambda_\tau \rightarrow 0} S_\tau(f) = \int_a^b f?$$

Тривиально следует из критерия интегрируемости и неравенства

$$s_\tau(f) \leq \int_a^b f \leq S_\tau(f).$$

## Note 19

1a704d6d276749bdaa56a88c05622b02

Если  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , то

$$\lim_{\lambda_\tau \rightarrow 0} s_\tau(f) = \left( \int_a^b f \right).$$

## Note 20

f274e2ec8d6648a383184e816782dedf

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Величина

$$\sup \left\{ f(x) - f(\hat{x}) \mid x, \hat{x} \in D \right\}$$

называется колебанием функции  $f$  на множестве  $D$ .

## Note 21

073304f993f94da7ab2f56d20b074752

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Колебание функции  $f$  на множестве  $D$  обозначается  $\omega(f)$ .

## Note 22

0a7ceb7d5f804209a506b41349ce11c9

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда

$$\omega(f) = \sup f(D) - \inf f(D)$$

(в терминах  $\sup f, \inf f$ )

## Note 23

ec97e108f2394602934c87c2f28f2a39

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tau = \{x_k\}_{k=0}^n$  — разбиение  $[a, b]$ . Тогда

$$\omega_k(f) \stackrel{\text{def}}{=} \omega(f|_{[x_k, x_{k+1}]})$$

## Note 24

649783b3a0c14571bdbbb8caba0d07a3

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tau = \{x_k\}_{k=0}^n$  — разбиение  $[a, b]$ . Тогда

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k(f) \Delta x_k$$

(в терминах  $\omega_k(f)$ )

## Note 25

82a86f84ecc44f89aac1396d471738d1

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда

$$\lim_{\lambda_\tau \rightarrow 0} S_\tau(f) = I^*$$

(в терминах предела при  $\lambda_\tau \rightarrow 0$ )

## Note 26

79915436f5b44d41a053bf8c0bf9e3ac

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда

$$\lim_{\lambda_\tau \rightarrow 0} s_\tau(f) = I_*$$

(в терминах предела при  $\lambda_\tau \rightarrow 0$ )

## Note 27

180307492ee647ac8b1bb30c91dcfb0d

**Критерий Дарбу интегрируемости функции**

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \iff f \text{ ограничена на } [a, b] \text{ и } I_* = I^*.$$

## Note 28

4fec9ca16c3d4d6a8ee9ac0f388eb31c

**Критерий Римана интегрируемости функции**

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \tau \quad S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

## Note 29

8ba2a0bdc9754111b4f3cac4493a895d

Существует ли непрерывная на отрезке функция, неинтегрируемая на этом отрезке?

Нет. Любая непрерывная на отрезке функция интегрируема на этом отрезке.

## Note 30

da9a4e99c01a42a4a8c5bccf8e3d24f7

Как, в общих чертах, доказать, что любая непрерывная на отрезке функция интегрируема на нём?

Из теоремы Кантора получить равномерную непрерывность и по теореме Вейерштрасса оценить для  $\lambda_\tau < \delta$  величину  $\omega_k(f)$ .

### Note 31

cb2eb65d72554cea90a47503d1d97474

Существует ли монотонная на отрезке функция, неинтегрируемая на этом отрезке?

Нет. Любая монотонная на отрезке функция интегрируема на этом отрезке.

### Note 32

7a4501cbb6414feaaaf12589452716ae3

Как, в общих чертах, доказать, что любая монотонная на отрезке функция интегрируема на этом отрезке?

Для определённости  $f \nearrow$ . Для произвольного  $\varepsilon$  взять

$$\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}.$$

Далее по критерию интегрируемости в терминах колебаний.



# Семинар 24.03.22

## Note 1

e2a6745c55e2452bb18cc67eb3b51eb9

Интегралы вида

$$\int \frac{Mx + N}{(x - \alpha)^k \sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

берутся с помощью замены

$$t := \frac{1}{x - \alpha}.$$

}}

## Note 2

76f25092a99044e7b985eeafa85ca9ca

Интегралы вида

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx,$$

где  $R$  — рациональная функция, берутся с помощью подстановок Эйлера.

## Note 3

f341e2ce094542f98b0a97abf09c7254

Каковы условия для применения каждой из подстановок Эйлера?

1.  $a > 0$ ;
2.  $c > 0$ ;
3.  $ax^2 + bx + c$  приводим над  $\mathbb{R}$ .

## Note 4

f0d585d86f5542a088764032d1d2eef8

Замена переменной в подстановке Эйлера для  $a > 0$ .

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x\sqrt{a} \pm t$$

### Note 5

3eb88f39c10241c1a11c805b799d8ae2

Замена переменной в подстановке Эйлера для  $c > 0$ .

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{c} \pm xt$$

### Note 6

9df1ed5f198d4793bc9ff466bc983224

Замена переменной в подстановке Эйлера для приводимого  $ax^2 + bx + c$ .

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm t(x - x_1),$$

где  $x_1$  — корень  $ax^2 + bx + c$ .

### Note 7

5defd336f3aa4b4aa26b239431f04d17

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

$$(a > 0)$$

### Note 8

c6f5af39f62e4d7f9a4cee9e0c45d107

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

$$(a > 0)$$

### Note 9

56abb403ab43437da9bf41b7ca9d15e8

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$(a > 0).$$

$$\int \sqrt{\{c1:a^2 - x^2\}} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{\{c1:a^2 - x^2\}} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$(a > 0).$

# Лекция 01.04.22

## Note 1

60ff32d5ed7347ae8036518373a5bc61

Пусть  $\{\{c3:: f, \tilde{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \in \mathcal{R}[a, b],\}\}$   $\{\{c4:: T \subset [a, b], |T| < \aleph_0.\}$

$\}} \text{ Если } \{\{c1::$

$$\forall x \in [a, b] \setminus T \quad f(x) = \tilde{f}(x),$$

$\}} \text{ то } \{\{c2:: \tilde{f} \in \mathcal{R}[a, b] \text{ и } \int_a^b f = \int_a^b \tilde{f}.\}\}$

## Note 2

9f281cfda3464766a189207f5029d7ed

В чем ключевая идея доказательства того, что изменение значений функции  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  в конечном числе точек не влияет на интегрируемость?

$$\sigma(f) - \sigma(\tilde{f}) \xrightarrow{\lambda_\tau \rightarrow 0} 0.$$

## Note 3

94c3dcad5bc247568a21704cb1d05f72

Пусть  $\{\{c2:: f \in \mathcal{R}[a, b], [\alpha, \beta] \subset [a, b].\}\}$  Тогда  $\{\{c1::$

$$f|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}[\alpha, \beta].$$

$\}} \text{ }$

## Note 4

385f602d08114dd39630009f76dbb7e0

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ . Тогда  $f|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$ .

В чем ключевая идея доказательства?

Если  $\tau_0 \in T[\alpha, \beta]$ ,  $\tau \in T[a, b]$ ,  $\tau_0 \subset \tau$ , то

$$S_{\tau_0} - s_{\tau_0} \leq S_\tau - s_\tau.$$

## Note 5

ee426e669ae545b8ad6d128a5870373e

Пусть  $\{\{c3:: f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, c \in (a, b).\}\}$  Тогда если  $\{\{c1::$

$$f|_{[a, c]} \in \mathcal{R}[a, c] \quad \wedge \quad f|_{[c, b]} \in \mathcal{R}[c, b],$$

$\}} \text{ то } \{\{c2:: f \in \mathcal{R}[a, b].\}\}$

## Note 6

c8c134e6d7c442c3a7214585d20c41ac

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $c \in (a, b)$ . Тогда если

$$f|_{[a,c]} \in \mathcal{R}[a, c] \quad \wedge \quad f|_{[c,b]} \in \mathcal{R}[c, b],$$

то  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .

В чем ключевая идея доказательства?

$$\begin{aligned}
S_\tau - s_\tau &\leq S_{\tau_1} - s_{\tau_1} + S_{\tau_2} - s_{\tau_2} + \omega(f) \cdot \lambda_\tau, \\
\tau &\in T[a, b], \quad \tau' = \tau \cup \{c\}, \\
\tau_1 &= \tau' \cap [a, c], \quad \tau_2 = \tau' \cap [c, b].
\end{aligned}$$

## Note 7

ccba27d6a29c468f8a60fbd0f106fec4

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Функция  $f$  называется кусочно непрерывной, если множество её точек разрыва пусто или конечно, и все её разрывы суть разрывы первого рода.

## Note 8

86f712cafa53498fa3b282915340635c

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Если  $f$  кусочно непрерывна на  $[a, b]$ , то  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .

## Note 9

78e23f5a381e4d01b4c4467b16955dcb

Как показать, что кусочно непрерывная функция  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  интегрируема на  $[a, b]$ ?

Показать, что она интегрируема на каждом из непрерывных «кусков».

## Note 10

682bfc21e35a489ebc7df5514e1d4690

Пусть  $E \subset \mathbb{R}$ . Говорят, что  $E$  имеет нулевую меру, если для любого  $\varepsilon > 0$  множество  $E$  можно заключить в не более чем счётное объединение интервалов, суммарная длина которых меньше  $\varepsilon$ .

## Note 11

3be97c537ee44236bfc5f8bae48390e3

«**Критерий Лебега интегрируемости функции**»

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  тогда и только тогда, когда  $f$  ограничена на  $[a, b]$  и множество точек разрыва  $f$  имеет нулевую меру.

## Note 12

1b3f6df593ba44b6b9558ec83720dd7e

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b], \alpha \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$f + g, fg, \alpha f, |f| \in \mathcal{R}[a, b].$$

## Note 13

275d09f8b4c9445992ecc4f02cd9f6ba

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\inf_{x \in [a, b]} |g(x)| > 0 \implies \frac{f}{g} \in \mathcal{R}[a, b].$$

## Note 14

20347e63d70945cdbe073a675dbcb23a

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда  $f + g \in \mathcal{R}[a, b]$ .

В чем основная идея доказательства?

Тривиально следует из определения предела интегральных сумм в терминах последовательностей.

## Note 15

909d22f843c9421598278c307e29edb5

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда  $fg \in \mathcal{R}[a, b]$ .

В чем основная идея доказательства?

Дать верхнюю оценку для  $\omega_k(f \cdot g)$  через  $\omega_k(f), \omega_k(g)$  и верхние границы  $f$  и  $g$ .

### Note 16

aad31d4599b94b8f8ee128bfbfec8251

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Тогда  $\alpha f \in \mathcal{R}[a, b]$ .

В чем основная идея доказательства?

■ Частный случай произведения двух функций.

### Note 17

76538508e5574126a26e4dbf06fe4160

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда  $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$ .

В чем основная идея доказательства?

■  $|f| = f \cdot \operatorname{sgn} f \in \mathcal{R}[a, b].$

### Note 18

dea0bdf999ae4306b554167c63eeb231

Как показать, что  $\operatorname{sgn}$  интегрируем?

■ Показать, что  $\operatorname{sgn}$  кусочно непрерывен.

### Note 19

6bb4953a2e6d41fb86cf8a801779a97f

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\inf_{x \in [a, b]} |g(x)| > 0 \implies \frac{f}{g} \in \mathcal{R}[a, b].$$

В чем основная идея доказательства?

■ Представить  $\frac{f}{g}$  как произведение функций  $f \cdot \frac{1}{g} \in \mathcal{R}[a, b]$ .

### Note 20

8dcb53c3642547a5bec77126b490908d

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\inf_{x \in [a, b]} |f(x)| > 0 \implies \frac{1}{f} \in \mathcal{R}[a, b].$$

В чем основная идея доказательства?

Оценить  $\omega_k(1/f)$  сверху через  $\omega_k(f)$  и  $\inf_{x \in [a,b]} |f(x)|$ .



## Лекция 04.04.22

### Note 1

40ffb14c933540e0a82a0f491c2ea946

Интегрируема ли функция Дирихле  $\chi$  на произвольном невырожденном отрезке?

■ Нет.

### Note 2

488460418bc246fe90907796c4db58be

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок,  $\chi$  — функция Дирихле. Как показать, что  $\chi \notin \mathcal{R}[a, b]$ ?

■  $\omega(\chi|_{[\alpha, \beta]}) = 1$  для любого отрезка  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ .

### Note 3

fdad8aea720d4949805e6d411e4d9cd0

Интегрируема ли функция Римана  $\psi$  на произвольном промежутке  $[a, b]$ ?

■ Да.

### Note 4

c7099fd03a894c53b8c80146045e9127

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок,  $\psi$  — функция Римана.

$$\int_a^b \psi = \{c1:0.\}$$

### Note 5

6350173ae50b44d8ac481bc4e58df52a

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок,  $\psi$  — функция Римана. В чём ключевая идея доказательства того, что  $\psi \in \mathcal{R}[a, b]$ ?

Показать, что множество

$$A = \left\{ \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \cap [a, b] \mid q \leq N \right\}$$

конечно.

## Note 6

83b18cc44cff41fc8f13f721bb95887f

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок,  $\psi$  — функция Римана. Как выбирается  $N$  в доказательстве того, что  $\psi \in \mathcal{R}[a, b]$ ?

Так, что  $\frac{1}{N} < \varepsilon$ .

## Note 7

e897ef9db02f489f8f78e18c71f5ee40

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок,  $\psi$  — функция Римана. Как выбирается  $\delta$  в доказательстве того, что  $\psi \in \mathcal{R}[a, b]$ ?

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|A|}.$$

## Note 8

aa4eace1713d444292a6cdb20f5d2bed

Пусть  $[a, b]$  — невырожденный отрезок,  $\psi$  — функция Римана. Какой критерий интегрируемости используется в доказательстве того, что  $\psi \in \mathcal{R}[a, b]$ ?

Критерий в терминах  $S_\tau - s_\tau$ .

## Note 9

ac79fc72aeb440e9a666f8dc2433dccc8

Пусть  $\{\{c3:: f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, g : [c, d] \rightarrow [a, b].\}\}$  Тогда

$$\{\{c2:: f \in C[a, b], g \in \mathcal{R}[c, d]\}\} \implies \{\{c1:: f \circ g \in \mathcal{R}[c, d].\}\}$$

## Note 10

bc11b9f7a4304f74b4bb3118d30cea22

Пусть  $\{\{c3:: a > b, f \in \mathcal{R}[b, a].\}\}$  Тогда

$$\{\{c2:: \int_a^b f\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1:: - \int_b^a f.\}\}$$

## Note 11

2be98235b82942f7bf08141dd983fe07

$$\int_a^a f \stackrel{\text{def}}{=} \{[c1: 0.]\}$$

## Note 12

649accec0ca304bd5bc72134401215095

Пусть  $f : [a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда

$$f \in \mathcal{R}[a, a] \stackrel{\text{def}}{\iff} \{[c1: \top.]\}$$

## Note 13

cc427e206f4d435889e87acd827bc5b4

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $c \in (a, b)$ . Тогда

$$\{[c2: \int_a^b f]\} = \{[c1: \int_a^c f + \int_c^b f.]\}$$

## Note 14

f57dd9f306a5429bb89c68b128c0e01f

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$\{[c2: \int_a^b \alpha f]\} = \{[c1: \alpha \int_a^b f.]\}$$

## Note 15

5aaf74ed1c3e414cb5b7c501c5970206

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\{[c2: \int_a^b (f \pm g)]\} = \{[c1: \int_a^b f \pm \int_a^b g.]\}$$

## Note 16

d43171cbe636478098887433ff64ea61

Откуда следует линейность интеграла Римана?

## ■ Из определения в терминах последовательностей.

### Note 17

8db1f43273d041d6b3fbc674270d4f5b

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\{\{c2:: f \geq 0\}\} \implies \{\{c1:: \int_a^b f \geq 0.\}\}$$

### Note 18

9778c1f4a58e4df9a9a25064935a647f

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\{\{c2:: f \leq g\}\} \implies \{\{c1:: \int_a^b f \leq \int_a^b g.\}\}$$

### Note 19

9ba16cbdf8fb4b65bd032cb56c483a1b

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\{\{c2:: \left| \int_a^b f \right|\}\}\{\{c1:: \leq \int_a^b |f|.\}\}$$

### Note 20

275d3bae3cfa48e9882d2d2a90ed21b8

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\{\{c2:: |f| \leq M \in \mathbb{R}\}\} \implies \{\{c1:: \left| \int_a^b f \right| \leq M(b-a).\}\}$$

### Note 21

84dfce5723b34bec8f05c42879c3e85f

Пусть  $f \in C[a, b]$ . Тогда

$$\{\{c2:: f \geq 0\}\} \wedge \int_a^b f = 0 \implies \{\{c1:: f \equiv 0.\}\}$$

## Note 22

2f438df6b5304cd7acbd273214875635

Пусть  $f \in C[a, b]$ . Тогда

$$f \geq 0 \wedge \int_a^b f = 0 \implies f \equiv 0.$$

В чем основная идея доказательства?

От противного; допустить, что  $\exists x_0 : f(x_0) > 0$  и использовать то, что  $\exists \delta : f|_{V_\delta(x_0)} > \frac{f(x_0)}{2}$ .

## Note 23

03b2fb7149444b2db71b150b49f267a9

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  непрерывна в точке  $x_0 \in [a, b]$ ,

$$\varphi(x) = \int_a^x f.$$

Тогда  $\varphi$  дифференцируема в точке  $x_0$  и  $\varphi'(x_0) = f(x_0)$ .

«Теорема Барроу»

## Note 24

2255bf6318be43ee834d6071ed740c89

В чем основная идея доказательства теоремы Барроу?

Оценить разность  $\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0)$  и получить дифференцируемость  $\varphi$  по определению.

## Note 25

ec57d94464cc4ecf8920954c5d4cbf76

Как в доказательстве теоремы Барроу непосредственно используется непрерывность  $f$ ?

Для представления  $f(x)$  как  $f(x_0) + \Delta x$ , где  $\Delta x \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ .

## Note 26

d26fa11d0b1e4d83bb4f4b224b9359a4

Почему в доказательстве теоремы Барроу

$$\Delta x \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0?$$

$$\Delta x = f(x) - f(x_0) \rightarrow 0.$$

### Note 27

cdc6a92b44fd4d488ca3b30c5e2b4232

В доказательстве теоремы Барроу

$$\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx.$$

### Note 28

c5dc36411f3a45598a70c9522a651022

В доказательстве теоремы Барроу

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) dx = f(x_0)h.$$

### Note 29

1cea51f7fd9b4b438856a6ec7f4c1a48

В доказательстве теоремы Барроу

$$\int_{x_0}^{x_0+h} \Delta x dx = o(h).$$

### Note 30

455761e28fe94191b0becfa38fc5b89

Откуда в доказательстве теоремы Барроу следует, что

$$\int_{x_0}^{x_0+h} \Delta x dx = o(h)?$$

$$\Delta x \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0 \stackrel{\text{def}}{\iff} \dots |\Delta x| < \varepsilon.$$

### Note 31

1109a435ae7543cf8263f72942677e95

Пусть  $\{\{c2: f, g \in \mathcal{R}[a, b], g \geq 0 \text{ (или } g \leq 0), m \leq f \leq M.\}\}$  Тогда

$$\{\{c4: \exists \mu \in [m, M]\}\} \quad \{\{c1: \int_a^b fg = \mu \int_a^b g\}\}$$

« $\{\{c3: \text{Первая теорема о среднем интегрального исчисления}\}\}$ »

### Note 32

2e6a92e370ed4445a1cd67bd8d0241f9

В чем основная идея доказательства первой теоремы о среднем интегрального исчисления?

Проинтегрировать все части неравенства

$$mg \leq fg \leq Mg \quad (\text{для } g \geq 0).$$

### Note 33

bede3b8a7d14462fbd5fcb32d222eb2d

Чему равно  $\mu$  из первой теоремы о среднем интегрального исчисления ( $\int_a^b g = 0$ )?

$\mu$  — произвольное значение из  $[m, M]$ .

### Note 34

9137b877b68a4313b09fc0b2e748f6a4

Чему равно  $\mu$  из первой теоремы о среднем интегрального исчисления ( $\int_a^b g \neq 0$ )?

$$\mu = \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}.$$

## Лекция 08.04.22

### Note 1

156407f3795145ac967ecf82e541fe0

Пусть  $\{c2: f \in C[a, b], g \in \mathcal{R}[a, b], g \geq 0 \text{ (или } g \leq 0)\}.$  Тогда  $\{c1:$

$$\exists c \in [a, b] \quad \int_a^b fg = f(c) \int_a^b g.$$

$\}$

(следствие из  $\{c3:$ первой теоремы о среднем $\}$ )

### Note 2

ba06ad7c7c3c453fa47427d955b922bb

Пусть  $\{c2: f \in R[a, b], m \leq f \leq M.\}$  Тогда  $\{c1:$

$$\exists \mu \in [m, M] \quad \int_a^b f = \mu(b - a)$$

$\}$

(следствие из  $\{c3:$ первой теоремы о среднем $\}$ )

### Note 3

ba06ad7c7c3c453fa47427d955b922bb

Пусть  $\{c2: f \in C[a, b].\}$  Тогда  $\{c1:$

$$\exists c \in [a, b] \quad \int_a^b f = f(c) \cdot (b - a)$$

$\}$

(следствие из  $\{c3:$ первой теоремы о среднем $\}$ )

### Note 4

df108f6ef527491996f1a2b6672c17fc

#### « $\{c3:$ Формула Ньютона-Лейбница $\}$ »

Пусть  $\{c2: f \in \mathcal{R}[a, b], F \in \mathcal{P}_f([a, b]).\}$  Тогда  $\{c1:$

$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

$\}$



## Note 5

bddc676c2daa42f0b218c91eac244ace

В чем основная идея доказательства формулы Ньютона-Лейбница?

Выбрать нужное оснащение используя формулу конечных приращений.

## Note 6

882e212c55614bb78548d3b6b7f2fbf2

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда  $\{\{c1\}$  разность

$$f(b) - f(a)$$

$\}\}$  называется  $\{\{c2\}$  двойной подстановкой функции  $f$  на  $[a, b]$ .  
 $\}\}$

## Note 7

b7e1b154b8de47bfbcb3d2afdf73ef75c

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .  $\{\{c1\}$  Двойная постановка функции  $f$  на  $[a, b]$   $\}\}$  обозначается  $\{\{c2\}$

$$f|_a^b, f(x)|_a^b, f(x)|_{x=a}^b$$

$\}\}$

## Note 8

df6dee2f53354eb8ae50cd3a673878a0

Пусть  $\{\{c3\}$   $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  дифференцируема на  $[a, b]$ ,  $f' \in \mathcal{R}[a, b]$ .  
 $\}\}$  Тогда

$$\{\{c2\}$$
  $\int_a^b f' = \{\{c1\}$   $f|_a^b$   $\}\}$

## Note 9

1146663e8ded4d63ba85b1b1ed35cb14

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $F \in C[a, b]$ ,  $F$  — первообразная  $f$  за исключением конечного числа точек. Тогда  $\{\{c1\}$

$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

$\}\}$

(обобщение формулы Ньютона-Лейбница)

## Note 10

496225bfd55a484fa6f61e7174af39f4

В чём основная идея доказательства обобщения формулы Ньютона-Лейбница для  $F \in \mathcal{P}_f([a, b] \setminus T)$ ,  $|T| < \aleph_0$ .

Разбить  $[a, b]$  на отрезки, во всех внутренних точках которых  $F' = f$ .

## Note 11

6abc693b3b104008b356cbca06692bdd

Пусть  $f : \mathcal{R}[a, b]$ ,  $F \in C[a, b]$ ,  $F'|_{(a,b)} = f|_{(a,b)}$ . Как показать, что  $\int_a^b f = F|_a^b$ ?

$$\int_a^b f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} f.$$

## Note 12

a8b4457947d3495c9b5fca5d72fdae28

Пусть  $f : \mathcal{R}[a, b]$ . Как показать, что

$$\int_a^b f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} f?$$

Показать, что их разность стремится к нулю.

## Note 13

8b853a07bfa94f17a0a6e43bd75e8226

Пусть  $f : \mathcal{R}[a, b]$ . Как показать, что

$$\int_a^{a+\varepsilon} f \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0?$$

$$m\varepsilon \leq \int_a^{a+\varepsilon} f \leq M\varepsilon.$$

## Note 14

6e131dfc6d004e86a827f88367981953

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Какова, в общем случае, зависимость между интегрируемостью  $f$  и существованием у неё первообразной?

В общем случае прямой зависимости нет.

## Note 15

dc24ef22e6c4921924ad580a30722c6

### «Интегрирование по частям для определённого интеграла»

Пусть  $f, g$  дифференцируемы на  $[a, b]$ ,  $f', g' \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда

$$\int_a^b fg' = fg|_a^b - \int_a^b f'g.$$

}}

## Note 16

a938ca4e00ae4ffaf1db99f384e1785

В чем основная идея доказательства формулы интегрирования по частям для определённого интеграла?

$$(fg)' = fg' + f'g \in \mathcal{R}[a, b],$$

$$\int_a^b (fg)' = fg|_a^b.$$

## Note 17

46828f8f846b4de1a73aed39d5b9d7a0

### «Замена переменной в определённом интеграле»

Пусть  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ ,  $\varphi$  дифференцируема на  $[\alpha, \beta]$ ,  $\varphi' \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$ ,  $f \in C[a, b]$ . Тогда

$$\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi) \varphi' = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f$$

}}

## Note 18

7d8af4366130490fbb87408d659837e7

В чем основная идея доказательства теоремы о замене переменной в определённом интеграле?

■ Формула Ньютона-Лейбница для  $\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi) \varphi'$ .

## Note 19

89c18701291a4123afd5111e00b0e9c8

Как преобразуется  $F \circ \varphi|_{\alpha}^{\beta}$  в доказательстве теоремы о замене переменной в определённом интеграле?

■ 
$$F \circ \varphi|_{\alpha}^{\beta} = F|_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)}$$

## Note 20

b6aa7eee0f404285b693fb392e8ea744

Пусть  $\{\{c2: f \in \mathcal{R}[-a, a], f - \text{чётна.}\}\}$  Тогда

$$\int_{-a}^a f = \{\{c1: 2 \int_0^a f.\}\}$$

## Note 21

53ccd4a61cc742818562b58b9bdce5b4

Пусть  $\{\{c2: f \in \mathcal{R}[-a, a], f - \text{нечётна.}\}\}$  Тогда

$$\int_{-a}^a f = \{\{c1: 0.\}\}$$

# Семинар 31.03.22

## Note 1

f6c10d5634604b8785e6d50a3b4179bb

Пусть  $\{c3: y = \frac{ax+b}{cx+d} \in \mathbb{R}(x) \setminus \mathbb{R}, p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathbb{Q}\}$  Тогда интеграл вида

$$\int_{\{c2: R(x, y^{p_1}, y^{p_2}, \dots, y^{p_n})\}} dx$$

берётся заменой  $\{c1: t^N = y$ , где  $N$  — общий знаменатель дробей  $p_1, \dots, p_n\}$

## Note 2

f28ac103f505434d9a7caa2eb9756579

$\{c2: \text{Дифференциальным биномом}\}$  называется  $\{c1: \text{дифференциал вида}$

$$x^m (a + bx^n)^p dx, \\ a, b \in \mathbb{R}, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}.$$

$\}$

## Note 3

6d980687cd794cb2b67482197892cb24

Каковы условия для применения каждой из подстановок применяемых для взятия интеграла от дифференциального бинома?

$$p \in \mathbb{Z}; \quad \frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}; \quad \frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}.$$

## Note 4

b2650fc8a6c4b88b1f39cd872a556b1

Какая подстановка используется для взятия интеграла от дифференциального бинома (случай  $p \in \mathbb{Z}$ )?

$t^N = x$ , где  $N$  — общий знаменатель  $m$  и  $n$ .

## Note 5

bcc008ea2e804fcc8d3df70bfc88cdc1

Какая подстановка используется для взятия интеграла от дифференциального бинома (случай  $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ )?

■  $t^k = a + bx^n$ , где  $k$  — знаменатель  $p$ .

## Note 6

90e931c9722e44219fe1e08170da8e53

Какая подстановка используется для взятия интеграла от дифференциального бинома (случай  $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ )?

■  $t^k = ax^{-n} + b$ , где  $k$  — знаменатель  $p$ .

# Лекция 23.04.22 (1)

## Note 1

57c65a69d4ce4beca2a4ef3d19482330

Пусть  $\{\{c3: f \in C^{n+1}\langle A, B \rangle, a, x \in \langle A, B \rangle, \} \} n \in \{\{c4: \mathbb{Z}_+\} \}$ . Тогда

$$\{\{c2: R_{a,n}f(x)\} \} = \{\{c1: \frac{1}{n!} \int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt.\} \}$$

(в интегральной форме)

## Note 2

0a72287655664b3e99f6388731f26bfc

Какой метод доказательства используется в доказательстве формулы Тейлора с остатком в интегральной форме?

■ Индукция по  $n$ .

## Note 3

82254691571e452294750327ef22eb89

В чём основная в доказательстве формулы Тейлора с остатком в интегральной форме (базовый случай)?

■ При  $n = 0$  получаем формулу Ньютона-Лейбница.

## Note 4

4a33a11f8ade46f08ce296db479a9007

В чём основная в доказательстве формулы Тейлора с остатком в интегральной форме (индукционный переход)?

■ Применить к остатку формулу интегрирования по частям.

## Note 5

aad636315afd4ee5a6744160d4b3e42d

$\{\{c2: \text{Интегральную формулу}\} \}$  остатка  $R_{a,n}f(x)$  иногда называют  $\{\{c1: \text{формой Якоби.}\} \}$

## Note 6

397b0796dce04587adb64efce1dd1140

$$0!! \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1: 1.\} \}$$

## Note 7

cac7fe0bc23d40a59bc9dd6812577d01

$$(-1)!! \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::1.\}\}$$

## Note 8

7da7dd0bd19944abbe2d01d155086010

« $\{\{c2::\text{Формула Валлиса}\}\}$ »

$\{\{c1::$

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$$

$\}\}$

## Note 9

f54929de1ece44289c241d6590700ab5

В чём основная идея доказательства формулы Валлиса?

Проинтегрировать на  $[0, \frac{\pi}{2}]$  неравенство

$$\sin^{2n+1} \leq \sin^{2n} \leq \sin^{2n-1}.$$

## Note 10

b5c778232bc94244b23a8e4a617ed0e6

Пусть  $\{\{c3::m \in \mathbb{Z}_+.\}\}$

$$\{\{c2:: \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \, dx\}\} = \{\{c1:: \frac{(m-1)!!}{m!!} \cdot \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & m \text{ чётно,} \\ 1, & m \text{ нечётно.} \end{cases} \}\}$$

## Note 11

715b1cec8b8041949185220e4e40a41b

В чём основная идея в доказательстве явной формулы для

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \, dx?$$

Индукция по  $m$  и формула интегрирования по частям.



## Note 12

38d390969b2741acbf82267d2fe35fd

### «Вторая теорема о среднем интегрального исчисления»

Пусть  $f \in C[a, b], g \in C^1[a, b], g$  монотонна на  $[a, b]$ . Тогда

$$\exists c \in [a, b] \quad \int_a^b f g = g(a) \int_a^c f + g(b) \int_c^b f.$$

## Note 13

69afab3fc5004157a7f35af02f3e3d12

Вторую теорему о среднем интегрального исчисления так же называют теоремой Бонне.

## Note 14

f0f631536a7f4b96b0398f89eca9118

Каков первый шаг в доказательстве теоремы Бонне?

Представить  $\int_a^b f g$  как  $\int_a^b F' g$ , где  $F(x) := \int_a^x f$ .

## Note 15

2166048a6ca44d23af43256399b234c9

Какое преобразование применяется к интегралу  $\int_a^b F' g$  в доказательстве теоремы Бонне?

Интегрирование по частям.

## Note 16

3029dc6c343e4d1c9888bf539fba3503

Какое преобразование применяется к интегралу  $\int_a^b F g'$  в доказательстве теоремы Бонне?

Первая теорема о среднем.

## Note 17

441ce64036224c3ebf472a05f4829979

Почему в доказательстве теоремы Бонне мы можем применить первую теорему о среднем к интегралу  $\int_a^b F g'$ ?

По следствию из теоремы Дарбу  $g'$  не меняет знак на  $[a, b]$ .

## Note 18

882ef3d613b947198a7bea4ad32d5160

Теорема Бонне так же будет выполняться, если ослабить предположение до:

$$f \in \mathcal{R}[a, b], \text{ } g \text{ монотонна.}$$

}}

(без доказательства)

## Лекция 23.04.22 (2)

### Note 1

8b2c86d7991e4a2b91921581b1ef4490

#### «Неравенство Йенсена для интеграла»

Пусть  $f \in C\langle A, B \rangle$ ,  $\varphi, \lambda \in C[a, b]$ ,  $\varphi : [a, b] \rightarrow \langle A, B \rangle$ ,  $\lambda \geq 0$ .

Тогда если  $f$  выпукла на  $\langle A, B \rangle$  и  $\int_a^b \lambda = 1$ , то

$$f\left(\int_a^b \lambda \varphi\right) \leq \int_a^b \lambda \cdot (f \circ \varphi).$$

}}

### Note 2

b1fef24356cb40989e268892f941d2bc

Какие два случая рассматриваются в доказательстве неравенства Йенсена для интеграла?

1.  $\varphi = \text{const}$ ,
2.  $\varphi \neq \text{const}$ .

### Note 3

0135fda5379a4582960532ada8cb52a9

В чём основная идея в доказательстве неравенства Йенсена (случай  $\varphi = \text{const}$ )?

Доказываемое неравенство тривиальным образом обращается в равенство.

### Note 4

77790770b54541099c9e486f28074f26

В чём основная идея в доказательстве неравенства Йенсена (случай  $\varphi \neq \text{const}$ )?

$\int_a^b \lambda \varphi \in (A, B)$ , а значит  $f$  имеет в этой точке опорную прямую.

## Note 5

402dc5f48e084c56acdbac1d8691cd46

Как в доказательстве неравенства Йенсена (случай  $\varphi \neq \text{const}$ ) показать, что  $\int_a^b \lambda \varphi \in (A, B)$ ?

$$\int_a^b \lambda \varphi \in (\inf \varphi, \sup \varphi) \subset [A, B].$$

## Note 6

69bcf26030d34b71839c245e2f0b80ca

Как в доказательстве неравенства Йенсена (случай  $\varphi \neq \text{const}$ ) показать, что  $\int_a^b \lambda \varphi \neq \sup \varphi$ ?

От противного.

## Note 7

3584b635c4dc44e7b9b1624c4019860f

Если в неравенстве Йенсена для интеграла  $\varphi \neq \text{const}$ , а  $f$  строго выпукла, то имеет место строгое неравенство.

## Note 8

83892edbede849aeb7d89f4abc718e41

Пусть  $p, q \in (1, +\infty)$ . Числа  $p$  и  $q$  называются сопряжёнными показателями, если

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

## Note 9

40347c04583b4c95b7cac9a0158ee490

**Неравенство Гёльдера для сумм**

Пусть  $\{a_i\}, \{b_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}_+$ ,  $p$  и  $q$  — сопряжённые показатели. Тогда

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left( \sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

## Note 10

97e460d86c3c4db6b2267d79218280cd

### «Неравенство Гёльдера для интегралов»

Пусть  $f, g \in C[a, b]$ ,  $p$  и  $q$  — сопряжённые показатели.

Тогда

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \left( \int_a^b |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_a^b |g|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

}}

## Note 11

fc914f6a007e42fc8512d6d3d277c03d

В чём основная идея в доказательстве неравенства Гёльдера для интегралов?

Применить неравенство Гёльдера для сумм к интегральным суммам.

## Note 12

e3416ff410fb47098739b40e48782ab7

Как представляется  $\Delta x_k$  в доказательстве неравенства Гёльдера для интегралов?

$$\Delta x_k = (\Delta x_k)^{\frac{1}{p}} \cdot (\Delta x_k)^{\frac{1}{q}}.$$

## Note 13

89fc34798a62448d9c6bd5173c1ac247

### «Неравенство Коши-Буняковского для интегралов»

Пусть  $f, g \in C[a, b]$ . Тогда

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}.$$

}}

## Note 14

72d317fe9af54aa4b717962551ba6ea0

### «Неравенство Минковского для сумм»

Пусть  $\{a_i\}, \{b_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}$ ,  $p \geq 1$ . Тогда

$$\left( \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

}}

## Note 15

19e57ef490ac48889603d288b4d8edd5

### «Неравенство Минковского для интегралов»

Пусть  $f, g \in C[a, b]$ ,  $p \geq 1$ . Тогда

$$\left( \int_a^b |f + g|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_a^b |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_a^b |g|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

}}

## Note 16

e0ef8b3744ed4d93a9138b1d967a1792

В чём основная идея доказательства неравенства Минковского для интегралов?

Применить неравенство Минковского для сумм к интегральным суммам.

## Note 17

000b6517531b4ecc9a052a60b3a741a4

Функция  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  называется локально интегрируемой на  $\langle A, B \rangle$ , если

$$\forall [a, b] \subset \langle A, B \rangle \quad f|_{[a, b]} \in \mathcal{R}[a, b].$$

}}

## Note 18

6b661945d0ee47a7a04ba92793c704f2

Множество функций, локально интегрируемых на  $\langle A, B \rangle$ , обозначается  $\mathcal{R}_{loc}(\langle A, B \rangle)$  или  $\mathcal{R}_{loc}\langle A, B \rangle$ .

## Note 19

435bbcd954b4c8bb3be63c6b63acc2a

Пусть  $\{\{c3:: -\infty < a < b \leq +\infty, f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b]\}.\}$

$$\{\{c2:: \int_a^{\rightarrow b} f\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1:: \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f.\}\}$$

## Note 20

51919a133fa34a6b8ed5ed7ad5b76bac

Пусть  $\{\{c3:: -\infty \leq a < b < +\infty, f \in \mathcal{R}_{loc}(a, b]\}.\}$

$$\{\{c2:: \int_{\rightarrow a}^b f\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1:: \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f.\}\}$$

## Note 21

27d9a13709de4fa5ab8baff3cd9fbaa0

Выражение

$$\int_a^{\rightarrow b} f$$

называют  $\{\{c1:: \text{несобственным интегралом } f \text{ по промежутку } [a, b)\}.\}$

## Note 22

bb25f0567eef47e7b707c500e9674f65

Выражение

$$\int_{\rightarrow a}^b f$$

называют  $\{\{c1:: \text{несобственным интегралом } f \text{ по промежутку } (a, b]\}.\}$

## Note 23

f741cd46bba044cfa110acd5e82b1af1

Несобственный интеграл называют  $\{\{c2:: \text{сходящимся},\}\}$  если  $\{\{c1:: \text{он определён и конечен.}\}\}$

## Note 24

db034e9065e54430baecac9bfd0a644f

Несобственный интеграл называют  $\{\{c2:: \text{расходящимся},\}\}$  если  $\{\{c1:: \text{он имеет бесконечное значение или не существует.}\}\}$

## Note 25

b0514d3cbba648c8a6e3b58d057869cd

Пусть  $\{c2:: f \in \mathcal{R}[a, b].\}$  Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f = \{c1:: \int_a^b f.\}$$

## Note 26

c8d35c7d4dfa4a8ab001d84f09a382bd

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Как показать, что  $\int_a^{\rightarrow b} f = \int_a^b f$ ?

Непосредственно следует из непрерывности функции  $x \mapsto \int_a^x f$  (теорема Барроу).

## Note 27

ad8461ebb11542bead198798c15c6a91

Пусть  $\{c3:: f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b), c \in (a, b).\}$  Тогда

$$\{c2:: \int_a^{\rightarrow b} f\} = \{c1:: \int_a^c f + \int_c^{\rightarrow b} f.\}$$

## Note 28

4873742f993743639632296fcb9c3fda

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b), c \in (a, b)$ . Тогда

$$\{c2:: \int_a^{\rightarrow b} f \text{ сходится}\} \{c3:: \iff \} \{c1:: \int_c^{\rightarrow b} f \text{ сходится.}\}$$

## Note 29

7f5c166670d24acc8348a74343d875cc

Пусть  $\{c3:: f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b), A \in (a, b).\}$   $\{c1::$  Несобственный интеграл  $\int_A^{\rightarrow b}$  называется  $\{c2::$  остатком интеграла  $\int_a^{\rightarrow b} f.$

## Note 30

3e68bd52c99f47b59cb0f6c550c12420

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Тогда

$$\{c2:: \int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R}\} \{c3:: \implies \} \{c1:: \int_A^{\rightarrow b} f \xrightarrow{A \rightarrow b^-} 0.\}$$



### Note 31

6f388abbe0394963abf8ebd7c8090616

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Как показать, что

$$\int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R} \implies \int_A^{\rightarrow b} f \xrightarrow{A \rightarrow b^-} 0?$$

Представить  $\int_A^{\rightarrow b} f$  как  $\int_a^{\rightarrow b} f - \int_a^A f$ .

### Note 32

eed850367bd24674b9fa0cdbc5af00f5

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^{\rightarrow b} f + \beta \int_a^{\rightarrow b} g.$$

### Note 33

1dcd21125ff841338d9ddad83b33302d

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} (\alpha f + \beta g) \text{ сходится} \iff \int_a^{\rightarrow b} f, \int_a^{\rightarrow b} g \text{ сходятся.}$$

### Note 34

5ca16eceb7f145959f15bd1feb33442e

«Замена переменной в несобственном интеграле»

Пусть  $\varphi \in C^1[\alpha, \beta)$  монотонна,  $f \in C[\varphi(\alpha), \varphi(\beta^-))$ . Тогда

$$\int_{\alpha}^{\rightarrow \beta} (f \circ \varphi) \varphi' = \int_{\varphi(\alpha)}^{\rightarrow \varphi(\beta^-)} f.$$

### Note 35

e96879968f0f4e3f8bcf844f10abfcc0

Пусть  $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$f|_a^{\rightarrow b} \stackrel{\text{def}}{=} f(b^-) - f(a).$$

## Note 36

a4c1c50607984cd88be2763ea1bce888

Пусть  $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$\{\{c2::f|_{\rightarrow a}^b\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::f(b) - f(a^+).\}\}$$

## Note 37

ceae3033619d408da982f6affab84e5b

Пусть  $\{\{c3::f, g \in C^1[a, b) \text{ и } \exists \lim_{x \rightarrow b^-} (f \cdot g)(x).\}\}$  Тогда

$$\{\{c2::\int_a^{\rightarrow b} f g'\}\} = \{\{c1::f g|_a^{\rightarrow b} - \int_a^{\rightarrow b} f' g.\}\}$$

# Семинар 21.04.22

## Note 1

c06a4a56c952416593e6c6aa940af048

Основное тригонометрическое тождество для гиперболических функций:  $\{c1::$

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

$\}\}$

## Note 2

e38aaa87d3a54ae0aa44b08a84229224

Интегралы вида

$$\int \{c2::R(x, \sqrt{a^2 - x^2})\} dx$$

берутся  $\{c1::$ подстановкой  $a \sin t = x\}$  для  $t \in \{c3::[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\}$ .

## Note 3

9c734267d24143218a9ed85452b8fb67

Интегралы вида

$$\int \{c2::R(x, \sqrt{a^2 + x^2})\} dx$$

берутся  $\{c1::$ заменой  $a \operatorname{sh} t = x\}$  для  $t \in \{c3::\mathbb{R}\}$ .

## Note 4

8c5f51e8a73d4e3fbf734d43dd62b423

Интегралы вида

$$\int \{c2::R(x, \sqrt{x^2 - a^2})\} dx$$

берутся  $\{c1::$ заменой  $a \operatorname{ch} t = x\}$  для  $t \in \{c3::\mathbb{R}_+\}$ .

## Note 5

56604ede765d4039b4eba27776ff61d0

Интегралы вида

$$\int \{c2::R(\sin x, \cos x)\} dx$$

берутся заменой  $\{c1::t = \tan \frac{x}{2}\}$

## Note 6

a709df92e9fe4310a7c2687c5de50054

Подстановку  $t = \tan \frac{x}{2}$  называют универсальной тригонометрической подстановкой.

## Note 7

a6d2e564dd8246af81224496b8f276b0

При взятии интегралов с помощью универсальной тригонометрической подстановки для определённости полагают, что  $x \in (-\pi, \pi)$ .

## Note 8

4baa637b1c464ab9b94bf7ef71fcc8

Как  $\sin x$  выражается через  $t = \tan \frac{x}{2}$ ?

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}.$$

## Note 9

3cee332cac3a4eee9f02834f87c159ea

Как  $\cos x$  выражается через  $t = \tan \frac{x}{2}$ ?

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

## Note 10

dd942a562634467e97ec85771a1d7a27

Каковы условия для частных случаев при взятии интеграла

$$\int R(\sin x, \cos x) dx?$$

1.  $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x);$
2.  $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x);$
3.  $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x).$

### Note 11

ff62f0455f5449e6a2187727fb759f0d

Если  $\int R(-\sin x, \cos x) dx = -\int R(\sin x, \cos x) dx$ , то интеграл

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

берётся заменой  $t = \cos x$ .

### Note 12

05898276b49140939ed972fa0dd24b19

Если  $\int R(\sin x, -\cos x) dx = -\int R(\sin x, \cos x) dx$ , то интеграл

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

берётся заменой  $t = \sin x$ .

### Note 13

6d9149e716954e3694079d557eb41976

Если  $\int R(-\sin x, -\cos x) dx = \int R(\sin x, \cos x) dx$ , то интеграл

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

берётся заменой  $t = \tan x$ .

### Note 14

ac6a5109ec254fdfbe4146361aef5293

Интегралы вида

$$\int \sin^m x \cdot \cos^m x dx, \quad n, m \in \mathbb{Q}$$

берутся заменой  $t = \sin x$

# Лекция 30.04.22 (1)

## Note 1

c145ba4d6dca4a06a50cec14e1551b20

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\{c4:: f \geq 0.\}$  Тогда  $\int_a^{\rightarrow b} f$   $\{c2:: \text{сходится}\}$   $\{c3:: \iff\}$  функция  $\{c1:: x \mapsto \int_a^x f\}$  ограничена сверху на  $[a, b)$ .

## Note 2

0be99a47ac0e428faad6ea9879f39822

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f \geq 0$ . Тогда  $\int_a^{\rightarrow b} f$  сходится  $\iff$  функция  $x \mapsto \int_a^x f$  ограничена сверху на  $[a, b)$ . В чём основная идея доказательства?

■  $\int_a^x f \nearrow$  и теорема о пределе монотонной функции.

## Note 3

e94553827bfa462995cb7abf3f169453

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\{c2:: f \geq 0.\}$  Тогда  $\int_a^{\rightarrow b} f$  либо  $\{c1:: \text{сходится},\}$  либо  $\{c1:: \text{расходится к } +\infty.\}$

## Note 4

2613f68b7e7b444ea053850e9887a1e8

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\{c2:: f \geq 0.\}$  Тогда  $\int_a^{\rightarrow b} f = \{c1:: \sup_{x \in [a, b)} \int_a^x f\}$ .

## Note 5

05b94ccacfa246db99eb2dcbfca408f2a

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\{c5:: f, g \geq 0,\}$

$$f(x) = \{c4:: O(g(x)), \quad x \rightarrow b^-. \}$$

Тогда  $\{c1:: \int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R}\} \{c3:: \iff\} \{c2:: \int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R}\}$

## Note 6

635015d74b6c4594817b074aa5417c29

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\{c5:: f, g \geq 0,\}$

$$f(x) = \{c4:: O(g(x)), \quad x \rightarrow b^-. \}$$

Тогда  $\{c2:: \int_a^{\rightarrow b} f \notin \mathbb{R}\} \{c3:: \implies\} \{c1:: \int_a^{\rightarrow b} g \notin \mathbb{R}\}$

## Note 7

95f69b2a23484af79ddfafb4fda8cf09

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f, g \geq 0$ ,

$$f(x) = O(g(x)), \quad x \rightarrow b^-.$$

Тогда, если  $\int_a^{\rightarrow b} g$  сходится, то и  $\int_a^{\rightarrow b} f$  сходится.

В чём основная идея доказательства?

Из определения  $O$ -большого сравнить остатки  $\int_\varepsilon^{\rightarrow b} f$  и  $\int_\varepsilon^{\rightarrow b} g$ .

## Note 8

88104faac5ad425e8ad1e9d194e82fcf

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f \geq 0, g > 0$  и  $\frac{f}{g}(b^-) \in [0, +\infty)$ .

Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R} \iff \int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R}.$$

## Note 9

1c33032b82c74c258d783b6f03d0ec39

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f \geq 0, g > 0$  и  $\frac{f}{g}(b^-) \in [0, +\infty)$ . Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R} \implies \int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R}.$$

В чём основная идея доказательства?

$\frac{f}{g}$  ограничена в окрестности  $b \implies f(x) = O(g(x))$ .

## Note 10

cec6bac50bc74bf1b743dc23079418dc

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f \geq 0, g > 0$  и  $\frac{f}{g}(b^-) \in (0, +\infty]$ .

Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R} \implies \int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R}.$$

## Note 11

156267ccd8034eca99dbb3d574fbf25e

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f \geq 0$ ,  $g > 0$  и  $\frac{f}{g}(b^-) \in (0, +\infty]$ . Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R} \implies \int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R}.$$

В чём основная идея доказательства?

Поменять местами  $f$  и  $g$ , рассмотрев  $\frac{g}{f}(b^-) \in [0, +\infty)$ .

## Note 12

1139c594c8b941fc9a945b4ca914a566

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f \geq 0, g > 0$  и  $\frac{f}{g}(b^-) \in (0, +\infty)$ .  
Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R} \iff \int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R}.$$

## Note 13

1588fad5b7a94fb7a874e07813b56e6a

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f, g \geq 0$ .

$$f(x) \sim g(x), \quad x \rightarrow b^-.$$

Тогда  $\int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R} \iff \int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R}$ .

## Note 14

3804d89199d040dea2d1a4ab5975760d

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $f, g \geq 0$ ,

$$f(x) \sim g(x), \quad x \rightarrow b^-.$$

Тогда  $\int_a^{\rightarrow b} f \in \mathbb{R} \iff \int_a^{\rightarrow b} g \in \mathbb{R}$ .

В чём основная идея доказательства?

Показать, что  $f$  и  $g$  ограничены по сравнению друг с другом.



## Note 15

03152527c42d4e8bb83dd25771b6c907

Пусть  $f \in C[a, +\infty)$ ,  $f \geq 0$ . Тогда

$$\int_a^{+\infty} f \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

## Note 16

3b29658e766c4cd28321fc274785321b

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Является ограниченность функции

$$x \mapsto \int_a^x f$$

необходимым условием для сходимости  $\int_a^{\rightarrow b} f$ ?

■ Да, является.

## Note 17

d8d5ca8f054b4f198c844c2fa4947b52

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Является ограниченность функции

$$x \mapsto \int_a^x f$$

достаточным условием для сходимости  $\int_a^{\rightarrow b} f$ ?

■ Нет, она является только необходимым условием.

## Note 18

0293c1fbac2c45939b37aee500e2e937

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Интеграл  $\int_a^{\rightarrow b} f$  называют  $\{\{c2::\text{сходящим-ся абсолютно},\}\}$  если  $\{\{c1::\int_a^{\rightarrow b} |f| \text{ сходится.}\}\}$

## Note 19

9f03ada40444f7b806ae914e3c10af8

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Если  $\int_a^{\rightarrow b} f$  и  $\int_a^{\rightarrow b} g$   $\{\{c2::\text{сходятся абсолютно},\}\}$  то  $\{\{c3::\int_a^{\rightarrow b} (\alpha f + \beta g) \}\}$   $\{\{c1::\text{сходится абсолютно.}\}\}$

## Note 20

877bbbf0aad47f18e73982ecb61a25c

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Если  $\int_a^{\rightarrow b} f$  сходится абсолютно, то он  
{{c1: сходится.}}

## Note 21

1e256a23b0234f618630bb0ecd81a5c1

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Если  $\int_a^{\rightarrow b} f$  сходится абсолютно, то он сходится. В чём ключевая идея доказательства?

Критерий Больцано-Коши сходимости функции для соответствующих интегралов с переменным верхним пределом.

## Note 22

90872b464e394488bd0388fbf5e5fc3e

Может ли несобственный интеграл сходиться, не сходясь при этом абсолютно?

Да, может.

## Note 23

0268c46e88c24c1d9a2339d7f0d3ee01

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Если  $\int_a^{\rightarrow b} f$  {{c2: сходится, но не абсолютно,}} то говорят, что {{c1: он сходится условно или неабсолютно.}}

## Note 24

8cf6a70282a945a2ba0dc4b0a63abad8

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Если интеграл  $\int_a^{\rightarrow b} f$  {{c2: сходится условно,}} а  $\int_a^{\rightarrow b} g$  {{c2: сходится абсолютно,}} то  $\int_a^{\rightarrow b} (f + g)$  {{c1: сходится условно.}}

## Note 25

710cc42101c14046a49743d5070986c1

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$ . Если интеграл  $\int_a^{\rightarrow b} f$  сходится условно, а  $\int_a^{\rightarrow b} g$  сходится абсолютно, то  $\int_a^{\rightarrow b} (f + g)$  сходится условно. В чём основная идея доказательства?

Представить  $f$  как сумму  $(f + g) - g$ .

## Note 26

4ff4773b59de42daa0a880e4a8a170e7

Пусть  $\{c4:: f \in C[a, b),\}$   $\{c3:: g \in C^1[a, b), g \text{ — монотонна.}\}$  Если  $\{c1:: g$  бесконечно мала в точке  $b^-$ , а  $x \mapsto \int_a^x f$  ограничена на  $(a, b),\}$  то  $\{c2:: \int_a^{\rightarrow b} (f \cdot g)$  сходится.

«Признак  $\{c5:: \text{Дирихле}\}$   $\{c2:: \text{сходимости несобственного интеграла}\}$ »

## Note 27

ae6efc013b634d36a35078f6d529988d

В чём основная идея доказательства признака Дирихле сходимости несобственного интеграла?

Применить формулу интегрирования по частям и показать абсолютную сходимость  $\int_a^{\rightarrow b} F g'$ .

## Note 28

2f08599a01c3436a9f48422e767ba763

Как в доказательстве признака Дирихле сходимости несобственного интеграла показать, что  $\int_a^{\rightarrow b} F g'$  сходится абсолютно?

Оценить сверху значение  $\int_a^{\rightarrow b} |F g'|$ .

## Note 29

599be6e31a83462881df0f2734d270d5

Почему в доказательстве признака Дирихле сходимости несобственного интеграла интеграл  $\int_a^{\rightarrow b} |F g'|$  не может не существовать?

Потому что  $|F g'| \geq 0$ .

## Note 30

fdf163be427a40e1a02bdfb1d3392f46

Пусть  $\{f \in C[a, b], g \in C^1[a, b], g \text{ — монотонна.}\}$  Если  $\{g \text{ — ограничена, а } \int_a^b f \text{ сходится,}\}$  то  $\{\int_a^b (f \cdot g) \text{ сходится.}\}$

«Признак  $\{g \in C^1[a, b], g \text{ — монотонна.}\}$  сходимости  
несобственного интеграла»

## Note 31

5714e2e7542d4b4aa0316cb086c35aac

В чём основная идея доказательства признака Абеля сходимости несобственного интеграла?

Признак Дирихле для функций  $f$  и

$$x \mapsto g(x) - g(b^-).$$

## Note 32

8ceee057705b4a778730645db78a3fb2

Признак Дирихле сходимости несобственного интеграла так же будет выполняться, если ослабить допущения до:

$$f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b), \quad g \text{ монотонна на } [a, b).$$

}}

(без доказательства)

## Note 33

3d0b9c7aa10142388b565e673f847be1

Признак Абеля сходимости несобственного интеграла так же будет выполняться, если ослабить допущения до:

$$f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b), \quad g \text{ монотонна на } [a, b).$$

}}

(без доказательства)

## Лекция 30.04.22 (2)

### Note 1

519087b524d64a7db308cfc813fb90f7

Отображение  $U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  называется **движением пространства  $\mathbb{R}^n$** , если оно сохраняет расстояние между точками.

### Note 2

b1453ceeece4b72b798234b7da1813d

**Площадь** называется отображение  $S : \{P\} \rightarrow \mathbb{R}_+$ , заданное на некотором классе  $\{P\}$  подмножеств плоскости, которое при этом

- аддитивно;
- нормируемо на прямоугольниках;
- и инвариантно относительно движений.

}}

### Note 3

47470cb51b9e4e21bb69da097aba5d2b

Фигуры из класса подмножеств плоскости, на которых задано отображение площади, называются **квадрируемыми фигурами**.

### Note 4

18345644cb79468f9ec377bda0dc0a8b

Пусть  $P_1$  и  $P_2$  — квадрируемые фигуры и  $P_1 \cap P_2 = \emptyset$ . Тогда  $P_1 \cup P_2$  — квадрируемая фигура и

$$S(P_1 \cup P_2) = S(P_1) + S(P_2).$$

}}

(свойство **аддитивности** из определения площади)

### Note 5

76c9c3e2743049ffa9cc6d12f6dc926d

Площадь прямоугольника со сторонами  $a$  и  $b$  равна  $ab$ .

(свойство **нормируемости на прямоугольниках** из определения площади)

## Note 6

21333bd49d034ec7af62abe5e5b689e7

Пусть  $P$  — квадратируемая фигура и  $U$  — движение плоскости. Тогда  $U(P)$  — квадратируемая фигура и

$$S(U(P)) = S(P).$$

}}

(свойство инвариантности относительно движений) из определения площади)

## Note 7

b8107a1dd5d24f29a317e003bc6c9181

Пусть  $P, P_1$  — квадратируемые фигуры,  $P_1 \subset P$ . Тогда

$$S(P_1) \leq S(P).$$

}}

(монотонность площади)

## Note 8

c493291ddbb94c7682c53a108ac7fce4

В чём ключевая идея в доказательстве монотонности площади?

Представить  $P$  как  $P \cup (P \setminus P_1)$ .

## Note 9

d66f7a47310e439da162bfb5d766daa8

Если квадратируемая фигура  $P$  содержится в некотором отрезке, то  $S(P) = 0$ .

## Note 10

4f73cf95243c4ae1a203f5a5cce2a024

Если квадратируемая фигура  $P$  содержится в некотором отрезке, то  $S(P) = 0$ . В чём основная идея доказательства?

$P$  можно заключить в прямоугольник сколь угодно малой площади.

## Note 11

eea6ca09c1c445469a7fafb3cdf7c5c6

Пусть  $\{P_1, P_2\}$  — квадратируемые фигуры,  $S(P_1 \cap P_2) = 0$ .

Тогда

$$S(P_1 \cup P_2) = S(P_1) + S(P_2).$$

}}

(усиленная аддитивность) площади

## Note 12

430f2d5b1ff841c29c7b3b184b5cd509

В чём основная идея доказательства усиленной аддитивности площади?

Представить  $P_1 \cup P_2$  как  $(P_1 \setminus P_2) \cup P_2$ .

## Note 13

14e7b163e187481dbd050b6109d9c55a

Чему равна  $S(P_1 \setminus P_2)$  в доказательства усиленной аддитивности площади?

$$S(P_1 \setminus P_2) = S(P_1).$$

## Note 14

a8841fa849b54fcdb1d646f27b165f0d

Объёмом называется отображение  $V : \{T\} \rightarrow \mathbb{R}_+$ , заданное на некотором классе  $\{T\}$  подмножеств  $\mathbb{R}^3$ , которое при этом

- аддитивно;
- нормируемо на прямоугольных параллелепипедах;
- и инвариантно относительно движений.

}}

## Note 15

7cfda5f9df304d888f1d18b59b9c2805

Элементы из класса подмножеств  $\mathbb{R}^3$ , на которых задано отображение объёма, называются кубическими телами.

}}

## Note 16

0857e7d4cb3949fa8150811b0b482d43

Объём прямоугольного параллелепипеда с рёбрами  $a, b$  и  $c$  равен  $abc$ .

(свойство нормируемости на прямоугольных параллелепипедах из определения объёма)

## Note 17

5718ba5a41374083b6fcc1508f440aa6

Если кубируемое тело  $T$  содержится в некотором прямоугольнике, то  $V(T) = 0$ .

## Note 18

429679b187e449738c280e35b1c167ba

Пусть  $P \subset \mathbb{R}^2$ ,  $h \geq 0$ . Множество  $P \times [0, h]$ , а так же всякий его образ при движении, называется прямым цилиндром с основанием  $P$  и высотой  $h$ .

## Note 19

910d0a9f9f5342c18ec7291c3bcf5a75

Пусть  $P$  — квадратуемая фигура,  $h \geq 0$ . Тогда цилиндр  $P \times [0, h]$  кубируем и

$$V(P \times [0, h]) = S(P)h.$$

}}

## Note 20

09254f53532b46f2a53c623d390ebb80

Пусть  $T \subset \mathbb{R}^3$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Множество

$$\{(y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y, z) \in T\}$$

называется сечением множества первой координатой  $x$ .

## Note 21

364174b8e50c41769a37bd8c66b37c2f

Пусть  $T \subset \mathbb{R}^3$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Сечение множества  $T$  первой координатой  $x$  обозначается  $T(x)$ .



## Note 22

897caf9d2c9e4338bb71941389908a3c

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $t \in [a, b]$ .  $\{\{c2: i\text{-я координата вектора } \gamma(t)\}\}$  обозначается  $\{\{c1: \gamma_i(t)\}\}$

## Note 23

bfb45d16ad184797a2996ad01ffcef3e

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $i \in [1 : m]$ .  $\{\{c2: \text{Функция } t \mapsto \gamma_i(t)\}\}$  называется  $\{\{c1: i\text{-й координатной функцией отображения } \gamma.\}\}$

## Note 24

b14417cf3a944cb4a66a5e8e9d998e8e

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $i \in [1 : m]$ .  $\{\{c2: i\text{-я координатная функция } \gamma\}\}$  обозначается  $\{\{c1: \gamma_i.\}\}$

## Note 25

dd1a71a2fed04fe9afe31c7632361372

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Отображение  $\gamma$  называется  $\{\{c2: \text{непрерывным на } [a, b]\}\}$ , если  $\{\{c1: \text{каждая его координатная функция непрерывна на } [a, b]\}\}$

## Note 26

b547615a5824427faef3dd11a3b25d6d

$\{\{c2: \text{Путём в } \mathbb{R}^m\}\}$  называется  $\{\{c1: \text{непрерывное отображение}$

$$[a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

$\}\}$

## Note 27

22935aef61d54e6ca59da2c35faa2d07

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ .  $\{\{c2: \text{Точка } \gamma(a)\}\}$  называется  $\{\{c1: \text{началом пути } \gamma.\}\}$

## Note 28

306f29e0450e438d99bc99ecf7bfc7f6

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ .  $\{\{c2: \text{Точка } \gamma(b)\}\}$  называется  $\{\{c1: \text{концом пути } \gamma.\}\}$

## Note 29

8dd5f0f6a866470697eebadc0467f96f

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ .  $\{\{c1: \text{Множество } \gamma([a, b])\}\}$  называется  $\{\{c2: \text{носителем пути } \gamma.\}\}$

### Note 30

7d4bcf2b08264eb9ab15db7043690c48

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Путь  $\gamma$  называется замкнутым, если  $\gamma(a) = \gamma(b)$ .

### Note 31

5093bb30b14c48e3b3fadaef0c12af88

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Путь  $\gamma$  называется простым или несамопересекающимся, если

$$\gamma(t_1) = \gamma(t_2) \implies t_1 = t_2 \text{ или } t_1, t_2 \in \{a, b\}.$$

}}

### Note 32

d8f2c782ae694dd988da84bcb859ff74

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Путь  $\gamma$  называется  $k$  раз непрерывно дифференцируемым или  $k$ -гладким, если все  $\gamma_i \in C^k[a, b]$ .

### Note 33

05da85b7f0a84b368ee3c6bef725c8da

Множество всех  $k$ -гладких путей  $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  обозначается

$$C^k[a, b].$$

}}

### Note 34

2915b1df3b9e42158ec7ffe997e98a04

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Путь  $\gamma$  называется кусочно-гладким, если существует такое разбиение отрезка  $[a, b]$ , что сужение  $\gamma$  на любой из отрезков разбиения — гладкий путь.

### Note 35

9c342e15007543ce80fa38b9df7f3251

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Путь, задаваемый формулой

$$t \mapsto \gamma(a + b - t), \quad t \in [a, b],$$

называется противоположным пути  $\gamma$ .

## Note 36

f069a263f684409d8ff3e26967cba803

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Путь, противоположный пути  $\gamma$ , обозначается  $\gamma^-$ .

## Note 37

591160f41fd4454bafef7bb81051e9799

Два пути  $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\gamma_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^m$  называются эквивалентными, если существует строго возрастающая сюръекция

$$u : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$$

такая, что  $\gamma_1 = \gamma_2 \circ u$ .

## Note 38

fe470bb82a2b4926851a2edfc7a0e8bb

Каждый класс эквивалентности путей в  $\mathbb{R}^m$  называется кривой.

## Note 39

cbe0b68e357849a2ad4608976c677898

Каждый из представителей класса эквивалентности, составляющего данную кривую, называется параметризацией этой кривой.

## Note 40

466347f360424036ba201c4d9083bb8b

Кривую в пространстве  $\mathbb{R}^m$  обозначают как  $\{\gamma\}$ , где  $\gamma$  — некоторая её параметризация.

## Note 41

1faf6fe6c5d7403c89e416216d3e9699

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Семейство отрезков, соединяющих точки  $\gamma(\tau_k)$  и  $\gamma(\tau_{k+1})$  для  $\{\tau_k\} \in T[a, b]$  называют ломаной, вписанной в путь  $\gamma$ .

## Note 42

4be9559c1fbc4e42804714ea29cdf641

Длиной ломаной называют сумму длин составляющих её отрезков.

### Note 43

2da98f4689254999b9ceb8a314d0ea1

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ .  $\{\{c2::\text{Длиной}\}\}$  пути  $\gamma$  называется  $\{\{c1::\text{величина}\}\}$

$$\sup_{\tau \in T[a, b]} \ell_{\tau},$$

где  $\ell_{\tau}$  — длина ломаной, отвечающей разбиению  $\tau$ .

### Note 44

60df0982954545929b0ff63a854ca1d8

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ .  $\{\{c2::\text{Длина пути } \gamma\}\}$  обозначается  $\{\{c1::s_{\gamma}\}\}$

### Note 45

38b6d13987e84d16b683136f8cbe95af

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Путь  $\gamma$  называется  $\{\{c2::\text{спрямляемым}\}\}$  если  $\{\{c1::s_{\gamma} < +\infty\}\}$

## Лекция 07.05.22 (1)

### Note 1

a086c7c565474cc28e5e635aa58fbc68

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Множество

$$\left\{ (x, y) \mid x \in [a, b], y \in \Delta_{0, f(x)} \right\}$$

называется подграфиком функции  $f$ .

### Note 2

ce2924abf7304cfb861aa52962241aa0

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Подграфик функции  $f$  обозначается  $Q_f$ .

### Note 3

938420b690a6454bb2d2f1eea1281a1b

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Подграфик функции  $f$  называется криволинейной трапецией, если  $f \geq 0$ ,  $f \in C[a, b]$ .

### Note 4

8454114fa9b446d495fd999f8d6522b6

Как показать, что подграфик криволинейной трапеции является квадратируемой фигурой?

■ Принять на веру. (В нашем курсе это не доказывается.)

### Note 5

1bbdb3d7edc4466bc39badd75fe893f

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $f \geq 0$ . Тогда  $S(Q_f) = \int_a^b f$ .

### Note 6

913f7f98ebc549638163e89e85c4e29b

Пусть  $f \in C[a, b]$ ,  $f \geq 0$ . Тогда  $S(Q_f) = \int_a^b f$ .

В чём ключевая идея доказательства?

■ Ограничить значение  $S(Q_f)$  через интегральные суммы Дарбу для произвольного разбиения.

### Note 7

ce632e26e2cf4cb19eea3f0a4ab3c709

Пусть  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Тогда  $S(Q_f) = \int_a^b |f|$ .

## Note 8

381eae56ef164e66acf7fefebf662c4a

Пусть  $f \in C[a, b]$ ,  $f \geq 0$ . Как соотносятся величины  $S(Q_f)$  и  $S(Q_f \setminus \Gamma_f)$ ?

■ Они равны.

## Note 9

4cde7099bf1543dabb6d8f15b462ae9e

Пусть  $f \in C[a, b]$ ,  $f \geq 0$ . Откуда следует, что

$$S(Q_f) = S(Q_f \setminus \Gamma_f)?$$

■  $S(\Gamma_f) = 0$ .

## Note 10

b6e7714d201749cd9fd4e7b0bd716384

Пусть  $\{f, g \in \mathcal{R}[a, b], f \leq g\}$  Фигура, заключённая между графиками  $f$  и  $g$  тоже называется  $\{c1\}$  криволинейной трапецией. $\}$

## Note 11

bc1564f4497f46e687c00d29b41fdb88

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $f \leq g$ .  $\{c2\}$  Площадь криволинейной трапеции, заключённой между графиками  $f$  и  $g$   $\{c1\}$  равна  $\{c1\}$ :

$$\int_a^b (g - f).$$

$\}$

## Note 12

7b57ff51f8f74d7a9e4b6bc05043f32c

Пусть  $\{c5\} 0 < \beta - \alpha \leq 2\pi, \{c4\} f \in C[\alpha, \beta], f \geq 0$ . Множество точек

$$\left\{ \{c1\} r \cdot (\cos \varphi, \sin \varphi) \mid \{c2\} \varphi \in [\alpha, \beta], r \in [0, f(\varphi)] \right\}$$

называется  $\{c3\}$  криволинейным сектором, ограниченным функцией  $f$ . $\}$

### Note 13

92d60a9a490b49c2af35b60f685c4b05

Пусть  $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$ ,  $f \in C[\alpha, \beta]$ ,  $f \geq 0$ . [[c2::Криволиней-  
 ный сектор, ограниченный функцией  $f$ ,]] обозначается [[c1::  
 $\tilde{Q}_f$ ]]

### Note 14

45120420e85a4503b25a5dd34b000e9f

Пусть  $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$ ,  $f \in C[\alpha, \beta]$ ,  $f \geq 0$ . Тогда

$$\{\{c2::S(\tilde{Q}_f)\}\} = \{\{c1::\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2.\}\}$$

### Note 15

896e566b8a2a4fe7817b2f52377d7fbd

Пусть  $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$ ,  $f \in C[\alpha, \beta]$ ,  $f \geq 0$ . Тогда

$$S(\tilde{Q}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2.$$

В чём ключевая идея доказательства?

Составить суммы, аналогичные суммам Дарбу, но составленные из площадей секторов, а не прямоугольников.

### Note 16

8e9b6c0f033b44bc81a2f3d4bf467a83

При вычислении объёмов с помощью интеграла на фигуру  $T \subset \mathbb{R}^3$  накладываются следующие ограничения:

- [[c1::  $\exists a, b \in \mathbb{R} \quad T \subset [a, b] \times \mathbb{R}^2$  ]]
- [[c2::  $\forall x \in [a, b] \quad T(x)$  — квадратируемая фигура с площадью  $S(x)$ , причём  $S \in C[a, b]$ ; ]]
- [[c3::  $\forall$  отрезка  $\Delta \subset [a, b] \quad \exists \xi_{\Delta}^*, \xi_{\Delta}^{**} \in \Delta \quad \forall x \in \Delta$

$$T(\xi_{\Delta}^*) \subset T(x) \subset T(\xi_{\Delta}^{**}).$$

]]

## Note 17

a7e13633747d4baaad4c2c6b3fa89048

Пусть  $T \subset \mathbb{R}^3$  удовлетворяет условиям для вычисления объёма с помощью интеграла. Тогда

$$\{\{c2::V(T)\}\} = \{\{c1::\int_a^b S.\}\}$$

## Note 18

1470b2fb4bbce3f8bc341fee4c90bc8

Пусть  $T \subset \mathbb{R}^3$  удовлетворяет условиям для вычисления объёма с помощью интеграла. Тогда  $V(T) = \int_a^b S$ . В чём основная идея доказательства?

■ Составить суммы Дарбу из объёмов цилиндров.

## Note 19

bd53f21dcde04ea0b85cb5af9f3591a3

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .  $\{\{c2::\text{Тело вращения подграфика } f \text{ вокруг оси } Ox\}\}$  обозначается  $\{\{c1::T_f.\}\}$

## Note 20

ba286a05719545d7989f5b131598cf49

Пусть  $\{\{c3::f : C[a, b].\}\}$  Тогда

$$\{\{c2::V(T_f)\}\} = \{\{c1::\pi \int_a^b f^2.\}\}$$

## Note 21

0a669c3f221f45deb163b883985df4d8

Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .  $\{\{c2::\text{Тело вращения подграфика } f \text{ вокруг оси } Oy\}\}$  обозначается  $\{\{c1::T'_f.\}\}$

## Note 22

f584d6707a1844349499bd55a4a9ea9c

Пусть  $f \in C[a, b]$ . Тогда

$$\{\{c2::V(T'_f)\}\} = \{\{c1::2\pi \int_a^b x f(x) dx.\}\}$$



## Note 23

28b42e81a08c4032a3b4ba6c93022f1f

Пусть  $f \in C[a, b]$ . Тогда  $V(T'_f) = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ . В чём основная идея доказательства (на интуитивном уровне)?

Интегрировать по “площадям” сечений цилиндрами, построенными на окружностях радиуса  $x$ .

## Note 24

37ce05b3e5534f20b8ea802974f37e7d

Пусть  $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}_+$ ,  $\alpha, \beta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ . Тело вращения криволинейного сектора, ограниченного функцией  $f$ , вокруг оси  $Oy$  обозначается  $T_f$ .

## Note 25

f3588c46da91488b9544a0278ca24931

Пусть  $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}_+$  непрерывна,  $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}$ . Тогда

$$V(\tilde{T}_f) = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} f^3(\theta) \cos \theta d\theta.$$

## Note 26

752d8f77f5274d05967dca413b1c9472

Будут ли верны интегральные формулы площадей и объёмов для неограниченных множеств?

Да, но выражающие их интегралы будут несобственными.

## Note 27

081bd87639824313a4c4b6ea6161ff62

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ , все  $\gamma_i$  — дифференцируемые функции. Тогда

$$\gamma' \stackrel{\text{def}}{=} (\gamma'_1, \dots, \gamma'_m).$$

## Note 28

78afc1de7241408b95a68a8f5ed2006a

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда

$$\|\gamma\| = \sqrt{\sum_i \gamma_i^2}.$$

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  — путь в  $\mathbb{R}^m$ . Тогда, если  $\gamma \in C^1[a, b]$ ,  
 то  $\gamma$  спрямляем и  $s_\gamma = \int_a^b \|\gamma'\|$ .

## Лекция 07.05.22 (2)

### Note 1

ddc3406fefdc4dcdb10eeb102957c8ce

Пусть  $\{f \in C[a, b]\}$ . При рассмотрении  $\Gamma_f$  как пути, полагают

$$\Gamma_f(t) = (t, f(t)), \quad t \in [a, b].$$

### Note 2

c2ae0466ac724aa8b74a18651e9b01b8

Пусть  $f \in C^1[a, b]$ . Тогда путь  $\Gamma_f$  спрямляем и

$$s_{\Gamma_f} = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2}.$$

### Note 3

d7845b70c0774392b73e28626dab39f8

Пусть  $f \in C[\alpha, \beta]$ ,  $f \geq 0$ . Выражение “путь  $\gamma$  задаётся в полярных координатах равенством  $r = f(\theta)$ ,  $\theta \in [\alpha, \beta]$ ” означает, что

$$\begin{aligned} \gamma(\theta) &= (f(\theta) \cdot (\cos \theta, \sin \theta)), \\ \gamma : [\alpha, \beta] &\rightarrow \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

### Note 4

58dcc2f7e9c04a209117dce56a3fdacb

Пусть  $f \in C^1[\alpha, \beta]$ ,  $f \geq 0$ , путь  $\gamma$  задаётся в полярных координатах неравенством  $r = f(\theta)$ ,  $\theta \in [\alpha, \beta]$ . Тогда

$$s_\gamma = \int_a^b \sqrt{f^2 + (f')^2}.$$

Пусть  $f \in C^1[\alpha, \beta]$ ,  $f \geq 0$ , путь  $\gamma$  задаётся в полярных координатах неравенством  $r = f(\theta)$ ,  $\theta \in [\alpha, \beta]$ . Тогда

$$s_\gamma = \int_a^b \sqrt{f^2 + (f')^2}.$$

В чём основная идея доказательства?

**|** Явным образом показать, что  $\|\gamma'\| = \sqrt{f^2 + (f')^2}$ .

## Лекция 14.05.22 (1)

### Note 1

db30293ae2e34ccaad4737c4f196a676

Отображение  $E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  называется отображением  $n$  вещественных переменных.

### Note 2

09a496c79f5646e49e9cbe8c39bc708e

Отображение  $E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  называется функцией  $n$  вещественных переменных.

### Note 3

50d467eacead432fb753be92cd3e3d5b

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$ .  $k$ -я координата точки  $x$  обозначается  $x_k$ .

### Note 4

6298966bfb9a436cafb65c0ac1f3b462

Пусть  $x, y \in \mathbb{R}^n$ . Тогда  $x \cdot y \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n x_i y_i$ .

### Note 5

82049479525249098f11edd6b86662f5

Евклидовой нормой в  $\mathbb{R}^n$  называется функция

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto \sqrt{x \cdot x}.$$

}}

### Note 6

0820d783bfc7483c983f2acd41905870

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$ . Евклидова норма вектора  $x$  обозначается

}}

$$\|x\|.$$

}}

### Note 7

f7962d62d97a4e45966cfbd5258d7be7

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|.$$

## Note 8

963d46ce6e6740c2ada2ae1586e864c8

Пусть  $x, y \in \mathbb{R}^n$ . Тогда  $\|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|$ .

(обратное неравенство треугольника для норм)

## Note 9

197c20e358c34941810836f09234bb95

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $k \in [1 : n]$ . Тогда

$$|x_k| \leq \|x\| \leq \sqrt{n} \cdot \max_{i \in [1:n]} |x_i|$$

## Note 10

56e8be63cc924fadaa65ad1a43d24b40

$$\overline{\mathbb{R}^n} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$$

## Note 11

2d0130af589f4bc8be65d79c610c9313

Пусть  $\delta > 0$ ,  $a \in \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$V_\delta(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < \delta\}$$

## Note 12

3bdf65ade40048daae6226ad13c91370

Пусть  $\delta > 0$ ,  $a \in \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\dot{V}_\delta(a) \stackrel{\text{def}}{=} V_\delta(a) \setminus \{a\}$$

## Note 13

a872bc2223d54bab976847e9cf14cc91

Пусть  $\delta > 0$ . Тогда множество  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| > \delta\}$  называется  $\delta$ -окрестностью бесконечно удалённой точки в  $\mathbb{R}^n$ .

## Note 14

2a6f33f0df8d4fd78ba6c02bccbc4f26

Пусть  $\delta > 0$ . Тогда  $\delta$ -окрестность бесконечно удалённой точки в  $\mathbb{R}^n$  обозначается  $V_\delta(\infty)$ .

### Note 15

4180d71589654850ba33a99a79e3a0d0

Пусть  $\delta > 0$ . Тогда в  $\{\{c2::\mathbb{R}^n\}\}$  полагаем  $\dot{V}_\delta(\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::V_\delta(\infty)\}\}$ .

### Note 16

cf41f3caf0a74d8392d85139c9968c07

В общем случае окрестности точек в  $\mathbb{R}^n$  так же ещё называют  $\{\{c1::\text{открытыми } n\text{-мерными шарами.}\}\}$

### Note 17

bd99061f38de4188b72bb2a2fe1f68e8

Пусть  $\delta > 0$ . Тогда множество  $\{\{c1::V_\delta(\infty) \cup \{\infty\}\}\}$  называется  $\{\{c2::\text{окрестностью бесконечно удалённой точки в } \overline{\mathbb{R}^n}\}\}$

### Note 18

40f1bd82241c4c7d8c8f327f0fd4f80e

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta_1, \delta_2 > 0$ . Тогда

$$V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(a) = \{\{c1::V_{\min\{\delta_1, \delta_2\}}(a)\}\}$$

### Note 19

c295589ac6fd4a91b7607784a4f6b94b

Пусть  $\delta_1, \delta_2 > 0$ . Тогда в пространстве  $\mathbb{R}^n$

$$V_{\delta_1}(\infty) \cap V_{\delta_2}(\infty) = \{\{c1::V_{\max\{\delta_1, \delta_2\}}(\infty)\}\}$$

### Note 20

be9be70ce56541a69bfec3663baa83f

Пересечение двух окрестностей одной и той же точки из  $\overline{\mathbb{R}^n}$  — тоже  $\{\{c1::\text{окрестность этой точки.}\}\}$

### Note 21

1eab3119b89e42c7bb0b893175654a5b

Пусть  $a, b \in \overline{\mathbb{R}^n}$ ,  $\{\{c2::a \neq b\}\}$ . Тогда существуют  $\{\{c1::\text{такие окрестности } V_{\delta_1}(a), V_{\delta_2}(b), \text{ что } V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(b) = \emptyset.\}\}$

## Note 22

91077edbd0ea4f8b85dd14c5a192ff70

Пусть  $a, b \in \overline{\mathbb{R}^n}$ ,  $a \neq b$ . Тогда существуют такие окрестности  $V_{\delta_1}(a), V_{\delta_2}(b)$ , что  $V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(b) = \emptyset$ . Какие два случая рассматриваются в доказательстве?

■ 1.  $a, b \neq \infty$ , 2.  $a$  или  $b = \infty$ .

## Note 23

8409f167cccb4e7988de4ceb04f3fc9

Пусть  $a, b \in \overline{\mathbb{R}^n}$ ,  $a \neq b$ . Тогда существуют такие окрестности  $V_{\delta_1}(a), V_{\delta_2}(b)$ , что  $V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(b) = \emptyset$ . В чём основная идея доказательства для  $a, b \neq \infty$ ?

■ Взять  $\delta_1 = \delta_2 = \frac{\|a-b\|}{2}$ .

## Note 24

7eb5b28213054f63a30990a588f653c9

Пусть  $a, b \in \overline{\mathbb{R}^n}$ ,  $a \neq b$ . Тогда существуют такие окрестности  $V_{\delta_1}(a), V_{\delta_2}(b)$ , что  $V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(b) = \emptyset$ . В чём основная идея доказательства для  $b = \infty$ ?

■ Для произвольного  $\delta_1 > 0$  положить  $\delta_2 = \|a\| + \delta_1$ .

## Note 25

6a3a01e6983e4a8cb972e4752f7aaa36

Пусть  $f, g : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда

$$(f + g)(x) \stackrel{\text{def}}{=}_{\{\{c1\}: f(x) + g(x).\}} f(x) + g(x).$$

## Note 26

431a63ea7a8f400f997c1789317d2efc

Пусть  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\{\{c2\}: \lambda : E \rightarrow \mathbb{R},.\}$  Тогда

$$(\lambda f)(x) \stackrel{\text{def}}{=}_{\{\{c1\}: \lambda(x)f(x).\}} \lambda(x)f(x).$$



## Note 27

fe02a3d518ad41bcaa8eab77a41edcd0

Пусть  $f, g : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда

$$(f \cdot g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \{[c1:: f(x) \cdot g(x).]\}$$

## Note 28

06ea693e03bf49faa4cea59e4dc68b73

Чем определения предела последовательности в  $\mathbb{R}^n$  отличается от такового для  $\mathbb{R}$ ?

■ Вместо модулей используется евклидова норма.

## Note 29

e7496a01680c4188ab2b77d49a956769

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{[c4:: a \in \mathbb{R}^n.]\}$  Тогда

$$\{[c2:: \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a]\}\{[c3:: \iff \}\{[c1:: \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k - a\| = 0.]\}$$

(в терминах вещественных последовательностей)

## Note 30

346e3e4f67cb4742a0a8c03f522ac66d

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\{[c2:: \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \infty]\}\{[c3:: \iff \}\{[c1:: \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k\| = +\infty.]\}$$

(в терминах вещественных последовательностей)

## Note 31

181e5459680740b4b4bb06e2b4204fba

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $a, b \in \overline{\{[c2:: \mathbb{R}^n]\}}$ . Тогда

$$x^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a \wedge x^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} b \implies \{[c1:: a = b.]\}$$

## Note 32

a1f21b775a3b4ee5b487baced44d3d6e

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $a, b \in \overline{\mathbb{R}^n}$ . Тогда

$$x^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a \wedge x^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} b \implies a = b.$$

В чём основная идея доказательства?

От обратного и использовать существование непересекающихся окрестностей  $V(a)$  и  $V(b)$ .

## Note 33

a2015de5744c4595a00a42a327399672

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{\{c3: x^k \rightarrow a \in \mathbb{R}^n.\}\}$  Тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{\{c2: \|x^k\|\}\} = \{\{c1: \|a\|\}\}$$

## Note 34

635954ced2b945f795fa2415739e634c

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $x^k \rightarrow a \in \mathbb{R}^n$ . Тогда  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k\| = \|a\|$ .

В чём основная идея доказательства?

Обратное неравенство треугольника для  $\|\|x^k\| - \|a\|\|$ .

## Note 35

398fb78214164adf83ccce280065c505

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $i \in [1 : n]$ . Последовательность  $\{x_i^k\}$  называется  $i$ -й координатной последовательностью последовательности  $\{x^k\}$ .

## Note 36

435eee779e914a3b8c6aaa95f6a763e7

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{\{c4: a \in \mathbb{R}^n.\}\}$  Тогда  $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a$  тогда и только тогда, когда  $\forall i \in [1 : n]$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^k = a_i.$$

}}

## Note 37

3fa906784d584b6e8ffd965de8a6322d

В чём основная идея в доказательстве теоремы о покомпонентной сходимости последовательности в  $\mathbb{R}^n$  (необходимость)?

$$\left| (x^k - a)_i \right| \leq \|x^k - a\| \rightarrow 0.$$

## Note 38

40c5520ef19c4bb39c271c243477ccd9

В чём основная идея в доказательстве теоремы о покомпонентной сходимости последовательности в  $\mathbb{R}^n$  (достаточность)?

Показать, что  $\|x^k - a\| \rightarrow 0$ .

## Note 39

3fd0844b01144973a767e49a2c96e78e

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Если  $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \infty$ , то координатные последовательности  $\{x_i^k\}$  могут не иметь предела.

## Note 40

33857f75ca574dc4808d8d21766be6fe

Пусть  $\{x^k\}, \{y^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ ,

$$x^k \rightarrow a \in \mathbb{R}^n, y^k \rightarrow b \in \mathbb{R}^n.$$

Тогда

$$(x^k + y^k) \rightarrow a + b.$$

## Note 41

0d43a16117a1444dba74a29d0ca712b4

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n, \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ ,

$$x^k \rightarrow a \in \mathbb{R}^n, \lambda_k \rightarrow \lambda \in \mathbb{R}.$$

Тогда

$$\lambda_k x^k \rightarrow \lambda a.$$

## Note 42

daf93a77a6d5452c882b4ec1bc279fc6

Пусть  $\{x^k\}, \{y^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,

$$x^k \rightarrow a \in \{\{c2::\mathbb{R}^n, \}\} y^k \rightarrow b \in \{\{c2::\mathbb{R}^n, \}\}$$

Тогда

$$x^k \cdot y^k = \{\{c1::a \cdot b, \}\}$$

## Note 43

abf40faf2fc04bae88f96f229c5991d1

В чём основная идея в доказательстве теоремы об арифметических операциях над пределами последовательностей в  $\mathbb{R}^n$ ?

■ Использовать покоординатную сходимость.

## Note 44

84e580fe871e4a9099a8b893a7f7ff11

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{x^{k_i}\}$  — подпоследовательность  $\{x^k\}$ ,  $a \in \{\{c2::\overline{\mathbb{R}^n}, \}\}$ . Тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a \implies \{\{c1:: \lim_{i \rightarrow \infty} x^{k_i} = a., \}\}$$

## Note 45

b3b121ad972c4c2eb01797117a795d2b

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{x^{k_i}\}$  — подпоследовательность  $\{x^k\}$ ,  $\{\{c2::a \in \overline{\mathbb{R}^n}, \}\}$  Тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a \implies \{\{c1:: \lim_{i \rightarrow \infty} x^{k_i} = a., \}\}$$

## Note 46

f3fc5ed889ed42c3ab9b94ad0dc2c4b6

В чём основная идея доказательства теоремы о пределе подпоследовательности в  $\mathbb{R}^n$ ?

Свести к пределу подпоследовательности числовой последовательности.

### Note 47

2cc6bf0ec4b744219216b8f7b9131c13

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Множество  $E$  называется  $\{\{c2::ограниченным,$   
 $\}\}$  если  $\{\{c1::E \subset V_\delta(0) \text{ для некоторого конечного } \delta > 0.\}\}$

(в терминах окрестностей)

### Note 48

3fdaf39b9f6849d3a7c1c0b77e0b2100

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Множество  $E$  называется  $\{\{c2::ограниченным,$   
 $\}\}$  если  $\{\{c1::\text{множество } \{\|x\| \mid x \in E\} \text{ ограничено.}\}\}$

(в терминах норм)

### Note 49

ef35bf7807bf49a4953be0fa863fa66a

Пусть  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Отображение  $f$  называется  $\{\{c2::ограниченным,\}\}$  если  $\{\{c1::\text{множество его значений ограничено.}\}\}$

### Note 50

c361e11e60c0426c9096ce58059852fe

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $\{\{c2::E \text{ ограничено}\}\} \iff \{\{c1::\sup_{x \in E} \|x\| < +\infty.\}\}$

(в терминах sup)

### Note 51

55039713f61943458ec789dbb6b145d8

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $j \in [1 : n]$ .  $\{\{c1::\text{Множество } \{x_j \mid x \in E\}\}\}$  называется  $\{\{c2::\text{проекцией } E \text{ на } j\text{-ю ось.}\}\}$

### Note 52

558a15d4b2d8461a85f9900f08c2c24e

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $j \in [1 : n]$ .  $\{\{c1::\text{Проекция } E \text{ на } j\text{-ю ось}\}\}$  обозначается  $\{\{c2::E_j.\}\}$

### Note 53

5f2ada96a96d40f288abf00365fd2a8f

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Как ограниченность  $E$  связана с проекциями  $E$  на координатные оси?

Ограниченность  $E$  эквивалентна ограниченности каждой из его проекций  $E_j$ .

### Note 54

f854719bde1446feb7b76aecad168192

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда ограниченность  $E$  эквивалентна ограниченности каждой из его проекций  $E_j$ . В чём основная идея доказательства?

Непосредственно следует из оценки

$$|x_j| \leq \|x\| \leq \sqrt{n} \cdot \max_i |x_i|.$$

### Note 55

3869f37cb0f24c2184567f8561a31e1f

Пусть  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда  $f$  ограничено тогда и только тогда, когда  $\{\{c1\}$  каждая из его координатных функций ограничена.

(в терминах координатных функций)

### Note 56

b7487016c4894d77a55418ebce7c8fc2

Пусть  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда  $f$  ограничено тогда и только тогда, когда каждая из его координатных функций ограничена. В чём основная идея доказательства?

Множество  $f(E)$  ограничено  $\iff$  каждая из его проекций  $f(E)_j$  ограничена, но  $f(E)_j = f_j(E)$ .

### Note 57

229fec40da6c48ceac33727eebf79e42

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\{x^k\} \text{ ограничена } \iff \{\{c1\} \{x_i^k\} \text{ ограничена } \forall i.\}$$

(в терминах координатных функций)

## Note 58

8166d65b01864fd88374f97ce75c3eda

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\{x^k\} \text{ ограничена} \iff \{x_i^k\} \text{ ограничена } \forall i.$$

В чём основная идея доказательства?

Частный случай аналогичной теоремы для произвольных отображений.

## Note 59

fec8d0a7bf5b47ecb36926b61a1818fb

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда если  $\{x^k\}$  сходится, то она ограничена.

## Note 60

7ac0f2188c6d4b72996dba94ed321553

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда если  $\{x^k\}$  сходится, то она ограничена. В чём основная идея доказательства?

Покоординатная сходимость и аналогичная теорема для числовых последовательностей.

## Note 61

5f6e1b3d2fac4b1d8da33e308f6c785b

В чём основная идея доказательства принципа выбора Больцано-Вейерштрасса для последовательностей в  $\mathbb{R}^n$ ?

Последовательно выбирать подпоследовательности, попеременно получая сходимости координатных последовательностей.

## Note 62

3e127d0b24f142e9beec4653c5ac676b

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда если  $\{x^k\}$  не ограничена, то у неё есть подпоследовательность, стремящаяся к  $\infty$ .

Пусть  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда если  $\{x^k\}$  не ограничена, то у неё есть подпоследовательность, стремящаяся к  $\infty$ . В чём основная идея доказательства?

■ Последовательность  $\{\|x^k\|\}$  неограниченна.



## Лекция 14.05.22 (2)

### Note 1

8f1408b5072a4c4db503662e57f44fae

Чем определение последовательности Коши в  $\mathbb{R}^n$  отличается от такового для последовательностей в  $\mathbb{R}$ ?

■ Вместо модуля используются евклидова норма.

### Note 2

a55fb30e99b8448bbf4daad28b535da6

Выполняется ли критерий сходимости Больцано-Коши для последовательностей в  $\mathbb{R}^n$ ?

■ Да, выполняется.

### Note 3

15ca58d336a843058f80b5e7f575bcd0

В чём основная идея доказательства критерия сходимости Больцано-Коши для последовательностей в  $\mathbb{R}^n$  (необходимость)?

Критерий Больцано-Коши для координатных последовательностей и неравенство

$$|x_k| \leq \|x\| \leq \sqrt{n} \cdot \max_i |x_i|.$$

### Note 4

48fb62af875d46c5b05b401c40d098c4

Чем определение предельных точек для подмножеств  $\mathbb{R}^n$  отличается от такового для подмножеств  $\mathbb{R}$ ?

■ Ничем.

### Note 5

a669a63c0542458f9252161374cec7f3

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{a \in \overline{\mathbb{R}^n}\}$ . Точка  $a$  является предельной для  $E$  тогда и только тогда, когда

$$\exists \{x^k\}_{k=1}^\infty \subset E \setminus \{a\} \quad x^k \rightarrow a.$$

}}

(в терминах последовательностей)

## Note 6

15109511ff924c4baaf5512ee750e154

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $a \in \overline{\mathbb{R}^n}$ . Точка  $a$  является предельной для  $E$  тогда и только тогда, когда

$$\exists \{x^k\}_{k=1}^\infty \subset E \setminus \{a\} \quad x^k \rightarrow a.$$

Какие два случая рассматриваются в доказательстве?

■ 1.  $a \neq \infty$ ; 2.  $a = \infty$ .

## Note 7

75f06294c4514596b330d9f62883ed49

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $a \in \overline{\mathbb{R}^n}$ . Точка  $a$  является предельной для  $E$  тогда и только тогда, когда

$$\exists \{x^k\}_{k=1}^\infty \subset E \setminus \{a\} \quad x^k \rightarrow a.$$

В чём основная идея доказательства для  $a \neq \infty$  (необходимость)?

■ Выбирать  $x^k$  по  $\varepsilon = \frac{1}{k}$ .

## Note 8

c78fe01a6f214aa38a3343be15a6543f

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $a \in \overline{\mathbb{R}^n}$ . Точка  $a$  является предельной для  $E$  тогда и только тогда, когда

$$\exists \{x^k\}_{k=1}^\infty \subset E \setminus \{a\} \quad x^k \rightarrow a.$$

В чём основная идея доказательства для  $a \neq \infty$  (достаточность)?

■ Из определения предела  $\forall \varepsilon \quad \exists k \quad x^k \in \dot{V}_\varepsilon(a)$ .

## Note 9

22db3f3ad0394102a1d98af06cc40fbdb

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{\{c3.a \in E.\}\}$  Точка  $a$  называется  $\{\{c2. \text{внутренней для } E,\}\}$  если  $\{\{c1. \text{у неё есть окрестность, содержащаяся в } E.\}\}$

## Note 10

18e311d437f341e9a873d377706cf0cb

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Множество  $E$  называется  $\{\{c2::\text{открытым в } \mathbb{R}^n,\}$   
 $\}$  если  $\{\{c1::\text{любая его точка является внутренней для } E.\}\}$

## Note 11

b8e86e0736db4159a59c29ffcb30ac8

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Множество  $E$  называется  $\{\{c2::\text{замкнутым в } \mathbb{R}^n,\}$   
 $\}$  если  $\{\{c1::\text{его дополнение } \mathbb{R}^n \setminus E \text{ открыто в } \mathbb{R}^n.\}\}$

## Note 12

6c14a78f8f304062aa09cf96ce030f48

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $\{\{c2::E \text{ замкнуто в } \mathbb{R}^n\}\} \{\{c3::\text{тогда и только тогда, когда}\} \{\{c1::E \text{ содержит все свои предельные точки в } \mathbb{R}^n.\}\}$

(в терминах предельных точек)

## Note 13

4313f6dffa4d4be288c13720b79f5e31

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $E$  замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  тогда и только тогда, когда  $E$  содержит все свои предельные точки в  $\mathbb{R}^n$ . В чём основная идея доказательства (необходимость)?

■ От обратного и противоречие с открытостью  $\mathbb{R}^n \setminus E$ .

## Note 14

338d88f6cd9b49a5b6e1fc14c46c07af

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $E$  замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  тогда и только тогда, когда  $E$  содержит все свои предельные точки в  $\mathbb{R}^n$ . В чём основная идея доказательства (достаточность)?

■ В  $\mathbb{R}^n \setminus E$  нет предельных точек  $E$ .

## Note 15

78034d8289654f2d989fd7d3cde60d2b

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $\{\{c2::E \text{ замкнуто в } \mathbb{R}^n\}\} \{\{c3::\text{тогда и только тогда, когда}\} \{\{c1::$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k \in E$$

для любой сходящейся последовательности  $\{x^k\}_{k=1}^\infty \subset E.\}$

(в терминах последовательностей)

## Note 16

c4a98576816047bd8e45761c09ffdc70

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $E$  замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  тогда и только тогда, когда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k \in E$$

для любой сходящейся последовательности  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset E$ . В чём основная идея доказательства (необходимость)?

■ От обратного и противоречие с открытостью  $\mathbb{R}^n \setminus E$ .

## Note 17

2ad826deacbf4422a6d0864598a81e82

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $E$  замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  тогда и только тогда, когда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k \in E$$

для любой сходящейся последовательности  $\{x^k\}_{k=1}^{\infty} \subset E$ . В чём основная идея доказательства (достаточность)?

■  $E$  содержит любую свою предельную точку.

## Note 18

0f1ca1a114fe4768af83b2987f80c626

Пусть  $\{E_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$  — семейство открытых подмножеств  $\mathbb{R}^n$ .

|| Тогда  $\bigcup_{\alpha \in A} E_{\alpha}$  || {c1: открыто в  $\mathbb{R}^n$ .}

## Note 19

3592d4aa6f1d49a088ea09f8f4850695

Пусть  $\{E_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$  — семейство открытых подмножеств  $\mathbb{R}^n$ .

|| Тогда если  $|A| < \aleph_0$ , || то  $\bigcap_{\alpha \in A} E_{\alpha}$  || {c1: открыто в  $\mathbb{R}^n$ .}

## Note 20

d5e0544892f344dcbd519b58b207d8b6

Пусть  $\{E_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$  — семейство закрытых подмножеств  $\mathbb{R}^n$ .

|| Тогда  $\bigcap_{\alpha \in A} E_{\alpha}$  || {c1: замкнуто в  $\mathbb{R}^n$ .}

## Note 21

203fb961ea984b4195210820a687183d

Пусть  $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$  — семейство закрытых подмножеств  $\mathbb{R}^n$ .  
 Тогда если  $|A| < \aleph_0$ , то  $\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha$  замкнуто в  $\mathbb{R}^n$ .

## Note 22

cdbfd70790af41228a9ac6941706aed5

Пусть  $E, F \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда если  $E$  открыто, а  $F$  замкнуто, то  $E \setminus F$  открыто.

## Note 23

11768bb518f845028aa77d77032444bf

Пусть  $E, F \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда если  $E$  замкнуто, а  $F$  открыто, то  $E \setminus F$  замкнуто.

## Note 24

db6839cb255845099043c9415f55b4af

Открыто или замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  множество  $\mathbb{R}^n$ ?

И открыто, и замкнуто.

## Note 25

7f1672e6cd054b6ea16112670e15fe3d

Открыто или замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  множество  $\emptyset$ ?

И открыто, и замкнуто.

## Note 26

d23104a8197346939669f31522a74633

Открыто или замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  произвольное конечное подмножество  $\mathbb{R}^n$ ?

Замкнуто.

## Note 27

685cbdd3894a49c79e96e14be1a73996

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ .

$$B_\delta(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < \delta\}.$$

## Note 28

dc873817f70d4d40b1f3c824ad89ad17

Пусть  $\{\{c4: a \in \mathbb{R}^n, \}\} \{\{c3: \delta > 0.\}\}$

$$\{\{c2: \overline{B_\delta(a)}\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1: \{a \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| \leq \delta\}.\}\}$$

## Note 29

e9a3af0fa0004802a9b0d082df09338e

Пусть  $\{\{c4: a \in \mathbb{R}^n, \}\} \{\{c3: \delta > 0.\}\}$

$$\{\{c2: S_\delta(a)\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1: \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| = \delta\}.\}\}$$

## Note 30

f8f71a74217449c29d5e66761ce0fcb8

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ . Открыто или замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  множество  $B_\delta(a)$ ?

■ Открыто.

## Note 31

537577c3bdfa4bde831b90a8d0f0615f

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ . Открыто или замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  множество  $\overline{B_\delta(a)}$ ?

■ Замкнуто.

## Note 32

3230aeffdb12417ca0fd94fb913dd39

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ . Открыто или замкнуто в  $\mathbb{R}^n$  множество  $S_\delta(a)$ ?

■ Замкнуто.

# Лекция 21.05.22 (1)

## Note 1

59c721ad4aeb41949fb3434169a89aeb

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ .  $\{\{c2:: \text{Замыканием множества } E\}\}$  называется  $\{\{c1:: \text{наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее } E.\}\}$

## Note 2

a94d9d6d06b6493c81f3b1e768b81375

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ .  $\{\{c1:: \text{Замыкание множества } E\}\}$  обозначается  $\{\{c2::$

$$\overline{E} \text{ или } \text{Cl } E.$$

$\}\}$

## Note 3

31d05cf282b9466e8a9a000950fede4b

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\{\{c2:: \overline{E}\}\} = \{\{c1:: \bigcap \{F \subset \mathbb{R}^n \mid F - \text{замкнуто, } E \subset F\}.\}\}$$

## Note 4

69f36de3475242618fbb0eb4ae74b6dd

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{\{c4:: a \in \mathbb{R}^n.\}\}$  Тогда

$$\{\{c2:: a \in \overline{E}\}\} \{\{c3:: \iff \}\} \{\{c1:: a \in E \text{ или } a - \text{предельная точка } E.\}\}$$

## Note 5

4bdd2826972c4b32bc4fdfbfcf85e6d3

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{\{c4:: a \in \mathbb{R}^n.\}\}$  Тогда

$$\{\{c2:: a \in \overline{E}\}\} \{\{c3:: \iff \}\} \{\{c1:: \exists \{x^k\}_{k=1}^\infty \subset E \quad x^k \rightarrow a.\}\}$$

(в терминах последовательностей)

## Note 6

61bd6874e98f44a0882b56e7a750b9a0

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ .  $\{\{c2:: \text{Внутренностью } E\}\}$  называется  $\{\{c1:: \text{множество всех внутренних точек } E.\}\}$

## Note 7

139034b5d2bc422097d150cb9da30c33

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Внутренность  $E$  обозначается

$$\text{Int } E \text{ или } \overset{\circ}{E}.$$

}}

## Note 8

b8de5908fb8d44bf92fcd25520547f67

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Открыто или закрыто в  $\mathbb{R}^n$  множество  $\text{Int } E$ ?

■ Открыто.

## Note 9

799638c4bc6f4c50bb965b8803d41eab

Пусть  $E, G \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда если  $G$  открыто в  $\mathbb{R}^n$  и  $G \subset E$ , то  $G \subset \text{Int } E$ .

## Note 10

cd90c5fff5534fb981914ccc37bd7ae9

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Внутренность  $E$  — это наибольшее по включению открытое множество, содержащееся в  $E$ .

(в терминах включения)

## Note 11

a1e8aa28d96d49799f0c4a4040f2dead

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\mathbb{R}^n \setminus \overline{E} = \text{Int}(\mathbb{R}^n \setminus E).$$

## Note 12

fb2a725e8e4b4c2fb0fa050078699cf5

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\mathbb{R}^n \setminus \text{Int } E = \overline{(\mathbb{R}^n \setminus E)}.$$



### Note 13

fe2c858bf3c04acfa21126cdd9904aef

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Границей  $E$  называется множество

$$\overline{E} \setminus \text{Int } E.$$

}}

### Note 14

0a35e47f857f43ec9bbff01116e04eb0

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Граница множества  $E$  обозначается  $\partial E$ .

### Note 15

88b2a73094fb4a239e5b513a46f3a622

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Открыто или замкнуто множество  $\partial E$ ?

■ Замкнуто.

### Note 16

e5f44e996a0c40ec85bea1411325179d

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ . Тогда  $\text{Int } B_\delta(a) = \text{Int } B_\delta(a)$ .

### Note 17

351b99e8bd1248d0b7d36a78fbdd1807

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ . Тогда  $\text{Int } \overline{B_\delta(a)} = \text{Int } B_\delta(a)$ .

### Note 18

5134e609e6a542f895fa5477372047a1

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ . Тогда  $\partial B_\delta(a) = \partial B_\delta(a)$ .

### Note 19

6d51fdbba058545838e2402ff10db74ea

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ . Тогда  $\partial(\overline{B_\delta(a)}) = \partial B_\delta(a)$ .

### Note 20

6091740d09a14c4da2f8435a9157b10d

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $F \subset E$ . Точка  $a \in F$  называется внутренней для  $F$  в  $E$ , если

$$\exists \delta > 0 \quad (V_\delta(a) \cap E) \subset F.$$

}}

## Note 21

d9c779744732420dbf907539811051e7

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{\{c3::F \subset E.\}\}$  Множество  $F$  называется  $\{\{c2::\text{открытым в } E.\}\}$  если  $\{\{c1::\text{любая его точка является внутренней для } F \text{ в } E.\}\}$

## Note 22

a6191d3dd3e94990aa8ee40f4b7e6d53

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{\{c3::F \subset E.\}\}$  Множество  $F$  называется  $\{\{c2::\text{замкнутым в } E.\}\}$  если  $\{\{c1::E \setminus F \text{ открыто в } E.\}\}$

## Note 23

d0303c87476a424c80b3fb7522768304

Пусть  $F \subset E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $\{\{c2::F \text{ открыто в } E.\}\} \{\{c3::\iff\}\} \{\{c1::\text{существует открытое множество } G \subset \mathbb{R}^n, \text{ для которого}$

$$F = E \cap G.$$

$\}\}$

(в терминах открытости/замкнутости в  $\mathbb{R}^n$ )

## Note 24

33888ff338f94ea59f1f245c0f5ae61b

Пусть  $F \subset E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда  $\{\{c2::F \text{ замкнуто в } E.\}\} \{\{c3::\iff\}\}$  существует  $\{\{c1::\text{замкнутое множество } G \subset \mathbb{R}^n, \text{ для которого}$

$$F = E \cap G.$$

$\}\}$

(в терминах открытости/замкнутости в  $\mathbb{R}^n$ )

## Note 25

c75d8ade85014bf2a2e7c13cc3299418

Пусть  $F \subset E \subset \mathbb{R}^n$ . Если  $\{\{c4::E \text{ открыто в } \mathbb{R}^n.\}\}$  то

$$\{\{c2::F \text{ открыто в } E.\}\} \{\{c3::\iff\}\} \{\{c1::F \text{ открыто в } \mathbb{R}^n.\}\}$$

## Note 26

8607c43c4d9145ce8b739f277bc467f5

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ .  $\{\{c1::\text{Семейство } \Omega \text{ подмножеств } \mathbb{R}^n \text{ такое, что}$   
 $E \subset \bigcup_{A \in \Omega} A.\}\}$  называется  $\{\{c2::\text{покрытием множества } E.\}\}$

### Note 27

89d8d5966eba46478e132c99f8a87207

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Если  $\Omega$  — это покрытие  $E$ , то говорят, что  $\Omega$   $\{\{c1:: \text{покрывает } E.\}\}$

### Note 28

69ac5bea935247e8ba609ec7be95b65f

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\Omega$  — покрытие  $E$ .  $\{\{c1:: \text{Подсемейство } \Omega, \text{ которое также покрывает } E, \}\}$  называется  $\{\{c2:: \text{подпокрытием } \Omega.\}\}$

### Note 29

8e8ddb4f754b447b863761db2945f748

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\Omega$  — покрытие  $E$ . Покрытие  $\Omega$  называется  $\{\{c2:: \text{открытым,}\}\}$  если  $\{\{c1:: \text{любое множество } A \in \Omega \text{ открыто.}\}\}$

### Note 30

33da2e11009a4fe9a561cfd024b9f9e

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Множество  $E$  называется  $\{\{c2:: \text{компактным (или компактом),}\}\}$  если  $\{\{c1:: \text{из любого открытого покрытия } E \text{ можно выбрать конечное подпокрытие.}\}\}$

### Note 31

cdb5bd07b1d340dd9b11c009a8d0fa29

Пусть  $\{\{c3:: E \subset \mathbb{R}^n \text{ компактно.}\}\}$  Тогда любое  $\{\{c1:: \text{замкнутое, под-множество } E \}\{c2:: \text{также компактно.}\}\}$

### Note 32

6efd282fcad744ba898c1ed2ad57dcb2

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\{\{c2:: E \text{ компактно}\}\} \{\{c3:: \iff \}\} \{\{c1:: E \text{ замкнуто и ограничено.}\}\}$$

«Теорема  $\{\{c4:: \text{Гейне-Бореля}\}\}$ »

### Note 33

d8a0467fa82d4e8db762642af19e20b2

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\{\{c2:: E \text{ компактно}\}\} \{\{c3:: \iff \}\} \{\{c1:: \forall \{x^k\}_{k=1}^\infty \subset E \quad \exists \{x^{k_i}\} \quad \lim_{i \rightarrow \infty} x^{k_i} \in E.\}\}$$

(в терминах последовательностей)

## Лекция 21.05.22 (2)

### Note 1

eab6566f65bf4003bec24142b9b187e5

Отображение  $E \subset R \rightarrow \mathbb{R}^m$  называется вектор-функцией.

### Note 2

ff7b125dc2ee4647b62cf48f1c0edc4c

Чем определение предела отображения  $E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  по Коши принципиально отличается от такового для функций  $E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ?

■ Ничем.

### Note 3

21646334c02042498ac8c3104a6f0b24

Чем определение предела отображения  $E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  по Гейне принципиально отличается от такового для функций  $E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ?

■ Ничем.

### Note 4

911558d747cb439f8cd881a764ff8700

Пусть  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $a \in \overline{E}$ ,  $A, B \in \overline{\mathbb{R}^m}$ . Тогда

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} A \quad \wedge \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} B \implies A = B.$$

### Note 5

67a1a0e4aa664174a6c43da05087c80d

Пусть  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $a \in \overline{E}$ ,  $A \in \overline{\mathbb{R}^m}$ . Тогда

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} A \iff \forall i \quad f_i(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} A_i.$$

(в терминах координатных функций)

### Note 6

1fe3bd0f7cca46f3926bbb096e417e7c

Чем критерий Больцано-Коши для отображений  $E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  отличается от такового для функций  $E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ?

■ Ничем.