

# Лекция 07.02.22

## Note 1

662fbc59ca984f5b820ad1041f1eb840

Пусть  $f(x) : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . <sup>[2]</sup> Многочлен  $p(x)$  степени  $n$  такой, что

$$\begin{aligned} f(x) &= p(x) + o((x-a)^n), \\ f(a) &= p(a), \end{aligned}$$

} называется <sup>[1]</sup> многочленом Тейлора функции  $f$  порядка  $n$  в точке  $a$ .

## Note 2

738279ec323b45e29a170a4e41b4bce0

Если многочлен Тейлора функции  $f$  порядка  $n$  в точке  $a$  существует, то <sup>[1]</sup> он единственен.

## Note 3

8f605243b193465799ba06e1576d171e

В чём ключевая идея доказательства единственности многочлена Тейлора?

Пусть коэффициент  $r_m$  при  $(x-a)^m$  — первый ненулевой коэффициент в многочлене  $p - q$ . Тогда

$$\frac{p - q}{(x - a)^m} \xrightarrow{x \rightarrow a} r_m,$$

но при этом

$$\frac{p - q}{(x - a)^m} = o((x - a)^{n-m}) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \implies r_m = 0.$$

## Note 4

f4110a9b63c640be96d810d835d0d1fd

<sup>[2]</sup> Многочлен Тейлора функции  $f$  порядка  $n$  в точке  $a$  обозначается <sup>[1]</sup>  $T_{a,n}f \cdot$

## Note 5

1b7244a616994615a1d41bbc85768a3f

### «<sub>{3}</sub> Формула Тейлора для многочленов »

Пусть  $p$  — <sub>{2}</sub> многочлен степени не более  $n$ . Тогда <sub>{1}</sub>

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{p^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

}

## Note 6

97c12315facb454e987cb94fae99be75

$$f(x)|_{x=a} \stackrel{\text{def}}{=} \substack{{1}} f(a).$$

## Note 7

cf7e5ab30b564c139557fd0a940f8204

$$\left. \left( (x-a)^k \right)^{(n)} \right|_{x=a} = \substack{{1}} \begin{cases} 0, & n \neq k, \\ n!, & n = k. \end{cases}$$

## Note 8

9b6c61f4867142bea860ca4d00c07174

В чем основная идея доказательства истинности формулы Тейлора для многочленов?

Записать  $p(x)$  с неопределенными коэффициентами и вычислить  $p^{(k)}(a)$  для  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ .

## Note 9

7597b782ce5f4e92998cc6445ce6f40e

### «<sub>{3}</sub> Свойство $n$ раз дифференцируемой функции »

Пусть <sub>{2}</sub>  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$  и

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0.$$

<sub>{1}</sub> Тогда  $f(x) = o((x-a)^n), x \rightarrow a.$

## Note 10

22aa07051d4c4e0ebb08ce0114be5429

«Определение  $o$ -малого в терминах  $\varepsilon, \delta$ .»

Пусть  $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a$  — предельная точка  $D$ . Тогда

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow a \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \cap \dot{V}_\delta(a) \quad |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|.)$$

## Note 11

b7ddf1bbcdf84c769dd7b409e5be494d

Какой метод используется в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции?

■ Индукция по  $n$ .

## Note 12

f04179797fd64614827341d425616341

Какова основная идея в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (базовый случай)?

■ Подставить  $f(a) = f'(a) = 0$  в определение дифференцируемости.

## Note 13

7a10e93958724ee6b93bc1637a13773f

Каков первый шаг в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■ Заметить, что из индукционного предположения

$$f'(x) = o((x - a)^n)$$

■ и расписать это равенство в терминах  $\varepsilon, \delta$ .

## Note 14

b863b13c8a8b45c09c6444b48e5c0b75

Какие ограничения накладываются на  $\delta$  в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■  $V_\delta(a) \cap D$  есть невырожденный промежуток.

## Note 15

2506d5781f234e13a94358880699831a

Почему в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход) мы можем сказать, что  $\exists \delta > 0$  такой, что  $V_\delta(a) \cap D$  есть невырожденный отрезок?

■ По определению дифференцируемости функции.

## Note 16

73ed2cd8b8b444ce991d587d9ed279ed

В чем ключевая идея доказательства свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■ Выразить  $f(x) = f'(c) \cdot (x-a)$  по симметричной формуле конечных приращений и показать, что  $|f'(c)| < \varepsilon |x-a|^n$ .

## Note 17

a08796d96ad841bd91a8e7daaab1857d

Откуда следует, что  $|f'(c)| < \varepsilon |x-a|^n$  в доказательстве свойства  $n$ -раз дифференцируемой функции (индукционный переход)?

■  $|c-a| < \delta \implies |f'(c)| < \varepsilon |c-a|^n < \varepsilon |x-a|^n$

## Note 18

957fd9747bd84545bd6b1cca723d72ba

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, n \in \mathbb{N}, {}_1 f(a) = 0,$

$$f'(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a.$$

}  
Тогда  $f(x) = {}_1 o((x-a)^{n+1}), \quad x \rightarrow a.$

«<sub>{3}</sub> Формула Тейлора-Пеано »

Пусть <sub>{2}</sub>  $f : D \subset R \rightarrow \mathbb{R}$  и  $f$   $n$  раз дифференцируема в точке  $a$ . <sub>}</sub> Тогда <sub>{1}</sub>

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

}

# Лекция 11.02.22

## Note 1

3bf65c72c3374838aeca626de8a3a4d

Каков первый шаг в доказательстве истинности формулы Тейлора-Пеано?

Обозначить через  $p(x)$  многочлен в формуле:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}_{p(x)} + o((x-a)^n).$$

## Note 2

6f41684761ec41308bf9f95619ec1849

Чему для  $k \leq n$  равна  $p^{(k)}(a)$  в доказательстве истинности формулы Тейлора-Пеано?

$$p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a).$$

## Note 3

72455c0671414c80aca4c9ef2ba63d44

В чем основная идея доказательства истинности формулы Тейлора-Пеано?

По свойству  $n$  раз дифференцируемой функции  $f(x) - p(x) = o((x-a)^n)$ .

## Note 4

db6e4a55afed4c5d95a38869cf9d2e00

Что позволяет применить свойство  $n$  раз дифференцируемой функции в доказательстве формулы Тейлора-Пеано?

$$\forall k \leq n \quad (f(x) - p(x))^{(k)} \Big|_{x=a} = 0$$

## Note 5

8c823210f5c94ab99024c3e8c3d6778a

$$\{^2\Delta_{a,b}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{^1\left\{\begin{array}{ll} [a,b], & a \leq b, \\ [b,a], & a \geq b. \end{array}\right.\}$$

## Note 6

9755fb6343494fa9b0034b4542e518d3

$$\{\widetilde{\Delta}_{a,b}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{^1\left\{\begin{array}{ll} (a,b), & a < b, \\ (b,a), & a > b. \end{array}\right.\}$$

## Note 7

dbb25fcd6e834aa2ae54ec6ddc0c6787

$$\{^2R_{a,n}f\} \stackrel{\text{def}}{=} \{^1f - T_{a,n}f\}$$

## Note 8

0d92b12a18f34554a0251578aa811b7f

### « $\{^3$ Формула Тейлора-Лагранжа »

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a, x \in \mathbb{R}, a \neq x$ ,  $\{^2 f \in C^n(\Delta_{a,x})$ ,  
 $f^{(n)}$  дифференцируема на  $\widetilde{\Delta}_{a,x}$ . Тогда  $\{^1$  найдется  $c \in \widetilde{\Delta}_{a,x}$ ,  
 для которой

$$f(x) = T_{a,n}f(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

}

## Note 9

f9314b4b0e184f52826c8f740c873e21

При  $n = 0$  формула Тейлора-Лагранжа эквивалентна  $\{^1$  теореме Лагранжа.

## Note 10

5fe508cfd3c445c4b15093e8d2c8c504

В чем основная идея доказательства истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

**|** Вычислить производную функции  $F(t) = R_{t,n}f(x)$  и найти точку  $c$  по теореме Коши.

### Note 11

e1a329fbc3ef4c5981773d8baad7d3b1

Для каких  $t$  определяется функция  $F(t)$  в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$t \in \Delta_{a,x}.$$

### Note 12

a4f7e43161cc4c9fb58ac7a250610c50

Для каких  $t$  вычисляется  $F'(t)$  в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$t \in \tilde{\Delta}_{a,x}.$$

### Note 13

73e4df5e1b074010a95ee5dbe0458338

К каким функциям применяется теорема Коши в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$F(t) \text{ и } \varphi(t) = (x - t)^{n+1}.$$

### Note 14

b1d63dae062e4a438ceb891f94a33e96

К каким точкам применяется теорема Коши в доказательстве истинности формулы Тейлора-Лагранжа?

$$\text{К границам отрезка } \Delta_{a,x}.$$

### Note 15

b8f3f99b66794d59b6fa546eb06d7fb3

Какое неявное условие позволяет применить теорему Коши к функциям  $F(t)$  и  $\varphi(t)$  с точках  $a$  и  $x$ ?

$$F(x) = 0, \quad \varphi(x) = 0.$$



## Note 16

e425a1ef13124799b6b391e3884f86f1

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{2e^x\} = \{1 \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)\}.$$

## Note 17

70a13102af174271b95762b24e6b1169

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{2 \sin x\} = \{1 \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})\}.$$

## Note 18

9c528f645b0741ef90f268989f7701eb

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{2 \cos x\} = \{1 \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})\}.$$

## Note 19

90ff22c33f67493fac3fa800e93905f4

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{2 \ln(1+x)\} = \{1 \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)\}.$$

## Note 20

aaf8ef38d3bb409baf7c7fcc1df14f48

$\{3 \text{ Обобщённый биномиальный коэффициент} \}$  задаётся формулой

$$C_{\alpha}^k = \{1 \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!}\}, \quad \alpha \in \{2\mathbb{R}\}.$$

## Note 21

5ed01e7f4e8e4b22adf1929f60e4d4f5

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{2(1+x)^\alpha\} = \{1 \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n) \}.$$

## Note 22

eb36b5f5a2b04e44b4d5b13d2278ff40

Формулу Тейлора-Пеано для  $(1+x)^\alpha$  называют  $\{1$  биномиальным разложением.

## Note 23

c766c427b7e44be8a2e40e872ec7dd2b

$$C_{-1}^k = (-1)^k.$$

## Note 24

82717b22134b4f66b014c17df3ba337c

По формуле Тейлора-Пиано при  $x \rightarrow 0$

$$\{2(1+x)^{-1}\} = \{1 \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n) \}.$$

## Note 25

7d3d35d9fcb344458f0d82ed7b2d940f

Пусть  $\{3$  функция  $f$  удовлетворяет условиям для разложения по формуле Тейлора-Лагранжа. $\} \{2$  Тогда если

$$\forall t \in \widetilde{\Delta}_{a,x} \quad |f^{(n+1)}(t)| \leq M,$$

$\} \text{ то } \{1$

$$|R_{a,n}f(x)| \leq \frac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

$\}$

# Семинар 17.02.22

## Note 1

05fb49aabf444b3daf73947c33bf8f10

$$\int x^n dx = \left( \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \right), \quad (n \neq -1).$$

## Note 2

3eae90c7fe9944e6a9d07784205f0d1d

$$\int \frac{1}{x} dx = (\ln |x| + C).$$

## Note 3

af533d11b4c2421baaad26c4fca61b2a

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \left( \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C \right).$$

## Note 4

8939b90686dc43ae81c37c01fa728294

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm 1}} dx = (\ln |x + \sqrt{x^2 \pm 1}| + C).$$

## Note 5

709b5fa5f404426ea7b67b17dc16f830

$$\int a^x dx = \left( \frac{a^x}{\ln a} + C \right).$$

## Лекция 18.02.22

### Note 1

b55d92bf361d4e31b5e60975656b3fb4

«<sup>{5}</sup> Критерий возрастания функции на промежутке »

Пусть <sup>{4}</sup>  $f \in C\langle A, B \rangle$  и дифференцируема на  $(A, B)$ . Тогда

- <sup>{2}</sup>  $f \nearrow$  на  $\langle A, B \rangle$  <sup>{3}</sup>  $\iff$  <sup>{1}</sup>  $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (A, B)$ .

### Note 2

63e919dff3ba4ea282cb06d25b445300

«<sup>{5}</sup> Достаточное условие строгого убывания функции на промежутке »

Пусть <sup>{4}</sup>  $f \in C\langle A, B \rangle$  и дифференцируема на  $(A, B)$ . Тогда

- <sup>{2}</sup>  $f \searrow$  на  $\langle A, B \rangle$  <sup>{3}</sup>  $\iff$  <sup>{1}</sup>  $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (A, B)$ .

### Note 3

2e3edf0757ba4f72bbdbb5b66dca690d

«<sup>{5}</sup> Критерий постоянства функции на промежутке »

Пусть <sup>{4}</sup>  $f \in C\langle A, B \rangle$  и дифференцируема на  $(A, B)$ . Тогда

- <sup>{2}</sup>  $f$  постоянна на  $\langle A, B \rangle$  <sup>{3}</sup>  $\iff$  <sup>{1}</sup>  $f'(x) = 0 \quad \forall x \in [A, B]$ .

### Note 4

2dfd421d331745a0a8b2da63493d1b4f

Пусть <sup>{3}</sup>  $f, g \in C[A, B]$  и дифференцируемы на  $(A, B)$ . Тогда

Если <sup>{2}</sup>  $f(A) = g(A)$  и

$$f'(x) > g'(x) \quad \forall x \in (A, B),$$

<sup>{1}</sup> то

$$f(x) > g(x) \quad \forall x \in (A, B).$$

}

## Note 5

0f2a5e13f0a2495388e631ac0b4776aa

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется <sup>{2}</sup> точкой максимума функции  $f$ , <sup>{1}</sup> если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) \leq f(a).$$

}

## Note 6

a89063cdc4a34df7aa891ad50a98d0a8

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется <sup>{2}</sup> точкой строгого максимума функции  $f$ , <sup>{1}</sup> если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) < f(a).$$

}

## Note 7

0c2db077ea274453a5c14d982fe1c571

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется <sup>{2}</sup> точкой минимума функции  $f$ , <sup>{1}</sup> если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) \geq f(a).$$

}

## Note 8

3bc6223309d34118a582302414c9632e

Пусть  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$ . Тогда точка  $a$  называется <sup>{2}</sup> точкой строгого минимума функции  $f$ , <sup>{1}</sup> если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap D \quad f(x) > f(a).$$

}

## Note 9

a1e964e24fc6456ca0a297c008405c34

Если <sup>{2}</sup> точка  $a$  является точкой минимума или максимума функции  $f$ , <sup>{1}</sup> то  $a$  называется <sup>{1}</sup> точкой экстремума  $f$ .

## Note 10

98f3cebf02ca464ab3cf9e94355caaa2

### «<sub>{3</sub> Необходимое условие экстремума »

Пусть <sub>{2}</sub>  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f$  дифференцируема в точке  $a$ . Тогда <sub>{1}</sub> если  $a$  является точкой экстремума  $f$ , то  $f'(a) = 0$ . <sub>}</sub>

## Note 11

96502706cad4449ab9ac44074765a384

Точка  $a$  называется <sub>{1}</sub> стационарной точкой функции  $f$ , <sub>}</sub> если <sub>{2}</sub>

$$f'(a) = 0.$$

## Note 12

99ca6c71ff484416941c4e10086ca6ea

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда <sub>{1}</sub> точка  $a \in (A, B)$  называется <sub>{2}</sub> критической точкой, <sub>}</sub> если <sub>{1}</sub> либо  $a$  стационарна для  $f$ , либо  $f$  не дифференцируема в точке  $a$ . <sub>}</sub>

## Note 13

40f1ebf761e14f5ba885b2276d64dae7

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда все <sub>{2}</sub> точки экстремума  $f$ , принадлежащие  $(A, B)$ , <sub>}</sub> лежат в <sub>{1}</sub> множестве её критических точек. <sub>}</sub>

## Note 14

e8adcc7d8b474840907e72b38014fcdc

Пусть  $f \in C[a, b]$ . Тогда

$$\sub{3}{\max f([a, b])} = \sub{1}{\max \{f(a), f(b), \max f(C)\}},$$

где  $C$  — <sub>{2}</sub> множество критических точек  $f$ . <sub>}</sub>

## Note 15

909932c22cec4a5fb5d8cfb506e7dbfb

### «<sub>{4}</sub> Достаточное условие экстремума в терминах $f'$ »

Пусть <sub>{3}</sub>  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f$  непрерывна в точке  $a$  и дифференцируема на  $\dot{V}_\delta(a)$ ,  $\delta > 0$ . Если <sub>{1}</sub>

$$\operatorname{sgn} f'(x) = \operatorname{sgn}(a - x) \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a),$$

<sub>}</sub> то <sub>{2}</sub>  $a$  — точка строго максимума  $f$ . <sub>}</sub>

**«Достаточное условие экстремума в терминах  $f'$ »**

Пусть  $f : \langle A, B \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (A, B)$ ,  $f$  непрерывна в точке  $a$  и дифференцируема на  $\dot{V}_\delta(a)$ ,  $\delta > 0$ . Если {1

$$\operatorname{sgn} f'(x) = \operatorname{sgn}(x - a) \quad \forall x \in \dot{V}_\delta(a),$$

} то {2  $a$  — точка строго минимума  $f$ .