

Интуитивная теория множеств

Note 1

6c0ed6eb23d8405e911650386a84b770

Под $\{\{c2::\text{множеством}\}\}$ понимается $\{\{c1::\text{некоторая, вполне определённая совокупность объектов.}\}\}$

Note 2

5f9814dbb38246348e00fce1554e94a

Два основных способа задания множеств.

■ Перечисление, характеристическое правило.

Note 3

325300814df34c129e29e55cd92829be

$\{\{c2::\text{Пустое множество}\}\}$ есть $\{\{c1::\text{множество, которое не содержит элементов.}\}\}$

Note 4

f4cb071a174b4cd29c7ac0c7cd405265

$\{\{c2::\text{Пустое}\}\}$ множество обозначается $\{\{c1::\emptyset \text{ или } \{\}\}\}$

Note 5

ee3c092ea6f8412982372151ed6a3ef8

Пусть A — множество. $\{\{c1::\text{Само множество } A \text{ и пустое множество}\}\}$ называют $\{\{c2::\text{несобственными подмножествами}\}\}$ множества A .

Note 6

d2d19259b6054a569cee5d5a0b24b0fe

Пусть A — множество. $\{\{c1::\text{Все подмножества } A, \text{ кроме } \emptyset \text{ и } A, \}\}\}$ называют $\{\{c2::\text{собственными подмножествами}\}\}$ множества A

Note 7

02cbf0e734664103a97df0f5c597b8c7

Пусть A — множество. $\{\{c2::\text{Множество всех подмножеств множества } A\}\}$ называется $\{\{c1::\text{булеаном}\}\}$ множества A .

Note 8

ac2c9531b8ad48eabb9e76bac3fdffaa

Пусть A — множество. $\{\{c2::\text{Булеан}\}\}$ множества A обозначается $\{\{c1::\mathcal{P}(A)\}\}$

Note 9

2355b9e8f18a44148a0a3fd9f08c2034

Универсальное множество — есть множество такое, что все рассматриваемые множества являются его подмножествами.

Note 10

446b3cd12ece46568e02af4ed65f3155

Универсальное множество обычно обозначается U или I .

Note 11

c7621865085b4ac5a4b2b24efb11cf87

Приоритет операций над множествами: $\overline{}, \cap, \cup, \dots$

Note 12

6b9f3c8671f2472e9e3b9a20aeb66aa5

Пусть A и B — множества. Для удобства часто используется сокращение

$$AB := A \cap B.$$

Note 13

dc6fc558021f401696123dddc6c61abe

Пусть A и B — множества. Симметрической разностью множеств A и B называется множество

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

}

Note 14

1c0cfd677111482c8d16fb1c43f9f802

Пусть A и B — множества. Симметрическая разность множеств A и B обозначается $A \triangle B$.

Note 15

658fb28e676a412082702daf0103e08e

Пусть A — множество. Дополнение A обозначается \overline{A} .

Note 16

13a0dc7af20b45a4b8d8785debbb106a

Три первых свойства свойства операций объединения и пересечения множеств.

■ Коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность.

Note 17

0ab39012eaa94abcb901e5c26354d65b

Пусть A — множество.

$$A \cap A = \{\{c1: A.\}\}$$

Note 18

99349135847f4ab7a28f76b06715594e

Пусть A — множество.

$$A \cup A = \{\{c1: A.\}\}$$

Note 19

02876f67e1514f6d92d1e32ce2a5673f

Пусть A — множество.

$$A \cup \overline{A} = \{\{c1: U.\}\}$$

Note 20

3303d884a57c4c979ab67f664325626a

Пусть A — множество.

$$A \cap \overline{A} = \{\{c1: \emptyset.\}\}$$

Note 21

c6b6114579204c8e99c5bfbcb80ac53b9

Пусть A — множество.

$$A \cup \emptyset = \{\{c1: A.\}\}$$

Note 22

35fbc385403041a7a92f1a9980d5643f

Пусть A — множество.

$$A \cap \emptyset = \{\{c1: \emptyset.\}\}$$

Note 23

bfb06afa6211c4b10bd2ecffa833b05a2

Пусть A — множество.

$$A \cup U = \{\{c1: U.\}\}$$

Note 24

b5e4ab6a90eb4de38aa91aa27c7c4847

Пусть A — множество.

$$A \cap U = \{\{c1: A.\}\}$$

Note 25

4e1167b5fa7748e68b1a4b9a80eaacb3

Пусть A и B — множества.

$$A_{\{\{c2:: \cup \}\}}(A_{\{\{c3:: \cap \}\}}B) = \{\{c1: A.\}\}$$

«{\[c4:Закон поглощения]\}

Note 26

478752160fb94508a605ed54a8601340

Пусть A и B — множества.

$$A_{\{\{c2:: \cap \}\}}(A_{\{\{c3:: \cup \}\}}B) = \{\{c1: A.\}\}$$

«{\[c4:Закон поглощения]\}

Note 27

84569bc3ab574cb78e9bbc9f21dc6bd6

Пусть A и B — множества.

$$A \cap (B \cup \overline{A}) = \{\{c1: A \cap B.\}\}$$

Note 28

8c46cf622a9840ba818604b1ddcbd74f

Пусть A и B — множества.

$$A \cup (B \cap \overline{A}) = \{c1::A \cup B.\}$$

Note 29

f391250023de4acfa419991a4de9c8ab

Пусть A и B — множества.

$$(A \cup B) \{c2:: \cap \} (A \cup \overline{B}) = \{c1::A.\}$$

«{c3::Закон расщепления}»

Note 30

29ec5d118d8849bea46146efcbbc4473

Пусть A и B — множества.

$$(A \cap B) \{c2:: \cup \} (A \cap \overline{B}) = \{c1::A.\}$$

«{c3::Закон расщепления}»

Note 31

cfe43c6f8ac74a43a3f82ea5e01fee7d

Пусть A — множество.

$$\overline{\overline{A}} = \{c1::A.\}$$

Note 32

edcde29726c04401a88af2ef23f3c264

Пусть A и B — множества.

$$A \setminus B = \{c1::A \cap \overline{B}.\}$$

Note 33

aed19cd8fa0d4ee3abf314b502af697d

Пусть A, B и X — множества.

$$\{c2::X \cup A \subseteq B\} \{c3:: \iff \} \{c1::X \subseteq B \text{ и } A \subseteq B.\}$$

(при решений уравнений относительно X)

Note 34

ec3c6b3684844799a206353c8668876c

Пусть A, B и X — множества.

$$\{\{c2:: A \subseteq X \cap B\}\}\{\{c3:: \Longleftrightarrow\}\}\{\{c1:: A \subseteq X \text{ и } A \subseteq B.\}\}$$

(при решений уравнений относительно X)

Note 35

5f70eba8ec804221a8c31f858c0b43ec

Пусть A, B и X — множества.

$$\{\{c2:: X \cap A \subseteq B\}\}\{\{c3:: \Longleftrightarrow\}\}\{\{c1:: X \subseteq \overline{A} \cup B.\}\}$$

(при решений уравнений относительно X)

Note 36

72ac0b5d9c1746c79264bb9bd3a0b5f2

Пусть A, B и X — множества.

$$\{\{c2:: A \subseteq X \cup B\}\}\{\{c3:: \Longleftrightarrow\}\}\{\{c1:: A \cap \overline{B} \subseteq X.\}\}$$

(при решений уравнений относительно X)

Note 37

9d92e00aafb44695841b52ab137664da

Пусть A, B, C, D и X — множества.

$$\begin{cases} A \subseteq X \subseteq B \\ C \subseteq X \subseteq D \end{cases} \Longleftrightarrow \{\{c2:: A \cup C\}\} \subseteq X \subseteq \{\{c1:: B \cap D.\}\}$$

(при решений уравнений относительно X)

Note 38

ee9afcd63b43416d954d357d1dc689bb

В чём основная идея общего алгоритма для решения систем уравнений со множествами?

Привести систему к виду $AX \cup B\overline{X} = \emptyset$, где A и B не зависят от X .

Note 39

f443d4e12a8745178ba97fd0f1d8772

Пусть A и B — множества.

$$\{\{c3:: A = B\}\}\{\{c4:: \} \iff \}\{\{c1:: A \triangle B\} = \{\{c2:: \emptyset.\}\}$$

Note 40

06c3d3d8c5614af3b760a31c9b94fdc8

Пусть A и B — множества.

$$A \cup B = \emptyset \{\{c2:: \} \iff \}\{\{c1:: A = \emptyset \text{ и } B = \emptyset.\}\}$$

Note 41

73259212f85a4411b131299cc49d90dc

Пусть A и X — множества.

$$AX = \emptyset \iff \{\{c1:: X \subseteq \overline{A}.\}\}$$

(при решений уравнений относительно X)

Note 42

c02302f80f0143d0bb7cdc18b8929288

Пусть B и X — множества.

$$B\overline{X} = \emptyset \iff \{\{c1:: B \subseteq X.\}\}$$

(при решений уравнений относительно X)

Note 43

96e46cd4122448b3a6c8a8543d793a05

Пусть A и B — множества. При каком условии система

$$\begin{cases} AX = \emptyset, \\ B\overline{X} = \emptyset \end{cases}$$

имеет решение?

$$| \quad B \subseteq \overline{A}.$$

Note 44

5e8c77b24b74411e9c9d6769ee278443

Пусть A и B — множества. Каково решение системы

$$\begin{cases} AX = \emptyset, \\ B\overline{X} = \emptyset. \end{cases}$$

$$| \quad B \subseteq X \subseteq \overline{A}.$$

Note 45

f1c5541c7c884dba936d4374ff51af88

Пусть A и B — множества. Как в уравнении $AX \cup B\overline{X} \cup C = \emptyset$ избавиться от «свободного» множества C ?

| $C = \emptyset$ — условие совместности системы.

Note 46

86475fdea01944fba56365048d57b02d

Пусть A и B — множества.

$$(A \times B) \cap (B \times A) = \{\{c2::\emptyset\} \quad \{\{c3:: \iff \} \quad \{\{c1:: A \cap B = \emptyset.\}\}$$

Note 47

8ca45754929648bda3ca5496c7cba70f

Операция $\{\{c3:: \text{декартового произведения}\} \quad \{\{c2:: \text{дистрибутивна}\}\}$ относительно $\{\{c1:: \text{операций } \cap, \cup, \setminus, \Delta.\}\}$

Note 48

ad330727e2cb4c27970e8cb8fcdceb23

Пусть A, B и C — множества. Равны ли множества $(A \times B) \times C$ и $A \times (B \times C)$?

| Их отождествляют и считают равными.

Note 49

06a0896de5284f44bac5ddff2170cbb1

Пусть A и B — множества. Для $\{\{c2:: \text{конечных}\}\}$ множеств,

$$|A \times B| = \{\{c1:: |A| \cdot |B|.\}\}$$

Бинарные отношения

Note 1

cfc293ce41644e75b3df5d21a2bf036d

Пусть A и B — множества. $\{\{c2:: \text{Бинарным отношением}\}\}$ на множествах A и B называется $\{\{c1:: \text{некоторое подмножество } A \times B.\}\}$

Note 2

3ba559fe73cf4c90b5b919ce1a45881a

Четыре способа задания бинарных отношений.

■ Перечисление, правило, матрица, граф.

Note 3

c0ee3ac94a454d748e625d9e8c854763

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение.

$$aRb \stackrel{\text{def}}{\iff} \{\{c1:: (a, b) \in R.\}\}$$

Note 4

cef6486539a64268a1827f863aa7b9e1

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. $\{\{c2:: \text{Обратным отношением к } R\}\}$ называется $\{\{c1:: \text{множество}$

$$\{(b, a) \mid aRb\}.$$

$\}\}$

Note 5

5e2c602b70a3473684a8ea79d93c7d68

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. $\{\{c2:: \text{Обратное отношение к } R\}\}$ обозначается $\{\{c1:: R^{-1}.\}\}$

Note 6

d6e34168370e44feafa7891c93b2df04

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда

$$R^{-1} \subseteq \{\{c1:: B \times A.\}\}.$$

Note 7

86c9a04a7ac14724b416780fec688449

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение.

$$(R^{-1})^{-1} = \{ \{c1: R.\} \}$$

Note 8

e91e90545919488bb2c2ebe373b9e615

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. $\{ \{c2: \text{Областью определения } R\} \}$ называется $\{ \{c1: \text{множество}$

$$\{x \mid \exists y : xRy\}.$$

$\}$

Note 9

08e952c62da84566a99743eb4c6c48a5

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. $\{ \{c2: \text{Область определения } R\} \}$ обозначается $\{ \{c1: D(R), \} \}$ $\{ \{c1: \delta_R\} \}$ или $\{ \{c1: \text{dom } R.\} \}$

Note 10

13e35bd817d9438690104754dc4d016d

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. $\{ \{c2: \text{Областью значений } R\} \}$ называется $\{ \{c1: \text{множество}$

$$\{y \mid \exists x : xRy\}.$$

$\}$

Note 11

051cc32e89b94bbebd49875c952f6b5b

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. $\{ \{c2: \text{Область значений } R\} \}$ обозначается $\{ \{c1: E(R), \} \}$ $\{ \{c1: \rho_R\} \}$ или $\{ \{c1: \text{im } R.\} \}$

Note 12

c0426f6bec33477e9bc759610c4d426b

Пусть $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ — бинарные отношения. $\{ \{c2: \text{Композицией } R \text{ и } S\} \}$ называется $\{ \{c1: \text{множество}$

$$\{(a, c) \mid \exists b : aRb \text{ и } bSc\}.$$

$\}$

Note 13

41418613a7934da4ab810abfcdf24e1a

Пусть $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ — бинарные отношения. $\{\{c2::$
композиция R и $S\}$ обозначается $\{\{c1::$

$$R \circ S.$$

$\}\}$

Note 14

78bbe389ea094b0aad40c370c5092937

Является ли операция композиции бинарных отношений коммутативной?

■ Нет.

Note 15

63f83037312e4f29a81de945fb387d06

Является ли операция композиции бинарных отношений ассоциативной?

■ Да.

Note 16

1530beb1e1c24540a8be6f534775cca0

Пусть $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ — бинарные отношения.

$$(R \circ S)^{-1} = \{\{c1::S^{-1} \circ R^{-1}.\}\}$$

Note 17

10fae1eae25a48a2998a9be7d6af2e4d

Пусть $R \subseteq \{\{c3::A \times A\}\}$. Отношение R называется $\{\{c2::$ несимметричным, $\}\}$ если $\{\{c1::$ оно не симметрично, не асимметрично и не антисимметрично. $\}\}$

Note 18

8e02e778a9a5426fa89340cd47a6a0c5

Пусть $R \subseteq \{\{c3::A \times A\}\}$ — бинарное отношение. Отношение R называется $\{\{c2::$ интранзитивным, $\}\}$ если $\{\{c1::$

$$aRb \text{ и } bRc \implies \overline{aRc}.$$

$\}\}$

Note 19

fdb65b9ca3c4a5c8c62ece25b744e92

Пусть $R \subseteq \{\{c3::A \times A\}\}$ — бинарное отношение. Отношение R называется $\{\{c2::\text{нетранзитивным},\}\}$ если $\{\{c1::\text{оно не транзитивно и не интранзитивно},\}\}$

Note 20

f3fcca348ef844da9d3cf01b1e27fe1f

Матрица A называется $\{\{c2::\text{бинарной},\}\}$ если $\{\{c1::\text{все её элементы принадлежат множеству } \{0, 1\},\}\}$

Note 21

25d02bbd94644780a0346254f22a07df

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, $\{\{c3::A \text{ и } B \text{ конечны},\}\}$ $\{\{c2::\text{Матрицей отношения } R\}\}$ называется $\{\{c1::\text{бинарная матрица}$

$$\left(a_i R b_j\right) \sim |A| \times |B|.$$

$\}\}$

Note 22

ce9cf9f0367d40f9bbdd914eb95eb396

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, A и B конечны. $\{\{c2::\text{Матрица отношения } R\}\}$ обозначается $\{\{c1::\|R\|,\}\}$

Note 23

1f23045998c647aca7a97bcf2a5b5d31

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, $\{\{c3::x \in A,\}\}$ $\{\{c1::\text{Множество } \{b \mid x R b\},\}\}$ называется $\{\{c2::\text{образом элемента } x \text{ при отношении } R,\}\}$

Note 24

65b799e6a5bc4b01bff56d2146031199

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, $x \in A$. $\{\{c2::\text{Образ элемента } x \text{ при отношении } R\}\}$ обозначается $\{\{c1::R(x),\}\}$

Note 25

477523df314842d1ad7c5a4d978f2f7a

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, $\{\{c3::x \in B,\}\}$ $\{\{c1::\text{Множество } \{a \mid a R x\},\}\}$ называется $\{\{c2::\text{прообразом элемента } x \text{ при отношении } R,\}\}$

Note 26

5150bf45802b4bad925b14f51a0d2f24

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, $x \in B$. $\{\{c2:: \text{Прообраз элемента } x \text{ при отношении } R\}\}$ обозначается $\{\{c1:: R^{-1}(x)\}\}$

Note 27

3348d69b0cf149a8a70f5ec94b05b306

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, $\{\{c2:: X \subseteq A\}\}$

$$\{\{c3:: R(X)\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1:: \bigcup_{x \in X} R(x)\}\}$$

Note 28

5c26a7f17db242d7b8db989512093cc6

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение, $\{\{c2:: X \subseteq B\}\}$

$$\{\{c3:: R^{-1}(X)\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1:: \bigcup_{x \in X} R^{-1}(x)\}\}$$

Note 29

5b5ba1073a2e479f8b8eca3f6c2c7329

Пусть A множество. $\{\{c1:: \text{Отношение } \{(x, x) \mid x \in A\}\}\}$ называется $\{\{c2:: \text{тождественным отношением на } A\}\}$

Note 30

c1e1caa30e724485b938627008bc28d0

Пусть A множество. $\{\{c2:: \text{Тождественное отношение на } A\}\}$ обозначается $\{\{c1:: E\}\}$

Note 31

1dc3c3c6dff84c6f8ba496ed57840291

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда R $\{\{c2:: \text{рефлексивно}\}\}$ тогда и только тогда, когда $\{\{c1::$

$$E \subseteq R.$$

$\}\}$

«В терминах множеств»

Note 32

ebabe4fca55b4c1c89734c5895e06ff8

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда R $\{\{c2::$ анти-рефлексивно $\}$ тогда и только тогда, когда $\{\{c1::$

$$R \cap E = \emptyset.$$

$\}$

«В терминах множеств»

Note 33

0b173912f3f54d539053ec72781173bf

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда R $\{\{c2::$ симметрично $\}$ тогда и только тогда, когда $\{\{c1::$

$$R = R^{-1}.$$

$\}$

«В терминах множеств»

Note 34

1d0d52561f0b48f8a96ed987369af728

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда R $\{\{c2::$ анти-симметрично $\}$ тогда и только тогда, когда $\{\{c1::$

$$R \cap R^{-1} \subseteq E.$$

$\}$

«В терминах множеств»

Note 35

92c95593c51a4ac08d44f6be1cf69e5e

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда R $\{\{c2::$ асимметрично $\}$ тогда и только тогда, когда $\{\{c1::$

$$R \cap R^{-1} = \emptyset.$$

$\}$

«В терминах множеств»

Note 36

3fb92e0a21764e979cf2dce095e95aea

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда R $\{\{c2: \text{транзитивно}\}\}$ тогда и только тогда, когда $\{\{c1: \}$

$$R \circ R \subseteq R.$$

$\}\}$

«В терминах множеств»

Note 37

045dab85eeaa4728b61896649dc1ba75

Пусть $A, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Тогда

$$\{\{c2: A \leq B\}\} \xLeftrightarrow{\text{def}} \{\{c1: a_{ij} \leq b_{ij} \quad \forall i, j.\}\}$$

Note 38

3b1e7f3609054643ae820caae66db2a

Пусть $A, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Тогда

$$\{\{c2: A < B\}\} \xLeftrightarrow{\text{def}} \{\{c1: A \leq B \text{ и } A \neq B.\}\}$$

Note 39

cfdc6aac0b1d4a87b2bec698ca44ce30

Пусть $A, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Матрицы A и B называют $\{\{c2: \text{несравнимыми,}\}\}$ если $\{\{c1: \text{не выполняется ни } A \leq B, \text{ ни } B \leq A.\}\}$

Note 40

303fa2bd38f446e59e6690ebc8c9c824

Бинарную операцию $\{\{c2: \text{«или»}\}\}$ так же называют логистическим $\{\{c1: \text{сложением.}\}\}$

Note 41

46107ba23b0a4fcdaaa341d70b37861c

Бинарную операцию $\{\{c2: \text{«и»}\}\}$ так же называют логистическим $\{\{c1: \text{умножением.}\}\}$

Note 42

1c8c345204344de49b5b669a648c128d

Операция поэлементного умножения матриц называется произведением Адамара.

Note 43

5510b762349a41cc87225739c6fe6dc0

Пусть $A, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Произведение Адамара матриц A и B обозначается $A \circ B$ или $A \odot B$.

Note 44

5054e224483f4cc28f2739f6fad9f517

Пусть $R, S \subseteq A \times B$ — бинарные отношение.

$$\|R \cap S\| = \|R\| \odot \|S\|$$

Note 45

93467a16ee87438cbc954b8b71d23aa4

Пусть $R, S \subseteq A \times B$ — бинарные отношение.

$$\|R \cup S\| = \|R\| + \|S\| \quad (\text{с логистическим сложением}).$$

Note 46

1c75356f6fe44393ae1e2c195bed3c1e

Пусть $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ — бинарные отношения.

$$\|R \circ S\| = \|R\| \cdot \|S\| \quad (\text{с логистическим сложением}).$$

Note 47

525cce9b6e944f94911754eec1fc824b

Пусть $R, S \subseteq A \times B$ — бинарные отношение.

$$R \subseteq S \iff \|R\| \leq \|S\|$$

(в терминах матриц)

Note 48

1b250fddc61e44539e477e7d17458d9b

Пусть $R \subseteq A \times B$ — бинарное отношение. Тогда R транзитивно тогда и только тогда, когда

$$\|R\|^2 \leq \|R\| \quad (\text{с логистическим сложением}).$$

}}

«В терминах матриц»

Note 49

bb1c4dba55ad47adbacfd250e1f39101

Пусть $R \subseteq A \times A$ — отношение эквивалентности. Множество классов эквивалентности R обозначается $[A]_R$.

}}

Note 50

c54eb7123d974c8aba9972163019b4ac

Пусть $R \subseteq A \times A$ — отношение эквивалентности, $a \in A$. Класс эквивалентности, порождённый a , обозначается $[a]$.

Note 51

b21c1b2e3c504807a89717a4205b3fdf

Пусть A — множество. Разбиение множества A обозначается $\langle A \rangle$.

Note 52

3d8bf9b65a4b4898be5460faaecab86

Пусть $R \subseteq A \times A$ — бинарное отношение. Транзитивным замыканием R называют наименьшее транзитивное отношение на A , включающее R .

Note 53

08c79ddd7572454f9ecc2f3580a39674

Пусть $R \subseteq A \times A$ — бинарное отношение. Если R транзитивно, то транзитивное замыкание R есть само R .

Note 54

e7b56866ed8e4192a45f157195f949e4

Пусть $R \subseteq A \times A$ — бинарное отношение. Транзитивным сокращением R называется минимальное отношение R' на A такое, что транзитивное замыкание R' совпадает с транзитивным замыканием R .

{{c3: Диаграмма Хассе}} — это вид диаграмм, используемый
 для представления {{c1: конечного частично упорядоченного
 множества}} в виде {{c2: графа его транзитивного сокращения.
 }}

Элементы комбинаторики

Note 1

48bfce03d7414c5ab08f51dd7162fe63

[[c2: r -элементный набор из n -элементного множества]] называется [[c1: выборкой объёма r из n элементов.]]

Note 2

9c40042b9af64db3823fd0fc687379f5

[[c2: Выборку объёма r из n элементов]] так же называют [[c1: (n, r) -выборкой.]]

Note 3

7b9c414597ef428981257c73511e44d2

[[c2: (n, r) -выборка, в которой элементы могут повторяться,]] называется [[c1: (n, r) -выборкой с повторениями.]]

Note 4

6afeb348dbbf4ce7a258ad26ba469c48

[[c2: (n, r) -выборка, в которой элементы попарно различны,]] называется [[c1: (n, r) -выборкой без повторений.]]

Note 5

ef4dbbc893164d0db276530cb20c94c7

[[c2: Упорядоченная (n, r) -выборка]] называется [[c1: (n, r) -перестановкой.]]

Note 6

514e05b8ce994556a7d4f31540bfec43

Число [[c1: (n, r) -перестановок без повторений]] обозначается [[c2:

$$P(n, r).$$

]]

Note 7

400452c068e84e42a0865821bd703a7b

Число [[c2: (n, r) -перестановок с повторениями]] обозначается [[c1:

$$\hat{P}(n, r).$$

]]

Note 8

376b9f21513d43118cf832e0ad6f8ef0

Неупорядоченная (n, r) -выборка называется (n, r) -сочетанием.

Note 9

6470ab31727449d8a82512cafaea2837

Число (n, r) -сочетаний без повторений обозначается

$$C(n, r)$$

}}

Note 10

ca7c36f0138749fb90d8876a44c92a24

Число (n, r) -сочетаний с повторениями обозначается

$$\hat{C}(n, r)$$

}}

Note 11

59712aabfb56413995a990d0c381fbee

Пусть $n \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}$.

$$(n)_r \stackrel{\text{def}}{=} n(n-1) \cdots (n-r+1).$$

Note 12

a10b62e86c38446c85f4bb8c5807d6c2

Биномиальный коэффициент из n по r обозначается

$$C_n^r \quad \text{или} \quad \binom{n}{r}.$$

Note 13

3221712b5dda4ebe9c522f4508804522

$$\binom{n}{r} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{(n)_r}{r!}$$

Note 14

e1ac7a181662466fa92a7768e3bb6899

$$P(n, r) = \llbracket \{c1::(n)_r\} \rrbracket$$

Note 15

4722cda874c44899a9bc36727640274a

$$\hat{P}(n, r) = \llbracket \{c1::n^r.\} \rrbracket$$

Note 16

bdb9dd6722f644019fedc6c94810b129

$$C(n, r) = \llbracket \{c1::\binom{n}{r}.\} \rrbracket$$

Note 17

a46501a9e6f54cbb15eb513c9b73039

$$\hat{C}(n, r) = \llbracket \{c1::\binom{n+r-1}{n-1}.\} \rrbracket$$

Алгебра логики

Note 1

d782cd98cdeb44098d0d1c31a6912d8d

Кратко булев набор $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ обозначается $\{\{c1:\tilde{\alpha}^n\}\}$ или $\{\{c1:\tilde{\alpha}.\}\}$

Note 2

b4eabdf1da9430caa51dea1f7973ebb

$\{\{c2:\text{Множество всех двоичных наборов длины } n\}\}$ называют $\{\{c1:n\text{-мерным булевым кубом.}\}\}$

Note 3

ae679a4256e04958a9d0d03ce4b174a2

$\{\{c2:n\text{-мерный булев куб}\}\}$ обозначается $\{\{c1:B^n\}\}$ или $\{\{c1:E_2^n\}\}$

Note 4

c06059c4d3014e8f8d7762ecb2e7fb4e

Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in B^n$. $\{\{c2:\text{Расстоянием Хэмминга между } \tilde{\alpha}^n \text{ и } \tilde{\beta}^n\}\}$ называется $\{\{c1:\text{число координат, в которых наборы } \tilde{\alpha} \text{ и } \tilde{\beta} \text{ различны.}\}\}$

Note 5

4b632fb9309f40b5b4286d3acbc0f06d

Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in B^n$. $\{\{c2:\text{Расстояние Хэмминга между } \tilde{\alpha} \text{ и } \tilde{\beta}\}\}$ обозначается $\{\{c1:\rho(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}).\}\}$

Note 6

37fb9e894285459ea68b457c8ce5d2d3

Булевы наборы $\tilde{\alpha}^n$ и $\tilde{\beta}^n$ называются $\{\{c2:\text{соседними,}\}\}$ если $\{\{c1:$

$$\rho(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 1.$$

$\}\}$

Note 7

96ae235391374f19821a21b56b6d8b98

Булевы наборы $\tilde{\alpha}^n$ и $\tilde{\beta}^n$ называются $\{\{c2:\text{противоположными,}\}\}$ если $\{\{c1:$

$$\rho(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = n.$$

$\}\}$

Note 8

463c6576cc6b4f2cb06d5c75b36c3db1

Множество всех булевых функций, зависящих от переменных x_1, \dots, x_n будем обозначать через

$$P_2(X^n).$$

}}

Note 9

d4d14bf7854d445e80552d7c67d03d4f

$$\|P_2(X^n)\| = 2^{2^n}.$$

Note 10

152863b499e64f64b2374c749fbde8ad

Константы $0, 1$ являются нульместными булевыми функциями.

Note 11

d06f0289418d4a41b071c552a48bff09

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Тогда

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

называются аргументами функции f .

Note 12

a0b4e4b264844402aed619c4fd37ca24

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Что есть $T(f)$?

Таблица, в которой слева — значения аргументов, справа — значения функции.

Note 13

bf9b50dc17e84201a627f5c871ea6c31

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Таблица $T(f)$ называется таблицей истинности f .

Note 14

1122c8a455b64cf789b394df752b821e

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Что есть $\Pi_{k,n-k}(f)$?

Таблица, в которой слева — значения k аргументов, сверху — значения остальных аргументов, на пересечении — значение функции.

Note 15

903d8fda79124586a7240910bb5d8a70

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. В каком порядке идут значения аргументов в таблице $\Pi_{k,n-k}$?

Слева направо, сверху вниз.

Note 16

53de4b3157f34550908c2cc6c8752a37

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Что есть N_f ?

Множество наборов $\tilde{\alpha}$, для которых $f(\tilde{\alpha}) = 1$.

Note 17

ec43c333201b45f28e9a03f6a2828c27

Как булева функция задаётся в виде вектора значений?

Значения функции в лексикографическом порядке следования наборов аргументов.

Note 18

6b8ed8864e3f468bb75dec0ad534e2b6

Как строится разложение булевой функции по нескольким переменным?

Аналогично разложению по одной построить дизъюнкцию по всем возможным значениям этих переменных.

Note 19

3915fbd594044a7782a5ecfb1b697c23

Пусть f — булева функция. Переменная x_i называется фиктивной, если f выражается формулой, не содержащей x_i .

Note 20

ca616b103ccb43dbbb362f5dcf0fa7f6

Пусть f — булева функция. Переменная x_i называется $\{\{c2::$ существенной, $\}$ если $\{\{c1::$ она не является фиктивной, $\}$

Note 21

1a853308fb53438c836240f876a13076

Пусть f — булева функция. Как показать, что x_i является существенной переменной?

Найти два набора аргументов, отличающихся только значением x_i , для которых отличается значение f .

Note 22

b171f4d5373543008b3c7165b170294d

Пусть $x_i \in X^n$ и $\sigma \in B$. Тогда

$$\{\{c2::x_i^\sigma\}\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::\begin{cases} x_i, & \sigma = 1, \\ \bar{x}_i, & \sigma = 0. \end{cases}\}\}$$

Note 23

3ff8ee76361d4f8aa2dc6817fb8e23c5

Пусть $x_i \in X^n$ и $\sigma \in B$. Выражение x_i^σ называется $\{\{c1::$ буквой, $\}$

Note 24

434c03fe1f394ebf9ed47f45f7432dcc

Что называется конъюнкцией над множеством переменных?

Конъюнкция набора букв из этих переменных.

Note 25

285409914ff4434dba7d33024928ee2c

Что называется дизъюнкцией над множеством переменных?

Дизъюнкция набора букв из этих переменных.

Note 26

08a4fb8d8f014dfab25d4e1bb8a7f2e3

Конъюнкция (или дизъюнкция) над множеством переменных называется $\{\{c2::\text{элементарной},\}\}$ если она $\{\{c1::\text{не содержит двух одинаковых переменных.}\}\}$

Note 27

69bac32971cb4720860b4dd4a9d453cb

$\{\{c2::\text{Число букв}\}\}$ в элементарной конъюнкции (или дизъюнкции) называется $\{\{c1::\text{её рангом.}\}\}$

Note 28

085748c48aca434f80ee81ccc4326795

Что считают элементарной конъюнкцией нулевого ранга?

■ Константу 1.

Note 29

54299e611ec9467c80fdf0edb992ffda

Что считают элементарной дизъюнкцией нулевого ранга?

■ Константу 0.

Note 30

7daec66acbc147049ae871ee63127e67

$\{\{c1::\text{Дизъюнкция попарно различных элементарных конъюнкций}\}\}$ называется $\{\{c2::\text{дизъюнктивной нормальной формой.}\}\}$

Note 31

9da6ac44d6864608adffeff2f2653b9e

$\{\{c1::\text{Конъюнкция попарно различных элементарных дизъюнкций}\}\}$ называется $\{\{c2::\text{конъюнктивной нормальной формой.}\}\}$

Note 32

4b63a16430be4e91a44d687409d1a59f

Дизъюнктивная нормальная форма называется $\{\{c2::\text{совершенной},\}\}$ если $\{\{c1::\text{все её элементарные конъюнкции имеют максимальный ранг.}\}\}$

Note 33

7f6e14160f284a26b1685ab037b732a0

Конъюнктивная нормальная форма называется $\{\{c2::\text{совершенной},\}$ если $\{\{c1::\text{все её элементарные дизъюнкции имеют максимальный ранг.}\}$

Note 34

5f9836f8024544a29c0d75faa28110d8

Что для элементарной конъюнкции означает обладание максимальным рангом?

■ Она содержит все переменные.

Note 35

5c8cca9d57834de1a77e826c87fcff5f

Что называется минимальным термом набора переменных?

■ Элементарная конъюнкция, содержащая все эти переменные.

Note 36

487bd0adfeec4611abb3c25da2b5c9d7

$\{\{c2::\text{Минимальный терм}\}$ сокращается как $\{\{c1::\text{минтерм.}\}$

Note 37

4c650846a2ca498cb6f414f00874d0c6

В чём основная особенность любого минтерма?

■ Он истинен только ровно на одном наборе аргументов.

Note 38

6353970c4054404c9fe9936241a3f8d2

В чём основная особенность любой элементарной дизъюнкции максимального ранга?

■ Она ложна ровно на одном наборе аргументов.

Note 39

291d8c80606b4957b2615d312164f8da

Какая элементарная дизъюнкция обращается в ноль ровно на одном наборе аргументов?

■ Элементарная дизъюнкция максимального ранга.

Note 40

76f3e85c81f14d4fa7c9d4699fd71df7

Элементарная $\{\{c1::\text{дизъюнкция}\}\}$ максимального ранга обращается в $\{\{c2::\text{ноль}\}\}$ ровно на одном наборе аргументов.

Note 41

c5ad27ca1aaa4a5f98e04fa49b506bd4

Элементарная $\{\{c1::\text{конъюнкция}\}\}$ максимального ранга обращается в $\{\{c2::\text{единицу}\}\}$ ровно на одном наборе аргументов.

Note 42

bbfcc84390d84f24abd0aee0aa1dfc13

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Тогда

$$f(\tilde{x}^n) = \{\{c1::x_i \cdot f|_{x_i=1} \vee \bar{x}_i \cdot f|_{x_i=0}\}\}$$

« $\{\{c2::\text{Теорема разложения для д.н.ф.}\}\}$ »

Note 43

45d478dc3b0b46789b3b2af3d10d0c35

Каждая булева функция $\{\{c3::\text{единственным образом}\}\}$ представляется в виде $\{\{c1::\text{совершенной}\}\}$ дизъюнктивной (или конъюнктивной) нормальной формы $\{\{c2::\text{своих аргументов}\}\}$

Note 44

3115335543484943b10f4139847114fa

Каждая булева функция единственным образом представляется в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы своих аргументов. В чём ключевая идея доказательства?

■ С.д.н.ф. состоит из минтермов, отвечающих единицам в векторе значений.

Note 45

ad0588753e0342ea901fb670f955419b

Как строится с.д.н.ф. по таблице значений булевой функции?

Для каждой единицы строится соответствующий мин-терм.

Note 46

86b0370b79784d5cb1f61f8d43ea62ca

Как строится с.к.н.ф. по таблице значений булевой функции?

Для каждого нуля строится соответствующая элементарная дизъюнкция.

Note 47

d5f6af188d8a41b2a3a644065c3ffa60

Логическая операция $\{\{c2::\langle\text{не-и}\rangle\}$ так же называется $\{\{c1::\text{штрихом Шеффера}\}$

Note 48

5cb3b093852847ad992d8f92afed8778

В булевой алгебре, $\{\{c2::\text{штрих Шеффера}\}$ обозначается $\{\{c1::x_1 \mid x_2.\}$

Note 49

53029bbdc0b455e801cee6510a98bf5

В чём смысл штриха Шеффера?

Аргументы не могут быть истинными одновременно.

Note 50

77f305f399f947bd90023950db2c7072

Пусть $\tilde{x} \in B^2$. Как читается выражение $\langle x_1 \mid x_2 \rangle$?

x_1 и x_2 не совместны.

Note 51

ec1d6d17cbb045b8abb57d404f0e5314

Логическая операция $\{\{c2::\langle\text{не-или}\rangle\}$ так же называется $\{\{c1::\text{стрелкой Пирса}\}$

Note 52

5bc24294b87949fe93f07f9db9363cc5

В булевой алгебре, $\{\{c2::\text{стрелка Пирса}\}$ обозначается $\{\{c1::x_1 \downarrow x_2.\}$

Note 53

8c3f9b67e62f4865a81c11d4cf2258c8

В чём смысл стрелки Пирса?

■ Оба аргумента ложны.

Note 54

44e41888826f48bb87b5d52cffdf82

Пусть $\tilde{x} \in B^2$. Как читается выражение « $x_1 \downarrow x_2$ »?

■ Ни x_1 , ни x_2 .

Note 55

811fe08112ea4d4184e59731f1744d49

В алгебре логики, $\{\{c2: \text{сложение по модулю } 2\}\}$ обозначается $\{\{c1: \oplus.\}\}$

Note 56

e2f54e00eb6649a2924ef3362262984c

В алгебре логики, $\overline{a \sim b} = \{\{c1: a \oplus b.\}\}$.

Note 57

c2e62b1e91d7494ba8a272bc7d96ae90

В алгебре логики, $\overline{a \oplus b} = \{\{c1: a \sim b.\}\}$.

Note 58

87a39833e41348ee966b516f50698494

$\{\{c2: \text{Многочлен над полем } \mathbb{Z}_2\}\}$ называется $\{\{c1: \text{многочленом Жегалкина.}\}\}$

Note 59

a4c0e96040054110938808830ac5d33d

При каком условии $A \vee B = A \oplus B$?

■ Если $AB = 0$.

Note 60

f4915d1be02b42fca57ca6ad6b668668

Если $AB = 0$, то

$$A \oplus B = \{\{c1: A \vee B.\}\}$$

Note 61

01f571fbf6304f23885f6a2cf670778f

Пусть m_1 и m_2 — два различных минтерма одних и тех же переменных. Тогда

$$m_1 \oplus m_2 = \{\{c1:m_1 \vee m_2.\}\}$$

Note 62

bb47104c9aca4ac4acf915353d4ec25d

Как по полином Жегалкина можно привести к с.д.н.ф.?

Представить его в виде суммы попарно различных минтермов и заменить сложение на дизъюнкцию.

Note 63

0c540bab6af449ec8bf3c2c8e211452b

Как по карте Вейча строится строится таблица значений полинома Жегалкина?

Каждое из слагаемых наносится на таблицу, как импликанта, и внутри каждой клетки удаляются пары единиц.

Note 64

6bda2a19f81f481ea8880a737a3ff3fa

Любая булева функция $\{\{c2: \text{единственным образом}\}\}$ представляется в виде многочлена $\{\{c1: \text{Жегалкина.}\}\}$

Note 65

59a8d454f30342909e9db0c643c83e4a

$\{\{c2: \text{Длиной}\}\}$ полинома Жегалкина называется $\{\{c1: \text{число слагаемых в его записи.}\}\}$

Note 66

58b6e8c19b7e4e02aa6fd2ff9accd7af

Какие есть основные способы построения полинома Жегалкина для данной булевой функции?

Метод неопределённых коэффициентов; преобразование вектора значений; алгоритм Паскаля.

Note 67

90f0eb74c2594473a47dc084cdceeee0

В каком порядке стоит брать наборы аргументов при построении полинома Жегалкина методом неопределённых коэффициентов?

■ Лексикографическом, начиная с нуля.

Note 68

22dd666ef1ac46b6a3db9f23cd06b74e

В чём состоит метод преобразования вектора значений для построения полинома Жегалкина?

■ Последовательно преобразовывать блоками все большей величины.

Note 69

3fd377445ff746d4bf5d09dfa3611128

Какое преобразование используется при построении полинома Жегалкина методом преобразования вектора значений?

■ Делим блок пополам и прибавляем левую часть к правой.

Note 70

81aaa6e743d74b498974ea1716a6fb32

Какое сложение используется при построении полинома Жегалкина методом преобразования вектора значений?

■ По модулю двух.

Note 71

44b6a657f85a489eb1e9d33ec8995171

Какого размера блоки берутся при построении полинома Жегалкина методом преобразования вектора значений?

■ Начиная с двух и на каждом следующем шаге в два раза больше.

Note 72

a9bd9cf64cea4452bfa49092ad3436d8

В чём состоит метод Паскаля построения полинома Жегалкина?

Построить треугольник аналогичный треугольнику Паскаля.

Note 73

94806c084ac540ef804d5444799594f0

Как строиться треугольник при построении полинома Жегалкина методом Паскаля?

На каждом шаге складываются по модулю двух соседние элементы вектора.

Note 74

b1d7be08723b44eaa0f476e513b31931

Где в построенном треугольнике находятся искомые коэффициенты при построении полинома Жегалкина методом Паскаля?

Левые элементы сверху вниз.

Note 75

b69324ff24e643199e1b880f783ff767

В каком порядке берутся коэффициенты полинома Жегалкина при представлении его в виде вектора коэффициентов?

В лексикографическом порядке следования булевых массок вхождения элементов в группы.

Note 76

bfd91e076ac840e49fdb06ac940c1e2b

Как дизъюнкция выражается полиномом Жегалкина?

$x \oplus y \oplus xy$.

Note 77

61a8295f62404faa91e19a69262e7a15

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Импликантой функции f называется такая элементарная конъюнкция k её аргументов, что

$$k \vee f(\tilde{x}^n) = f(\tilde{x}^n).$$

}}

Note 78

a3e3fca754924589b36ea95c9edd20fc

Что означает условие $k \vee f(\tilde{x}^n) = f(\tilde{x}^n)$ из определения импликанты k булевой функции?

■ $k \rightarrow f(\tilde{x}^n).$

Note 79

8f3f29bfc6d54b9ca09a2fd1fdd6e58b

Импликанта булевой функции называется простой, если после отбрасывания любой из букв она перестаёт быть импликантой.

Note 80

4a3577b789674da58ba03a52b5710ea3

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Дизъюнкция всех простых импликант функции f называется сокращённой д.н.ф. функции f .

Note 81

c5d072cd661d45e4b1027aadbe203045

Конъюнкции, входящие в д.н.ф., называются её слагаемыми.

Note 82

1acef456faac42fd8420cc99d8890e5b

Число слагаемых д.н.ф. называется её длиной.

Note 83

c1dcc531f8c44588bfc596aae2905e6b

Сумма рангов всех слагаемых д.н.ф. называется её сложностью.

Note 84

8f3adf33c7d542cb89e2c7f19554d84c

Д.н.ф. называется $\{\{c3::\text{минимальной},\}\}$ если она имеет наименьшую $\{\{c1::\text{сложность}\}\}$ среди $\{\{c2::\text{всех д.н.ф., эквивалентных ей.}\}\}$

Note 85

1dd146ddf117426cacc4a76fa773d84d

Д.н.ф. называется $\{\{c3::\text{кратчайшей},\}\}$ если она имеет наименьшую $\{\{c1::\text{длину}\}\}$ среди $\{\{c2::\text{всех д.н.ф., эквивалентных ей.}\}\}$

Note 86

e0998ae22e13457aa7bedbe548e0ce57

Д.н.ф. называется $\{\{c2::\text{тупиковой},\}\}$ если $\{\{c1::\text{отбрасывание любых её слагаемого или буквы приводит к д.н.ф., не эквивалентной исходной.}\}\}$

Note 87

3c3cb501fe524d508cee8a396e246de5

Любая минимальная д.н.ф. является $\{\{c1::\text{тупиковой.}\}\}$

Note 88

41b825d38ba944ac959b52db25423ee8

Любая кратчайшая д.н.ф. является $\{\{c1::\text{тупиковой.}\}\}$

Note 89

381196254f5b4ff88f7cb1dbe58cdf33

$\{\{c1::\text{Двоичный код},\}\}$ в котором $\{\{c2::\text{соседние значения представляются соседними булевыми наборами}\}\}$, называется $\{\{c3::\text{кодом Грея.}\}\}$

Note 90

9fb6eca8a3984a83ac41b14b95e52ea7

Какое табличное представление функции используется для построения её сокращений д.н.ф.?

■ Карта Карно.

Note 91

0c27efc060274a43bd146a48ba517e7d

Чем, в первую очередь, является карта Карно?

■ Табличное представление булевой функции.

Note 92

404849406d374f84b0027730b5a93b8c

Чем карта Карно отличается от обычного табличного представления?

■ Наборы значений аргументов расположены в коде Грея.

Note 93

f49b1a9385c14febbe5a75682af3073

Как называется табличное представление булевой функции, в котором наборы значений переменных на каждой из сторон прямоугольника расположены в коде Грея?

■ Карта Карно.

Note 94

6f39d187479f4790bb4e1a151406918b

Как по другому называют карты Карно?

■ Диаграммы Вейча.

Note 95

7ec72a3172754a4c9b75c2c12151406d

Для каких функций имеет смысл использование карты Карно для построения сокращённой д.н.ф.?

■ Не более четырёх аргументов.

Note 96

3367571a83104bc8aa72c23b88036a5c

Что на карте Карно представляет импликанты булевой функции малого числа аргументов?

■ Прямоугольники размера 2^k , покрывающие только единицы.

Note 97

73244fdc1053472da90d49b391d90c61

Какие из соответствующих прямоугольников на карте Карно отвечают **простым** импликантам булевой функции малого числа аргументов?

■ Максимальные по включению.

Note 98

3d6c9e0393a241a7a81798b38ba03769

Как по данному прямоугольнику на карте Карно строится импликанта функции?

■ Берутся переменные, сохраняющие значение внутри прямоугольника, с соответствующими знаками отрицания.

Note 99

dcec278578344605aeecc4341ee1fbccf

Сколько переменных входит в импликанту, отвечающую прямоугольнику размера 2^k на карте Карно?

■ [число переменных] — k

Note 100

12df0cc8ac6448aeaabca21d69e8ac58

Как строится сокращённая д.н.ф. по карте Карно?

■ На карте находятся все прямоугольники, отвечающие простым импликантам, и из них строится сокращённая д.н.ф.

Note 101

84f5a9f698ca42048f6b5e5a6c52a18d

Как по карте Карно построить все тупиковые д.н.ф. функции?

■ Построить к.н.ф., где каждый множитель — это дизъюнкция имён импликант, покрывающих данную единицу, и привести её к д.н.ф.

Note 102

ec5b60a019984beeb30acf754aa9bf67

При построении всех возможных тупиковых д.н.ф. функции по карте Карно, что отвечает искомым д.н.ф. в построенной д.н.ф. из импликант?

- Каждое отдельное слагаемое.

Note 103

8213d7c755db4307b3e66b4f49906322

Что используется вместо карты Карно, когда булева функция зависит от большого числа аргументов?

- Алгоритм Квайна.

Note 104

72dd709a9ecb4ffdaa0fffd682758ab6

В чём, в общих чертах, состоит алгоритм Квайна?

- Пошагово применять операции склеивания и поглощения ко всем парам слагаемых.

Note 105

6dc04a146f6c4bc786292e7eeaeabf1

С какого представления функции начинается алгоритм Квайна?

- Совершенная д.н.ф.

Note 106

793a3497f4734adf9c710e04dd9c6905

До какого момента применяются операции склеивания в алгоритме Квайна?

- Пока это возможно.

Note 107

4e9b5e650af741f5b2d73141d0add6f6

В каком порядке применяются операции склеивания и поглощения в алгоритме Квайна?

Сначала склеивание ко всем возможным парам, потом так же поглощение и так далее.

Note 108

1cc8d30b9006404d862ba491dd696589

Как применяется операция склеивания в алгоритме Квайна?

Без удаления склеиваемых слагаемых.

Note 109

b1ebc3b297184053aaabf561ed08c9d0

Что есть результат выполнения алгоритма Квайна?

Сокращённая д.н.ф.

Note 110

93c3aff28286465d8f1c04e2309d4857

Что перечисляется в левой части таблицы Квайна?

Простые импликанты булевой функции.

Note 111

195e9ac7ffd840a9bd372abb29260386

Что перечисляется в верхней части таблицы Квайна?

Значения, на которых функция обращается в единицу.

Note 112

f44386bc3fe1460b9c4b4d9245cc3b46

Что стоит на пересечениях в таблице Квайна?

Значения импликант на наборах.

Note 113

bd6c452a75a54f8fac85d08a227081e9

Как по таблице Квайна строится кратчайшая д.н.ф. функции?

Выбрать набор строк минимальной длины, “покрывающий” каждый из столбцов.

Note 114

971484331eaf449c8a4e1ec0c3de9141

Как называется метод построения списка всех тупиковых форм по таблице Квайна?

Метод Петрика.

Note 115

393692dc6cea40e6b3f18ac2ef7fc2a8

Какую задачу решает метод Петрика?

Построения списка всех тупиковых форм по таблице Квайна.

Note 116

f97546626ab54e16a04456b748a30b7b

В чём состоит метод Петрика?

Построить к.н.ф., представляющую всевозможные способы покрытия таблицы Квайна, и привести её к д.н.ф.

Note 117

2429e5dfb85944919fb847dec0c29a8a

В чём основная практическая ценность минимальных и кратчайших д.н.ф.?

Они потенциально упрощают схемы.

Note 118

8a13a643152146efa28d7fa36d4a69ec

Что есть суперпозиция некоторого множества булевых функций?

Функция, полученная из них подстановками и отождествлением переменных.

Note 119

e66c3ade07d24d54b78cb6132ec9809d

Как осуществляется подстановка булевой функции φ в булеву функцию f ?

■ Заменой i -го аргумента f значением φ .

Note 120

822544c72aa94dfbb0bae4f1cf967c00

Как осуществляется отождествление переменных булевой функции f ?

■ Заменой i -го аргумента j -м аргументом.

Note 121

82290cd117c449c3a01e149103d64c10

Рангом суперпозиции булевых функций называется минимальное число подстановок и отождествлений, необходимых для её построения.)

Note 122

72c248c379834f5b86701f9b7d0bc07b

Пусть K — некоторое множество функций алгебры логики. Замыканием множества K называется множество всех функций, являющихся суперпозициями функций из K .)

Note 123

3c14f05d74b3432087dc8d02b5e32d2f

Пусть K — некоторое множество функций алгебры логики. Замыкание множества K обозначается $[K]$.)

Note 124

a9c3b7f892cc4f0ba7e429a2ae9bfc25

Пусть K — некоторое множество функций алгебры логики. Множество K называется замкнутым, если $[K] = K$.)

Note 125

3887b6c690454ba19288df70564724d1

Пусть K — некоторое множество функций алгебры логики, $P \subseteq K$. Множество P называется полным в K , если $[P] = K$.)

Note 126

b0796681f6e74371ba03e541d9186f62

Какая функционально полная система называется минимальной?

Из которой нельзя убрать ни одной функции, не потеряв полноты.

Note 127

64c261c434554b9b96c6e84127be3261

Как называется функционально полная система, из которой нельзя убрать ни одной функции, не потеряв при этом полноты?

Она называется минимальной.

Note 128

dfab0998eba1421791a148018fcb5dc

Какая функционально полная система называется избыточной?

Из которой можно убрать по крайней мере одну функцию, не потеряв полноты.

Note 129

798eec77073f470a847b8d4d3adadabd

Как называется функционально полная система, из которой можно убрать по крайней мере одну функцию, не потеряв при этом полноты?

Она называется избыточной.

Note 130

abec035010394fca3c01ed0592b93d7

Для каких множеств булевых функций вводят понятие базиса?

Замкнутых.

Note 131

10f0be9e531440ef893c16460c0dcbb7

Что называют базисом в замкнутом множестве булевых функций?

■ Минимальное функционально полное подмножество.

Note 132

de4b908cd0bb47eeaf4e602b05abbf91

Как называется минимальная функционально полная система?

■ Базис.

Note 133

af64c664f09649279116490ffa23fb45

Для каких множеств булевых функций вводят понятие предполного класса?

■ Замкнутых.

Note 134

c3746fb92f5249caac3137d588d49641

Чем в первую очередь является предполный класс в множестве булевых функций?

■ Некоторое подмножество данного множества.

Note 135

7dc74903f1714cf9864548f5962278f3

Сколько свойств должно выполняться в определении предполного класса в множестве булевых функций?

■ Два.

Note 136

31a086ce5eba46cf925f8230422a3162

Каково первое свойство в определении предполного класса в множестве булевых функций?

■ Подмножество не полно в изначальном множестве.

Note 137

e46801717d68478cab32edf6affc2bd0

Каково второе свойство в определении предполного класса в множестве булевых функций?

■ Добавление любой новой функции в класс делает его полным.

Note 138

3d895adaef7a443aa99a5e9d8e5fe09d

Сколько всего существует предполных классов в P_2 ?

■ Ровно пять.

Note 139

8715e50cadda45ca9047f6e0eff2e87b

Что можно сказать о пресечении двух замкнутых множеств функций алгебры логики?

■ Оно замкнуто.

Note 140

b1c5e8a567764fb48b6fcbf6215f31d4

Что можно сказать об объединении двух замкнутых множеств функций алгебры логики?

■ В общем случае ничего.

Note 141

7fd05ce54904435eb18294179811b1f7

Чем примечательно множество булевых функций $\{x, \bar{x}\}$?

■ Оно замкнуто.

Note 142

da842f2d910a4a338420a0c994752d6f

Чем примечательно множество булевых функций $\{0, 1\}$?

■ Оно замкнуто.

Note 143

0a6c832056ee4d2b96e0566585d86be0

Две формулы алгебры логики называются $\{\{c2::\text{конгруэнтными},\}\}$ если $\{\{c1::\text{одна из них может быть получена из другой заменой переменных.}\}\}$

Note 144

3655826e951542a3bb98d89da369c6bb

Пусть f — формула алгебры логики. $\{\{c2::\text{Множество всех формул, конгруэнтных } f,\}\}$ обозначается $\{\{c1::\{f\}.\}\}$

Note 145

d4e78c956bef4290883dfc89f3533b13

Класс булевых функций, $\{\{c2::\text{сохраняющих } 0 \text{ (или } 1)\},\}$ обозначается $\{\{c1::T_0 \text{ (или } T_1).\}\}$

Note 146

964153dc496c462396cb9600c28b120d

Класс $\{\{c2::\text{монотонных}\}\}$ булевых функций обозначается $\{\{c1::M.\}\}$

Note 147

33abe044eade417591ad8dea4aa970ed

Почему класс монотонных булевых функций не совпадает с замыканием системы \wedge, \vee ?

■ Замыкание не включает в себя константы.

Note 148

fdac4e7fcde642d3a96938c08b180ae5

Класс $\{\{c2::\text{линейных}\}\}$ булевых функций обозначается $\{\{c1::L.\}\}$

Note 149

5d2bf26b265b4bcb2ebe7ceaf6f6d72

Класс $\{\{c2::\text{самодвойственных}\}\}$ булевых функций обозначается $\{\{c1::S.\}\}$

Note 150

e76e73941c6348b09e32f473c6449dda

Булева $f(\tilde{x}^n)$ называется $\{\{c2: \text{линейной по аргументу } x_n, \}\}$ если $\{\{c1: \}$

$$f = x_n \oplus \varphi(\tilde{x}^{n-1}).$$

$\}\}$

Note 151

70b10874d9274fc58691cfa4137a2174

Как вектору значений булевой функции f определяется линейность f по аргументу x ?

Любые два набора, соседние по x , отвечают различным значениям f .

Note 152

1f25f83507a342ebbb345d6f11c3009e

Что можно сказать о булевой функции, если она линейна по каждому из своих аргументов?

Функция линейна и существенно зависит от всех переменных.

Note 153

c1af37cf021b4a39b021704d1b1fcac1

Булева функция $\{\{c2: \text{является линейной}\}\}$ $\{\{c3: \text{тогда и только тогда, когда}\}\}$ $\{\{c1: \text{она линейна по каждой существенной переменной.}\}\}$

Note 154

356ba7d44d8b49398fdb67b91eb9f69

Как по вектору значений булевой функции f определить, является ли f линейной?

Проверить линейность по каждой существенной переменной.

Note 155

5c410303d05a49c887c990c5c87e48aa

Булева функция

$$f(\tilde{x}^3) = \{\{c2: x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3\}\}$$

называется $\{\{c1: \text{функцией голосования}\}\}$ или $\{\{c1: \text{медианой.}\}\}$

Note 156

8e347949c0fc404784b2590bacf445d0

Какую булеву функцию задаёт вектор значений (00010111)?

■ Медиана (т.е. функция голосования.)

Note 157

c1d5614e17164b85b05a5b1f66141be2

Как выглядит вектор значений булевой функции голосования трёх аргументов?

■ (00010111)

Note 158

167d624339934ec4b6ef5d7d371c3f0b

Как булева функция голосования трёх аргументов выражается полиномом Жегалкина?

■ Так же как в д.н.ф., но со сложением вместо дизъюнкции.

Note 159

3bcb426f9e644bf4a437317ea872af32

Какую булеву функцию задаёт полином $xy + xz + yz$?

■ Медиана (т.е. функция голосования.)

Note 160

72c92ccef1e4efcb4d1cbdf6cbdbeb

Каким предполным классам принадлежит функция голосования?

■ Всем, кроме L .

Note 161

b00edb7be33c4e53a0002df39ad38246

Каким предполным классам принадлежит штрих Шеффера?

■ Никаким.

Note 162

ab34a11be4a84ecd83fba4efe21a1a4b

Каким предполным классам принадлежит стрелка Пирса?

■ Никаким.

Note 163

b8b92c9bdab345beb1054bbefbd52f9a

Булев набор $\tilde{\alpha}^n$ называется `{{c2: кососимметричным,}}` если `{{c1: любые его противоположные компоненты различны.}}`

Note 164

907e8ec071e1475cba926ab704b02e3e

Вектор значений `{{c2:самодвойственной}}` булевой функции `{{c1: кососимметричен.}}`

Note 165

2dc890637442459bbeb16a4d4f314545

Как в граф-схеме пропозициональной формулы отображаются ассоциативные операции?

■ Как вершины с бóльшим числом детей.

Note 166

009a0d1cf2fe4f6489b4d1bbc8a875ca

Как в граф-схеме пропозициональной формулы отображается отрицание?

■ Если аргумент — функция, то как отдельная вершина; если аргумент — переменная, то вместе с переменной.

Note 167

20876b12bfc648a39d2d11fb797ea4c0

Что называется глубиной граф-схемы пропозициональной формулы?

■ Длина самого длинного пути от корня до листа.

Note 168

00c34cb95532448bbba2ba3566d4aac1

Что называется порядком пропозициональной формулы?

Глубина её граф-схемы.

Note 169

c3359f1109804dcf90388b490b0fb124

Пропозициональная формула называется абсолютно минимальной, если она имеет наименьшее число вхождений переменных среди всех формул, ей эквивалентных.

Note 170

e385f5a21d024947ad5e15aff62d9b75

Пусть f — булева функция. Пропозициональная формула, выражающая f , называется формой f .

Note 171

75428f6ae54b4e218e1ca00539722cdd

На какие основные классы делятся формы булевых функций?

Нормальные (к.н.ф. и д.н.ф.); формы высших порядком.

Note 172

a7b15509a760489186d355995c0812d6

Что называют изображающим числом булевой функции?

Вектор её значений, рассматриваемый как двоичное число.

Note 173

0ac2f2079def4ecd9451306eb30cb757

Изображающее число булевой функции f обозначается $\#f$.

Note 174

e95394679b4843fe8d8b7caf167c06b7

Что называется базисом изображающего числа?

Упорядоченный набор переменных, по которому строится вектор значений.

Note 175

ecd92f16f82e4f74ae8775686c1fd291

Базис изображающего числа называется {{c2: минимальным, }} если {{c1: все его переменные существенны.}}

Note 176

1ee3f5a071fe483eba726d0043494e09

Как найти изображающее число конъюнкции булевых функций?

Выравнивать базисы и поэлементное «и» изображающих чисел.

Note 177

a4d67204bb2344ad8090ebbc57d96ac6

Как найти изображающее число дизъюнкции булевых функций?

Выравнивать базисы и поэлементное «или» изображающих чисел.

Note 178

248b825a74bd452f9b1a3862c9d48636

Как строится матричное числовое представление системы булевых функций?

Выравнивать базисы и по строкам по порядку изображающие числа булевых функций.

Note 179

ad715c9be23946e6a0d7982d9b5e088c

Что называют ω -числом системы булевых функций?

Двоичное число, образованное i -м столбцом матричного числового представления.

Note 180

2d4313cc5c8243c3971ddf2b5ff20b31

Какая часть столбца значений отвечает младшим разрядам ω -числа системы булевых функций?

■ Нижняя.

Note 181

30c0d125b10d4a9ca69f744aa13bca18

Какая часть столбца значений отвечает старшим разрядам ω -числа системы булевых функций?

■ Верхняя.

Note 182

7d5f0a97328d45b3b3b5b87ec583bde7

Что называют ω -набором системы булевых функций?

■ Набор ω -чисел в естественном порядке.

Note 183

8c3599fc7d7948caad0e7459e157e9c2

Базис ω -набора системы булевых функций называется $\{\{c2::$ минимальным, $\}$ если $\{\{c1::$ любая его переменная существенна для какой-то функции из системы, $\}$

Note 184

4e5a446a47284614844a2ff4d0a9ac7e

Однозначно ли восстанавливается система булевых функций по её ω -набору?

■ Нет.

Note 185

37a8bd655dc142429fc184aea244588d

Однозначно ли восстанавливается система булевых функций по её ω -набору с известным базисом?

■ Нет.

Note 186

b41aa8c41cc8453aa9f62c2ff77e6251

Почему система системы булевых функций не всегда однозначно восстанавливается по её ω -набору с известным базисом?

Всегда можно добавить тождественный ноль в начало системы.

Note 187

971ae8c71b5f43048b1df9eb30cc854f

Как гарантировать однозначность восстановления системы булевых функций по её ω -набору?

Фиксировать базис и число функций.

Note 188

a1439a2e51b14886b00b692316b16d0d

Система булевых функций называется $\{\{c_2\}$ независимой, если $\{\{c_1\}$ в её ω -набор входит не менее $2^{\text{[кол-во функций]}}$ различных значений. $\}$

Note 189

d4330bc2ab574eab90042703997e3d89

Какие системы булевых функций не могут быть независимыми?

С числом функций превышающим число аргументов.

Note 190

82eb19bc8e18446a9511af30049d0948

Если число булевых функций в системе строго больше числа их аргументов, то $\{\{c_1\}$ система не может быть независимой. $\}$

Note 191

2aef3676aca944adaeb728c3096e1d68

Сколько существует видов зависимости между двумя булевыми функциями?

■ 15.

Note 192

fef5f74bb09f4795b56d82d74ece12d4

Чем определяется вид зависимости между двумя булевыми функциями?

■ Вхождением чисел $\{0, 1, 2, 3\}$ в ω -набор.

Note 193

53972f2f2c204eefbf6cb67c6fe82b0d

Почему видов зависимости между двумя булевыми функциями именно 15?

■ Количество вариантов вхождения чисел $\{0, 1, 2, 3\}$ в ω -набор.

Note 194

dc31c715d8a145019227bf86bfb3995a

Какой смысл несёт минтерм, составленный из булевых функций некоторой системы?

■ Он характеризует вхождение соответствующего ω -числа в ω -набор.

Note 195

f784bf3fe5064f0e9d8104337a8c5b92

Как называется минтерм, составленный из булевых функций некоторой системы?

■ ω -функция.

Note 196

55d44e3658d942bb8976bbffa043ea7b

ω -функция системы, $\{\{c2\}$: характеризующая вхождение числа i в ω -набор $\}$, обозначается $\{\{c1\}$: ω_i ; $\cdot\}$

Note 197

aa789101360c4f2ca7cca5cbd2bdbbba

Что можно сказать о функции ω_i , если число i входит в ω -набор системы булевых функций?

■ $\omega_i \neq 0$.

Note 198

626e3172d4074a0bbec6bc0bafaa9f85

Что можно сказать о функции ω_i , если число i не входит в ω -набор системы булевых функций?

■ $\omega_i \equiv 0$.

Note 199

3b0e55432255422f8966c9481b13ea6e

Что называется явным видом логической зависимости системы булевых функций?

■ Тавтология над множеством функций системы.

Note 200

dd6a80e6af2d40739923603831b59367

Как называется тавтология над множеством булевых функций зависимой системы?

■ Явный вид логической зависимости.

Note 201

d895d0925b0a461f814c85b676f70f08

В каком виде на практике записывается явный вид логической зависимости системы булевых функций $\{f_i\}_{i=1}^n$?

■ $F(f_1, f_2, \dots, f_n) = 1$.

Note 202

14c0775bcd4fba9a8511c305173c8a

Как строится явный вид логической зависимости системы булевых функций?

■ Дизъюнкция ненулевых ω -функций есть тавтология.

Note 203

a3c0a4add24146c8b1d474d40dde1673

Как строится вектор значений функции, выражающей явный вид логической зависимости системы булевых функций?

■ Как маска вхождений чисел из $[0 : 2^n - 1]$ в ω -набор.

Note 204

b7e3560c12c7429daf7148e621741abe

Что, фактически, означает логическая зависимость системы булевых функций?

■ Существование нетривиальной тавтологии над множеством функций этой системы.

Булевы алгебры

Note 1

20f3d9e66cae48b4872cde6c9ed57d3a

Что есть верхняя граница в контексте произвольного частично упорядоченного множества?

■ Элемент \geq любому элементу множества.

Note 2

43fa1e0fee2c4a718e26e0c7f9c37c46

Что есть нижняя граница в контексте произвольного частично упорядоченного множества?

■ Элемент \leq любому элементу множества.

Note 3

0ac55444db6e4fed8fa19d402da0fde0

Что есть супремум в контексте произвольного частично упорядоченного множества?

■ Наименьшая из верхних границ.

Note 4

7f565979844841de8441229417e3e1c8

Что есть инфимум в контексте произвольного частично упорядоченного множества?

■ Наибольшая из нижних границ.

Note 5

b6e17bbaad124d3ebd6e98b8381a867f

Какое множество рассматривается в определении решётки?

■ Частично упорядоченное.

Note 6

99e77ba59fe64260b79e25d9f28cad08

Какое частично упорядоченное множество называется решёткой?

Любое двухэлементное подмножество имеет \sup и \inf .

Note 7

37a3e12e05de4cdfab62d0dea07344d1

Пусть (X, \leq) — решётка, $a, b \in X$. Тогда

$$\{\{c2::a \vee b\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::\sup \{a, b\}\}.\}$$

Note 8

c9da1f844e3f4bd9bbe116283730ceeb

Пусть (X, \leq) — решётка, $a, b \in X$. Тогда

$$\{\{c2::a \wedge b\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\{c1::\inf \{a, b\}\}.\}$$

Note 9

95e0104c61f1411a8b36c0dccc9a0c7d

Решётку так же можно определить как универсальную алгебру с операциями $\{\{c1::\wedge \text{ и } \vee.\}\}$

Note 10

647880d6a2d84657b6ed1d688cf8a568

Какие аксиомы должны выполняться в определении решётки как универсальной алгебры?

Идемпотентность, коммутативность, ассоциативность, поглощение.

Note 11

a9dc77aa008449b2a79f45c128715ce9

В определении решётки $\{\{c1::\text{свойство идемпотентности}\}\}$ на самом деле выводится из $\{\{c2::\text{свойства поглощения}\}\}$

Note 12

a70eaa64be014d1f8d32db2187ac39b0

$\{\{c1::$

$$a \wedge a = a \quad \text{и} \quad a \vee a = a.$$

$\}\}$

« $\{\{c2::\text{Идемпотентность}\}\}$ » (из определения решётки)

Note 13

3d74bd246a8448588f6d80ab75840d4e

Пусть (X, \leq) — решётка, $a, b \in X$. Тогда

$$\{\{c2::a \leq b\}\} \iff a \wedge b = \{\{c1::a\}\}.$$

Note 14

900809a351c54ff4a39993d52ae1c388

Пусть (X, \leq) — решётка, $a, b \in X$. Тогда

$$\{\{c2::a \leq b\}\} \iff a \vee b = \{\{c1::b\}\}.$$

Note 15

33c337eccc8e4e5e8457ad2312f7a0ce

Решётка называется $\{\{c2::\text{дистрибутивной},\}\}$ если $\{\{c1::\text{в ней } \wedge \text{ и } \vee \text{ обоюдно дистрибутивны.}\}\}$

Note 16

e6915cd9a90b49cd8bba81443ba0a14ab

$\{\{c2::\text{Нулём}\}\}$ $\{\{c3::\text{частично}\}\}$ упорядоченного множества называется $\{\{c1::\text{его наименьший элемент.}\}\}$

Note 17

12dd64fc8d0648eca210d44a0b7e5ae5

Ноль частично упорядоченного множества обозначается $\{\{c1::\mathbf{0.}\}\}$

Note 18

730dc345dc804811be6c1f82b9350a94

$\{\{c2::\text{Единицей}\}\}$ $\{\{c3::\text{частично}\}\}$ упорядоченного множества называется $\{\{c1::\text{его наибольший элемент.}\}\}$

Note 19

543c12d0c8214d79ac9fca56bb2ec02e

Единица частично упорядоченного множества обозначается $\{\{c1::\mathbf{1.}\}\}$

Note 20

b4bef54da8aa41d1863424cc97398a77

Пусть A — множество. Тогда ноль $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ — это $\{\{c1::\emptyset.\}\}$

Note 21

8c05502489844ebb8fa500e583edd7d1

Пусть A — множество. Тогда единица $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ — это $\{\{c1::A.\}$

Note 22

94ed508a73f945fc8a6b4c1803cef774

Пусть (X, \leq) — решётка, $x, y \in X$. Элементы x и y называются $\{\{c2::\text{дизъюнктивными},\}$ если $\{\{c1::$

$$x \wedge y = \mathbf{0}.$$

$\}$

Note 23

ef9dbbf66ec64b659e16cdb4bb830f5e

Пусть (X, \leq) — решётка, $x, y \in X$. Элемент y называется $\{\{c2::$ дополнением $x,\}$ если $\{\{c1::$

$$x \wedge y = \mathbf{0} \quad \text{и} \quad x \vee y = \mathbf{1}.$$

$\}$

Note 24

eb16dfe04f534fcd95dfce6b0eab9636

Для каких решёток имеет смысл понятие дополнения?

■ Для решёток с нулём и единицей.

Note 25

2b49c7f09eeb4fa09c205e6ef5416e6b

Для начала, булева алгебра — это $\{\{c1::\text{решётка},\}$

Note 26

e823cfd66b9a4b7aba2bcfeb6ae82e0c

Какую решётку называют булевой алгеброй?

■ Дистрибутивную; с нулём и единицей; каждый элемент имеет дополнение.

Note 27

520a3543220b49dea92ab712105e5b01

Как называют дистрибутивную решётку с нулём и единицей, каждый элемент которой имеет дополнение?

■ Булева алгебра.

Note 28

55a7f39372324f8692538470e13cebb7

В определении $\{\{c3: \text{булевой алгебры}\} \{\{c2: \text{свойство поглощения}\}\}$ можно заменить на $\{\{c1: \text{закон тождественности}\}\}$

Note 29

7c150397485f4e128ed7a0aa7d34f6cc

$\{\{c1::$

$$a \wedge 1 = a \quad \text{и} \quad a \vee 0 = a.$$

$\}\}$

« $\{\{c2: \text{Закон тождественности}\}\}$ »
(из определения булевой алгебры)

Note 30

5486cf3db94f4129bf68eed1e3194939

Каждый элемент булевой алгебры имеет $\{\{c1: \text{единственное дополнение}\}\}$

Note 31

eb156d1ea036435a89006401851c38d6

Пусть (X, \leq) — булева алгебра, $x \in X$. $\{\{c2: \text{Дополнение } x\}\}$ обозначается $\{\{c1: \overline{x}\}\}$

Note 32

2b88d7541f5641d5ac8623f8a78c3384

Каждый элемент булевой алгебры имеет единственное дополнение. В чём ключевая идея доказательства?

■ Умножить \overline{x} на $x \vee x^*$, где x^* — второе дополнение.

Note 33

6baeed8e7301491ea3dfca0b6fd7750d

Для булевых алгебр верны $\{\{c1: \text{все основные законы}\}\}$ алгебры логики.

Note 34

4faa85785e62481db5f40d0026177f6e

В чём ключевая идея доказательства законов Де-Моргана для булевых алгебр?

Показать, что правая часть является дополнением по определению.

Note 35

d7959d4251d34780bf02493d717f2c6a

Пусть (X, \leq) — булева алгебра, $f, g : X^n \rightarrow X$. Функции f и g называются взаимно двойственными, если

$$f(x_1, \dots, x_n) = \overline{g(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n})}.$$

}}

Note 36

13cfa6ef0b5649518e5f73d626669239

Пусть (X, \leq) — булева алгебра, $f : X^n \rightarrow X$. Функция, двойственная к f , обозначается f^* .

Note 37

dd63d9bebef6405bad499b8ac612b3d2

Пусть (X, \leq) — булева алгебра, $f : X^n \rightarrow X$.

$$(f^*)^* = f.$$

Note 38

f46b68627d9a4a49ae7759f86e1198b1

Пусть (X, \leq) — булева алгебра, $f : X^n \rightarrow X$. Функция f называется самодвойственной, если $f^* = f$.

Note 39

f94e35db4a9047a7bee032a5cae511d0

Пусть $f : B^n \rightarrow B$. Если

$$f = (\alpha_1, \dots, \alpha_{2^n}),$$

то

$$f^* = (\bar{\alpha}_{2^n}, \dots, \bar{\alpha}_1).$$

Note 40

cdf74506714e476ca5dfe2e59883d032

Пусть (X, \leq) — булева алгебра. $0^* = \llbracket c1::1 \rrbracket$.

Note 41

7a361ce9cbe84f77b236a38d96ee29a6

Пусть (X, \leq) — булева алгебра. $1^* = \llbracket c1::0 \rrbracket$.

Note 42

a83c28cd41a247e0905cb9b46bc30c39

Пусть (X, \leq) — булева алгебра. $\wedge^* = \llbracket c1::\vee \rrbracket$.

Note 43

32ec500412874f4cb81569a5483da5c9

Пусть (X, \leq) — булева алгебра. $\vee^* = \llbracket c1::\wedge \rrbracket$.

Note 44

1ed5cffeea17343ef9953a3bed3081904

В алгебре логики, $\oplus^* = \llbracket c1::\sim \rrbracket$.

Note 45

c7ec94fd1e224455bb8338bc967651b5

В алгебре логики, $\sim^* = \llbracket c1::\oplus \rrbracket$.

Note 46

6d5ed061caee4a21b5e098a197019176

В алгебре логики, $\mid^* = \llbracket c1::\downarrow \rrbracket$.

Note 47

d99e4bd6874d47aeb0185f58610c8ab8

В алгебре логики, $\downarrow^* = \llbracket c1::\mid \rrbracket$.

Note 48

abf23bd834914587b24eb8d0cf857c59

Пусть $f : B \rightarrow B$ и $f(x) = x$. Тогда $f^* = \llbracket c1::f \rrbracket$.