

評卷參考

本文件供閱卷員參考而設，並不應被視為標準答案。考生以及沒有參與評卷工作的教師在詮釋文件內容時應小心謹慎。

一般閱卷原則

1. 評卷時，閱卷員須跟循評卷參考的評分標準給分，這是十分重要的。很多時考生會運用評卷參考以外的方法而得到正確答案，一般來說，只要運用合理的方法而取得正確答案，該考生應可獲得該部分的**所有分數**（除題目特別指明特定方法外）。閱卷員應有耐性地評閱評卷參考以外的解題方法。
2. 在評卷參考中，分數會分為下列三類：

「M」分	使用正確方法的得分；
「A」分	正確答案的得分；
沒有「M」或「A」的分	正確地完成證題或推演得題目所給的答案的得分。

某些題目由數部分組成，而較後部分的答案卻需依賴較前部分所得的結果。在這情況下，若考生因為前部分錯誤的結果而導致後部分的答案錯誤，但卻能運用正確的方法去解題，則方法正確的步驟可給「M」分，而相應的答案將沒有「A」分（除特別指明外）。
3. 為方便閱卷員評卷，評卷參考已盡量詳盡。當然，考生的答案多不會如評卷參考般清楚列寫出來，諸如欠缺某幾個步驟或將步驟隱含於字裏行間。如遇到類似情況，閱卷員應運用他們的專業知識去判斷是否給分。一般來說，如考生的答案顯示他已運用相關的概念或技巧，則該部分應予給分。
4. 評卷時遇有不清楚的地方，應以考生的利益為依歸。
5. 評卷參考中，**塗上陰影的部分**代表可省略的步驟，**有外框的部分**代表運用不同方法的答案。所有分數答案必須化簡。

試卷一

解	分	備註
<p>1. $\frac{5}{h+k} = \frac{k}{h-3}$ $5(h-3) = k(h+k)$ $5h-15 = hk+k^2$ $5h-hk = 15+k^2$ $h = \frac{15+k^2}{5-k}$</p>	<p>1M 1M 1A</p>	<p> 給將 h 放在一邊 或等價</p>
<p>$\frac{5}{h+k} = \frac{k}{h-3}$ $\frac{h+k}{h+k} = \frac{h-3}{h-3}$ $\frac{5}{5} = \frac{k}{k} = \frac{-3}{k} = \frac{k}{5}$ $h\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{k}\right) = \frac{-3}{k} - \frac{k}{5}$ $h\left(\frac{k-5}{5k}\right) = \frac{-15-k^2}{5k}$ $h = \frac{15+k^2}{5-k}$</p>	<p>1M 1M 1A</p>	<p> 給將 h 放在一邊 或等價</p>
<p>2. $\frac{x^{-8}y}{(x^7y^9)^{-6}}$ $= \frac{x^{-8}y}{x^{-42}y^{-54}}$ $= x^{-8-(-42)}y^{1-(-54)}$ $= x^{34}y^{55}$</p>	<p> ----- (3)</p>	<p> 給 $(a^h)^k = a^{hk}$ 或 $(ab)^l = a^l b^l$ 給 $\frac{c^p}{c^q} = c^{p-q}$ 或 $d^{-r} = \frac{1}{d^r}$ 1A ----- (3)</p>
<p>3. 250 包普通裝芝士的最小可取總重量 $= (0.22 - 0.005)(250)$ $= 53.75 \text{ kg}$ $> 53.65 \text{ kg}$ 因此，該宣稱不正確。</p>	<p> 1M+1M 1A</p>	<p> 必須顯示理由</p>
<p>留意 $\frac{53\,600+50}{250}$ $= 214.6 \text{ g}$ $< 215 \text{ g}$ 因此，該宣稱不正確。</p>	<p> 1M+1M 1A</p>	<p> 必須顯示理由</p>
<p>留意 $\frac{53\,600+50}{220-5}$ ≈ 249.5348837 < 250 因此，該宣稱不正確。</p>	<p> 1M+1M 1A</p>	<p> 必須顯示理由</p>
	<p>----- (3)</p>	

解	分	備註
<p>4. (a) $3x+2 > \frac{4x-5}{2}$ $6x+4 > 4x-5$ $6x-4x > -5-4$ $2x > -9$ $x > \frac{-9}{2}$ $3x-2 < 7$ $x < 3$</p> <p>因此，可得 $\frac{-9}{2} < x < 3$。</p> <p>(b) 4</p>	<p>1M</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>----- (4)</p>	<p>給將 x 放在一邊</p> <p>$x > -4.5$</p>
<p>5. 設 x 及 y 分別為在該渡輪上男乘客人數及原本的女乘客人數。</p> $\begin{cases} y = (1+40\%)x \\ x = (1+40\%)(y-24) \end{cases}$ <p>故此，可得 $x = 1.4(1.4x - 24)$。</p> <p>求解後，可得 $x = 35$。</p> <p>因此，在該渡輪上男乘客人數為 35。</p>	<p>} 1A+1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p>	<p>給得一元線性方程</p>
<p>設 x 為在該渡輪上男乘客人數。</p> <p>故此，在該渡輪上原本的女乘客人數為 $(1+40\%)x$。</p> $x = (1+40\%)((1+40\%)x - 24)$ $x = 1.4(1.4x - 24)$ <p>求解後，可得 $x = 35$。</p> <p>因此，在該渡輪上男乘客人數為 35。</p>	<p>1A</p> <p>1M+1A</p> <p>1A</p>	<p>1M 給得一元線性方程</p>
<p>在該渡輪上男乘客人數</p> $= \frac{(1+40\%)24}{(1+40\%)^2 - 1}$ $= 35$	<p>1M+1A+1A</p> <p>1A</p> <p>----- (4)</p>	<p>{ 1M 給分數 + 1A 給分子 + 1A 給分母</p>

解	分	備註
8. (a) $\angle CAE = \angle DBE$ [(內)錯角, $AC \parallel DB$] $\angle AEC = \angle BED$ [對頂角] $\angle ACE = \angle BDE$ [Δ內角和] $\triangle ACE \sim \triangle BDE$ (AAA)		(AA) [等角]
評分標準: 情況 1 任何附有正確理由的正確證明。 情況 2 任何未附有理由的正確證明。	2 1	
(b) $\frac{BE}{BD} = \frac{AE}{AC}$ (藉 (a)) $\frac{20 - AE}{15} = \frac{AE}{10}$ $AE = 8 \text{ cm}$ 留意 $AC > AE > CE$ 。 AC^2 $= 10^2$ $= 100$ $AE^2 + CE^2$ $= 8^2 + 7^2$ $= 113$ 所以, 可得 $AE^2 + CE^2 \neq AC^2$ 。 由此, $\triangle ACE$ 不是一直角三角形。 藉 (a), $\triangle BDE$ 不是一直角三角形。	1M 1M 1A -----(5)	必須顯示理由
9. (a) $49 - (20 + a) = 27$ $a = 2$ 平均值 $= 36$ 眾數 $= 33$	1M 1A 1A	
(b) 所求的概率 $= \frac{14}{24}$ $= \frac{7}{12}$	1M 1A -----(5)	給分母 接受答案準確至 0.583

解	分	備註
10. (a) Γ 為 AB 的垂直平分線。	1M	或等價
(b) (i) Γ 的斜率 $= -3$	----- (1)	
AB 的斜率 $= \frac{1}{3}$	1M	
AB 的方程為 $y + 4 = \frac{1}{3}(x - 2)$ $x - 3y - 14 = 0$	1A	
(ii) 留意所求的圓的圓心為 Γ 與 AB 的交點。 求解 $3x + y - 12 = 0$ 與 $x - 3y - 14 = 0$ 後， 所求的圓的圓心的坐標為 $(5, -3)$ 。	1M	
所求的圓的半徑 $= \sqrt{(2-5)^2 + (-4+3)^2}$ $= \sqrt{10}$	1M	$x^2 + y^2 - 10x + 6y + 24 = 0$
因此，所求的圓的方程為 $(x-5)^2 + (y+3)^2 = 10$ 。	1A	
設 (h, k) 為 B 的坐標。 $h - 3k - 14 = 0$ $h = 3k + 14$ 留意 AB 的中點在 Γ 上。 $3\left(\frac{2+3k+14}{2}\right) + \frac{-4+k}{2} - 12 = 0$ 求解後，可得 $k = -2$ 及 $h = 8$ 。 所以， B 的坐標為 $(8, -2)$ 。	1M	$x^2 + y^2 - 10x + 6y + 24 = 0$
所求的圓的圓心的坐標 $= \left(\frac{2+8}{2}, \frac{-4-2}{2}\right)$ $= (5, -3)$		
所求的圓的半徑 $= \sqrt{(2-5)^2 + (-4+3)^2}$ $= \sqrt{10}$		
因此，所求的圓的方程為 $(x-5)^2 + (y+3)^2 = 10$ 。	1A	
	----- (5)	

解	分	備註
11. (a) $\frac{(1)(8) + (2)(5) + (3)(n) + (4)(1)}{8 + 5 + n + 1} = 2$ $n = 6$ 中位數 $= 2$ 四分位數間距 $= 3 - 1$ $= 2$ 方差 $= 0.9$	1M 1A 1M 1A 1A -----(5)	
(b) 留意原本的分佈域為 3。 有兩種情況。 情況 1：該兩名學生各人均擁有 2 部計算機。 該分佈的分佈域 $= 3$ 情況 2：該兩名學生其中一名擁有 1 部計算機，而另一名擁有 3 部計算機。 該分佈的分佈域 $= 3$ 因此，該分佈的分佈域沒有因該兩名學生退學而改變。	1M 1A -----(2)	任何一項 必須顯示理由
12. (a) 設 $f(x) = px^2 + q$ ，其中 p 及 q 均為非零的常數。 故此，可得 $100p + q = 62$ 及 $225p + q = 122$ 。 求解後，可得 $p = \frac{12}{25}$ 及 $q = 14$ 。 由此，可得 $f(x) = \frac{12}{25}x^2 + 14$ 。 因此，可得 $f(5) = 26$ 。	1M 1M 1A -----(3)	給任何一項代換
(b) 藉 (a)，可得 $u = 14$ 及 $v = 26$ 。 故此，可得 $UW = 12$ 及 $VW = 5$ 。 留意 $\angle UWV = 90^\circ$ 。 由此， UV 為 C 的一直徑。 C 的圓周 $= \pi\sqrt{UW^2 + VW^2}$ $= \pi\sqrt{12^2 + 5^2}$ $= 13\pi$	1M 1M 1M -----(4)	給任何一項

解	分	備註
13. (a) 設 $mx+n$ 為所求的商式，其中 m 及 n 均為常數， 則可得 $h(x) = (mx+n)(x^3+5x^2-12x-1)+mx+n$ 。 藉比較 x^4 的係數，可得 $m=3$ 。 藉比較 x^2 的係數，可得 $5n-12m=-16$ 。 故此，可得 $n=4$ 。 因此，所求的商式為 $3x+4$ 。	1M 1M 1A ----- (3)	 任何一項
(b) $h(x)=0$ $(3x+4)(x^3+5x^2-12x-1)+3x+4=0$ (藉 (a)) $(3x+4)(x^3+5x^2-12x)=0$ $x(3x+4)(x^2+5x-12)=0$ $x=0$ 、 $3x+4=0$ 或 $x^2+5x-12=0$ $x=0$ 、 $x=\frac{-4}{3}$ 或 $x=\frac{-5\pm\sqrt{73}}{2}$ 留意 $\frac{-5+\sqrt{73}}{2}$ 及 $\frac{-5-\sqrt{73}}{2}$ 均不是有理數。 再者留意 $\frac{-4}{3}$ 及 0 均為 $h(x)=0$ 的有理根。 因此，方程 $h(x)=0$ 有 2 個有理根。	1M 1M 1M 1A ----- (4)	給 $(px+q)(x^3+5x^2-12x)=0$ 必須顯示理由
14. (a) 設 l cm 為該圓錐體的斜高。 $\pi(14)(l) = 700\pi$ $l = 50$ 該圓錐體的高 $= \sqrt{l^2 - 14^2}$ $= \sqrt{50^2 - 14^2}$ $= 48$ cm	1M 1M 1A ----- (3)	
(b) (i) Y 的體積 $= \frac{1}{3}\pi(14^2)(48)\left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{15+1}}\right)^3\right)$ $= 3\,087\pi \text{ cm}^3$	1M+1M 1A	
(ii) 設 d cm 為每個球體的直徑。 $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{3\,087\pi}{2}$ $d = 21$ 因此，每個球體的直徑為 21 cm。	1M 1A ----- (5)	

解	分	備註
15. (a) 所求的概率 $= \frac{C_2^5}{C_2^9}$ $= \frac{5}{18}$	1M 1A ----- (2)	給分母 接受答案準確至 0.278
(b) 所求的概率 $= \frac{5}{18} + \frac{C_1^5 C_1^4 C_3^9 + C_2^4 C_3^8}{C_2^9 C_3^{10}}$ $= \frac{67}{90}$	1M 1A ----- (2)	給 (a) + p ，其中 $0 < p < 1$ 接受答案準確至 0.744
16. (a) 留意 $p+5p=-a$ 及 $p(5p)=b$ 。 所以，可得 $6p=-a$ 及 $5p^2=b$ 。 故此，可得 $5\left(\frac{-a}{6}\right)^2=b$ 。 因此，可得 $5a^2=36b$ 。	1M 1 ----- (2)	給任何一項
(b) 設 t 為 Q 的 x 坐標， 則 R 的 x 坐標為 $5t$ 。 把 $y=mx$ 代入 $x^2+y^2-6x-12y+20=0$ ，可得 $x^2+(mx)^2-6x-12(mx)+20=0$ 故此，可得 $(m^2+1)x^2-(12m+6)x+20=0$ 。 所以， t 及 $5t$ 均為方程 $x^2-\frac{6(2m+1)}{m^2+1}x+\frac{20}{m^2+1}=0$ 的根 藉 (a)，可得 $5\left(\frac{-6(2m+1)}{m^2+1}\right)^2=36\left(\frac{20}{m^2+1}\right)$ 。 化簡後，可得 $(2m+1)^2=4(m^2+1)$ 。 所以，可得 $4m=3$ 。 求解後，可得 $m=\frac{3}{4}$ 。	 1M 1M 1A ----- (3)	 0.75

解	分	備註
<p>17. (a) 藉正弦公式，可得</p> $\frac{\sin \angle XWY}{XY} = \frac{\sin \angle WYX}{WX}$ $\frac{\sin \angle XWY}{5} = \frac{\sin 70^\circ}{6}$ $\angle XWY \approx 51.54318937^\circ \text{ 或 } \angle XWY \approx 128.4568106^\circ \text{ (捨去)}$ $\angle XWY \approx 51.5^\circ$	<p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (2)</p>	<p>接受答案準確至 51.5°</p>
<p>(b) 設 P 為 Z 在三角形 WXY 上的投影。</p> <p>留意 $PW = PX = PY$。</p> <p>將 XY 的中點記為 M。</p> <p>三角形 WXY 與三角形 XYZ 間的交角為 $\angle PMZ$。</p> <p>通過 W、X 及 Y 的圓的圓心為 P。</p> <p>故此，可得 $\angle MPX = \frac{1}{2} \angle XPY = \angle XWY$。</p> $\begin{aligned} MP &= PX \cos \angle MPX \\ &= PW \cos \angle XWY \end{aligned}$ $\tan \angle PWZ = \frac{PZ}{PW}$ $\tan 30^\circ = \frac{PZ}{PW}$ $PZ = PW \tan 30^\circ$ $\begin{aligned} \tan \angle PMZ &= \frac{PZ}{MP} \\ &= \frac{PW \tan 30^\circ}{PW \cos \angle XWY} \\ &= \frac{\tan 30^\circ}{\cos \angle XWY} \\ &\approx \frac{\tan 30^\circ}{\cos 51.54318937^\circ} \quad (\text{藉 (a)}) \\ &\approx 0.928328501 \end{aligned}$ <p>所以，可得 $\tan \angle PMZ < 1$。</p> <p>由此，可得 $\angle PMZ < 45^\circ$。</p> <p>因此，三角形 WXY 與三角形 XYZ 間的交角不超過 45°。</p>	<p>1M</p> <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (4)</p>	<p>任何一項</p> <p>必須顯示理由</p>

解	分	備註
18. (a) $\frac{\beta}{7} = \frac{7}{\alpha}$ $\alpha\beta = 49$ $\log_7 \alpha\beta = \log_7 49$ $\log_7 \alpha + \log_7 \beta = 2$ $\log_7 \alpha = 2 - \log_7 \beta$	1M 1M 1A	
----- (3)		
(b) $\log_\alpha \beta - \log_7 \beta = \log_7 \beta - \log_\beta \alpha$	1M	
$\frac{\log_7 \beta}{\log_7 \alpha} - \log_7 \beta = \log_7 \beta - \frac{\log_7 \alpha}{\log_7 \beta}$	1M	
設 $u = \log_7 \beta$ 。		
$\frac{u}{2-u} - u = u - \frac{2-u}{u}$ (藉 (a))	1M	給利用 (a) 的結果
$\frac{u^2 - u}{2-u} = \frac{u^2 + u - 2}{u}$		
$\frac{u(u-1)}{2-u} = \frac{(u+2)(u-1)}{u}$		
$u^2 = (u+2)(2-u)$ (由於 $u \neq 1$)		
$u^2 = 2$		
$u = \sqrt{2}$ 或 $u = -\sqrt{2}$ (捨去)		
$\log_7 \beta = \sqrt{2}$		
該等差數列的公差		
$= \log_7 \beta - \log_\beta \alpha$		
$= \log_7 \beta - \frac{\log_7 \alpha}{\log_7 \beta}$		
$= \log_7 \beta - \frac{2 - \log_7 \beta}{\log_7 \beta}$		
$= \sqrt{2} - \frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$	1M	
$= 1$	1A	
----- (5)		

解	分	備註
<p>19. (a) PQ 的斜率</p> $= \frac{t-0}{32-50}$ $= \frac{-t}{18}$ <p>留意 G 的 x 坐標為 25。 PR 的垂直平分線的方程為</p> $y-t = \frac{18}{t}(x-32)$ <p>把 $x=25$ 代入 $y-t = \frac{18}{t}(x-32)$，可得 $y = \frac{t^2-126}{t}$。</p> <p>所以，G 的坐標為 $\left(25, \frac{t^2-126}{t}\right)$。</p> <p>再者留意 R 的 x 坐標為 14。 通過 O 且垂直於 PR 的直線的方程為 $y = \frac{18}{t}x$。</p> <p>把 $x=14$ 代入 $y = \frac{18}{t}x$，可得 $y = \frac{252}{t}$。</p> <p>因此，H 的坐標為 $\left(14, \frac{252}{t}\right)$。</p>	<p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (5)</p>	<p>任何一項</p>
<p>(b) (i) 由於 $\angle PQS = \angle POQ$，可得 $\tan \angle PQS = \tan \angle POQ$。</p> $\frac{50-32}{t} = \frac{t}{32}$ $\frac{18}{t} = \frac{t}{32}$ $t^2 - 576 = 0$ <p>由於 $t > 0$，可得 $t = 24$。</p>	<p>1M</p> <p>1</p>	<p>給任何一邊</p>
<p>(ii) 藉 (a)，G 的坐標為 $\left(25, \frac{75}{4}\right)$。 Q 的坐標為 $(32, 24)$。</p> <p>OG 的斜率</p> $= \frac{\frac{75}{4}-0}{25-0}$ $= \frac{3}{4}$ <p>OQ 的斜率</p> $= \frac{24-0}{32-0}$ $= \frac{3}{4}$ <p>所以，OG 的斜率與 OQ 的斜率相等。 因此，O、G 與 Q 共線。</p>	<p>1M</p> <p>1A</p>	<p>給利用 (a) 的結果</p> <p>必須顯示理由</p>

解	分	備註
<p>由於 OQ 為 $\triangle OPR$ 的中線，所以 Q 為 PR 的中點。 留意 G 為 $\triangle OPR$ 的外心。 所以，可得 $GQ \perp PR$。 $\angle OQP$ $= 180^\circ - \angle POQ - \angle OPQ$ $= 180^\circ - \angle PQS - \angle OPQ$ $= \angle PSQ$ $= 90^\circ$ 故此，可得 $OQ \perp PR$。 由此，可得 $GQ \parallel OQ$。 因此，O、G 與 Q 共線。</p>	<p>1M</p> <p>1A</p>	<p>任何一項</p> <p>必須顯示理由</p>
<p>(iii) 留意 OQ 垂直於 PR 及 $\triangle OPQ \cong \triangle ORQ$。 由此，$OQ$ 為 $\angle POR$ 的角平分線。 所以，I 在 OQ 上。 將由 I 至 OP 的垂足記為 J， 則可得 $\triangle OIJ \sim \triangle OPQ$。 設 r 為 $\triangle OPR$ 的內切圓的半徑。 故此，可得 $\frac{OQ-r}{r} = \frac{OP}{PQ}$。 由於 $OQ = 40$ 及 $PQ = 30$，可得 $\frac{40-r}{r} = \frac{50}{30}$。 求解後，可得 $r = 15$。 由此，I 的坐標為 $(20, 15)$。 再者留意 H 的坐標為 $\left(14, \frac{21}{2}\right)$。 又再留意 O、H、I、G 與 Q 共線。 由於 OQ 為 $\triangle OPR$ 的中線，可得 $PQ = QR$。 所求的比 $= \frac{1}{2}(GH)(QR) : \frac{1}{2}(IQ)(PQ)$ $= GH : IQ$ $= (25 - 14) : (32 - 20)$ $= 11 : 12$</p>	<p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (7)</p>	

試卷二

題號	答案	題號	答案
1.	C (78)	26.	B (40)
2.	C (79)	27.	C (51)
3.	A (72)	28.	D (65)
4.	B (87)	29.	C (75)
5.	A (70)	30.	A (84)
6.	D (77)	31.	B (62)
7.	C (82)	32.	D (64)
8.	D (74)	33.	A (39)
9.	A (43)	34.	B (63)
10.	D (67)	35.	D (32)
11.	B (81)	36.	B (40)
12.	D (39)	37.	D (25)
13.	B (66)	38.	C (50)
14.	B (62)	39.	A (31)
15.	A (50)	40.	A (29)
16.	D (27)	41.	C (33)
17.	B (44)	42.	B (45)
18.	A (59)	43.	C (40)
19.	C (54)	44.	D (60)
20.	A (52)	45.	A (47)
21.	C (34)		
22.	B (42)		
23.	D (38)		
24.	C (58)		
25.	A (56)		

註： 括號內數字為答對百分率。