


T4 腹部外傷

程 序



要 旨

- 一、腹部嚴重外傷是傷患死亡的其中一個主因。由於腹、骨盆腔是人體重要體腔，可以容納大量的體液或血液，一旦其中的臟器或大血管受創破損，可在短時間內造成出血性休克而危害生命。
- 二、腹部外傷在初期症狀可能不明顯，也可能因合併頭部外傷、休克、酒精或非法藥物的影響導致傷患意識不清而無法說明，故不可因腹部沒有出現外傷，就排除腹部外傷之可能；仍須由現場受傷機轉及傷患評估結果來判斷。

註 解

註1>

徵得傷患同意後，可以進行腹部視診與觸診。如果在腹、骨盆臟器的解剖位置發現有體表的傷勢（例如左上腹皮膚有瘀青）及觸診時有明顯的壓痛感或腹部肌肉僵硬（例如左上腹有壓痛感或腹部肌肉僵硬），代表底下的臟器很可能有受傷（可能有脾臟撕裂傷及內出血）。

註2>

可考慮以被單包覆加以固定、骨盆固定帶、KED反穿、大片抽氣式護木包覆。骨盆固定帶僅可用於骨盆環(pelvic ring)骨折。若懷疑為髖部骨折(Hip fracture)或「股骨頭或股骨頸」骨折則不宜使用，應使KED協助搬運。