

病情嚴重度判斷

- (一)初步評估後，若屬危急個案應開始準備送醫，若為非危急個案則可接著做 2 度評估。
- (二)傷病患依下列 4 項指標定義為「危急個案 (ALS case)」
1. 生命徵象指標 (註 2):
 - (1)意識不清 (昏迷指數 <13 分)
 - (2)呼吸每分鐘 ≥ 30 或 <10 次
 - (3)脈搏每分鐘 ≥ 150 或 <50 次
 - (4)收縮壓 ≥ 220 或 <90 mmHg
 - (5)微血管充填時間 ≥ 2 秒

(6)體溫 ≥ 40 或 $< 32^{\circ}\text{C}$

(7)SP02 $< 90\%$

(8)血糖值： $< 60\text{mg/dl}$ （或顯示 low）或 $\geq 500\text{mg/dl}$ （或顯示 high）

(9)發紺

2. 傷病部位指標：

(1)燒灼傷：2 度或 3 度燒傷體表面積 $\geq 18\%$ 、顏面燒灼傷、會陰燒灼傷、吸入性燒灼傷

(2)大量皮下氣腫

(3)手腕或腳踝以上截肢、大而深的傷口

(4)頭、頸、軀幹(含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或開放性傷口

(5)連枷胸

(6)腦組織或內臟外露

(7)頭部或脊椎傷害併肢體癱瘓

(8)長骨開放性骨折

(9)2 處以上長骨骨折（此處所稱長骨指上臂、前臂、大腿或小腿）

(10)骨盆腔骨折

3. 傷病機轉指標：

(1)高處墜落（ ≥ 6 公尺、 ≥ 2 層樓高或兒童身高 2 倍以上之墜落）

(2)脫困時間 ≥ 20 分鐘

(3)身體被車輛輾過（遠端肢體除外）

(4)從車輛中被拋出

(5)其他有高能量撞擊可能之創傷機轉（例如：車速 $\geq 50\text{KM/H}$ 、內部乘員空間凹陷 ≥ 30 公分）。

4. 特殊傷病患及狀況：

(1)疑似急性腦中風（ < 3 或 6 小時且有通報救指中心）

(2)缺血性胸痛發作

(3)突然或近期昏迷

(4)抽搐不止

(5)中毒可能危及生命

(6)急產

(7)情況異常或不穩定之嬰兒或兒童

(8)毒蛇咬傷

註 1：若傷病患同時符合多項危急個案定義，應同時通報救指中心及告知醫院（如疑似急性腦中風合併低血糖）。

註 2：兒童生命徵象正常值參考：

正常範圍	心跳 / 分	呼吸 / 分	血壓 mmHg	體重 Kgs
嬰兒	120 ~ 160	40 ~ 60	$SBP = (\text{年齡} \times 2) + 80$ $DBP = 2/3 \text{ SBP}$	3 ~ 8
學齡前幼兒	100 ~ 120	30 ~ 60		8 ~ 20
學齡兒童	80 ~ 100	20 ~ 30		> 20