

清除呼吸道異物 (<1 歲)

(一)有反應(拍背壓胸法)：

1. 施救者抱著嬰兒坐在椅子或床沿邊，1 手支持嬰兒的下巴、頸部與前胸，手臂放在大腿上，頭比軀幹低，面朝下。
2. 用另 1 手掌根在兩肩胛骨中間用力擊打 5 下。
3. 雙手保護頭頸部，以兩前臂將嬰兒夾在中間，一邊固定並保護嬰兒的頭頸部，一邊將嬰兒翻轉成面朝上姿勢。
4. 以單手掌根給予胸部 5 次推壓，同時要目視是否有異物吐出跡象。
5. 重複 1-4 步驟直到嬰兒無反應或異物被排除為止。若病人意識尚未尚失，且已執行約 4 回合(拍背及腹部推壓)仍無法將異物排除，應考慮送醫。

(二)若異物無法排除且病人無反應時：

1. 當嬰兒無反應後，應打開病人的呼吸道，同時間若發現病人嘴內有可見的固體異物時，應先實施手指清除。
2. 若已被清除後或無可見的固體異物時，給予吹氣 1 次。
3. 若氣吹不進去或胸部沒有升起時，則再次暢通呼吸道並再給 1 次吹氣。
4. 以單手掌根給予胸部推壓 30 次(每分鐘 100~120 次之速度)，同時

要目視是否有異物吐出或阻塞解除的現象。

5. 重複步驟 1~4，直到阻塞解除或已執行 5 循環按壓結束後仍未排除時，立即 CPR 相關處置持續急救。

(三)操作當中發現異物被吐出或阻塞解除的現象時，除非目視病人已顯現出適當的呼吸外，應繼續基本生命急救術之流程給予 2 次的吹氣，然後檢查脈搏。