

袋瓣罩甦醒球人工呼吸（有脈搏且需給予人工呼吸者適用）

25

（一）將氧氣導管連接氧氣筒和甦醒球，打開氧氣筒開關並調整流量為 15 L/min。

(二)將面罩尖端朝傷病患的前額，以適當方式打開並維持「打開呼吸道」之姿勢。

註：若已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道（含氣切管）時，則直接將甦醒球接上。

(三)擠壓甦醒球，每次擠壓 1 秒至有可見之胸部升起。

(四)擠壓速率：

1. 成人：每分鐘 10 次（約 6 秒 1 次）。

2. 兒童或嬰兒：每分鐘 20-30 次（約 2~3 秒 1 次）。

3. 已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道（含氣切管）者，成人每分鐘擠壓甦醒球 10 次（約每 6 秒 1 次），兒童或嬰兒每分鐘擠壓甦醒球 20-30 次（約每 2-3 秒 1 次）。

4. 新生兒（出生後 1 個月內）在擦乾、保暖、擺位及墊肩後，心率每分鐘 60-100 次，以每分鐘 40-60 次的速度擠壓甦醒球，正壓通氣 30 秒。在給予上述步驟後，心率每分鐘仍 < 60 次時，則進行新生兒 CPR（壓胸和吹氣比例為 3：1），此時擠壓甦醒球速率為每次 0.5 秒。