

心肺復甦術（1 歲至青春期）

（一）胸外按壓及強迫給氧：

1. 壓胸者：以目視方式將 1 手掌之根部置於兩乳頭間胸部之中央或中段，另 1 手掌之根部置於前 1 手之上面使雙手重疊及平行，手臂打直，雙肩向前傾至手部之正上方，利用上半身之重量向下按壓，「胸部按壓」操作要領如下：

（1）下壓深度至少胸部前後徑 $1/3$ （大約 5 公分）。

（2）每次按壓後必須放鬆讓胸部全回彈。

（3）壓與放的時間各佔 50%。

(4)按壓速度每分鐘 100-120 次。

(5)每循環按壓 15 下(配合通氣者執行 15：2)，直至 2 分鐘。

(6)按壓至第 10 後再唸出「11、12、13、14、15」，以提醒通氣者準備進行強迫給氧。

(7)俟通氣者擠壓 BVM，第 2 次通氣喊壓「2」時，持續胸外按壓。

2. 通氣者：

(1)取出 BVM，組裝球體及面罩。

(2)吹氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。

(3)在壓胸者進行按壓過程聽到「10……」時，準備將 BVM 罩在病人口鼻並維持呼吸道暢通，俟壓胸者按壓至第「15」次時，擠壓 BVM 2 次(得以拇指與 3 指按壓球體約 1/4)，通氣勿過量。

(4)連接氧氣導管(同時確認儲氣袋已接妥並充滿)，將氧氣調整至 15L/min。

(5)處置過程詢問病史(簡短病史：病人剛剛發生什麼事、這樣的狀態多久了及過去什麼疾病)。

(二)壓胸者原則每 2 分鐘換人。

(三)CPR 2 分鐘後檢查頸動脈搏(評估時間不超過 10 秒)，若有則檢查呼吸及其他生命徵象，若無則繼續 CPR。

(四)3 歲以下之兒童急救過程可考慮墊肩維持呼吸道。