

嬰兒心肺復甦術（不滿 1 歲，新生兒除外）

（一）胸外按壓及強迫給氧：

1. 壓胸、通氣者：以目視方式用兩手環抱嬰兒胸部，兩拇指併攏按壓兩乳頭連線中點正下方的胸骨處；單人急救時，以單手掌根置於兩乳頭間胸部之中央或中段按壓。「胸部按壓」操作要領如下：

（1）下壓深度至少胸部前後徑 $1/3$ （大約 4 公分）。

（2）每次按壓後必須放鬆讓胸部全回彈。

（3）壓與放的時間各佔 50%。

（4）按壓速度每分鐘 100-120 次。

（5）胸部按壓與袋瓣罩甦醒球人工呼吸之比率：1 名急救按壓時為 30：2。2 名急救按壓時為 15：2。。

（6）按壓至第 10 後再唸出「11、12、13、14、15」，以提醒通氣者準備進行強迫給氧。

（7）俟通氣者擠壓 BVM，第 2 次通氣喊壓「2」時，持續胸外按壓。

2. 通氣者：

(1)取出 BVM，組裝球體及面罩。

(2)吹氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。

(3)在壓胸者進行按壓過程聽到「10……」時，準備將 BVM 罩在病人
口鼻並維持呼吸道暢通，俟壓胸者按壓至第「15」次時，擠壓 BVM
2 次(得以拇指與 3 指按壓球體約 1/4)，通氣勿過量。

(4)處置過程詢問病史(簡短病史：病人剛剛發生什麼事、這樣的狀態
多久了及過去什麼疾病)。

(二)完成必要之處置後即可開始做轉送醫院之準備。

(三)CPR 2 分鐘後檢查**股動脈或肱動脈**(評估時間不超過 10 秒)，
若有則檢查呼吸及其他生命徵象，若無則繼續 CPR。

(四)急救過程可考慮墊肩維持呼吸道。