

心肺復甦術（新生兒，出生到第 1 次住院期間）

- (一) 以目視方式用兩手環抱嬰兒胸部，兩拇指併攏按壓按壓兩乳頭連線中點正下方的胸骨處。
- (二) 下壓深度約胸壁厚度的 $1/3$ ，每次按壓後手指不離開胸部，但必須放鬆讓胸部回彈，壓與放的時間各約佔 50%
- (三) 胸部按壓與 BVM 人工呼吸(氧氣)之比例為 3:1。速率是每分鐘總共 90 下按壓及 30 下通氣。
- (四) CPR 約 60 秒後，在通氣之同時應檢查心跳(評估時間不超過 10 秒):
 1. 心跳 <60 次/分，持續 CPR。
 2. 心跳 60-100 次/分，通氣時有胸部起伏，持續正壓通氣 30-60 次/分，直到有自發性呼吸。
 3. 心跳 ≥ 100 次/分，持續正壓通氣 30-60 次/分，直到有自發性呼吸。
- (五) 應開始進行送醫之準備。
- (六) 急救過程可考慮墊肩維持呼吸道。
- (七) 校正通氣(MRSOPA)：

M：面罩(Mask adjustment)，面罩是否適合、漏氣，必要時雙人通氣。

R：擺位(Reposition head)，調整新生兒頭部位置使呼吸道保持通暢或頸部墊肩。

S：抽吸(Suction mouth and nose)，檢查是否需要抽吸(先口再鼻)。

O：暢通(Open mouth)，確保口部開啟，可抬下頷。

P：加壓(Pressure increase)通氣，增加通氣壓力直到有胸部起伏。

A：替代呼吸道(Alternative airway)，放置SGA。