

靜脈注射

- (一)向傷病患解釋執行靜脈注射之原因。
- (二)選擇適當之靜脈輸注溶液，檢查其色澤、清澈度及有效期限。
- (三)選擇適當之點滴管及針頭。
- (四)將控制點滴流速之調速器置於集液腔室之下方並關閉。
- (五)以無菌技術將點滴管插入點滴瓶內。
- (六)將集液腔室充滿 1 半的量，打開調速器(可將點滴管末端保護套移除)，並排除點滴管內之空氣。
- (七)關閉調速器(若剛有移除滴管末端保護套時，將點滴管末端接上保護套)。
- (八)準備黏貼之膠布(以 OP site 為主)，將止血帶綁在欲注射部位之上方位。
- (九)消毒欲注射處周圍至少 3~5 公分之皮膚區域。
- (十)將注射針頭斜面朝上打入血管內(觀察有無回血)。
- (十一)置入留置式膠管。
- (十二)移開止血帶，於注射處約留置式膠管長度之上方，以手指加壓靜脈及留置膠管交接處，同時取出針頭(應丟棄於適當容器)。
- (十三)連接點滴管，將調速器打開，先以較快流速檢視點滴液下降狀況，觀察注射部位是否有腫脹現象。
- (十四)以無菌技術固定針頭及皮膚接觸之點滴管。
- (十五)調整適當之輸注流速。