

急產接生

- (一)將產婦平躺、兩膝彎曲、兩大腿張開之姿勢。
- (二)必要時應給予氧氣。
- (三)確定胎頭已外露。並請產婦用力哈氣、深吸氣。
- (四)打開生產包，並以無菌技術戴上無菌手套。
- (五)將無菌治療巾墊於產婦臀部下方。
- (六)保護胎頭及會陰，但勿用力阻止胎兒產出。
- (七)當胎兒頭頸部已產出時，應注意有無臍帶繞頸，若有則排除之。
- (八)支持胎兒頭頸部，先往下使上方肩部露出。
- (九)再往上使另 1 肩膀露出，並順勢讓胎兒娩出。
- (十)必要時以吸球抽吸口鼻及刺激胎兒。
- (十一)若胎兒有窘迫狀況，則進行胎兒急救；若胎兒無窘迫狀況，則以乾的紗布或被單擦拭胎兒全身，以乾的無菌治療巾包裹胎兒並保暖。
- (十二)產出 60 秒後以 2 個臍帶夾（或兩支止血鉗）夾 2 處臍帶，第 1 處離肚臍 5-10 公分，第 2 處離第 1 處 5-10 公分，完成後將胎兒交給母親，讓母親抱著。
- (十三)胎盤若產出視情況將胎盤帶至醫院交給醫護人員確認其完整性，並觀察產婦有無大出血之情形。